


حياتيات



ڊاڪٽر ڪريم داد پٽافي

پي ايڇ ڊي (انگلينڊ)



سنڌي ٻوليءَ جو با اختيار ادارو

حيدرآباد-سنڌ

سنڌي ٻوليءَ جي بااختيار اداري
پاران سائنسي ڪتابن جي اشاعتي سلسلي جو ڇهون ڪتاب

حياتيات

مصنف:

ڊاڪٽر ڪريم داد پتافي
پي ايڇ ڊي (انگلينڊ)



سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو
حيدرآباد، سنڌ
۱۴۱۴ھ / ۱۹۹۳ع

سنڌي ٻوليءَ جي بااختيار اداري جا سڀ حق ۽ واسطا قائم

سال ۱۴۱۴ھ / ۱۹۹۳ع
هڪ هزار

چاپو پهريون
تعداد

قيمت: ۴۰/- روپيا

پاران ايم ايڇ پنهور انسٽيٽيوٽ آف سنڌ اسٽڊيز، ڄامشورو.

Digitized by M. H. Panhwar Institute of Sindh Studies, Jamshoro.

ملڻ جو هنڌ:

سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو
سنڌ صوبائي ميوزيم نيشنل هاءِ وي
حيدرآباد، سنڌ

۴

مرڪزي ڪتاب گهر نمبر ۹۷۲
گل شاھ محلو، گاڏي کاتو
حيدرآباد، سنڌ
پاڪستان

هي ڪتاب سنڌي ٻوليءَ جي بااختيار اداري جي ڪمپيوٽر تي ڪمپوز ٿيو ۽
اداري پاران اشاعتي نگران امين لغاري النصيب پرنٽرس ڪراچي / حيدرآباد
مان ڇپائي پڌرو ڪيو.

عنوانن جي فهرست

صفحا	عنوان
۶	پيش لفظ
۸	مهاڳ
۱۴	باب پهريون: تعارف
۱۴	علم حيوانات جو ٻين علمن سان واسطو
۱۵	علم حيوانات جون شاخون
۱۸	جانورن جي اڀياس مطابق علم حيوانات جون شاخون
۱۹	علم حيوانات جي اهميت
۲۴	باب ٻيو: سائنس ۽ جاندارن جي دنيا
۲۶	جاندارن جون بنيادي خاصيتون
۳۱	باب ٽيون: پروٽوپلازم
۳۲	پروٽوپلازم جي طبعي حالت
۳۴	پروٽوپلازم جي ڪيميائي بناوت
۳۵	پروٽوپلازم جا غير نامياتي جزا
۳۷	پروٽوپلازم جا نامياتي مرڪب
۴۰	نيوڪليائي تيزاب
۴۳	باب چوٿون: خليا ۽ خلين جو وندجڻ
۴۴	ريڪاميننٽ (گاڙڻ) ڊي اين اي
۴۵	وائرس

۴۷	خلین جو ایاس ڪرڻ
۴۹	خلین جا قسم (پروڪیریوٽ ۽ یوکیریوٽ)
۵۱	خلی جی جوڙجڪ
۵۲	جانورن جو خلیو
۵۴	(i) خلی جی ٻاھرین ڪل
۵۵	(ii) انڊوپلازمڪ ریتیکیولیم
۵۷	(iii) گالجي ڪامپلیڪس
۵۷	(IV) لائسوزوم
۵۸	(V) مائکروٽیبول ۽ مائکروفلامینٽ
۵۹	(VI) مائٽوڪانڊریا
۶۰	(VII) مرڪز (نیوڪلیس)
۶۲	نون خلین جو ٺھڻ
۶۳	خلین جو ونڊجڻ
۶۳	(i) خلین جو یکسان ونڊجڻ وارو عمل
۶۸	(ii) خلین جی ونڊ جو تخفیفی عمل
۷۳	(iii) یکسان ۽ تخفیفی ونڊ ۾ پیٽ
۷۶	باب پنجنون: گیمیٽوجینیسیس
۷۶	اسپریم ۽ آنی جو ٺھڻ
۷۵	(I) اسپریم ٺھڻ جو عمل
۹۰	(ii) آنی ٺھڻ جو عمل
۹۶	باب ڇھون: ڳیجڻ
۹۶	ڳیجڻ جا بنیادی جزا

- ۹۶ اسپرم جي بناوت
 ۹۷ آني جي بناوت ۽ آني جا ٻاهريان ته
 ۹۹ اسپرم ۽ آني جو ميلاپ
 ۱۰۱ باب ستون: ڪروموزوم ۽ انهن جي درجابندي
 ۱۰۳ ڪروموزوم تعداد جي لحاظ کان
 ۱۰۸ ڪروموزوم جي ڊيگهه ۽ بناوت
 ۱۱۰ ماڻهوءَ جي ڪروموزوم جي درجابندي
 ۱۱۵ ڪروموزوم جي بنياد تي جنسن جي سڃاڻپ ڪرڻ
 ۱۱۹ ميون جي مک ۽ ٻين جانورن ۾ جنس جي سڃاڻپ ڪرڻ
 ۱۲۰ ماڻهوءَ ۾ جنسي سڃاڻپ
 ۱۲۳ لفظ ۽ اصطلاح



پيش لفظ

سنڌي ۾ سائنسي مطالعي واري ڪتابن جي گهڻي ڪوت آهي جنهن کي محسوس ڪندي ”سنڌي ٻوليءَ جي بااختيار اداري“ پنهنجي پهرين گڏجاڻي مؤرخه ۴ جولاءِ ۱۹۹۱ع ۾، سائنسي علمن ۽ موضوعن بابت سنڌيءَ ۾ ڪتابن جي تياري ۽ ڇپائي کي اداري جي عملي پروگرام جو هڪ بنيادي مقصد بنايو.

انهيءَ مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ اداري طرفان ڪم جي شروعات ڪئي ويئي آهي اهو ڪم مختلف سطحن ۽ مرحلن تي راس ٿيندو جن مان هڪ سطح اها آهي جو اسڪول، ڪاليج جي شاگردن ۽ عام پڙهندڙن لاءِ عام موضوعن ۽ عام مشاهدي وارين شين بابت عام فهم ٻوليءَ ۾ معلومات مهيا ڪئي وڃي. هي ڪتاب ان سلسلي جي هڪ ڪڙي آهي. جنهن کي اسلام آباد ۾ قائم هڪ سائنسي اداري جي لائق محقق ڊاڪٽر ڪريم داد پتافي مرتب ڪيو آهي. کيس اڳ ۾ ئي سائنسي موضوعن تي لکڻ جو تجربو حاصل آهي.

هن ڪتاب جو موضوع ’جيوت‘ ۽ ان جي بنيادي جزي ”خَلِي“ متعلق آهي. ان سان گڏوگڏ لائق مصنف طبي دنيا جي جديد موضوع ”جينس“ يعني بنيادي موروثي ايڪي کي پڻ بحث هيٺ آندو آهي: خالق حقيقي، انساني جسم جي جوڙجڪ ۽ وڌڻ ويجهڻ ۾ وڏي حڪمت رکي آهي. انساني موروثي خاصيتن جي هڪ نسل کان ٻئي نسل ۾ مٽاسٽا به هڪ نرالو سرشتو آهي. اهي سڀ ڳالهيون هن ڪتاب ۾ بحث هيٺ آنديون ويون آهن.

ستن بابن تي مشتمل هي ڪتاب نه فقط عام پڙهندڙ لاءِ مفيد
ثابت ٿيندو، پر اسڪول ۽ ڪاليج جي شاگردن کي پڻ 'حياتيات'
جي علم کي سمجهڻ ۾ مدد ڏيندو.
ان مقصد لاءِ ڏکيا لفظ ۽ اصطلاح سنڌي ۾ ترجمو ڪري
سمجهايا ويا آهن، جن جي فهرست ڪتاب جي آخر ۾
ڏني وئي آهي.

۲۶ - سيپٽمبر ۱۹۹۳ع ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ

چيئرمين

سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو

مهاڳ

بنيادي طرح ڪتاب لکڻ ۽ ڪتاب اندر سمجھائين سان مواد پيش ڪرڻ مهارت جو ڪم آهي. اڪثر سائنسدان سٺا ليکڪ نه هوندا آهن پر سٺي سائنسدان هجڻ سان گڏ هڪ سٺو ليکڪ هجڻ قدرتي ڳالهه آهي. ڪوشش ڪري پنهنجي وس آهر ٿورو گهڻو لکڻ ضروري آهي. هڪ ماڻهو لاءِ اهو مشڪل آهي ته هو سائنس جي هر مضمون ۾ مهارت رکي، ڇو ته سائنس تمام وسيع مضمون آهي. بهرحال ان جي بنيادي ڄاڻ رکڻ هرو ڀرو مشڪل ڪونهي ۽ ضروري به آهي، ڇو ته اڄڪلهه هڪ سائنس ڪي ٻي کان الڳ ڪرڻ مشڪل آهي. حياتيات پڙهڻ ۽ سمجهڻ لاءِ ننڍي سطح تي ڪيميا، طبعي، حساب ۽ شماريات جو ڄاڻڻ ضروري آهي. هونئن به حياتيات سائنس جو هڪ اهڙو موضوع آهي جنهن جو واسطو هڪ ننڍڙي جيتامڙي کان وٺي هاڻي جهڙن جانورن سان پوي ٿو. انسان ڪي جيئن ته اشرف المخلوق جو درجو حاصل آهي، پر حياتيات جي اصولن مطابق پڻ اعليٰ حيثيت رکي ٿو. اهوئي سبب آهي جو انسان پنهنجي سوچ ويچار ۽ مختلف شين جي ڄاڻ رکڻ جي جستجو جي ڪري چنڊ تي پهچي چڪو آهي.

حياتيات جي کوجنائن ۾ انسان ڪيتريون ئي ڪاميابيون حاصل ڪيون آهن پر اڃان اهي آڱرين تي ڳڻڻ جيتريون آهن. حالانڪ اهميت جي لحاظ کان ڏسجي ته ۱۹۵۳ ۾ ڊي اين اي جي بناوت، هٽرادو جنس ٺاهڻ، جينٽڪ انجنيئرنگ جنهن ۾ ڊي اين اي جو ٽوڙڻ ۽ جوڙڻ، منن پيشابن جي مريضن لاءِ بيڪٽريا ۾ خاص جين

داخل ڪري انسولن جي پيداوار وٺڻ، ٻارن جي واڌ واري هارمون جي پيداوار ۽ ٻين به ڪيترن ئي جينس جي ڪروموزم جي جڳهه ڳولي لهڻ انتهائي اهم ڪاميابيون آهن. پر حياتيات ۾ اڃان به ڪي اهڙا جڳهه آهن جتي انساني دماغ جي پهچ نه ٿي سگهي آهي. مثال طور: هڪ ڳيل خليي مان وڌي پورو جاندار نهن. هڪ جاندار جي واڌ جا پورا تفصيل سندن اسپرم ۽ آنن جي مرڪز ۾ موجود ڪروموزومن جو هجڻ. اسپرم ۽ آنو ايترا ته ننڍا خليا آهن جو ڪنهن سٺي خوردبينيءَ کان سواءِ ڏسڻ ممڪن ئي ڪونهن ۽ خاص طرح سان اسپرم. اهي سڀ اهڙا موضوع آهن جن تي جيتري کوجنا ڪجي گهٽ آهي.

سائنس جي ترقي ۽ عروج کان ڪير به انڪاري ڪونهي پر سائنس کي تجربيجاڻن تائين محدود رکڻ ۾ ڪو خاص فائدو ڪونهي. ڪيترائي تجربا ڪجن ۽ نتيجا وٺجن پر جيستائين اهي عام ماڻهن تائين نٿا پهچن يا، موضوع ۽ مضمون جي ٻين ماهرن تائين نٿا پهچن ته انهن جي ڪا خاص اهميت ڪونهي. سائنس عام ڪرڻ جي ذريعن ۾ ڪتاب لکڻ، رسالن يا اخبارن ۾ مضمون ڇپرائڻ يا وري ريڊيو ۽ ٽي وي تي سائنس جي مختلف مضمونن تي بحث مباحثا ڪرائڻ شامل آهن. ڇپيل مواد جي اهميت انهيءَ ڪري به وڌي وڃي ٿي جو اهو هميشه لاءِ محفوظ ٿي وڃي ٿو. ڪتابن لکڻ جي ضرورت صرف درسي ڪتابن تائين محدود نه هجي پر ان کان وڌيڪ ساڳين مضمونن تي عام ماڻهن جي پڙهڻ لاءِ به ڪتاب لکيا وڃن ۽ اهڙي طرح سان گهڻن ڪتابن لکڻ سان اهو مسئلو به حل ٿي ويندو ته هر پڙهندڙ کي پنهنجي پسند مطابق ڪتاب ملي ويندو. ان سان

گڏ ڪتابن ۾ سمجھائڻون ۽ ٻولي آسان رکي وڃي ڇو ته سائنس عام ڪرڻ لاءِ اهو به ضروري آهي ته عام ماڻهوءَ کي سائنس عام فهم ٻولي ۾ سمجھائي وڃي.

ڪنهن به قوم جي ترقيءَ جو راز سائنس جي ترقيءَ ۾ سمايل آهي جيڪڏهن دنيا جي گولي تي نظر ڦيرائينداسون ته صاف نظر ايندو، ته جن قومن سائنس پنهنجي زبان ۾ لکي آهي سي جلدي ترقي ڪري ويون. مثال طور: جپان ۾ سائنس جا ڪتاب جپاني ۾، انگريزن ۽ آمريڪين وٽ انگريزيءَ ۾ ۽ جرمني ۾ جرمن ٻوليءَ ۾ ملندا. سائنسي تجربن جا اصول ۽ ڍنگ ته ساڳيا آهن پر ٻولي پنهنجي پنهنجي آهي، ٻين لفظن ۾ سائنس ته پوري دنيا ۾ ساڳي آهي پر سمجهڻ لاءِ پنهنجي ٻولي پهريون شرط آهي.

مٿين ڳالهين کي ذهن ۾ رکندي حياتيات تي هي ڪتاب پيش خدمت آهي. هي ڪتاب ڪنهن خاص ڪلاس يا، درجي لاءِ نه لکيو ويو آهي پر حياتيات ۽ خاص طرح سان حيوانات (Zoology) جي شاگردن جن ۾ اسڪولن کان وٺي يونيورسٽين تائين ۽ عام ماڻهو جيڪي حياتيات بابت بنيادي ڄاڻ رکڻ چاهين، انهن لاءِ پڻ مددگار ۽ ڪارآمد ثابت ٿيندو.

ڪتاب ۾ حياتيات بابت بنيادي ڄاڻ مهيا ڪئي وئي آهي ۽ ڪتاب کي ستن بابن ۾ ورهايو ويو آهي. اصل ۾ مواد جي ڪوٽ ته ڪونهي پر لکڻ پڙهڻ، کوجنا ۽ تحقيق ڪرڻ دوران اهو به هڪ اهم نڪتو آهي ته ان جي ڪا حد مقرر ڪري، اتي بيهڻو پوندو آهي ڇو ته سڄي سائنس هڪ ڪتاب ۾ سمائي ڪو نه ٿي سگھجي. ڪتاب جو محور گهڻي ڀاڱي جانورن تي رکيل آهي ۽ ڏنل مواد جا تفصيل

ڪجهه هن طرح آهن: پهرئين باب ۾ حياتيات ۽ حيوانات بابت تعارف ڏنل آهي جنهن ۾ هن مضمون سان واسطو رکندڙ حيوانات جي ٻين شاخن جو ذڪر ڪيو ويو آهي. مختصر طور تي هر شاخ جي وصف ۽ ٻين سائنسي مضمونن سان سندس واسطو پيش ٿيل آهي. باب ٻيو به تعارف سان واسطو رکي ٿو. هن باب ۾ اهو سمجهايو ويو آهي ته حيوانن (جاندارن) متعلق ڄاڻ حاصل ڪرڻ به هڪ سائنس آهي ۽ انهيءَ سان گڏوگڏ اهو به ٻڌايو ويو آهي ته اڄ ڏينهن تائين حياتيات ۾ ڪهڙيون ڪوجنائون ٿيون آهن ۽ انهن ڪوجنائن جي نتيجي ۾ انسان جي زندگي ڪافي آسان ٿي آهي. ٽئين باب ۾ پروٽوپلازم جو ذڪر ٿيل آهي. پروٽوپلازم کي سنڌي ۾ ”زندهه مادو“ يا ”حياتياتي مادو“ به چئي سگهجي ٿو. حياتياتي مادي جو خاص ڪم خليي کي خوارڪ مهيا ڪرڻ آهي. حقيقت ۾ حياتياتي مادو نامياتي ۽ غيرنامياتي مرڪبن جو ڳار آهي. خليي جا اڪثر ڪم حياتياتي مادي ۾ ئي ٿيندا آهن جيئن ”پروٽين جي آميزش“. چوٿين باب ۾ خليي جي بناوت ۽ جوڙجڪ بابت معلومات ڏني وئي آهي ۽ اهو پڻ ظاهر ڪيو ويو آهي ته خليو زندگيءَ جو بنيادي ايڪو آهي، هڪ خليو ڪنهن به جاندار جي بناوتي ڪم جو بنيادي جزو آهي. هن ئي باب جي آخر ۾ خلين جي وندجڻ، نون خلين جي ٺهڻ ۽ انهن جي واڌ بابت تفصيل ڏنل آهن. جنسي خلين، اسپرم ۽ اني جي ٺهڻ ۽ سندن بناوت پنجنين باب ۾ ڏنل آهي. ڳيڄڻ جو عمل ڪيئن ٿو ٿئي، ڳيڙيل آنو ڪيئن ٿو وڌي ۽ اسپرم ۽ آنو هڪ ٻئي جي سڃاڻپ ڪيئن ٿا ڪن جڏهن ته اهي هڪ ٻي ذات جي نر ۽ ماديءَ مان آيل آهن ۽ مختلف جانورن جا اسپرم ۽ آنا هڪٻئي سان ملن ڇو نه ٿا ؟

اهي سڀ تفصيل ڇهين باب ۾ شامل ڪيا ويا آهن.

ڪتاب جي پڄاڻي ڪروموزوم جي تفصيلن سان ڪيل آهي. ڪروموزوم اهڙا جڙا آهن جيڪي ڪيميائي رنگن سان جلدي رنگجي ويندا آهن ۽ خليي جي مرڪز ۾ ئي موجود هوندا آهن. ڪروموزوم ڊي اين اي ۽ پروٽين جا ٺهيل آهن ۽ ڊي اين اي (جينياتي مادو) وري جينس جو ٺهيل آهي جيڪي موروثيت جا بنيادي ايڪا آهن ۽ ڪنهن به خاصيت جو هڪ نسل کان ٻئي نسل تائين پهچائڻ ۽ ظاهر ٿيڻ جينس جي ذميواري آهي. باب جي پڄاڻي جنسي ڪروموزوم ۽ جنس جي تشخيص ۾ ڪروموزوم جي واسطيداري سان ڪئي وئي آهي.

هي ڪتاب سنڌيءَ ۾ سائنسي ڪتابن جي کوٽ کي ته ختم ڪونه ڪري سگهندو پر تعداد جي لحاظ کان هڪ ڪتاب جو واڌارو ضرور ٿيندو. ڪتاب جي ڇپرائڻ جي ذميداري ”سنڌي ٻوليءَ جي بااختيار اداري“ قبول ڪئي آهي ۽ اها زيادتي ٿيندي جيڪڏهن مان هن اداري جي احسان مڃڻ کان انڪاري ٿيان ڇو ته نه رڳو اداري هن ڪتاب جي ڇپائي لاءِ ذميداري قبول ڪئي پر اداري جي چيئرمين ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ صاحب جو همٿائڻ ۽ وڌيڪ ڪتابن لکڻ لاءِ زور ڀرڻ به منهنجي لاءِ پنهنجي صلاحيتن جي مڃوٽيءَ جي مترادف آهي جنهن لاءِ آءٌ سائين جن جو احسان مند آهيان.

ڪريم داد پٽافي
اسلام آباد

۲۳ - سيپٽمبر ۱۹۹۳

حياتيات

باب پهريون

تعارف

علم حيوانات کي انگريزيءَ ۾ زولوجي (Zoology) چئبو آهي، جيڪو يوناني ٻوليءَ جو لفظ آهي ۽ ٻن لفظن کي ملائي ٺاهيو ويو آهي: $Zion = جانور + Logos = بحث$ (معنيٰ جانورن جو علم). علم حيوانات ساهوارن جي ان سائنس جو نالو آهي، جنهن جو واسطو جانورن سان آهي. جيئن نباتات (Botany) يعني وڻن ۽ ٻوٽن جي سائنس. جاندارن جي انهن ٻنهي علمن کي گڏي ”علم حياتيات“ (Biology) چئبو آهي. بايولاجي پڻ يوناني زبان جو لفظ آهي ۽ ٻن لفظن $Bios = زندگي + logos = بحث$ معنيٰ (زندگيءَ جو علم) جو ٺهيل آهي، يا ايئن کڻي چئجي ته جاندار شين جي علم کي ”حياتيات“ چئبو آهي. حياتيات سائنس جي اها شاخ آهي جنهن جي ذريعي ڪنهن به جاندار جي اصليت، جوڙجڪ، ڪم ۽ سندس زمين جي مٿاڇري تي ورڇ جي ڄاڻ حاصل ڪري سگهجي ٿي.

علم حيوانات جو ٻين علمن سان واسطو: سائنسي دنيا ۾ هر هڪ سائنس جو هڪ ٻئي سان گهرو لاڳاپو آهي. جيتوڻيڪ حياتياتي سرشتن جي سمجهڻ لاءِ فزڪس، ڪيمسٽري ۽ ٻين طبعي سائنس جي اصولن کي استعمال ڪري سگهجي ٿو پر ڪي اهڙا به حياتياتي مسئلا آهن، جن کي ظاهر ڪرڻ کان فزڪس ۽ ڪيمسٽري قاصر آهن. حياتياتي مٿا صرف طبعي - ڪيميائي سرشتن کي لاڳو ڪرڻ لاءِ ڪونهن، پر زندگيءَ جا ڪي اهڙا به مسئلا آهن،

جن کي ”علم رياضي“ جي مدد سان حل ڪري سگهجي ٿو. جڏهن ته ڪجهه مسئلا اهڙا به آهن. جن جي سمجهائي رياضي ذريعي نٿي ڏني سگهجي.

حياتياتي سرشتن کي ڪيترن ئي نمونن سان پيش ڪري سگهجي ٿو، ڇاڪاڻ ته سائنس جون ڪيتريون اهڙيون شاخون آهن، جيڪي حياتيات جي اصولن کي ٻين علمن سان ڳنڍين ٿيون. جهڙوڪ: (Palaentology) پيلنٽولاجي يعني پنڊ پهڻ جو علم بايوفزڪس (Biophysics) ۽ بايو ڪيمسٽري (Biochemistry) وغيره.

علم حيوانات جون شاخون: حيوانات جي ڄاڻ رکڻ هڪ اهڙو وسيع علم آهي، جنهن مان ڪو به شاگرد هن علم جي ڪنهن به شاخ ۾ محنت ڪري مهارت حاصل ڪري سگهي ٿو. علم حيوانات جون شاخون هيٺ ڏجن ٿيون:

۱. مارفالاجي (Morphology): جاندارن جي عام جوڙجڪ ۽ بدني بناوت (شڪل شباهت) جي علم کي مارفالاجي چئبو آهي. مارفالاجي جون ٻه شاخون آهن:

(الف): ائنائومي (Anatomy) جاندارن جي جوڙجڪ بابت علم جنهن مطابق کليل اک ذريعي سندن هر انگ ۽ عضو (انڊريون) توڙي ٻاهريون (ڏسي سگهجي.

(ب): هستالوجي (Histology) جاندارن جي خلائن جي جهڳٽن جو علم، جنهن ۾ خللي جي اندرين ۽ ٻاهرين جوڙجڪ اچيو وڃي. ۲. ٽئگزانامي (Taxonomy) علم حيوانات جي اها شاخ جنهن


مطابق جاندارن جي سڃاڻپ سندن مختلف ذاتين جي ترتيب ۽ سندن نالا ڏنا وڃن ٿا.

۳. علم بدن (Physiology) جا اهڙي سائنس جنهن جي ذريعي خبر پوي ته جاندارن جي اندريان عضوا ڪيئن ڪم ڪن ٿا، ماڻهو ڪيئن ٿو کاڌو هضم ڪري ۽ اهي ڪهڙا طريقا آهن جن ذريعي خليا نئون ماس (Protoplasm) ٺاهن ٿا.

۴. امبريولاجي (Embriology) ”علم ٻچوي ڳپ“ هن علم ذريعي اها خبر پوندي آهي ته هڪ مڪمل جاندار ٺهڻ تائين سندس واڌ ڪيئن ٿي ٿئي. ڇاڪاڻ ته اڪثر جاندارن جي زندگيءَ جي شروعات هڪ خليي سان ٿئي ٿي. امبريولاجي جو واسطو انهي هڪ خليي (جنهن کي ڳپيل آڻو = Fertilized egg-Zygote چئبو آهي) جي واڌ کان وٺي شروع ٿئي ٿو ۽ ويندي مختلف عضون ٺهڻ ۽ مڪمل جاندار ٺهڻ تائين جاري رهي ٿو امبريولاجيءَ جو واسطو ان وقت ختم ٿيو وڃي، جڏهن ٻچا پيدا ڪندڙ جانور ٻچا ڄڻين يا پيدا ڪرڻ جي عمر کي پهچن ٿا. يا وري آني اندر جڏهن ٻچو وڌي ٻاهر نڪري ٿو ته، انهيءَ واڌ جو واسطو علم ٻچوي ڳپ سان آهي.

۵. اڪالاجي (Ecology) جاندارن جي رهڻي ڪهڻي بابت علم ته وايومنڊل ۾ هڪ جاندار ٻين جاندارن سان واسطيداري ۾ ڪيئن ٿو رهي، کاڌو ڪيئن ٿو حاصل ڪري، ڪهڙن جاندارن کان ڊڄي ٿو، پنهنجو بچاءُ ڪيئن ٿو ڪري ۽ خراب موسمن ۾ پاڻ کي زنده رکڻ لاءِ ڪهڙا بچاءُ جا طريقا اختيار ٿو ڪري؟.

۶. جينيٽڪ (Genetics) موروثي خاصيتن سان واسطو رکندڙ علم ته هڪ ٻچو پنهنجي پيءُ، ماءُ سان ڪهڙين خاصيتن ۾ مشابهت،



خاڪو ۱. علم حيوانات جون شاخون.

مطابقت ۽ موافقت رکي ٿو ۽ ڪهڙين خاصيتن ۾ ان کان الڳ آهي. جيئن ته جينيٽڪ جو بنياد هڪ بنيادي جزي تي آهي، جنهن کي جينس (Genes) چئبو آهي ۽ جينيٽڪ اصولن مطابق جينس ۽ ڪروموزمس (Chromosomes) جي سکيا حاصل ڪري اهو معلوم ڪري سگهجي ٿو ته اهي جاندارن جي واڌ تي ڪيئن ضابطو رکن ٿا. ۷. ايولوشين (Evolution) علم ارتقا زولوجيءَ جي هن شاخ ذريعي اهو معلوم ٿيندو ته جاندار ڪيترن ئي ارتقائي مرحلن مان گذرندي، اهي سٺيون خاصيتون ڪيئن ٿا سانڍيو اچن، جن جي ڪري هو بهتر زندگي گذاري سگهن ٿا. علم ارتقا جو جاندارن جي اصليت سان واسطو آهي.

۸. پيلنٽولوجي (Palaeontology) پنڊيهن جو علم اهڙو علم جنهن ذريعي گذريل وقت جي جاندارن جي زندگي گذارڻ جي خبر پئجي سگهي. علم ارتقا سان گهرو واسطو آهي. هن علم ذريعي جاندار جيڪي اڄوڪي وقت ۾ يا گهڻو اڳي جيئرا هئا پر هينئر پنڊيهن تي ويا آهن، انهن جي رهڻي ڪهڻي جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو.

۹. زووجرافي (Zoogeography) ”جانورن جي ورڇ جو علم“ هن علم ذريعي اهو سمجهي سگهجي ٿو ته جانورن جي ورڇ زمين جي مٿاڇري تي ڪيئن ٿيل آهي. ڪي اهڙا جانور آهن، جيڪي دنيا جي صرف هڪ ئي حصي ۾ رهن ۽ وڌن ٿا. جيئن ڪيوي (Kiwi) صرف نيوزيلينڊ ۽ آسٽريليا ۾ ئي ملندي آهي.

جانورن جي اڀياس مطابق علم حيوانات جون شاخون:
۱. پروٽوزولوجي (Protozoology) شروعاتي علم حيوانات، اهڙن

جاندارن جو علم جيڪي هڪ خليي جا نهيل آهن، جيئن پروتازا
Protoza (شروعاتي = Proto + جانور = zoa)

۲. هيلمينٿالاجي (Helminthology) پيٽ جي ڪينئن جو علم.

۳. پئراسائيتولاجي (Parasitology) اهڙن جاندارن جو علم جيڪي پنهنجي خوراڪ ٻين جاندارن ۾ اندر يا ٻاهر رهي حاصل ڪندا هجن.

۴. انٽامولاجي (Entomology) جيتن جو علم.

۵. اڪٿيالاجي (Ichthyology) مڇين جو علم.


۶. هرپيٽولاجي (Herpetology) ڏيڏرن، سانڊن، ڪرڙين ۽ نانگن جو علم.

۷. آرٿييالوجي (Orinthology) پکين جو علم.

۸. مئمالاجي (Mammology) ثنائتن جانورن جو علم جنهن ۾ انسان به اچيو وڃي.

علم حيوانات جي اهميت: علم حيوانات هڪ ڏکيو ۽ منجهيل علم آهي؛ ڇاڪاڻ ته سندس واسطو زندگيءَ جي مختلف پهلوئن سان آهي، جنهن ۾ اڃان تائين ڪيترائي اهڙا مسئلا آهن جيڪي حل نه ڪيا ويا آهن. علم حيوانات جي اهميت بابت ڪجهه سبب هيٺ ڏجن ٿا:

۱. جيڪڏهن سائنسي نقطه نگاهه کان ڏٺو وڃي ته ماڻهوءَ جو پيدا ٿيڻ هڪ حياتياتي ميراث آهي. ماڻهو، جانورن جي دنيا جو هڪ حصو آهي ۽ ارتقائي ڳانڍاپن جي پيداوار آهي. زندهه مادن جي ڪري هن جون ڪجهه قوتون محدود ٿيو وڃن، ڇاڪاڻ ته سندس پاڙون حياتياتي پس منظر ۾ ڪتل آهن. ڪوبه خاندان ڪنهن ٻئي خاندان کان الڳ نٿو رهي سگهي. پر سڀ زندگيءَ جي پيچيده ارتقائي ڳانڍاپن سان ڳنڍيل آهن، ٻين جاندارن جي ڄاڻ حاصل ڪري ماڻهوءَ



خاڪو ۲. علم حيوانات جون ڪجهه خاص شاخون.

بابت گهڻو ڪجهه ڄاڻي سگهجي ٿو، ڇاڪاڻ ته سندن جوڙجڪ ۽ ڪم ۾ ڪافي حد تائين هڪجهڙائي آهي.

۲. حيوانات جو علم پڙهڻ ان ڪري به ضروري آهي ته، دوائن جو ڪم، ڏندن جو علم، پالڻ يا نپائڻ، جانورن جو علاج معالجو، کاڌ خوراڪ بابت ڄاڻ، زراعت، مڇين جو علم، ڪڪڙين پالڻ جو علم، پٽ ڪينٺا پالڻ، ماڪيءَ جي مک جي پالنا، جهنگلي جانورن جو بچاءُ، صاف ستري رهڻ جي انجنيئرنگ ۽ ٻيا به ڪيترائي علم-علم حيوانات جي روشنيءَ ۾ سهڻي نموني سان سمجهي سگهجن ٿا ۽ کين گهرائي تائين پهچائي سگهجن ٿو. ميڊيڪل سائنس جي ترقي لاءِ، علم حيوانات جي کوجنائن مان فائدو ورتو ويو آهي. اهڙا تجربا جيڪي ڪن جانورن تي ڪاميابيءَ سان ڪيا ويا آهن، جن مان معلوم ٿيو ته انسان جي ڀلي لاءِ اهي شيون استعمال ڪرڻ سان ڪو جوکو ڪونهي.

۳. علم حيوانات هڪ عملي سائنس آهي، ڇاڪاڻ ته اسان جي ڪيترن ئي ضرورتن جي پورائيءَ جو دارو مدار ٻين جاندارن جي پيداوار ۽ ڪمن تي آهي، جيئٽڪس خوراڪ، ڪپڙا، دوائن جا ذريعا ۽ ٻين ڪيترن ئي تجرباتي ڪمن لاءِ، جيئن جيئٽڪس زولاجي جي هڪ اهڙي شاخ آهي، جنهن سان جانورن جي جينياتي مادي ۾ مت ست ڪري کائڻ سنو نسل وٺي سگهجي ٿو ۽ اها ساڳي ڄاڻ ماڻهوءَ لاءِ به ڪارآمد ٿي سگهي ٿي.

۴. حيوانات جي علم پڙهڻ سان ئي نفسيات ۽ سماجيات جو بنياد پوي ٿو. هن وقت جانورن جي هلت چلت جي ڄاڻ حاصل ڪئي پئي وڃي ۽ اهو ڏٺو پيو وڃي ته ان ۾ ماڻهو جي هلت چلت سان

ڪيتري قدر مطابقت آهي، جيڪو انسان لاءِ ئي فائديمند آهي. جانورن جي سماجي رهڻي ڪهڻي جو علم تمام تيزيءَ سان ترقي ڪندو پيو وڃي ۽ جلد ئي حيواناتي علمن جي شاخ بڻجي ويندو.

۵. جاندارن (جانور ۽ وڻ ٻوٽا) جي ڄاڻ جو شوق هڪ بنيادي شيءِ آهي. پراڻي زماني وارو ماڻهو شطرنج جي اصولن جي پوئواري ضرورت جي ڪري ڪندو هو ۽ هاڻوڪي دور جو ماڻهو وري ذهني سڪون حاصل ڪرڻ ۽ شڪار جي شوق لاءِ انهن شطرنجي اصولن جي پوئواري ڪندو آهي.

۶. جاندار ماڻهوءَ لاءِ فائديمند هئڻ سان گڏوگڏ تمام نقصانڪار به ثابت ٿين ٿا. جيئن مفتخور ڪيڻاڻ (Parasites) ماڻهوءَ کي ۽ سندس پاليل جانورن کي نقصان پهچائن ٿا. ڪيترن ئي جاندارن ۾ بيمارين جا جيوڙا هوندا آهن ۽ ڪجهه جاندار وري اهڙا به آهن، جيڪي پاڻ بيمارين جو سبب بنجن ٿا. جيئن مچرن سان مليريا بخار ٿئي ٿو ۽ ٻين جيتن جو فصلن ۽ ميون کي نقصان پهچائڻ وغيره. اڄڪلهه فصلن کي نقصان پهچائيندڙ جيت سڄي دنيا ۾ زراعت لاءِ مسئلو بڻجي ويا آهن.

۷. ماڻهوءَ سميت سڀئي جاندار، قدرتي هم آهنگي واري اصول ۾ سمايل آهن، جاندار جن ۾ وڻ ۽ ٻوٽا به اچي وڃن ٿا، فطري طرح اهڙا ته هڪٻئي سان ڳنڍيل آهن، جو زندگيءَ جو هڪ چار ٺهيو پيو آهي. اسان لاءِ اهو ضروري آهي ته جاندارن جي ان واسطيداريءَ کي سمجهون.

۸. علم حيوانات جي پڙهڻ سان ماڻهوءَ جون تخليقي صلاحيتون وڌن ٿيون. اها حقيقت هر هڪ سائنس لاءِ هڪ جهڙي آهي پر زندگي بابت ڪنهن به سائنس جي شاخ کي سمجهڻ سان گڏ ماڻهوءَ جي تهذيبي لاڙن کي پڻ سمجهي سگهجي ٿو. ماڻهو جي سوچ ويچار

واري سگهه تي حياتياتي اصولن جو گهرو اثر پوي ٿو، مثال طور : ارتقا جو علم؛ مختلف جبالاجي جي دورن ۾ هڪ جاندار جو مڻجي پيو جاندار ٺهڻ، ماڻهوءَ جي فلسفي، نفسيات، سماجيات، مذهب ۽ ٻين ڪيترن ئي ڳالهين تي اثر ڪيو آهي. علم حياتيات جي پڙهڻ ۾ مزي جي ڳالهه اها به آهي ته ان ۾ وقت بوقت سندس اصولن ۾ ٿيڻ وارا ايندي رهي ٿي. حياتياتي کوجنا لاءِ هڪ عملي طرح تيار ذهن جي ضرورت آهي، پر هن قسم جي علم پڙهڻ ۽ سکڻ لاءِ شوق ۽ ذهني لاڙي کي گهڻي اهميت آهي، ان لاءِ اهو ضروري آهي ته عام معلومات حاصل ڪري اڳتي ڏسون ته زندگيءَ جي رازن ۾ ڇا سمايل آهي.

۹. علم حيوانات پڙهڻ هڪ وندر مثل آهي، هڪ شاگرد اهو چاهيندو آهي ته جيڪر هو هر علم جي ڄاڻ حاصل ڪري. جيڪو مشڪل ضرور آهي، پر ناممڪن نه آهي ۽ حياتيات جي شاگرد کي گهٽ ۾ گهٽ اهو شوق ضروري هوندو ته جيڪر هو تمام گهڻن وڻن، ٻوٽن ۽ جانورن جي نالن کان واقف ٿئي ۽ سندن خاصيتن جي وڌ کان وڌ ڄاڻ حاصل ڪري. جڏهن جاندارن جي جوڙجڪ ۽ سندن ڪم جي باري ۾ پڙهڻ شروع ڪبو ته ائين محسوس ٿيندو ڄڻ ڪو سمنڊ جي ڪناري تي تفريح ٿي رهي آهي. شهرن ۾ رهندڙ عام ماڻهن جي پهچ ۾ اهو ممڪن ڪونهي جو هو سمنڊ ۾ يا سڪيءَ تي رهندڙ سڀني جاندارن کي ڏسي معلومات حاصل ڪري سگهن پر انهن لاءِ اهو ممڪن آهي ته ڪن خاص باغن، جانور گهرن، مڇي خانن ۽ عجائب گهرن ۾ وڃي گهڻي کان گهڻا جاندار ڏسن.

باب ٻيو

سائنس ۽ جاندارن جي دنيا

ڪنهن به شاگرد لاءِ علم حياتيات جي بنيادي جماعتن ۾ داخلا وٺڻ جو هڪ مقصد اهو به ٿي سگهي ٿو ته هو پنهنجي ۽ جاندارن جي دنيا جنهن ۾ اسين رهون ٿا، جي ڄاڻ رکڻ چاهيندو هجي. اسان جي چوڌاري جاندارن جي دنيا آباد آهي ۽ اسين سڀ ان جو حصو آهيون. توهان پنهنجي چوڌاري نظر ڦيرائي ڏسندؤ ته ڪيترن ئي قسمن جا وڻ، ٻوٽا، گل، پکي، جيت، پاليل جانور ۽ ٻيا ماڻهو نظر ايندا. انهيءَ کان سواءِ بيماريون پيدا ڪندڙ ڪيترائي جيوڙا، جن ۾ وائرس (virus) ۽ ٻيا جاندار اچي وڃن ٿا، جهڙوڪ بيڪٽيريا (Bacteria) ۽ پروٽوزوم (Protozoam) جيڪي هڪ خليي وارا جاندار آهن. ماڻهو گهڻو ڪري انهن جاندارن جي ڄاڻ رکڻ جي ڪوشش ۾ رهيو آهي، جيڪي سندس چوڌاري موجود آهن. پهرئين ڳالهه ته هو اهڙن جاندارن جي ڳولا ۾ هوندو آهي جيڪي کيس کاڌي طور ڪم اچي سگهن. جيئن جيئن انسان ۾ سمجهه وڌندي وئي ٿيڻ ٿيڻ هو فطرت جي اڙانگن رازن، سونهن، جاندار ۽ بي جان دنيا جي ڄاڻ رکڻ خاطر پنهنجي جاکوڙ ۽ تپاس مختلف ۽ مؤثر طريقن سان تيز ڪندو ويو. اهوئي سبب آهي جو اڄ انسان هر شعبي سان گڏ زراعتي طريقن ۾ به ڪافي ترقي حاصل ڪئي آهي. اخبارن ۽ رسالن ۾ اهڙن مختلف سائنسي موضوعن تي رپورٽون ڇپنديون رهن ٿيون، جنهن ۾ تجرباتي طور آزمائشي نليءَ ۾ ٻار جي واڌ ڪرائڻ

(Test tube baby)، ماڻهن جي جين (Gene) جي مٽ سٽ ڪرڻ، ماحول جي آلودگي، جينيٽڪ انجنيئرنگ (جينياتي جوڙ ۽ ٽوڙ) ۾ روڪ ۽ ٻار ڪيرائڻ جا مختلف طريقا اچي وڃن ٿا.


علم حياتيات پڙهڻ سان هڪ شاگرد کي خبر پوندي ته سائنس ڇا ٿيندي آهي ۽ سائنسدان ڇا پيا ڪن؟ ڪيترائي ماڻهو اڄڪلهه جي دنياوي مسئلن جي پٺا ٿيڻ جو ڏوهه سائنس تي ڏيندا آهن، انهيءَ ڪري جو انهن ڪڏهن سائنس ۾ دلچسپي نه ورتي آهي. حياتيات پڙهڻ کان پوءِ اهڙن ماڻهن کي سمجهائي سگهجي ٿو، پوءِ اهي والدين، پاڙيسري يا پنهنجا ٻار ڇو نه ڪئي هجن.

سائنسدانن جي بنيادي ڪمن ۾ ڪنهن به مسئلي کي سمجهڻ خاطر ان جي ڄاڻ ۾ واڌارو آڻڻ، اهڙن سببن جي ڳولا ڪن جنهن سان ان مسئلي کي حل ڪري سگهجي، مثال طور: سائنسدانن نقصدار ٻارن جي ڄمڻ لاءِ سندن ڪجهه نقصن جي ڳولا ڪري ورتي آهي. اهڙن ٻارن جي ڄمڻ جو سبب ڪهڙو ٿي سگهي ٿو، جيڪڏهن والدين کي اها خبر پوي ته سندن ايندڙ ٻار لولو لنگڙو ڄمندو ته شايد اهي انهيءَ ٻار کي ڄمڻ کان اڳ ۾ ڪيرائڻ جو فيصلو ڪن، بجاءِ ان جي جو هو انهيءَ جي پالنا ڪري هن کي وڏو ڪن ۽ سڄي عمر جي مصيبت ڪڏهن بهرحال انهيءَ ٻار جي مستقبل جو فيصلو ڪرڻ وارا سندن والدين ئي آهن ۽ ان جو سائنس سان ڪوبه واسطو ڪونهي. سائنسي طريقا اهو ڪونه ٻڌائيندا ته هن مسئلي سبب اهڙو ڄمندڙ ٻار ڪيرايو وڃي. پر اهو ضرور ٻڌائيندا ته ٻار جي لولي لنگڙي ٿيڻ جو سبب ڪهڙو آهي. سائنسي مشاهدن ذريعي اهڙن قسمن جي مسئلن کي سمجهي سگهجي ٿو. اڳڪٿيون


مقرر ٿيل جينيتڪ جي قائدن مطابق ئي ڪيون وينديون آهن.

جاندار جون بنيادي خاصيتون: ٿورو جاندارن جي دنيا تي سوچيو ته اها ڪيڏي نه مختلف آهي، هن ڌرتي تي آسمان سان ڳالهائون ڪندڙ وڻ ۽ انهن جي پٽن تي رهندڙ ۽ پلجندڙ ننڍڙا جيو، وڏا ننڍا سمندڙ ۽ انهن ۾ رهندڙ جانور، جن ۾ مڇيون، بنا ڪرنگي وارا جانور ۽ پاڻي ۾ اڀرندڙ ٻوٽا ۽ آفريڪا جي برٽن ۾ رهندڙ جانور اچي وڃن ٿا.

جيتوڻيڪ درجابنديءَ جي لحاظ کان جاندارن جي دنيا تمام گهڻي مختلف آهي، پر انهيءَ جي باوجود انهن منجهه ڪي هڪجهڙايون به هونديون آهن. وائرس (Virus) کي الڳ ڪري باقي سڀ جاندار هڪ يا هڪ کان وڌيڪ خلين جا ٺهيل آهن. خليا مختلف قسمن جا ٿيندا آهن پر سندن بنيادي جوڙجڪ ۽ ڪيميائي مرڪبن ۾ ڪافي هڪجهڙائي هوندي آهي، اهي جاندار جيڪي صرف هڪ خلي جا ٺهيل آهن. انهن کي (Unicellular organism) چئبو آهي، جڏهن ته هڪ کان وڌيڪ خلين جي ٺهيل جاندارن کي (Multi cellular organism) چئبو آهي. اهڙن قسمن جي جاندارن جا خليا پاڻ ۾ ملي خلين جا جهڳٽا (Tissues) ٺاهيندا آهن ۽ اهي جهڳٽا گڏجي بدن جا مختلف عضوا (organs) ٺاهيندا آهن. انهن خلين جي زندهه رهڻ لاءِ سندن بنيادي ضرورتون ساڳيون ئي آهن جيڪي ڪنهن پوري جاندار جون هونديون آهن. جن ۾ کاڌ خوراڪ، طاقت (شڪتي) ۽ سندن مختلف ڪم ڪار اچي وڃن ٿا. اهي خليا خوراڪ استعمال ڪرڻ کان پوءِ ڪجهه مادو ٻاهر ڪڍندا آهن، جنهن کي ٽوڳ (waste product) چئبو آهي. انهن سڀني کي ملائي



خاڪو ۳. جاندارن جون خاصيتون، ارتقائي تبديلين جو اثر ۽ جانورن جو هڪٻئي کان مختلف ٿيڻ.



خاڪو ۴. هڪ خليي مان هڪ جاندار جو ٺهڻ، سندس نشو و نما ۽
ڪم جي ترتيب

خليجي جو ميٽابولزم (Metabolism) چڻبو آهي. خليجي جي ميٽابولزم (Metabolism) جو ظابطو سندس جينيائي مادي (Genetic Material) تي هوندو آهي. جنهن کي (DNA) ڊي آڪسي رائبو نيوكلائڪ ايسڊ (نيوڪليائي تيزاب) چڻبو آهي. هر جاندار جي شڪل شبيهه جو راز به ان ۾ موجود (ڊي اين اي DNA) تي رکيل هوندو آهي. مثال طور زيتون جي ٻج منجهان زيتون جو وڻ ٿي ٿئي ٿو، تنڊڙيون، تنڊڙيون ٿي پيدا ڪنديون ۽ ماڻهو، ماڻهو ٿي پيدا ڪندا.

هر جاندار ۾ پنهنجي نسل وڌائڻ جو هڪ مخصوص انداز هوندو آهي. نسل وڌائڻ کان اڳ هر جاندار لاءِ اهو ضروري آهي ته هو پاڻ وڌي وڌو ٿئي، جنهن جي لاءِ هن کي کاڌ خوراڪ ۽ طاقت جي ضرورت پوندي. انهيءَ ڪيميائي طاقت جو اصل راز يا مُنڍُ ”سج“ آهي. سج جي روشني، ٻوٽن ۽ وڻن ذريعي انهيءَ ڪيميائي طاقت (Energy) ۾ تبديل ٿي ويندي آهي. جيڪا پوءِ ٻيا جاندار کاڌي طور استعمال ڪندا آهن. وڻن ذريعي طاقت جي هن قسم جي تبديلي واري عمل کي (Photosynthesis) چڻبو آهي.

خليجي جي هڪ ڪيميائي عمل (ساهر ڪڍڻ Cellular Respiration) ذريعي اها طاقت کاڌي جي جزن منجهان نڪري ايندي آهي. اهو ئي سبب آهي جو جاندار جي کاڌ خوراڪ جو دارو مدار وڻن ۽ ٻوٽن تي آهي. ڪجهه اهڙا به جاندار آهن، جيڪي ٻين جاندارن کي کائي پنهنجو جياپو قائم رکندا آهن. جڏهن ڪو وڻ سُڪندو يا جانور مرندي آهي ته ان جو بدن جلدي ڳري مٽي سان ملي ويندي آهي ۽ ٻين ننڍن جيوون (Micro-organisms) لاءِ کاڌ خوراڪ جو ڪم ڏيندي آهي. ٻيا وڻ وري انهن ئي ڳريل مادن کي

کاڌي طور استعمال ڪري وڌا ٿيندا آهن، اهڙي طرح اهو چڪرو پيو ٿرندو آهي.

جاندارن جي دنيا ۾ مختلف قسمن جون مخلوقات اچي وڃن ٿيون ۽ انهن ۾ ايندڙ جاندارن جو ٻين جاندارن سان تمام گهرو ڳانڍاپو آهي. سائنسي مشاهدن ۽ تجربن مطابق هزارين سال اڳ جاندار زمين تي پيدا ٿيا پوءِ انهن منجهان اهي جنسون پنهنجي بقا ۾ ڪامياب رهيون جيڪي وقت ۽ حالتن سان مطابقت رکنديون آيون ۽ باقي ٻيا جاندار ختم ٿي ڌرتيءَ تان مٽيا ويا. جن کي سائنسي لفظن ۾ فنا ٿيڻ (Extinct) چئبو آهي. اهي جاندار جيڪي مختلف تبديلين سان مطابقت رکندي قائم رهيا تن جي چونڊ فطرتي هئي. جنهن کي (Natural Selection) فطرتي چونڊ چئبو آهي. بهرحال اهي تبديليون تمام آهستي آهستي اينديون آهن، ۽ ڪنهن به نئين ذات (Species) جي مخلوق ٺهڻ يا اڀرڻ ۾ اڪثر هزارين سال لڳي ويندا آهن. اڄڪلهه جيڪا به مخلوق ڌرتيءَ جي تختي تي موجود آهي اها فطرتي چونڊ (Natural Selection) جو نتيجو آهي. جيڪا هميشه تبديل ٿيندي رهندي آهي، جيئن موجوده جاندارن ۾ جيڪڏهن ڪا گهٽتائي آهي ته انهن ۾ تبديلي آڻي اهڙا جاندار پيدا ڪجن جيڪي ڪامياب زندگي گذاري سگهن، جن ۾ ماڻهو به اچي وڃي ٿو.

باب ٽيون

پروٽوپلازم (Protoplasm)

پروٽوپلازم يوناني ٻوليءَ جو لفظ آهي ۽ ٻن لفظن کي جوڙي ٺاهيو ويو آهي. پروٽوس Protos معنيٰ پهريون يا شروعاتي، پلازما Plasma معنيٰ جيڪا شيءِ پهريائين وجود ۾ آئي هجي. اٺويه سو چاليهه (1940) ۾ پَرَڪِنجِي (Purkinje) نالي هڪ سائنسدان جانورن جي ٻچوي ڳپ (امبريو Embryo) جي جاندار جزن لاءِ پهريون ڀيرو پروٽو پلازم لفظ استعمال ڪيو. ارڙهن سو پنجٽيهه (1835) ۾ حيوانات جي ماهر ڊيو جاردن (Dujardin) پروٽو پلازم جي اهميت کي تسليم ڪيو. ارڙهن سو ايڪهٺ (1861) ۾ شلز (Schultze) وٽن ۽ جانورن جي پروٽوپلازم ۾ هڪجهڙائي ڏيکاري ۽ اهڙيءَ طرح سان هڪ قسم جو نظريو پيش ڪيو جنهن کي پروٽوپلازم وارو نظريو (Protoplasm theory) جو نالو ڏنو ويو. هن نظريي مطابق جاندار شيون گڏ ٿي هڪ خليو ٺاهينديون آهن، خليي ۾ هڪ مرڪز (نيوڪليس Nucleus) ۽ خليي جي ٻاهرئين ڪل هوندي آهي. شروعات ۾ پروٽو پلازم لاءِ اهو چيو ويندو هو ته اهو هڪ ڪيميائي مرڪب آهي، پر پوءِ مختلف کوجنائن جي نتيجن منجهان پتو ٿيو ته پروٽو پلازم هڪ کان وڌيڪ ڪيميائي مرڪبن جو ٺهيل آهي ۽ هر جاندار يعني وڻن، ٻوٽن ۽ جانورن جي پروٽو پلازم جي بناوت مختلف هوندي پر شايد هر خليي منجهه پروٽو پلازم جي بناوت مختلف هوندي آهي.


تمام گهڻي عرصي تائين پروٽو پلازم ۽ سائٽو پلازم کي هڪ ئي مرڪب تصور ڪيو ويندو هو. بهرحال تازين پروٽن مطابق پروٽوپلازم هڪ شفاف (Transparent) يڪسان (Homogenous) ۽ پاڻياٺ سان گڏ نئين نئين ذرن جو ٺهيل مرڪب آهي ۽ سائٽو پلازم خليجي جي ٻاهرئين ڪل ۽ مرڪز جي وچ واري وٿيءَ ۾ موجود پروٽو پلازم کي چئبو آهي. نيوڪليس ۾ موجود پروٽو پلازم کي نيوڪليوپلازم (Nucleoplasm) چئبو آهي. سائٽو پلازم ۽ نيوڪليو پلازم ٻنهي کي گڏي پروٽو پلازم چئبو آهي.

پروٽوپلازم جي طبعي حالت: پروٽو پلازم مختلف روپن جو هڪ مرڪب آهي جنهن ۾ هلڪي سخت قسم جا جزا پاڻياٺ سان مليل هوندا آهن، جنهن کي ڪولائيڊل سرشتو (Colloidal system) چئبو آهي. ڪولائيڊل (Colloidal) يوناني ٻوليءَ جو لفظ آهي جنهن جي معنيٰ (gluekolla) ڪنور آهي. پروٽو پلازم ۾ ڪيترائي مرڪب هڪ ٻئي سان ڳنڍيل صورت ۾ موجود هوندا آهن ۽ ڪيترائي جزا پروٽوپلازم ۾ اٽڪيل صورت ۾ يا وري ڳنڍيل صورت ۾ موجود هوندا آهن. پروٽوپلازم ۾ موجود جرن کي خاص طرح سان ٻن قسمن ۾ ورهايو ويو آهي.

۱. هائيڊروفيلڪ (Hydrophilic) پاڻيءَ سان ملي ويندڙ جزا.
 ۲. هائيڊروفوبڪ (Hydrophobic) پاڻيءَ سان نه ملندڙ جزا.
- هائيڊروفيلڪ اهي جزا آهن، جيڪي پروٽو پلازم ۾ موجود پاڻيءَ سان مليل هوندا آهن، انهن ۾ ڪاربو هائيڊريٽ (Carbohydrate) پروٽين (Protein) ۽ غير نامياتي لوڻ (inorganic saltes) اچي وڃن ٿا. هائيڊروفوبڪ جرن ۾ اهي مرڪب اچي وڃن ٿا، جيڪي پاڻيءَ سان ميلاپ نه ڪندا هجن يا، پاڻيءَ کان پري ڀڄندڙ يا ٽهي ويندڙ

مرڪب هجن. هن ۾ سٽيا (lipids) يا چرٻي وارا جزا اچي وڃن ٿا. پروٽوپلازم جو هي ڪولائيڊل (Colloidal) ڪنور نما سرشتو يا ته پاڻياٺ يا وري اڌو گابرو سخت روپن ۾ موجود هوندو آهي. اڌو گابري سخت يا هلڪي سخت روپ کي (Gel phase) چئبو آهي، جڏهن ته پاڻياٺ روپ کي (sol phase) چئبو آهي. پروٽوپلازم جي (gel phase) ۾ موجود جزا هڪ ٻئي سان ڪيميائي بانڊن (بندڻن) ذريعي ڳنڍيل هوندا آهن.

ڪيميائي بندڻ



سمجھائي: خاطر ڪيميائي بندڻ ڪيميائي لوئن کي ملائيندڙ ننڍڙي ليڪ ذريعي ڏيکاريا ويا آهن.

جيلفيز (Gel phase) جي مضبوطيءَ جو مدار انهن ڪيميائي بندڻن تي هوندو آهي ۽ سندس طبعي حالت انهن ٻنهي روپن ۾ متجي سڻجي سگهي ٿي. انهيءَ ڦيرڦار واري خاصيت جي ڪري پروٽوپلازم جي شڪل، بيهڪ ۽ بناوت تبديل ٿيندي رهندي آهي. پروٽوپلازم جي بناوت ۽ اصليت لاءِ ڪيترائي رايو ڏنا ويا آهن. جيڪي هيٺ ڏجن ٿا:

۱. ريتيڪولر ٿيوري (Reticular theory): هن نظريي مطابق پروٽوپلازم ڌاڳن جي چار وانگي يا ننڍن فرڙن وانگر بنيادي مادن جو ٺهيل آهي.
۲. اليوولر ٿيوري (Alveolor theory): هن نظريي مطابق پروٽوپلازم ڪيترن ئي اٽڪيل يا ڦاٽل فرڙن جو ٺهيل آهي. جيڪي ڪنهن پاڻياٺ جي گجيءَ جهڙا هوندا آهن.
۳. گرينيولر ٿيوري (Granular theory): هن نظريي مطابق پروٽوپلازم مختلف قد بت جي دائدار مادن جو ٺهيل آهي. جن جي

موجودگي الڳ الڳ دائي وانگر نظر ايندي آهي.

۴. فائبريلر ٿيوري (Fibrillar theory): هن نظريي مطابق پروٽو پلازم

قدرتي طرح تندن يا ڌاڳن جهڙن مادن جو ٺهيل هڪ ڪيميائي مادو آهي.

۵. ڪولائيڊل ٿيوري (Colloidal theory): هن بظريي مطابق

پروٽوپلازم (جيڪو سڀني کان تازو آهي ۽ اليڪٽران خوردبينيءَ جي

مشاهدن کان پوءِ ڏٺو ويو آهي) خليي جي ڪن حصن ۾ باقائدي

ڳار جي شڪل ۾ ۽ ڪٿي وري پاڻياٺ سان گڏيل نيم سختيءَ تي

مائل ذرڙن سان مليل ڪنور نما مادن (Colloidal systems) جو ٺهيل

هڪ ڪيميائي مرڪب آهي.

پروٽوپلازم جي ڪيميائي بناوت: پروٽوپلازم ڪل بيانوي

(۹۲) منجهان اٽڪل چئيهن (۳۶) مادن جو ٺهيل آهي، انهن چئيهن

(۳۶) ڪيميائي مادن منجهان ٻارنهن (۱۲) تمام گهڻي اهميت

(predominant) وارا آهن، جن ۾ ڪاربان (C) هائيڊروجن (H)

نائٽروجن (N) آڪسيجن (O) فاسفورس (P) پوٽاشيم (K) گندرف

(سلفر) (S) ڪلورين (Cl) سوڊيم (Na) ڪئلسيم (Ca) مئگنيشم

(Mg) ۽ لوهم، آئرن (Fe) اچي وڃن ٿا. نوانوي سيڪڙو پروٽو پلازم

مٿين ڪيميائي مادن جو ٺهيل هوندو آهي، جڏهن ته ان ۾ باقي ٻين

ڪيميائي جزن جو مقدار هڪ سيڪڙو هوندو آهي.

پروٽوپلازم ۾ ڪجهه ٻيا به ڪيميائي مادا هوندا آهن، جن جو

مقدار تمام ٿورو يا نه هئڻ جي برابر هوندو آهي. جن ۾ ڪاپر ٽوتيو

(Cu) ڪوٽ Cobalt (Co) مئنگنيز (Manganese) (Mn) جسٽ (Zn)

Zinc آيوڊين (I) مولي بيڊيم (Mb) بوران (Boron) (B) وينيڊيم

Vanadium (Va) ۽ واريءَ جا ذرا سليڪان (Si) Silicon اچي وڃن ٿا.

پروٽوپلازم اندر اهي مٿيان سڀ ڪيميائي مادا غيرنامياتي ۽ نامياتي مرڪبن جي شڪل ۾ هوندا آهن. پروٽوپلازم جا غيرنامياتي (Inorganic) جزا: پروٽوپلازم جا غير نامياتي جزا اڪثر ڪري پاڻي، معدنيات ۽ لوڻياڻ جي شڪل ۾ هوندا آهن.

پاڻي: پروٽوپلازم ۾ موجود ٻين ڪيميائي جزن جي ڀيٽ ۾ پاڻيءَ جو مقدار تمام گهڻو ٿيندو آهي، جيڪو تقريبن پنجهٺ کان اسي سيڪڙو ٿئي ٿو. پاڻي ٻن روپن ۾ موجود هوندو آهي، هڪ ته پاڻي پنهنجي اصل شڪل ۾ ۽ ٻيو ٻين جزن سان گڏيل يا مليل صورت ۾. پروٽوپلازم ۾ پڻجائوي سيڪڙو پاڻي مختلف غيرنامياتي ۽ نامياتي مرڪبن ڳارڻ جي ڪم ايندو آهي. باقي پنج سيڪڙو پاڻي مختلف پروٽين ۽ ٻين ڪيميائي جزن سان ڳنڍيل هوندو آهي.

پروٽوپلازم ۾ پاڻي جي مقدار جي موجودگيءَ جو دارو مدار هر جاندار جي عمر، رهڻي ڪهڻي ۽ غذائي پيچ باهه (Metabolic activity) جي عمل تي هوندو آهي، مثال طور: ٻچوي ڳپ (Embryo) منجهه پاڻيءَ جو مقدار تقريبن اسي کان پڻجائوي سيڪڙو تائين هوندو آهي، جيڪو پوءِ وڏي جاندار ۾ گهٽجي ويندو آهي.

پاڻي غيرنامياتي ۽ نامياتي مرڪبن ڳارڻ لاءِ هڪ بهترين حياتياتي ڳاريندڙ آهي، مثال طور: غير نامياتي مرڪبن ۾ معدنيات آڻا، لوڻياڻ ۽ نامياتي مرڪب (جهڙوڪ: ڪاربوهائيڊريٽ، پروٽين ۽ پاڻي). بهرحال پروٽوپلازم هڪ بهترين معلول ٺاهيندڙ جزو آهي، ڇاڪاڻ ته پاڻي تمام گهڻو گرمي پد برداشت ڪري سگهندو آهي ۽ پاڻي ٺهڻ يا بخار ٺهڻ لاءِ به تعلق مٿاهون گرمي پد گهربل هوندو آهي، جنهن جي

ڪري خليي اندر ايندڙ تمام گهڻين تبديلين جو بچاءُ ٿي ويندو آهي. اهو ئي سبب آهي جو پاڻيءَ جي ڪري خليي جو گرمي پد هڪ ڪرو رهندو آهي.

پاڻي بجليءَ جو تمام بهترين پسرئيندڙ آهي، جنهن ڪري ڪيترن ئي ڪيميائي مرڪبن کي پنهنجي اصل آئن ۾ توڙي ڇڏيندو آهي. خليي اندر پاڻيءَ جي موجودگي انهيءَ لاءِ به ضروري آهي، جو ڪيترن ئي ڪيميائي عملن لاءِ پاڻيائي ماحول جي ضرورت آهي. خليي اندر کاڌي وارن جزن کي هڪ جاءِ تان ٻي جاءِ تائين پهچائڻ ۽ ڦوڳ کي ٻاهر ڪڍڻ به پاڻيءَ جو ڪم آهي.

معدنيات: معدنيات ۾ غيرنامياتي لوڻياڻ اچي وڃن ٿا. جيڪي مٽيءَ جي دڙ ۾ به موجود هوندا آهن. پروٽوپلازم ۾ گهڻو ڪري اهي معدنيات لوڻن جي شڪل ۾ موجود هوندا آهن يا، وري نامياتي مرڪبن سان ڳنڍيل مرڪب جي صورت ۾ موجود آهن. معدنياتي لوڻ پروٽوپلازم ۾ آئن جي صورت ۾ ملندا آهن. آڻا هڪ ائٽم يا ائٽمن جي گروپ جي شڪل ۾ موجود هوندا آهن، جن تي واڌو يا ڪاٽو چارج موجود هوندي آهي. واڌو چارج وارن کي، ائن آئنس (Anions) جڏهن ته ڪاٽو چارج واري کي ڪئٽ آئنس (Cations) چئبو آهي، مثال طور: جڏهن عام لوڻ (سوڊيم ڪلورائيڊ NaCl) کي پاڻيءَ ۾ ڳاريو ويندو آهي ته اهو پنهنجي آئن منجهه ٽٽي پوندو يعني جتي سوڊيم تي واڌو چارج ۽ ڪلورائيڊ تي ڪاٽو چارج هوندي آهي. اهڙا مرڪب جيڪي پاڻيءَ ۾ ڳري وڃن ۽ پنهنجي آئن جي شڪل وٺن ته انهن کي اليڪٽرولائٽ (Electrolyte) چئبو آهي.

جيڪي مرڪب پاڻيءَ ۾ نه ڳرن ته انهن کي ”نان اليڪٽرولائيٽ“ (Non Electrolyte) چئبو آهي. پروٽو پلازم منجهه ٻئي اليڪٽرولائيٽ ۽ نان اليڪٽرولائيٽ موجود هوندا آهن.

پروٽوپلازم جا نامياتي مرڪب: اهڙا ڪيميائي مرڪب جن ۾ ڪاربان (C) ٻين آئن سان مليل هجي جيئن نائٽروجن (N) هائيڊروجن (H) گندرف سلفر (S) سان مليل هجي، انهن کي نامياتي (organic) مرڪب چئبو آهي. پروٽو پلازم منجهه جيڪي خاص نامياتي مرڪب آهن، انهن ۾ ڪاربوهايڊريٽ (Carbohydrates) (جن کي نشاستا چئبو آهي)، چرٻي (سٽپ) (Lipids) پروٽين (Proteins) ۽ نيوڪليائي تيزاب (Nucleic acids) اچي وڃن ٿا.

نشاستا (ڪاربوهايڊريٽ): هي اهڙا مرڪب آهن، جيڪي ڪاربان، آڪسيجن ۽ هائيڊروجن جا ٺهيل هوندا آهن. سڀني جاندارن جي طاقت جو سرچشمو نشاستا ئي آهن. صرف ڪجهه ساون وڻن ۾ ننڍڙن جيوون (Micro-organisms) کي ڪاربوهايڊريٽ جي آميزش ڪرڻ جي لاءِ مشينري هوندي آهي. جيڪي هو سج جي روشني ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ۽ پاڻي جي موجودگيءَ ۾ ٺي ناهي سگهندا آهن. سڀئي جانور، وائرس ۽ بئڪٽيريا، (سائي رنگ جي ٻوٽن کان سواءِ) پنهنجي کاڌ خوراڪ ۽ ڪاربوهايڊريٽ جي گهرج پوري ڪرڻ لاءِ ساون ٻوٽن تي ئي مدار رکندا آهن.

چرٻي: چرٻي نامياتي مرڪبن ۾ اچي ٿي ۽ پاڻي ۾ نٿي ڳري، پر ايٿر (Ether) ڪلوروفارم (Chloroform) بينزين (Benzene) الڪوحل شراب (Alcohol) ۽ پئٿرول ۾ ڳري ويندي آهي. چرٻيءَ

وارن جزن جو ڪم خليائي ميمبرين، هارمون، ۽ حياتين (Vitamin) ناهن ۽ خلين کي طاقت مهيا ڪرڻ آهي، چرپي هائيڊروجن، ڪاربان ۽ آڪسيجن جي ٺهيل آهي.

پروٽين: پروٽوپلازم جي جزن ۾ پروٽين هڪ انتهائي اهم جزا آهن. سڀ پروٽين ڪاربان (C) هائيڊروجن (H) آڪسيجن (O) نائٽروجن (N) جون ٺهيل آهن. پر ڪن پروٽين ۾ سلفر (S) يعني گندرف به مليل هوندو آهي. پروٽوپلازم جي نائٽروجن (N) سلفر (S) ۽ فاسفورس (P) جي گهرج پوري ڪرڻ جو پورو دارو مدار پروٽين تي هوندو آهي. پروٽين، امينواسيد (Amino acid) جون ٺهيل هونديون آهن. ٻه، ٽي يا گهڻي تعداد ۾ امينواسيد ڳنڍجي هڪ پروٽين ٺاهيندا آهن. پروٽين اصل ۾ هڪ امينواسيد جي قطار جو نالو آهي جنهن ۾ مختلف امينواسيد هڪ ٻئي سان ڪيميائي بندن (Peptide Bonds) ذريعي ڳنڍيل هوندا آهن.

انزائيم: پروٽوپلازم ۽ ٻين ڪيترن ئي خليائي جزن ۾ انزائيم موجود هونديون آهن. اصل ۾ انزائيم پروٽين جو هڪ خاص قسم آهي، جن جو ڪم ڪنهن به ڪيميائي عمل ۾ مددگار ٿي ڪم اچڻ ۽ انهيءَ عمل کي تيز ڪرڻ آهي، پر انزائيم تي ڪنهن به قسم جو عمل نه ٿئي. انزائيم تمام گهڻن ڪيميائي عملن ۾ اهم ڪردار ادا ڪن ٿيون، جن ۾ ڊي اين اي (DNA) آر اين اي (RNA) پروٽين جي آميزش ۽ ڪاربوهائيڊريٽ جو ٺهڻ اچي وڃي ٿو.

هارمون: هي تمام اهم نامياتي مرڪب آهن، جيڪي پروٽوپلازم ۾ تمام ٿورڙي مقدار ۾ موجود هوندا آهن ۽ مسينجر آر اين اي (m)

RNA جي آميزش کي باقائدي سان نهڻ ۽ هلائڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪندا آهن. انزائيم جي آميزش ۽ ٻين ڪيترن ئي برقي سرشتن کي باقائدي سان هلائڻ هارمون جو ڪم آهي.

ٻارن جي واڌ ڪرائڻ وارا هارمون (Growth hormone) ايسٽروجن (Estrogen) ٽائراڪسين (thyroxine) ڪارٽيزون (Cortisone) ائنڊروجن (Androgen) انسولن (Insulin) انڊرينو ڪارٽيسون (Adrenocortisone) هارمون سڀئي تمام اهميت وارا هارمون آهن. انهن هارمونن جي آميزش، خلين جي ڳوڙين (گڙين- Glands) منجهان ٿيندي آهي.

ٿڌائڻ جانورن جي جيري جي خلين منجهان هڪ انزائيم گلوڪوس (Glucose) کي گلائي ڪوجن (Glycogen) ۾ تبديل ڪندي آهي. انهيءَ انزائيم جي باقائديءَ آميزش هڪ هارمون انسولن (Insulin) ذريعي ٿيندي آهي ۽ انسولن (Insulin) جي آميزش وري لبلبي جي خلين منجهان ٿيندي آهي.

جيڪڏهن انسولن هارمون گهٽ مقدار ۾ نهندو يا مورڳو نهندو ئي ڪونه ته گلوڪوس جي باقائدي نه رهندي ۽ ماڻهو کي منن پيشابن جي بيماري ٿي پوندي.

جنسي عضون منجهان ائنڊروجن (Androgen) ۽ ايسٽروجن (Estrogen) هارمون پيدا ٿيندا آهن، جيڪي جنسي عضون جي واڌ ۾ مرد ۽ عورت جي ٻين خاصيتن کي نمايان ڪرڻ لاءِ تمام ضروري آهن. اهڙي طرح ننڍن جاندارن ۾ به ڪجهه اهڙا هارمون نهندا آهن جيڪي سندن واڌ لاءِ تمام ضروري آهن، مثال طور: جيتن جي مٿي منجهان هڪ قسم جو هارمون نهندو آهي، جيڪو انهن جي واڌ لاءِ

تمام ضروري آهي.


نيوڪليائي تيزاب: جاندارن جي دنيا ۾ نيوڪليائي تيزابن جو تمام اهم مقام آهي، خليي جي آميزشي عملن جو دارو مدار نيوڪليائي تيزابن تي آهي ۽ پيو ته هڪ پيڙهيءَ کان ٻي پيڙهيءَ تائين موروثي خاصيتن کي پهچائڻ به انهن ئي نيوڪليائي تيزابن جو ڪم آهي، نيوڪليائي تيزاب ٻن قسمن جا آهن:

۱. ڊي اين اي (DNA) ۲. آر اين اي (RNA) : ٻئي نيوڪليائي تيزاب نيوڪليوٽائيڊ (Nucleotide) قطارن جا ٺهيل هوندا آهن ۽ نيوڪليوٽائيڊ وري پينٽوز شگر (ڪنڊ) (Pentose) (deoxyribose) ۽ نائٽروجن ڪاربن، پيورين ڪاربن (purine) ۽ پريميڊين ڪاربن (Pyrimidine) جا ٺهيل هوندا آهن. پيورين ڪاربن ۾ ايڊنين (Adnine) ۽ گوانين (Guanine) ۽ پريميڊين ڪاربن ۾ سائٽوسين (Cytosine) ۽ ٿائيمين (Thymine) اچي وڃن ٿيون.

اهي ڪارون اڪثر ڪري جوڙن جي شڪل ۾ مليل هونديون آهن. جنهن ۾ هڪ پيورين سان هڪ پريميڊين مليل هوندي آهي، جنهن ۾ ايڊنين سڌائين ٿائيمين سان ۽ گوانين سڌائين سائٽوسين سان جوڙي ٺاهيندي آهي.


آر اين اي منجهه وري ٿائيمين ڪار ڪونه ٿيندي آهي، تنهن ڪري ايڊنين سڌائين يورسل (Uracil) ڪار سان جوڙي ٺاهيندي آهي. عام طرح سان هڪ نيوڪليائي تيزاب ڊي اين اي جو وڪوڙيل جوڙجڪ خلين جي مرڪز اندر ڪجهه هيٺين طرح هوندي آهي هن ۾ ٻه تندورا ٿيندا آهن، جيڪي هڪ خاص ترتيب ۾ هڪٻئي سان وڪوڙيل هوندا آهن:

نيوڪليائي تيزاب DAN جي
 بناوت (ڊي اين اي) جون ٻه
 وڪوڙيل تتدون.



ڊي اين اي جي هڪ تتد
 ڊي اين اي جي ٻي تتد

ٿورو تفصيل ۾ ويجهي ته ڊي اين جي ٻنهي تتدن جي جوڙجڪ هيٺين
 طرح هوندي آهي:



P = فاسفورس

S = کنڊ شگر

ناتروجن کارون	G = گئانين
	A = ايڊنين
	C = سائٽسين
	T = ٽائمين

حياتيات جو بنيادي مقصد (Central Dogma) ڪجهه هيئن طرح
ڪم ڪري ٿو.

ڊي اين اي — آر اين اي — پروٽين
هاڻي اهو مدار ڊي اين اي جي ٽڪري تي رکي ٿو ته ان ۾ ڪهڙي
جين سمائل آهي. ڇو ته هر جين جي پيداوار هڪ خاص پروٽين جي
صورت ۾ ٿيندي آهي.

آر اين اي جو جوڙجڪ صرف هڪ تنڊ تي مدار رکي ٿو ۽ خليي
جي مرڪز کان ٻاهر سائٽوپلازم ۾ به موجود هوندو آهي. ائين چئي
سگهجي ٿو ته آر اين اي جا ٽي قسم ٿيندا آهن : مسينجر آر اين اي
(m RNA)، ٽرانسفر آر اين اي (t RNA) ۽ رائبوزومل آر اين اي (r
RNA) ٻئي نيلوڪلياڻي تيزاب (DNA) ۽ (RNA)، پروٽين جي
آمزش ۾ اهم ڪردار ادا ڪندا آهن.

باب چوٿون

خليا ۽ خلين جو وندجڻ

جيئن ته، علم مورثيت يا جينيٽڪس موجوده وقت جي سائنس آهي، انهيءَ لاءِ عام ماڻهن ۾ هن مضمون جي ڄاڻ هئڻ انتهائي ضروري آهي، جينيٽڪ جو اسان جي رهڻي ڪهڻي، نسل جي واڌ، زراعت ۽ زندگيءَ جي ٻين ڪيترين ئي طور طريقن تي تمام گهرو اثر آهي. جينيٽڪس جي هڪ جڳ مشهور سائنسدان ٿيوڊوسيس ڊوبچانسڪي (Theodosius Dobzhansky) جي چوڻ مطابق (علم ارتقا - Evolution) جي سمجهڻ کان سواءِ حياتيات سمجهي نٿي سگهجي. پر موجوده دور ۾ جيڪڏهن ائين چئجي ته ”جينيٽڪس“ سمجهڻ کان سواءِ علم حياتيات جي ڪابه اهميت ڪونهي ته ڪو واڌاءُ نه ٿيندو، جينيٽڪس حياتيات جي هڪ اهم شاخ آهي، جنهن کي سمجهڻ سان مختلف جاندارن جي زندگيءَ جي ڳجهڻ رازن بابت مڪمل ڄاڻ حاصل ڪري سگهجي ٿي.

گريگر مينڊل (Gregor mendel) 1866 ۾ جينيٽڪس جو بنياد وڌو، پر انهيءَ صديءَ جي پڄاڻيءَ يعني (1900) اڻويهين صديءَ تائين، انهيءَ علم جي ڪنهن کي به خبر ڪونه هئي. ويهين صدي جي شروعاتي اڌ دوران آهستي آهستي اها پڪ ٿيندي وئي ته وڏن جانورن جي ارتقا ۾ جينس (Genes) اهم ڪردار ادا ڪن ٿيون، پر جينس (Genes) جي ڪردارن جي تصديق ان وقت ٿي جڏهن ڊي اين اي (DNA) کي موروثي مادو (Genetic Material) مڃيو ويو. ڊي اين اي جي ڪيميائي جوڙجڪ جي ڄاڻ کان پوءِ اها خبر پئي ته

جينس (Genes) ڪيئن ڊي اين اي جي شڪل ۾ هڪ پيڙهيءَ کان پي پيڙهيءَ ڏانهن منتقل ٿين ٿيون ۽ هر پيڙهيءَ ۾ پنهنجو اثر ڏيکارين ٿيون. جينيٽڪ انفرميشن ڊي اين اي جي نيوڪليوٽائيڊ سلسلن (Nualeotide Sequences) ۾ سمایل آهي ۽ پنهنجو اثر امينو ايسڊ سلسلا ٺاهي پروٽين جي ڊي اين اي — آر اين اي — ۽ پروٽين جي شڪل ۾ ظاهر ڪري ٿي. سڀني جاندارن جي هڪ جهڙائي تمام سهڻي نموني سان جينيٽڪ ڪوڊ (Genetic code) جي نيوڪليوٽائيڊ سلسلن ۾ سمایل آهي، اهي نيوڪليوٽائيڊ سلسلا ڊي اين اي جي شڪل ۾ خليي جي مرڪز اندر موجود هوندا آهن، جتان جينيٽڪ انفرميشن ذريعي مرڪز کان ٻاهر امينو ايسڊ سلسلا ٺهندا آهن، جيڪي پاڻ ۾ ڳنڍجي پروٽين جي شڪل وٺندا آهن. سڀني جاندارن؛ بڪٽريا، وڻن، ٻوٽن، جانورن ۽ ماڻهن ۾ پڻ هر هڪ امينو ايسڊ جي ڪيميائي جوڙجڪ ساڳي ۽ هڪجهڙي ٿيندي آهي.

پنئين ڏهاڪي دوران جينيٽيڪس جي ماهرن ڪجهه اهڙي قسم جا طريقا دريافت ڪري ورتا آهن، جن جي وسيلي جاندارن جي ارتقا تجربيه گاهن اندر به ٿي قدم اڳتي سمجهي سگهجي ٿي. تجربيه گاهن اندر هن قسم جا جيڪي تجربا ڪيا ويا آهن، اڳ اهي صرف فطري (Nature) طرح ئي ممڪن هئا.

ريڪامبيننٽ (گاڙڙ) ڊي اين اي (Recombinant DNA) جي تجربن منجهان جينيٽيڪس جي ماهرن اهو ثابت ڪري ڏيکاريو ته، ”هڪ جاندار جون جينس ٻئي جاندار جي جينسن سان پيوند ڪري يا ملائي سگهجن ٿيون.“ جڏهن ته اڳي جينيائي مادي

(DNA) منجه هن قسم جي هٿرادو ڦيرڦار ڪرڻ ممڪن ئي ڪونه هئي. هن قسم جي هٿرادو ميل جول کي پنهنجي مقصد مطابق لاڳو ڪرڻ يعني موروثي مادي (ڊي اين اي DNA) ۾ ڦيرڦار کي علم حياتيات ۾ تمام گهڻي اهميت آهي. اڳي ائين چيو ويندو هيو ته ”اسان کي زندگيءَ جي ڄاڻ آهي“، هاڻي انهيءَ ۾ ٿوري مت ست ڪري سگهجي ٿي ته ”زندگيءَ کي جيئن اسان ٺاهيون ٿا.“

وائرس (Virus): ساهدارن ۾ ننڍڙي ۾ ننڍڙي قسم جا جيوو ”وائرس“ هوندا آهن. اڻويهين صدي جي آخر ڌاري ”وائرس“ دريافت ڪيا ويا. انهيءَ وقت اهو تصور ڪيو پئي ويو ته اهي تمام ننڍڙي قسم جا بيماري پکيڙيندڙ جيوو آهن، جيڪي ٻين جاندارن اندر وڌندا رهن ٿا. وائرس لازمي طرح جانورن ۽ وڻن ٻوٽن تي مفتخور ٿي رهندڙ جيوو (پيراسائيت Parasite) آهن، ۽ پنهنجي نسل وڌائڻ خاطر انهن لاءِ ڪنهن ٻئي جاندار جي خليي اندر گهڙڻ ضروري آهي. جاندارن (جانورن يا وڻن، ٻوٽن) جي خليين کان ٻاهر ”وائرس“ جي واڌ نه ٿيندي آهي.

”وائرس“ جانورن ۽ ٻوٽن جي خليين اندر گهڙي انهن خليين جي مشينري ۾ اهڙي تبديلي آڻيندا آهن جو اهي خليا ٻيا نوان وائرس ٺاهڻ شروع ڪندا آهن. عام طرح سان وائرس کي ساهدار جاندارن ۾ شامل ڪيو ويندو آهي، ڇاڪاڻ ته سندن واڌ ٻين جاندارن جي خليين اندر پنهنجو پاڻ (Self reproduction) ئي ٿيندي آهي.

مختلف وائرس جي شڪل، ڊيگهه ۽ ڪيميائي جوڙجڪ به


مختلف ٿيندي آهي. ۱۹۳۵ ۾ وينڊل ايمر اسٽينلي (Wandell M. Stanley) اهو ڳولي لڌو ته ”وائرس“ پورٽين جي ته اندر هڪ نيوڪليائي تيزاب جا ٺهيل آهن. جانورن ۽ بئڪٽيريا جي وائرس ۾ اڪثر ڪري ڊي اين اي (DNA) ۽ وٽن ٻوٽن جي وائرس ۾ آر اين اي (RNA) ٿيندو آهي. وائرس شڪل ۾ گول، سڌا لڪڻ جي شڪل جا يا، وري هڪ مٿي (Head) ۽ ان سان چنبريل پيچ جي شڪل جا ٿيندا آهن.

جينٽيڪس جي تجربن ۾ استعمال ٿيندڙ وائرس گهڻو ڪري بئڪٽيريا جا وائرس هوندا آهن. بئڪٽيريا جي وائرس کي بئڪٽيريا فاج (Bacteriophage) يا صرف فاج (Phage) چيو ويندو آهي. بئڪٽيريا فاج جو مطلب آهي بئڪٽيريا کي ڪائيندڙ وائرس. هن قسم جا وائرس جڏهن بئڪٽيريا جي ٻاهرين ڪل تي لڳندا آهن ته پنهنجو نيو ڪليائي تيزاب (ڊي اين اي DNA) بئڪٽيريا اندر موڪلي ڇڏيندا آهن پر پروٽين ته بئڪٽيريا جي مٿاڇري تي رهجي ويندو آٿن، اهو وائرس بئڪٽيريا جي مشينري (ڊي اين اي DNA) ۾ ڦير گهير آڻي ڇڏيندو آهي. اهڙي طرح سان ٿوري ئي عرصي اندر تقريباً ۲۰ منٽن ۾ اهو بئڪٽيريا انهيءَ وائرس جا ٻيا نوان وائرس ٺاهڻ شروع ڪندو آهي. بئڪٽيريا جي ٻاهرين ڪل ڦاٽڻ تي ڪافي تعداد ۾ اهي وائرس ٻاهر نڪري ايندا آهن، ۽ وري اهي وائرس ٻئي بئڪٽيريا کي لڳڻ شروع ڪندا ۽ اهڙيءَ طرح اهو سلسلو جاري رهندو.

خلین جو ایپاس ڪرڻ

اڪثر خليا (Cells) تمام ننڍڙا ٿيندا آهن ۽ خوردبينيءَ سان ئي ڏسي سگهبا آهن. انهيءَ ڪري ئي سترهين صديءَ جي آخر تائين ڪنهن به ڪو جيوو خليا ڪونه ڏٺو هيو. رابرٽ هوڪ (Robert Hooke) پهريون سائنسدان هيو جنهن ديال جي پنڃيءَ (Cork) جا سنهڙا پتري جهڙا چلر ٺاهي انهن کي خوردبيني ۾ ڏٺو ته ڪارڪ مختلف پاڻن (يونٽس Units) ۾ ورهايل جوڙجڪ جو ٺهيل هيو ۽ اهي يونٽ سنهڙن پردن ۾ ورهايل هيا. هن انهن پاڻن کي (Cellula) جو نالو ڏنو. جنهن جي معنيٰ آهي تمام ”ننڍڙيون ڪوٺڙيون“ هوڪ (Hooke) اصل ۾ زنده خلين لاءِ ڪارڪ ڪونه پئي ڏنو، پر اهي خال جتي اڳ ۾ زنده خليا موجود هيا، آخر ڪار، ڪارڪ جي خانن، جنهن کي هن (Cellula) سڏيو. انهن کي اڳتي هلي جيوو خلين (Cells) جو نالو ڏنو ويو. انهيءَ دوران ڪجهه سائنسدان تمام ننڍڙين شين کي ڏسڻ لاءِ ڪنهن سٺي خوردبينيءَ ٺاهڻ جي جستجو ۾ لڳل هيا، ۽ پهريون سائنسدان اينٿان وين ليون هوڪ (Anton Van Leeuwenhock) هو جنهن مرد جا جنسي خليا يعني ”اسپرم“ ۽ رت جا خليا اهڙي خوردبيني ذريعي ڏٺا. اهڙي طرح سٺن خوردبينين ٺهڻ کان پوءِ ڪيترائي ننڍڙا جيوو (Micro-organisms) ڏٺا ويا.

جرمنيءَ جي ٻن سائنسدانن ميٿاس جيڪب شيلڊن ("1839")
(Mathias Jacob Schleiden) نباتات جو ماهر ۽ ٿيوڊر شوان ("1839")
(Theoder Schwann) حيوانات جو ماهر هيٺئين نتيجي تي پهتا ته



خاڪو ۵. خلين جي بنيادي اهميت.

”سڀ جاندار، خلين جا ٺهيل آهن“ هن راءِ کي سيل ٿيوري (Cell theory) جو نالو ڏنو ويو ۽ مٿين ٻنهي سائنسدانن کي اهو نظريو (Cell Theory) ڏيڻ جو اعزاز حاصل آهي. لوئس پاسچر "Louis Pasteur" ۽ روڊولف ورجو (Rudolf Virchow) ٻنهي سائنسدانن هن نظريي ۾ اهو وڌارو ڪيو ته جاندارن جا خليا اڳ ۾ موجود خلين منجهان ئي ٺهندا آهن.

خلين جا قسم

جيئرو خليا ٻن قسمن جا ٿيندا آهن:

۱. پروڪيريوت خليا (Prokaryote cells)

۲. يوڪيريوت خليا (Eukaryote cells)

۱. پروڪيريوت خليا (Prokaryotes Cells)

(بئڪٽيريا ۽ بلو - گرین الجي ”سيور“)

(Bacteria and Blue Green Algae)

پروڪيريوت ننڍڙي قسم جا خليا آهن، جن ۾ بئڪٽيريا ۽ بلوگرين الجي (سيور) اچي وڃن ٿا. بئڪٽيريا شڪل ۾ گول، لکڻي ڇاپ يا ويڙوئي (Spiral) جي شڪل جا ٿيندا آهن. هنن ۾ خليائي ڪل (Cell membrane) جي ٻاهران هڪ سخت قسم جو تھ ٿيندو آهي، جنهن کي سيل وال (Cell wall) چئبو آهي. سيل وال وٽن جي خلين ۾ به موجود هوندي آهي پر جانورن جي خلين ۾ سيل وال ڪونه ٿيندي آهي ٻين لفظن ۾ سيل وال ۽ سيل ميمبرين خلين ۾ مختلف گلون آهن. بئڪٽيريا ۾ جينيٽڪي مادو (Genetic material) صرف هڪ ڪروموزم جي شڪل ۾ هوندو آهي. بئڪٽيريا ۾

مرکز جي ڪل ڪونه ٿيندي آهي، مرکز جي ڪل ڪروموزوم کي خليي جي ٻين جزن کان الڳ ڪندي آهي. بئڪٽيريا ۾ مائٽو چانڊريا (Mitochondria) ۽ ڪجهه ٻيا جزا به ڪونه ٿيندا آهن. ڪجهه بئڪٽيريا جهڙوڪ اشريشيا ڪولاءِ (Escherichia coli) يا عام طرح اي ڪولاءِ (E.coli) جيڪي ماڻهوءَ جي آنڊي ۾ ٿيندا آهن ۽ نمونيا ڪندڙ بئڪٽيريا (Pneumococcus pneumoniae) جينيٽڪ جي تجربن ۾ تمام گهڻي انداز ۾ استعمال ڪيا ويندا آهن.

بلوگرين الجي سيور (Blue green Algre) ۾ خليائي پٽ ته ٿيندي آهي پر مرکز جي ڪل ڪونه ٿيندي آهي. بئڪٽيريا جي پٽ ۾ بلوگرين الجي (سيور) اڪيلي خليي جي شڪل ۾ نه پر ڪيترن ئي خلين جي مڇي جي صورت ۾ ملندا آهن. بئڪٽيريا ۽ بلورين الجي سيور جي واڌ سندن ڪروموزوم جي پيڻي ٿيڻ کان پوءِ ٿيندي آهي. جانورن ۽ وڻن ٻوٽن جي خلين جي جوڙجڪ ۾ به ڪجهه فرق هوندو آهي.

۲. يوڪيريوت Eukaryotes : يو Eu معنيٰ سٺو، ڪيريوت Karyote (نيوڪليس) مرکز. اهڙا خليا جن ۾ مڪمل ۽ سائٽوپلازم کان الڳ مرڪز هجي. يوڪيريوت ۾ سواءِ بئڪٽيريا ۽ بلو - گرين الجي جي ٻيا سڀئي خليدار جاندار اچي وڃن ٿا. يوڪيريوت خلين ۾ مرڪز هڪ الڳ ڪل ذريعي، خليي جي سائٽوپلازم کان الڳ ٿيل هوندو آهي، جنهن کي نيوڪليئر ميمبرين (Nuclear membrane) چئبو آهي. مرڪز اندر به يا ٻن کان وڌيڪ ڪروموزوم ٿيندا آهن. يوڪيريوت جا ڪروموزوم هڪ قسم جي پروٽين سان ويڙهيل هوندا آهن، جن کي هستونس (Histones) چئبو

آهي. انهيءَ کان علاوه يوڪيريوت ۾ ٻيا به ڪجهه ڪمپوننٽ ٿيندا آهن، جيڪي پروڪيريوت ۾ نه ٿيندا آهن، جن جو تفصيلي ذڪر هيٺ ڏجي ٿو.

خليي جو جوڙجڪ: علم حياتيات جو بنيادي متو، سيل ٿيوري (Cell Theory) تي ٻڌل آهي جنهن مطابق:

۱. سڀئي جاندار هڪ يا هڪ کان وڌيڪ خلين جا ٺهيل آهن.
۲. سڀئي خليا، اڳي موجود خلين منجهان ٺهندا آهن.
۳. موروثي مادا (Genetic Material) هر خليي جي ڪروموزوم ۾ بند، مرڪز اندر موجود هوندا آهن.
۴. جاندارن جي بدن ۾ مختلف ڪيميائي عمل سندن خلين ذريعي ۽ خلين اندر ٿيندا آهن.


خليا جاندارن جي بدن جا بنيادي جزا آهن. اهي مختلف شڪلين ۽ مختلف ماپ جا ٿيندا آهن خلين جي شڪل ته ڪيترن ئي قسمن جي ٿي سگهي ٿي، باقي سندن ماپ ۽ ڊيگهه ۱ کان ۱۰۰ مائڪرو ميٽر کان مٿي نه ٿيندي آهي، ڪجهه جاندار صرف هڪ خليي جا ٺهيل هوندا آهن جن کي يونيسيلولر (Unicellular) چئبو آهي، ۽ ٻيا جاندار وري ڪيترن ئي خلين جا ٺهيل هوندا آهن جن کي ملٽي سيلولر (Multicellular) چئبو آهي. هڪجهڙي قسم جي خلين جا ڇڱا جن جو ڪم ساڳيو ئي هجي انهن کي تشو (Tissue) يا خلين جو جهڳٽو چئبو آهي.

ماڻهوءَ جو بدن، هڪ اندازي مطابق (Billion 60,000) سٺ هزار بلين خلين منجهان ٺهيل آهي. جيڪي سڀ جا سڀ هڪ خليي (گڀيل آني) منجهان ٺهندا آهن. گڀيل آنو پهريائين ٻن خلين، پوءِ ڇئن،

ان کان پوءِ اٿن، سورنهن ۽ اهڙي طرح وڌيڪ خلين ۾ ونڊجڻو ويندو آهي. آخر ۾ اهڙي حد تي پهچندو آهي جتي انهيءَ خليي جو مڇو نهي پوندو آهي جنهن کي پڇوي ڳپ امبريو (Embryo) چئبو آهي ۽ انهي طرح سان ئي ماڻهوءَ جو پڇوي ڳپ ٺهندو آهي. سڀني جانورن جي (امبريو) پڇوي ڳپ ۾ شروعاتي واڌ هڪ ئي قسم جي ٿيندي آهي. شروع ۾ عام قسم جا خليا ۽ پوءِ اسپيشلائيزڊ (Specialized) خاص قسم جا خليا ٺهندا آهن. مخصوص يا خاص خلين جي ٺهڻ کي (خليائي تبديلي) سيلولر ڊفرنٽيشن (Cellular Differentiation) چئبو آهي. خاص خلين ۾ ماس ٺاهيندڙ خليا تنهن ۽ رت ٺاهيندڙ خليا ۽ بدن جي مختلف سرشتن کي هلائيندڙ خليا اچي وڃن ٿا.

جانورن جو خليو: خوردبيني ۾ جيڪڏهن جانورن جي هڪ خليي کي ڏسبو ته ان ۾ ڪي جزا نمايان (Organelles) نظر ايندا. جن ۾ خليي جي ٻاهرئين ڪل جيڪا خليي کي ٻين ٻاهرين شين کان الڳ ڪري ٿي ۽ خليي جي سلامتي به برقرار رکي ٿي، خليي جي ٻاهرئين ڪل ۽ ڪل اندر موجود جزن (ڪمپوننٽ) کي گڏيل صورت ۾ پروٽوپلازم (Protoplasm) چئبو آهي. خليي اندر گهڻي ۾ گهڻو جيڪو نمايان جزو (ڪمپوننٽ) آهي اهو (مرڪز) نيوڪليس آهي جنهن کي خليي جو مرڪز به چئبو آهي. مرڪز ۾ موجود جزن کي گڏيل صورت ۾ نيوڪليوپلازم (Nucleoplasm) چئبو آهي. خليي جي مرڪز کي الڳ ڪل ٿيندي آهي جيڪا کيس خليي اندر مرڪز کي پروٽوپلازم کان الڳ ڪندي آهي. هن مرڪز جي عمل کي نيوڪليئر ميمبرين (Nuclear membrane) نيوڪليائي ڪل چئبو

آهي. خليي جي نقل و حرڪت کي ضابطي هيٺ ڪرڻ سندس مرڪز جو ڪم آهي ڇو ته خليي جي تمام سرشتن کي ضابطي هيٺ ڪندڙ مادو جنهن کي موروثي مادو (ڊي اين اي Headitary material - DNA) چئبو آهي، مرڪز ۾ موجود هوندو آهي. خليي اندر مرڪز ۽ ٻاهرئين ڪل جي وچواري پروٽوپلازم کي سائٽو پلازم (Cytoplasm) چئبو آهي. اهڙيءَ طرح پروٽوپلازم ٻن حصن ۾ ورهايل هوندو آهي. هڪ نيوڪليو پلازم (Nuclcoplasm) ۽ ٻيو سائٽو پلازم (Cytoplasm) .



جيڪڏهن هڪ خليي کي هڪ عام خورد بينيءَ هيٺان ڏسبو ته ، سڀ نمايان طور تي نظر ايندڙ (جزا) ته نظر ايندا پر وڌيڪ تفصيل سان ڪونه ڏسي سگهبا، جيڪي اليڪٽران خورد بيني ذريعي ئي ڏسي سگهجن ٿا.


خليي اندر ڪجهه نمايان طور تي نظر ايندڙ (جزن) جو احوال هيٺ ڏجي ٿو، جن ۾ :

۱. خليي جي ٻاهرئين ڪل (Cell Membrane)
۲. اندو پلازم ڪ ريتيڪيولم (Endoplasmic reticulum)
۳. گالجي ڪامپليڪس (Golgi complex)
۴. لائسوزوم (Lysosomes)

۵. مائڪرو ٽيبل ۽ مائڪرو فلامينٽ (Microtubule and Microfilament)

۶. مائٽو ڪانڊريا (Mitochondria)

۷. نيوڪليس (مرڪز) (Nucleus)



شڪل ۱. خليي جي اندروني بناوت.

۱. خليي جي ٻاهرين ڪل: خليي جي ٻاهرين ڪل کي پلازما ميمبرين (Plasma Membrane) چئبو آهي، پلازما ميمبرين جو ڪم خليي جي شڪل کي برقرار رکڻ ۽ ٻاهران اندر ايندڙ ۽ اندران ٻاهر ويندڙ ڪيميائي جزن کي باقائدي سان هلائڻ آهي، انهن ڪيميائي جزن منجهان ڪجهه جزا ته تمام تيزيءَ سان ۽ ڪجهه وري آهستي

آهستي اچي وڃي سگهندا آهن. انهيءَ چرپر جو دارومدار گهڻي قدر ڪيميائي جزن جي جوڙجڪ تي آهي.

پلازما ميمبرين، ٽن تنهن جي ٺهيل آهي، ٻاهريان ته پروٽين جا ۽ وچون ته چرٻيءَ جي ذرڙن (Fat and lipids) جو ٺهيل هوندو آهي. ڪڏهن ڪڏهن پلازما ميمبرين کي يونٽ ميمبرن (Unit Membrane) به چئبو آهي، ڇو ته سندس جوڙجڪ هر هر، سڄي خليي جي چوڌاري ساڳي نموني ڦرندي رهندي آهي. پلازما ميمبرن جي انهيءَ هڪ جهڙي جوڙجڪ علم حياتيات جي ماهرن کي مونجهارن ۾ وجهي ڇڏيو آهي، ڇو ته انهيءَ ڪل منجهان ڪجهه جزن جي چرپر ته آزادي سان ٿئي ٿي. پر ڪن کي وري خليي اندر داخل ٿيڻ کان روڪي ڇڏي ٿي، جڏهن ته سندس جوڙجڪ سڄي خليي ۾ هڪجهڙي آهي سواءِ انهيءَ جي ته ڪي ڪمپوننٽ ۾ ٿلها ته ڪي سنها ٿين ٿا سندن پروٽين ۽ چرٻيءَ جي جزن ۾ به ڪجهه گهٽ وڌائي هوندي آهي. اهڙي سبب آهي جو پلازما ميمبرين جي جوڙجڪ لاءِ هڪ نئون ماڊل پيش ڪيو ويو، جنهن کي ”فلئڊ موزڪ ماڊل“ (Fluid Mosaic Model) جو نالو ڏنو ويو. هن ماڊل مطابق پروٽين ڪمپوننٽ، وچين ته اندر گهريل هوندا آهن ۽ انهيءَ پروٽين ڪمپوننٽ جو ڪم ڪن خاص جزن کي چرپر جي اجازت ڏيڻ آهي.

۲. انڊوپلازمڪ ريٽيڪيولم: سائٽو پلازم اندر سنهڙيون ناليون (جن رستي ڪيميائي جزن جي چرپر ٿئي) ٺاهيندڙ ڪمپوننٽ (جزن) کي ”انڊوپلازمڪ ريٽيڪيولم“ چئبو آهي، انڊو پلازمڪ ريٽيڪيولم ٻن قسمن جي ٿيندي آهي، هڪ ڪهري قسم جي جنهن

کي رڦ انڊوپلازمڪ ريٽيڪيولم (Rough Endoplasmic reticulum) ۽ ٻئي لسي قسم جي انڊوپلازمڪ ريٽي ڪيولم جنهن کي سموٿ انڊوپلازمڪ ريٽيڪيوليم (Smooth Endoplasmic Reticulum) چئبو آهي. ڪهري انڊوپلازمڪ ريٽيڪيولم تي رائبوزوم (Ribosome) جا ننڍڙا ذرڙا موجود هوندا آهن ۽ انهن رائبوزوم جي ذرڙن ڪري ئي هن قسم جي انڊوپلازمڪ ريٽيڪيولم کي ڪهري انڊوپلازمڪ ريٽيڪيولم چئبو آهي. رائبوزوم پورين جي آميزش (Synthesis) ۾ اهم ڪردار ادا ڪندا آهن. رائبوزوم انڊوپلازمڪ ريٽيڪيوليم کان الڳ، سائٽوپلازم ۾ موجود هوندا آهن، جن کي آزاد رائبوزوم (Free ribosome) چئبو آهي. ڪهري انڊوپلازمڪ ريٽيڪيولم، انهن خلين اندر تمام گهڻي مقدار ۾ موجود هوندي آهي، جيڪي پاڻ وڌندا آهن ۽ پڻ اهڙن خلين ۾ جيڪي پروٽين جي آميزش ڪندا آهن.

مثال طور: لبلبي (Pancreas) جا خليا، جيڪي هڪ قسم جو پروٽين ٺاهيندا آهن، جنهن کي انسولن (Insulin) چئبو آهي، انهن خلين ۾ ڪهري انڊوپلازمڪ ريٽي ڪيولم تمام گهڻي مقدار ۾ ٿيندي آهي.

لسي انڊوپلازمڪ ريٽيڪيوليم سان رائبوزوم ڳنڍيل ڪونه هوندا آهن، لسي انڊوپلازمڪ ريٽيڪيوليم انهن خلين ۾ تمام گهڻي ٿيندي آهي، جيڪي اسٽيرائڊ (Steroid) هارمون ۽ چرٻيءَ جا ذرڙا ٺاهيندا آهن، مثال طور: جنسي هارمون (Sex hormone) لسي انڊوپلازمڪ ريٽي ڪيولم اڪثر ڪري چرٻيءَ جي ذرڙن ٺهڻ ۽ گڏ ڪرڻ (Storage) ۾ خاص ڪردار ادا ڪندي آهي.

۳. گالجي ڪامپليڪس: گالجي ڪامپليڪس، هڪجيتري ويوٽيءَ وارن تنهن جو ٺهيل هوندو آهي. انهن تنهن جي وچ ۾ ڪجهه وٿيون ٿينديون آهن جن کي سسٽرني (Cisternae) چئبو آهي. سسٽرني اندر ڪجهه پاڻيائون ٿينديون آهن ۽ هڪ پاسي تي ٿوريون ڏوڙيون هونديون آهن انهيءَ ڪري ڪامپليڪس هڪ پاسي وٺيل (Concave) نظر ايندو آهي. هر هڪ گالجي ڪامپليڪس ۾ تقريباً پنجن کان ٽيهن تائين سسٽرني هونديون آهن. گالجي ڪامپليڪس جو ڪم، خليي اندر ٺهندڙ ڪيميائي جزن کي ڪجهه مخصوص تنهن ۾ بند ڪري نيڪال ڪرڻ آهي، اڪثر ڪري خليي اندر ڪيميائي جزا ٺاهڻ ڪهري انڊوپلازمڪ ريتي ڪيولم جو ڪم آهي، پر ڪجهه مادا گالجي ڪامپليڪس ۾ به ٺهندا آهن. ڪهري انڊوپلازمڪ ريتيڪيولم منجهان اهي جزا ٺهي پوءِ گالجي ڪامپليڪس ۾ ايندا آهن، جتي انهن جزن کي ڪيميائي طرح ڳنڍڻ ۾ بند ڪري خليي جي ٻاهرين ڪل منجهان نيڪال ڪيو ويندو آهي. گالجي ڪامپليڪس، جڏهن چستيءَ سان ڪم ڪندي آهي ته سسٽرنيءَ جي چيڙن منجهان اهي ڪيميائي طرح ٺهيل ڳنڍڻيون آهستي آهستي پلازما ميمبرين ڏانهن هلنديون وينديون آهن. خليي جي نئين ڪل يا نئين پلازما ميمبرين ۽ لائيسوزوم ٺاهڻ به گالجي ڪامپليڪس جو ڪم آهي.

۴. لائيسوزوم: جيتوڻيڪ لائيسوزوم، گالجي ڪامپليڪس جي سسٽرني (Cisternae) جي چيڙن تي ٺهندا آهن پر ڪجهه لائيسوزوم انڊوپلازمڪ ريتي ڪيولم منجهان ٺهندا آهن. لائيسوزوم هڪ ته اندر ويڙهيل ڳنڍڻ جي شڪل ۾ هوندا آهن ۽ انهن اندر انزائيم

(Enzyme) موجود هونديون آهن. اهي انزائم ڪيترن ئي ڪيميائي جزن سان ڪيميائي عمل ڪري انهن کي ڳاري ڇڏينديون آهن. مثال طور: ڪجهه خلين ۾ وائرس بئڪٽيريا ۽ ٻيا مادا پنهنجو پاڻ اندر اچي ويندا آهن، پوءِ اهي وائرس يا بئڪٽيريا هڪ وائڪيول (Vacuole) جنهن اندر ڪجهه مخصوص پاڻيانون موجود هونديون آهن ۾ بند ٿي ويندا آهن. هڪڙو پيرو جڏهن اهي وائرس ۽ بئڪٽيريا سائٽوپلازم ۾ اچي ويا ته پوءِ اهي لائسوزوم سان ڳنڍجڻ شروع ٿي ويندا آهن. لائسوزوم جون انزائم انهن وائرس، بئڪٽيريا ۽ ٻين مادن کي ڪيميائي عمل ذريعي ڳاري ختم ڪري ڇڏينديون آهن. ماڻهو جي رت جي سفيد خلين (White Blood Cells) ۾ لائسوزوم تمام گهڻي تعداد ۾ موجود هوندا آهن ۽ انهيءَ ڪري اهي خليا مؤثر طريقي سان انهن ڌارين جزن (Foreign Particles) کي ختم ڪري ڇڏيندا آهن. رت جي سفيد خلين ۾ بيماريون پيدا ڪندڙ جيوڙن کي ختم ڪرڻ ۾ پڻ تمام گهڻي اهميت رکن ٿا.

لائسوزوم جون انزائم، خليي جي سائٽوپلازم ۾ موجود ٻين جزن کي به ڳاري سگهن ٿيون ۽ اهوئي سبب آهي جو هڪ خليي اندر پراڻن جزن جي جاءِ، نوان ٺهيل جزا وٺندا آهن. ڪڏهن ڪڏهن لائسوزوم جون انزائم پوري خليي کي به ختم ڪري ڇڏينديون آهن ۽ تباهه ٿيل خلين جي جڳهه نوان خليا وٺندا آهن. انهيءَ عمل کي حياتيات ۾ خاص اهميت حاصل آهي.

۵. مائڪروٽبيل ۽ مائڪرو فلامينٽ: خليا پنهنجي شڪل شبيهه بدلائيندا رهندا آهن، خليائي جزا، خليي اندر چرپر ڪندا رهندا آهن ته خليا پاڻ به چرپر ڪندا رهندا آهن. انهيءَ چرپر

جي ذميداري مائڪروٽيبيول ۽ مائڪرو فلامينٽ تي آهي. مائڪرو فلامينٽ پروٽين جا ٺهيل هوندا آهن ۽ سوس کائي سگهندا آهن، جيئن خليائي جرن جي چرپر تي سگهي. اهي مشڪن جي خلين اندر تمام گهڻي انداز ۾ ٿيندا آهن. مائڪرو ٽيبيول جي جوڙجڪ ڪجهه پيچيده آهي. اهي تيرهن خانن تي مشتمل گلوبولر پروٽين جا ٺهيل هوندا آهن. مائڪرو ٽيبيول جي چرپر ڪيميائي تبديلين ڪري ٿيندي آهي ۽ انهن جو واسطو فليجيل (Flagella) ۽ سليا (Cilia) سان آهي، جيڪي ڪيترن ئي هڪ خليدار جاندارن (Unicellular) جي چرپر جا عضوا ٿي ڪم ڪندا آهن.

مائڪرو ٽيبيول، جو واسطو خليي جي سينٽريول (Centriole) سان به هوندو آهي. سينٽريول، خليي جا اهڙا جزا آهن، جيڪي جانورن جي خلين ۾ ته موجود هوندا آهن پر وڏن وڻن جي خلين ۾ ڪونه ٿين. هڪ سينٽريول جي ڪل ستاويھه (۲۷) مائڪرو ٽيبيول جي ٺهيل هوندي آهي، جن جي ترتيب نون سیتن ۾ هوندي آهي ۽ هر هڪ سیت ۾ ٽي مائڪرو ٽيبيول موجود هوندا آهن. سينٽريول، خلين جي وڻجڻ ۾ ڪم ايندا آهن.

۶. مائٽوڪانڊريا: مائٽوڪانڊريا = پاور هائوس (طاقت گهر). مائٽوڪانڊريا خليي جو طاقت گهر (پاور هائوس) آهن. انهن ۾ خاص قسم جون انزائم موجود هونديون آهن. جن جو ڪم کاڌي جي جرن کي ڳاري انهن منجهان طاقت پيدا ڪرڻ آهي، هن عمل کي سيلولر ريسپائريشن (Cellular respiration) چئبو آهي. خليا، مائٽوڪانڊريا ذريعي پيدا ڪيل طاقت کي ڪيترن ئي نمونن سان استعمال ڪندا آهن، جنهن ۾ خلين جي چرپر، پاڻيانون پيدا ڪرڻ ۽

خلین جي ونڊجڻ وغيره جا ڪم اچي وڃن ٿا. اُهي خليا جيڪي پنهنجي ڪمن ۾ چست هوندا آهن، انهن ۾ مائٽوڪانڊريا جو تعداد به گهڻو ٿيندو آهي مثال طور؛ مشڪن جي خلين اندر گلينڊس (Glands) جي خلين جي پيٽ ۾ مائٽو ڪانڊريا جو تعداد وڌيڪ هوندو آهي.

مائٽوڪانڊريا هڪ قسم جي گل ۾ بند ٿيل ڳوٺريءَ جي شڪل جا ٿيندا آهن. ٻاهريون ته ٻن حصن جو ٺهيل هوندو اٿن. سندن تهن ۾ بند وٿين کي ليومن (Lumen) چئبو آهي، ۽ ليومن ۾ هڪ اڌو گابرو سخت قسم جو مادو ميٽرڪس (Maix) موجود هوندو آهي، مائٽوڪانڊريا جي ٻاهرين گل سنئين سڌي هوندي آهي. پر اندرين ميٽرڪس وڪڙيل (Folded) هوندي آهي. ميٽرڪس (Matrix) جي وڪڙن (Folds) کي ڪرسٽي (Cristae) چئبو آهي ۽ اهي صرف مائٽوڪانڊريا ۾ ئي ٿينديون آهن ڪيترن ئي قسمن جون انزائيم مائٽوڪانڊريا جي اندرئين ته تي موجود هونديون آهن، مائٽوڪانڊريا جي شڪل تبديل ٿيندي رهندي آهي، پر ڪرسٽي ڪري سندن سڃاڻپ جلدي ٿي ويندي آهي.

۷. مرکز (نيوڪليس): خليي اندر وڏي ۾ وڏو ۽ نمايان طور تي نظر ايندڙ ڪمپوننٽ (جزو) خليي جو مرکز (Nucleus) آهي. جينيتيڪ موروثي مادو، خليي جي مرکز ۾ موجود هوندو آهي، جنهن ڪري خليي جي ڪارڪردگي ۽ ان جي جوڙجڪ تي مرکز (نيوڪليس) جو ضابطو هوندو آهي. مرکز سائٽوپلازم کان هڪ گل (جنهن کي نيوڪليئر ميمبرين (Nuclear Membrane) چئبو آهي) ذريعي الڳ ٿيل هوندي آهي پر مرکز جي ٻاهرين گل انڊوپلازمڪ

ريٽيڪيولم سان ڳنڍيل هوندي آهي. مرڪز جي ڪل ۾ سنهڙا سنهڙا سوراخ هوندا آهن، جن رستي خليي ۾ ٺهندڙ جزن جي چرپر سائٽوپلازم ڏانهن هلندي رهندي آهي. مرڪز اندر ڪيترائي سنهڙا گرينيول (Granules) هوندا آهن، جيڪي پاڻ ۾ ڳنڍيل هوندا آهن ۽ انهن کي ڪرومٽين ڌاڳا (Chromatin Threads) چئبو آهي. (ڪرومو Chromo = رنگ - Color) خلين کي جڏهن ڪجهه رنگن (Dyes) سان عمل ڪرائبو آهي ته انهن ڪرومٽين ڌاڳن تي ڪيميائي عمل ڪرڻ سان رنگ چڙهي ويندو آهي. خليا جڏهن وندجڻ جي عمل ۾ داخل ٿيندا آهن ته اهي ڪرومٽين ڌاڳا آهستي آهستي ٿلها ٿيڻ لڳندا آهن، ڪرومٽين جي انهن ٿلهن ڌاڳن کي ڪروموزوم (Chromosome) چئبو آهي. ڪرومٽين ڌاڳا اصل ۾، هڪ نيوڪليائي تيزاب، جنهن کي ڊي اين اي (DNA) ڊي آڪسي رائبو نيوڪليائي ايسڊ (Deoxyribo nucleir Acid) چئبو آهي، جي تندن جا ٺهيل هوندا آهن، جيڪو جينيائي (موروثي) مادو آهي، جنهن سان ڪجهه پروٽين به ڳنڍيل هوندا آهن. ڪرومٽين ڌاڳا ايترا ته سنهڙا ٿيندا آهن جو اليڪٽران خوردبيني سان به انهن کي ڏسڻ مشڪل هوندو آهي، ڪڏهن ڪڏهن مرڪز ۾ ڪرومٽين ڌاڳن جو ”مڇو“ نظر ايندو آهي جنهن کي هيٽرو ڪورمٽين (Heterochromatin) چئبو آهي. تازين کوجنائن مطابق هيٽرو ڪرومٽين، ڊي اين اي جا اهي ٽڪرا به معلوم ڪيا ويا آهن جيڪي (تمام سست ۽ ناڪاره) ڪنهن به ڪم جا نه) هوندا آهن، ٻين لفظن ۾ ائين ڪٿي چئجي ته ڪرومٽين ٻن قسمن جي آهي هڪ هيٽروڪرومٽين

(Hetrochromatin) جيڪا سست هوندي آهي ۽ ٻي يوڪروميٽن (Euchromatin) جيڪا تمام چست هوندي آهي.

مرڪز اندر ڪجهه ٻيا به هڪ يا هڪ کان وڌيڪ ڪمپوننٽ هوندا آهن، جن کي نيوڪليولاءِ (Nucleoli) چئبو آهي نيوڪليولاءِ پروٽين جي آميزش ۾ ردل هوندا آهن.

اصل ۾ نيوڪليولاءِ، هڪ نيوڪليائي تيزاب، آر اين اي (RNA) (Ribonucleic Acid) جون ڳنڍڻيون آهن، جيڪي گرينولر (Granular) ۽ ڌاڳن (Fibrous) جهڙن پروٽين سان ڳنڍيل هونديون آهن. اهڙو آر اين اي جيڪو پوءِ زائوزوم (Ribosome) ۾ تبديل ٿئي، اصل ۾ نيوڪليولاءِ منجهان ئي ٺهندو آهي.

سائنسدانن، اهڙي قسم جا سٺا مشاهدا ڪري ورتا آهن جن وسيلي اها پروڙ پوي ٿي ته خليي اندر سلسليوار هلندڙ عمل ڪروموزوم جي ڊي اين اي کان شروع ٿين ٿا. جن ۾ نيوڪليولاءِ (Nucleoli) جو واسطو به رهي ٿو، ۽ آخر ۾ اهي عمل پروٽين جي آميزش سان ڳنڍيل هوندا آهن، ۽ پروٽين جي آميزش سائٽوپلازم ۾ ٿيندي آهي. (ڊي اين اي ۽ آر اين اي جو مختصر احوال باب ٽئين ۾ ڏنل آهي.)

نون خليا جو ٺهڻ

خليا ٻن قسمن جا ٿيندا آهن، هڪڙا اهي جيڪي وندجن ۽ وڌن ڪونه ٿا، انهن کي بدن جا خليا يعني سوماتڪ خليا (Somatic cells) چئبو آهي، ۽ ٻيا وندجندڙ خليا يعني جنسي خليا (اسپرم ۽ اُنو) جن کي گيميٽ (Gamete) به چئبو آهي.

خلين جي وندجڻ يا نون خلين ٺهڻ جو عمل ٻن قسمن جو ٿيندو آهي، هڪ اهو جنهن ۾ سندن ڪروموزوم جو تعداد وندجڻ کان پوءِ به ساڳيو رهي يا، ائين ڪڍي چئجي ته هڪ خليي منجهان ٻن هڪجهڙن خلين جي ٺهڻ واري عمل کي مائيٽوسس (Mitosis) چئبو آهي. خلين جي هڪ ٻئي مان وندجڻ واري عمل کي ميٿاسس (Meiosis) چئبو آهي. هن عمل ۾ هڪ خليي منجهان چار خليا ٺهندا آهن ۽ هر خليي ۾ ڪروموزوم تعداد سندن اصلي خليي جي اڌ برابر هوندو آهي مثال طور: ماڻهوءَ جي اسپرم يا، آني ۽ بدن جي ٻين خلين ۾ ڪروموزوم جو تعداد چاٿيتاليهه (۴۶) هوندو آهي. پر بدني خلين منجهه ته وندجڻ جو عمل ٿئي ٿي ڪونه. اسپرم ۽ آنو جيڪي هڪ قسم جي جنسي خلين منجهان ٺهندا آهن. اسپرم ٺهڻ واري عمل کي (Spermatogenesis) ۽ آني ٺهڻ واري عمل کي (Oogenesis) چئبو آهي. اهي جنسي خليا وندجڻ کان پوءِ ئي آني يا اسپرم ۾ تبديل ٿيندا آهن ۽ وندجڻ دوران سندن ڪروموزوم جو تعداد اصل خليي جي ڪروموزوم جي اڌ برابر هوندو آهي. ڪروموزوم جي انهيءَ تعداد جي تبديليءَ يعني اڌ ٿيڻ کي هاپلوڊ نمبر پوري تعداد کي ڊائپلوڊ نمبر چئبو آهي.

خلين جو وندجڻ

خلين جو يڪسان وندجڻ وارو عمل (Metosis):
وڻن جي خلين ۾ به جزا، جانورن جي خلين کان مختلف هوندا آهن. جن جي بنياد تي انهن کي جانورن جي خلين کان الڳ ڪري سگهجي ٿو.

۱. سيل وال (Cell Wall) خلياتي پٽ خليي جي ٻاهرئين ڪل جو هڪ تهه آهي ۽ هيءُ سيل وال جو تهه جانورن جي خلين ۾ ڪونه ٿيندو آهي.

۲. ڪلوروپلاسٽ (Chloroplast) پنن جو اهو سائو مادو آهي جنهن وسيلي سج جي روشني ۾ ٻوٽا پنهنجو ڪاڌو ٺاهيندا آهن، هن عمل کي فوٽو سينٿيسس (Photosynthesis) يا آميزشي عمل چئبو آهي.

هڪ خليي (Unicellular)، وارا جاندار مائيٽوسس (Mitosis) طريقي سان ئي پنهنجي نسل جي واڌ ڪندا آهن. گهڻن خلين جي ٺهيل جاندارن جي واڌ لاءِ پهريائين سندن جنسي خليا (Reproductive cells) (نر ۽ مادي خليا) (Sperm and Egg cells) پاڻ ۾ ملي زائگوٽ (Zygote) ٻڍ ٺاهيندا آهن ۽ پوءِ مائيٽوسس ذريعي پورو جاندار ٺهندو آهي. مائيٽوسس (Mitosis) سڀني نيوڪليائي خلين ۾ هڪ جهڙي ٿيندي آهي. ٻن مائيٽوسس جي وچواري ڏاڪي يا، اسٽيج کي بيٺل اسٽيج (Resting stage) يا وچوارو عرصو انٽرفيز (Interphase) چئبو آهي. هن ڏاڪي دوران خلين ۾ وندجڻ جو ڪو به عمل ڪونه ٿيندو آهي.

خلين جي واڌاري وارو چڪرو: خليو پنهنجي وندجڻ واري عمل پوري ٿيڻ سان انٽرفيز جي "GI" فيز ۾ داخل ٿيندو آهي، جيڪو خليي جي واڌ جو ڏاڪو آهي. جيڪڏهن انهيءَ خليي کي ٻيهر وندجڻو آهي ته اهو خليو "GI" کان 'S' فيز ۾ داخل ٿيندو جنهن دوران سندس نيوڪليائي تيزاب "ڊي اين اي (DNA) ٻيٺو ٿي ويندو. "S" کان پوءِ اهو خليو "G2" فيز ۾ هليو ويندو، ۽ 'G2'

کان سڌو "M" فيز ۾ داخل ٿيندو جنهن دوران سندن وندجڻ وارو عمل ٿيندو 'G', 'S' ۽ 'G2' سڀ انٽر فيز جا ڀاڱا آهن.

باقِي هن اسٽيج دوران خليا پنهنجا مختلف ڪم ڪندا آهن. نيڪليائي تيزاب ڊي اين اي (DNA) جي واڌ يا ٻيڻو ٿيڻ (DNA Duplication) به هن ڌاڪي دوران ٿيندو آهي.


خلين جو وندجڻ مائيٽوسس (Mitosis) ذريعي ٿي ٿيندو آهي ۽ اصل ۾ مائيٽوسس (Mitosis) هڪ لڳاتار عمل آهي، پر سائنسدانن پنهنجي سهوليت ۽ سمجهڻ خاطر هن کي چئن "حصن" ڌاڪن ۾ ورهايو آهي:

۱. پروفيز اسٽيج Prophase Stage

۲. ميٽافيز اسٽيج Metaphase Stage

۳. اناٽافيز اسٽيج Anaphase Stage

۴. ٽيلوفيز اسٽيج Telophase Stage



شڪل ۲. خلين جي واڌاري وارو چڪرو.

■ پروفيز اسٽيج: پهريان يا شروعاتي خليي اندر موجود هر هڪ ڪروموزوم پروفيز ۾ انٽر فيز کان پوءِ ٿي داخل ٿيندو آهي ۽ هر ڪروموزوم ٻن ڪرومٽيڊ (Double chromatid) جو ٺهيل هوندو آهي ۽ انهن ٻنهي ڪرومٽيڊ ۾ ڊي اين اي (DNA) هوندو آهي. ٻئي

ڪروميٽڊ هڪ ڊي اين اي (DNA) جي ڳنڍ (ڊير سان وڌندڙ يا، ٻيڻو ٿيندڙ ڊي اين اي DNA) ذريعي ڳنڍيل هوندا آهن، جنهن کي سينٽروميئر (Centromere) چئبو آهي. جيئن ئي ڪروموزوم پهرين ڏاڪي ۾ داخل ٿيندا تيئن ئي انهن جي ڊيگهه گهٽجي ويندي آهي، جنهن ڪري سندن ٽولھ وڌندي ويندي اٿن. آخرڪار نيوكليس جي ڪل ڳري (Disintegration of Nuclear Membrane) ختم ٿي ويندي آهي ۽ ڪروموزوم خليي جي پوري سائيتوپلازم ۾ اچي ويندا آهن. آخر ۾ ڪروموزوم خليي جي وچ ۾ اچي هڪ گدي جي شڪل (Spindle Shaped) اختيار ڪندا آهن ۽ انهيءَ گدي ۾ ڪجهه ڊگھا پروٽين جا ٺھيل ٽاڳا به هوندا آهن، جن منجهان ڪجهه ڪروموزوم سينٽروميئر (Centromere) سان ڳنڍيل هوندا آهن.

■ ميٽافيز اسٽيج: هر هڪ ڪروموزوم باقائديگيءَ سان خليي جي وچ ۾ اچي ويندو آهي، ۽ انهيءَ جوڙجڪ کي (Equatorial plate) چئبو آهي. هن ڏاڪي دوران هر ڪروموزوم جو سينٽروميئر ٻن حصن ۾ ورهائجي ويندو آهي ۽ هر ڪروموزوم جون ٻئي ٽارون (Chromatids) الڳ الڳ ٿي وينديون آهن. هن ڏاڪي دوران خليي جي وچ ۾، ڪروموزومن جي مڪمل طرح گدي (Spindle) ٺھي ويندي آهي.

■ ائنافيز اسٽيج: سينٽروميئر سان ڳنڍيل ٽاڳا هر هڪ ڪروميٽڊ کي خليي جي مختلف چيٽرن (Opposite Poles) ڏانهن ڇڪيندا آهن، جنهن جي نتيجي ۾ ڪروموزومن جو هڪ سيٽ خليي جي هڪ چيٽري ۽ ٻيو سيٽ ٻئي چيٽري ڏانهن ڇڪجي ويندو

آهي. هن اسٽيج ۾ اڇڻ کانپوءِ هر ڪروموسوم کي مڪمل ڪروموزوم چيو ويندو آهي.

■ **ٽيلوفيز اسٽيج :** هن اسٽيج دوران ڪروموزوم جو هر هڪ

سيٽ خليي جي مختلف (آمهون سامهون) وارن چيٽرن تي گڏ ٿي ويندو آهي ۽ اهو خليو، ٻن خلين جي وچ ۾ ونڊجڻ شروع ٿي ويندو آهي ڇو ته سندس سائٽوپلازم ٻن حصن ۾ ورهائجي ويندو آهي ۽ آخر ۾ ٻه خليا ٺهي ويندا آهن ۽ انٽرفيز (Interphase) ۾ داخل ٿي ويندا آهن. سائٽوپلازم جي ونڊجڻ واري عمل کي (Cytokinesis) چئبو آهي. تقريباً پوري جينيتڪ انفريشن ڪروموزوم جي نيوكليائي تيزاب ڊي اين اي (DNA) منجهه موجود هوندي آهي ۽ خليي جي هن طرح سان ونڊجڻ ڪري ڪروموزومن (ڊي اين اي DNA) ۾ موجود موروثي خصوصيتن (Genetic Characteristics) جو بنا ڪنهن تبديليءَ جي، پنهنجي اصل حالت ۾ رهڻ يقيني ٿي ويندو آهي. مائيٽوسس (Mitosis) ارتقائي تبديلين (Evolution) جي مخالف آهي.

خلين جي برابر ونڊجڻ جي اهميت :

۱. هن قسم جي خليائي ونڊ ۾ ڪروموزوم جي تعداد ۾ ڪا به ٿيڻ ٿار نه ايندي آهي ۽ ٺهندڙ خلين ۾ ڪروموزوم جو تعداد ساڳيو ٿي هوندو آهي.

۲. مائيٽوسس، خليي جي مقرر ماپ کي برقرار رکڻ ۾ مدد ڪري ٿي.

۳. هن سان خليي ۾ موجود ڊي اين اي (DNA) ۽ آر اين اي (RNA) جي ورڇ ۾ برابري رهي ٿي.

۴. مائٽوسس ڪري مختلف عضون جو ٺهڻ ۽ وڌڻ، عمل ۾ اچي ٿو.
۵. پرائن (ختم ٿيندڙ) خلين جي جڳهه نوان ۽ تازا خليا وٺن ٿا.
۶. غير جنسي واڌ (Asexual reproduction) ۾ مدد ڪري ٿي.
۷. جنسي خلين جي تعداد ۾ واڌارو هن عمل ۽ (مائٽوسس) ڪري ٿي ٿو.

خلين جي وندجڻ جو تخفيفي عمل:

مائٽوسس کي خلين جي وندجڻ جو بنيادي عمل چيو ويندو آهي، جڏهن ته ميٿاسس (Meiosis) منجهان هڪ ڊپلوئڊ (Diploid) ٻه هيپلوئڊ (Haploid) خليا ٺهندا آهن ۽ ميٿاسس صرف جنسي خلين ۾ ٿيندي آهي. جنسي عمل ۾ به گيميٽ (Gamete) جنسي خليا پاڻ ۾ ملي هڪ خليو ٺاهيندا آهن، جنهن کي (Zygote) زائگوٽ چئبو آهي. جڏهن به هيپلوئڊ (Haploid) خليا پاڻ ۾ ملي هڪ ڊپلوئڊ (Diploid) خليو ٺاهيندا آهن ته انهيءَ عمل کي زائگوٽ چئبو آهي. زندگيءَ جو چڪر (Life cycle) تڏهن پورو ٿيندو آهي، جڏهن هڪ ڊپلوئڊ (Diploid) جاندار وڏو ٿي هيپلوئڊ (Haploid) جنسي خليا ٺاهڻ شروع ڪندو آهي.

هڪ ميٿاسس چڪري (Meiosis cycle) دوران ٻي اين اي (DNA) هڪ ڀيرو وڌي ٻيڻو ٿيندو آهي، جڏهن ته ڪروموزوم ۽ سائيٽوپلازم ٻه ڀيرا وڌندا آهن. خلين جي وندجڻ جو هي عمل (Meiosis) ٻن حصن ۾ ورهايل آهي، پهرئين کي ميٿاسس هڪ (Meiosis I) ۽ ٻئي کي ميٿاسس ٻي (Meiosis II) چئبو آهي، ميٿاسس جي ٻنهي حصن کي مائٽوسس (Mitosis) وانگر چئڻ ڏاڪن (Stages) ۾ ورهائيو ويو آهي.

Meiosis = Meiosis I+ Meiosis II

Meiosis	II	I	تخفیفی وند
Prophase	II	I	۱. پروفیز
Metaphase	II	I	۲. مرمیتافیز
Anaphase	II	I	۳. ائتافیز
Telophase	II	I	۴. تیلوفیز

تخفیفی وند Meiosis II

Prophase	II	I	۱. پروفیز
Metaphase	II	I	۲. میتافیز
Anaphase	II	I	۳. ائتافیز
Telophase	II	I	۴. تیلوفیز

تخفیفی وند I (Meiosis I):

■ پروفیز I (Prophase I): - تخفیفی وند (Meiotic division) ۾ پروفیز I ٻين سڀني ڏاڪن کان ڊگهو ٿيندو آهي، اهو ئي سبب آهي جو پروفیز I کي وڌيڪ ڇهن ڀاڱن ۾ ورهايو ويو آهي:

۱. پرولیتوتین Proleptotene

۲. لیپتوتین Laptotence

۳. ڏاڱوتین Zygotene

۴. پیکائی تین Pacytene

۵. دیپلوتین Diplotene

۶. ڊائکینسس Diakinesis

ڊي اين اي (DNA) جو ٻيٽو ٿيڻ ڪروموزوم جي ڌاڳن (تندن) جو هڪٻئي مٿان ويڙجڻ، ڪروموزوم جو ننڍو ۽ ٿلهو ٿيڻ، ۽ ٻن ڪروميٽڊ جو ٺهڻ هن اسٽيج دوران ٿيندو آهي، نيوڪليائي ڪل جو ڳرڻ (Disintegration of Nuclear membrane) ۽ اسپنڊل (Spindle) جو ٺهڻ به هن ئي اسٽيج دوران ٿيندو آهي. مٿيون سڀ تبديليون يڪسان (Mitosis) ۽ تخفيفي ونڊ (Meiosis) ٻنهي ۾ هڪجهڙيون ٿينديون آهن، بهرحال ٻه مختلف تبديليون جيڪي صرف تخفيفي ونڊ (Meiosis) ۾ ٿينديون آهن اهي هي آهن:

۱. هڪجهڙن ڪروموزوم جو ميلاپ (Synapsis): هڪجهڙا ڪروموزوم جيڪي والدين (ماءُ ۽ پيءُ) کان ايندا آهن، پاڻ ۾ ملي ويندا آهن ۽ انهيءَ ڪري هن عمل کي (Synapsis) چئبو آهي.

۲. ڪراسنگ اوور (Crossing over): هن عمل ۾ مختلف ڪروميٽڊ جي ڪجهه ٽڪرن جو ٽٽڻ ۽ وري هڪجهڙن ٽڪرن جو پاڻ ۾ ملڻ اچي ويندو آهي، هن عمل ذريعي جينيائي مادن جي مٽ سٽ ٿيندي آهي، جنهن ڪري ارتقائي عمل (Evolution) ٿيندو آهي ۽ فطرتي چونڊ (Selection) پنهنجو ڪم ڪندي آهي ۽ انهيءَ طرح فطرت ڪارگر جاندارن جي چونڊ ڪندي آهي. هتي ڪارگر جاندار مان مُراد اهڙا جاندار آهن، جيڪي بدلجندڙ موسمي حالتن سان مطابقت ۽ قدرتي آفتن سان مقابلو ڪري سگهن ۽ وڏي ويجهي پنهنجو نسل پيدا ڪري سگهن.

■ ميٽافيز I (Metaphase I) : سينٽرو ميئر (Centromere) جي ڌاڳن سان ڳنڍيل ڪروموزوم خليي جي وچ ۾ (Equatorial plane) ۾ اچي ويندا آهن، پر انهن ۾ سينٽروميئر (Centromere)

جي واڌ (ميٽوٽيڊس) يا، وندجڻ جو عمل ڪونه ٿيندو آهي.

■ ائنا فيز I (Anaphase I): هڪجهڙا ڪروموزوم الڳ الڳ ٿي خليي جي مختلف چيٽرن (Opposite poles) ڏانهن ڇرپر ڪندا آهن ۽ اهڙي طرح ٻنهي چيٽرن تي ڪروموزومن جو اڌ تعداد خليي جي هر هڪ چيٽري تي گڏ ٿي ويندو آهي، ۽ ٻنهي ٺهندڙ خلين ۾ اصل خليي جي اڌ جيترا ڪروموزوم اچي ويندا آهن.

ڪروموزومن جو اڌ تعداد خليي جي هڪ چيٽري تي ۽ ٻيو اڌ تعداد ٻئي چيٽري تي وڃڻ جو سبب اهو آهي ته سندن سينٽروميئر (Centromere) نه وندبي آهي.

■ ٽيلوفيز I (Telophase I): جيئن ئي ڪروموزوم خليي جي چيٽرن تي گڏ ٿيندا آهن ته (Cytokinesis) سائٽوپلازم وندجڻ شروع ٿيندو آهي ۽ اهو خليو، ٻن خلين ۾ وندجي ويندو آهي ۽ ڪروموزومن جو تعداد ٻنهي خلين ۾ سندن اصل خليي جي ”اڌ“ برابر هوندو آهي، ڪنهن به خليي جي ڪروموزومن جي تعداد ڳڻڻ لاءِ اسان سندن مينٽروميئر (Mentromere) ڳڻيندا آهيون.

تخفيفي وندب II (Meiosis II):

■ پروفيز II (Prophase II): جيڪڏهن ٽيلوفيز I ۾ ڪروموزوم سڌا ٿي ويندا آهن ۽ پروفيز II ۾ وري ويڙهجي نٿو ٿيڻ شروع ڪندا آهن، اسپنڊل (Spindle) وري ٺهندو آهي ۽ مرڪزي ڪل ٻيهر غائب ٿيڻ شروع ٿي ويندي آهي.

■ ميتافيز II (Metaphase II): هر هڪ ڪروموزوم پنهنجي مرضيءَ مطابق خلين جي وچ ڏانهن سُرِي ويندو آهي ۽ سينٽروميئر

(Centromere) ونڊجڻ ڪري ڪروموزوم جا ٻئي ڪروموسوم الڳ الڳ ٿي ويندا آهن.

■ اناپھيز II (Anaphase II): ڪروموزوم جون ٻئي ڪروموسوم آزاديءَ سان خليي جي مختلف چيٽرن ڏانهن سرڻ شروع ڪنديون آهن، ۽ خليي جي آمهون سامهون وارن چيٽرن تي گڏ ٿي وينديون آهن. هن اسٽيج تي پهچڻ کانپوءِ ۽ ٻن ڪروموسوم جي هڪٻئي کان الڳ ٿيڻ ڪري، ڪين مڪمل ڪروموزوم جي حيثيت ملي ويندي آهي.

■ ٽيلوفيز II (Telophase II) : هن ڌاڪي دوران ڪروموزوم وري سنهڙن ڌاڳن جهڙا ٿي ويندا آهن، اسپنڊل (Spindle) ختم ٿي ويندو آهي. مرڪز جي ڪل (Nuclear Membrane) ٻيهر بحال ٿي ويندي آهي. اهڙي طرح هڪ ڊپلوئڊ (Diploid cell) خليي منجهان چار هيپلوئڊ خليا ٺهندا آهن ۽ انهن چٽي خليين جي جينيائي مادي (Hereditary Material) منجهه ڪراسنگ اوور (Crossing over) سبب ٿوري ڦير ڦار يا تبديلي آيل هوندي آهي. اهڙيءَ طرح هڪ ڊپلوئڊ ($2N$) خليي ۾ ونڊجڻ جا ٻه ڌاڪا آهن (تخفيفي ونڊ I ۽ تخفيفي ونڊ II) تخفيفي ونڊ I ۾ ڪروموزوم جو ڪل تعداد ٻن خليين ۾ اڌو اڌو ٿي ويندو آهي ۽ تخفيفي I دوران ڪروموزوم جو تعداد اڌ رهندو پر هر هڪ خليو ٻن خليين ۾ ونڊجي ويندو. حقيقت ۾ تخفيفي ونڊ II ۽ يڪسان ونڊ واري عمل ۾ ڪو فرق ڪونهي پر جيئن ته تخفيفي عمل لڳاتار ٿئي ٿو انهيءَ ڪري ونڊ کي تخفيفي ونڊ II جو نالو ڏنو ويو آهي.

ميٿاسس جي افاديت (Significance of Meiosis):

۱. ميٿاسس ڪري هر جنس جي جانورن جي ايندڙ نسل ۾ سندن ڪروموزومن جو تعداد بنا ڪنهن گهٽ وڌائي جي مقرر تعداد ۾ رهندو آهي.

۲. ڪراسنگ اوور (Crossing over) جي ڪري جينيائي مادي يعني جينس (Genes) جي جوڙجڪ ۾ مٽ ست ٿئي ٿي جنهن ڪري موروثي خاصيتن (موروثي مادي) ۾ ٿير گير ٿئي ٿي، انهي جي ڪري ارتقائي تبديليون عمل ۾ اينديون آهن.

يڪسان ۽ تخفيفي وند ۾ پيٽ

Meiosis وند تخفيفي	Mitosis وند يڪسان
۱. تخفيفي وند صرف جنسي خلين (خصين ۽ ٻچي داني جي خلين) ۾ ٿيندي آهي	۱. يڪسان وند جنسي ۽ بدني خلين، ٻنهي ۾ ٿيندي.
۲. پورو عمل ٻن مرحلن ۾ مڪمل ٿيندو آهي.	۲. پورو عمل هڪ ئي مرحلي ۾ مڪمل ٿيندو آهي.
Prophase - پروفيز	
۳. پروفيز، تمام گهڻي وقت لاءِ ٿيندو آهي ڇهن ننڍن ڌاڪن ۾ ورهايل آهي.	۳. پروفيز تمام ٿوري وقت لاءِ ٿيندو آهي ۽ ننڍن ڌاڪن ۾ ورهايل ڪونه هوندو آهي.
۴. اصلي خليي جي پيٽ ۾، وندجڻ کانپوءِ ٺهندڙ خلين ۾ ڪروموزومن جو تعداد مقرر تعداد جي پيٽ ۾ اڌ جي برابر	۴. هڪ خليي جي وندجڻ کانپوءِ ٺهندڙ خلين جي ڪروموزومن جي تعداد ۾ ڪنهن

هوندو آهي.	به قسم جي گهٽ وڌائي ڪونه ٿيندي آهي.
۵. هڪ جهڙن ڪروموزومن جون جوڙيون (Synapsis) ٺهنديون آهن.	۵. هڪ جهڙن ڪروموزومن ۾ ڪنهن به قسم جون جوڙيون (Synapsis) ڪونه ٿينديون آهن.
۶. ڪروموزومن جو ٻيڻو ٿيڻ پروفيز جي آخر ڌاري ٿيندو آهي.	۶. ڪروموزومن جو ٻيڻو ٿيڻ پروفيز ڏاڪي جي شروعات ۾ ٿيندو آهي.
۷. ڪراسنگ اوور (Crossing over) جي ڪري جينياتي ڀرمت ست ۽ موروثي خاصيتن ۾ ڦيرگير ٿيندي آهي.	۷. ڪنهن به قسم جي جينياتي ڦيرگير يا موروثي خاصيتن جي ڀرمت ست ڪونه ٿيندي آهي.

ميٽافيز - Metaphase

۸. سينٽروميئر جو رخ خليي جي قطبن (Poles) ڏانهن هوندو آهي، جڏهن ته ڪروموزومن جي چيڙن يا ٻانهن جو رخ خليي جي وچ (Equatorion) ڏانهن هوندو آهي.	۸. سينٽروميئر (Centromere) جو رخ خليي جي وچ (Equatorion) ڏانهن هوندو آهي، جڏهن ته ڪروموزوم جي چيڙن جو رخ خليي جي قطبن ڏانهن هوندو آهي.
---	--

ائنافيز - Anaphase

۹. هر هڪ ڪروموزوم ۾ ٻه حصا (ٻه ٻانهون) ڪروميٽڊ (Chromatids) ٿينديون آهن.	۹. سڀ ڪروموزوم هڪ ڪروميٽڊ جي شڪل ۾ موجود هوندا آهن.
۱۰. ڪروموزوم ننڍا ۽ ٿلهڙا ٿيندا	۱۰. ڪروموزوم ڊگهڻ ٿاڳڻ

جهڙا ٿيندا آهن.

۱۱. هميشه خليا ونڊجڻ جي آخري ڌاڪي ٽيلوفيز منجهان (Telophase) گذرندا آهن.

آهن

۱۱. ونڊجڻ جي پهرئين مرحلي دوران ڪڏهن ڪڏهن خليا پهرئين ٽيلوفيز (Telophase) منجهان ڪونه گذرندا آهن، پر پهرئين اثاڻيز I کان پوءِ سڌو ٻئي مرحلي جي پروفيز ۾ داخل ٿي ويندا آهن.



افاديت - Significance

۱۲. ڪروموزمن جو تعداد اصلي خلين ۽ ونڊجڻ کان پوءِ ٺهندڙ خلين ۾ هڪ جيترو ۽ هڪ جهڙو هوندو آهي.

۱۳. هڪ ڊپلوائڊ خليو، ٻه ڊپلوائڊ خليا ٺاهيندو آهي.

۱۲. ونڊجڻ کانپوءِ ٺهندڙ خلين ۾ ڪروموزمن جو تعداد گهٽجي اڌ ٿي ويندو آهي

۱۳. هڪ ڊپلوائڊ خليي منجهان چار هيپلوائڊ خليا ٺهندا آهن،




باب پنجون

گيميتوجينيسس Gametogenesis

اسپرم ۽ آني جو ٺهڻ: هي هڪ اهڙو عمل آهي جنهن ۾ گيميت (Gamete) ٺهن ٿا. گيميت اهڙا جنسي خليا آهن، جيڪي مرد ۽ عورت ۾ الڳ الڳ ٺهندا آهن. اهي گيميت پاڻ ۾ ملي هڪ نئون خليو ٺاهيندا آهن، جنهن کي ڳڻپ (Zygote) چئبو آهي. نر ۽ ماديءَ جي گيميت ملڻ واري عمل کي ڳڻپ چئبو آهي. ڳڻپ مختلف جاندارن ۾ مختلف طريقن سان ٿيندو آهي ۽ جنهن عمل ذريعي ڳڻپ ٿيندو آهي، تنهن کي ريپروڊڪشن (Reproduction) يا نسل وڌائڻ وارو عمل چئبو آهي.

هڪ ڳڻيل خليي (زائگوٽ) منجهان هزارين هڪجهڙا ۽ مختلف خليا ڪيئن ٺهن ٿا؟ جيڪي گڏيل صورت ۾ هڪ مڪمل جاندار جي شڪل اختيار ڪن ٿا. هڪ اسپرم خليو (Sperm cell) ڪيئن هڪ ”تارو جيوو“ ۾ تبديل ٿي، تيار ٿيل ”آني“ سان ملي ان کي ڪيئن ٿو ڳيرائي (Fertilize)، ڪروموزوم (Chromosomes) ڪيئن ٿا وڌجن ۽ سندن ورڇ ڪيئن ٿي ٿئي، گيميت ۾ ڪروموزوم جو تعداد ڪيئن ٿو گهٽجي اڌ ٿي وڃي، ڳڻپ کان پوءِ نر ۽ مادي ٻنهيءَ جا ڪروموزوم ملي، ڪروموزوم جو پورو (مڪمل) تعداد ڪيئن ٺاهن ٿا؟ جنهن ۾ ٻنهي (والدين) جي موروثي خاصيتن جو هڪجيترو حصو ٿئي ٿو. اهو سڀ ڪجهه جنسي خلين جي ٺهڻ واري عمل (Gametogenesis) ۾ سمايل آهي. گيميتوجينيسس ٻن عملن يعني اسپرميتوجينيسس (Spermatogenesis) (جنهن ۾ اسپرم ٺهن) ۽



خاڪو ۶. نسل جي واڌ جو عمل.

اووڄينيسس (Oogenesis) (جنهن ۾ آنا نهن) تي مشتمل آهي. اسپرميٽوجينيسس Spermatogenesis : هي هڪ اهڙو عمل آهي جنهن ۾ ”اسپرم“ نهندا آهن. اها جڳهه (حصو) جتي اسپرم نهندا آهن انهيءَ کي سيمي نفرس ٽيبيولس (Seminiferous tubules) چئبو آهي. سيمي نفرس ٽيبيولس ٻن قسمن جي خلين جا نهيل هوندا آهن. هڪ (Germ cells) جنسي خليا جيڪي تخفيفي وند (Meiosis) جي مختلف ڌاڪن ۾ هوندا آهن ۽ ٻيا سرٽولي خليا (Sertoli cells) يا مددگار خليا. هي مددگار خليا نهندڙ اسپرم خلين جي نشوونما ڪندا آهن. سرٽولي خليا، اسپرم خلين کي ڪجهه اهڙي قسم جا جزا به مهيا ڪندا آهن، جن جي ڪري اسپرم خلين ۾ واڌ، ورهاست ۽ تبديليءَ وارو عمل ٿيندو آهي.

پرائيمورڊيل جرم خليا (Primordial germ cells) گونادس (Gonads) منجهان پيدا نه ٿيندا آهن پر بدن جي ٻين حصن منجهان لڌ پلاڻ ڪري ايندا آهن يا، وري رت جي وهڪري (دوري) ذريعي گونادس ۾ اچي گڏ ٿيندا آهن.

مرد جا اسپرم خليا ۽ عورت جا آنا گونادس ۾ گڏ ٿيل پرائمورڊيل جرم خلين منجهان نهندا آهن. اسپرم جي نهڻ واري عمل ۾ پرائمورڊيل خليا سيمي نفرس ٽيبيولس ۾ هڪ ٻئي قسم جي خلين ۾ تبديل ٿي ويندا آهن، جن کي اسپرميٽو گونيا (Spermatogonia) چئبو آهي. اسپرميٽو گونيا هڪ اهڙي قسم جا خليا آهن، جيڪي آخر ڪار ”اسپرم“ ۾ تبديل ٿي ويندا آهن. ڪيترن ئي ڪرنگهي وارن يا، ڪير ڏيندڙ جانورن ۾ اسپرميٽو گونيائي خليا سيمي نفرس جي ٻاهرئين دائري ۾ موجود هوندا آهن.

جيئن جيئن اهي اسپرميٽو گونياڻي خليا اسرندا ۽ وڌندا ويندا تيئن تيئن اهي سيمي نفرنس جو ٻاهريون دائرو ڇڏي اندرئين حصي يعني ٽيٻول ”نليءَ“ ڏانهن ايندا ويندا. انهن وڌندڙ خلين کي هن اسٽيج تي پهچڻ کان پوءِ پرائمري اسپرميٽوسائيٽس (Primary Spermatocytes) چئبو آهي.

پرائمري اسپرميٽو سائيٽ ۾ ڪروموزوم جي ڊي اين اي (DNA) جو مقدار پنهنجي اصل مقدار کان ٻيڻو ٿي ويندو آهي. جڏهن ته اسپرميٽوگونيا ۾ ڊي اين اي (DNA) جو مقدار رواجي خلين برابر هوندو آهي. هاڻي پرائمري اسپرميٽو سائيٽ کي ٻن تخفيفي ونڊ واري عمل منجهان گذرڻو پوندو آهي ۽ انهيءَ ونڊجڻ جي عمل جي آخر ۾ پرائمري اسپرميٽوسائيٽ منجهان ٺهندڙ خلين ۾ ڪروموزوم جو تعداد رواجي خلين جي ڪروموزوم جي تعداد جي اڌ جيترو هوندو آهي، جن کي هائيپلائيڊ خليا (Haploid cells) چئبو آهي ۽ اهڙي طرح اسپرميٽو جينيس جي عمل جي نتيجي ۾ جيڪي خليا ٺهندا آهن. انهن جي ڪروموزوم جو تعداد رواجي خلين جي اڌ جيترو هوندو آهي ۽ هڪ تيار ٿيل يعني مڪمل اسپرم جي ڪروموزوم جو تعداد به اڌ جيترو هوندو آهي.

تخفيفي ونڊ: خلين جي ونڊجڻ جو هي عمل هڪ ته صرف جنسي خلين ۾ ٿيندو آهي ۽ ٻيو ته ٻن قسمن جي خليائي ونڊجڻ واري عمل تي مشتمل هوندو آهي. اصل ۾ خلين جي ونڊجڻ جو عمل ته لڳاتار هلندو آهي، پر سمجهڻ خاطر هن عمل کي ٻن حصن ۾ ورهايو ويو آهي، (تخفيفي ونڊ I ۽ تخفيفي ونڊ II). هنن ٻنهي ڊويزنن کي وري مختلف چئن ڏاڪن ۾ ورهايو ويو آهي.

تخفيفي ونڊ I

تخفيفي ونڊ II

Prophase II	پروفيز	Prophase I	۱. پروفيز
Metaphase II	ميتافيز	Metaphase I	۲. ميتافيز
Anaphase II	ائتافيز	Anaphase I	۳. ائتافيز
Telophase II	ٽيلوفيز	Telophase I	۴. ٽيلوفيز


تخفيفي ونڊ ۾ پروفيز I ٻين سڀني مرحلن کان ڊگهو ٿيندو آهي. اهوئي سبب آهي جو پروفيز I کي وڌيڪ ڇهن ڀاڱن ۾ ورهايو ويو آهي:

Pachytene	۴. پيڪلائي ٽين	Proleptotene	۱. پروليپٽوٽين
Diplotene	۵. ڊپلوٽين	Laptotene	۲. ليپٽوٽين
Diakinesis	۶. ڊائڪنيسس	Zygotene	۳. ڏاڱوٽين

تخفيفي ونڊ ۾ ڪروموزوم جو تعداد سندن اصل تعداد جي ڌڻي ۾ ٿي ويندو آهي. اهڙي طرح سان اسپرم ۾ ڪروموزوم جو تعداد عام خليي جي ڪروموزوم جي تعداد جو اڌ هئڻ گهرجي، ڇو ته ڳيڄڻ دوران ماءُ ۽ پيءُ يعني، آني ۽ اسپرم جا ڪروموزوم ملي گهريل تعداد ٺاهن ٿا. اهڙيءَ طرح والدين يعني، ماءُ ۽ پيءُ ٻنهي جون جينياتي (موروثي) خاصيتون اولاد ۾ يا، پيدا ٿيل ٻچن ۾ اچي وڃن ٿيون، مثال طور: ماڻهو ۾ ڪل ڪروموزومن جو تعداد (۴۶) چائيتاليهه ٿيندو آهي. * اسپرم (جيڪو مرد ۾ ٺهندو آهي) ۾ ۲۳ ڪروموزوم ٿيندا آهن ۽ ** آني (جيڪو عورت ۾ ٺهندو آهي) ۾ ڪروموزوم جو تعداد پڻ ۲۳ ٿيندو آهي. اسپرم ۽ آني پاڻ ۾ ملي

* اسپرم = نر جزا ** آني = مادي جزا.

(گيجي) کروموزوم جو گهربل تعداد (جيڪو ۴۶ آهي) ناهيندا آهن. اهڙي طرح گڍيل آني ۾ کروموزومن جو تعداد ۴۶ هوندو آهي. گڍيل آنو هڪجيتري ونڊ (Mitosis) ذريعي ونڊجڻ شروع ٿيندو آهي ۽ هر نئين ٺهندڙ خليي ۾ کروموزومن جو تعداد ۴۶ ئي رهندو آهي.



پرائمري اسپرميٽو سائيٽ ۾ پهريون ونڊجڻ جو عمل (تحفيفي ونڊ) انهيءَ وقت شروع ٿيندو آهي، جڏهن اهي جنسي خليا (Sperm cells) ونڊجڻ واري عمل جي پروفيز اسٽيج I ۾ داخل ٿيندا آهن. پروفيز جي پهرئين ڌاڪي ۾ هي خليا انهيءَ وقت داخل ٿيندا آهن جڏهن سندن کروموزوم سنهي ڌاڳي (پروليپٽوٽين) ۽ پوءِ ٻئي ڌاڳي (ليپٽوٽين) جهڙي شڪل ۾ ظاهر ٿيڻ شروع ٿيندا آهن. پروفيز جي ٻئي ڌاڪي (زائگوٽين) ۾ هي خليا انهيءَ وقت داخل ٿيندا آهن، جڏهن سندن هڪجهڙا کروموزوم (Homologous chromosome) پاڻ ۾ گڏجي جوڙن جي شڪل اختيار ڪندا آهن. جيئن ته ٻنهي کروموزومن جي ڊي اين اي (DNA) جو مقدار ٻيڻو ٿي ويندو آهي ۽ هن اسٽيج تي پهچڻ وقت هر هڪ کروموزوم جي جوڙي چئن کرومائيڊس (Chromatids) جي ٺهيل هوندي آهي ۽ انهيءَ کي ٽيٽراڊ (Tetrad) چئبو آهي. جيئن ته هر کروموزوم جي

جوڙيءَ جو هڪ کروموزوم الڳ الڳ والدين کان ايندو آهي (يعني هڪ ماءُ ۽ هڪ پيءُ کان) ۽ ڪجهه جينياتي جزا هڪجهڙن کروموزومن ۾ مٽجي سٽجي ويندا آهن، ٽيٽراڊ ٺهڻ کانپوءِ هڪجهڙيون کروموزومن جي جوڙيءَ ۾ ڪجهه ٽڪرن جي هڪ کان ٻئي کروموزومن ۾ مٽ سٽ ٿيندي آهي، جنهن ڪري ڪجهه جينياتي جُزن جي ٻنهي، يعني هڪ ئي جوڙيءَ جي ٻنهي کروموزومن اندر ٿير گهير اچي ويندي آهي ۽ هن عمل کي ڪراسنگ اوور (Crossing over) چئبو آهي. ڪراسنگ اوور، پروفيز I جي (پيڪائيٽن) اسٽيج دوران عمل ۾ ايندي آهي. ڪراسنگ اوور ڪري چمندڙ ٻار يا، پيدا ٿيندڙ نسل ۾ جينياتي ٿير غير ٿيندي آهي ۽ اهڙي قسم جو نسل ”فطرتي چونڊ“ (Natural Selection) مطابق وڌيڪ موزون ۽ ڪامياب هوندو آهي. کروموزومن ۾ ڪراسنگ اوور ٿيڻ کان پوءِ هڪڙا کروموزوم جيڪي اڳ ۾ جوڙيءَ جي صورت ۾ هئا، هڪٻئي کان الڳ ٿيڻ شروع ٿيندا آهن ۽ اهو عمل پروفيز I جي ڊپلوٽن اسٽيج دوران ٿيندو آهي. ڊائڪنيسس ۾ ٻئي کروموزوم خليي جي مختلف چيٽن (Poles) ڏانهن هليا ويندا آهن ۽ نيوڪليس (مرڪز) جي ڪل (Nuclear membrane) غائب ٿيڻ شروع ٿي ويندي آهي.

پروفيز I جي مختلف ڏاڪن کي ياد ڪرڻ جو سولو طريقو اهو آهي ته استعمال ٿيل لفظن جي معنيٰ ياد ڪجي.

مثال طور: ليپٽوٽين (leptotene) = سنهو thin - ٽين tene = ڏاڳو thread

(ڪروموزوم سنهي ڏاڳي جهڙا نظر اچن)

زائگوٽين - Zygotene زائگو zygo = جوڙي Pair

پيڪائي ٿين Packy tene - پيڪائي - pachy - ٿلهو - thick
(ڪروموزوم ٿلهن ڏاڳن جي شڪل ۾ تيتراڊ ۽ ڪراسنگ اوور ٿيڻ).

ڊپلزيٽن Diplotene ڊپلو - Diplo ڊپلو يا ڊٽي Double

(هڪجهڙن ڪروموزومن جو الڳ ٿيڻ ۽ چٽيءَ طرح نظر اچڻ)

پروفيزا اسٽيج جي پڄاڻيءَ تي هڪ قسم جو اسپينڊل (Spindle) ٺهندو آهي، جنهن ۾ ڪروموزوم سنهن ڏاڳن ذريعي هڪ ٻئي سان ڳنڍيل هوندا آهن. نيوڪليس جي ڪل (Nuclear membrane) اڳي ئي غائب ٿي ويندي آهي ۽ انهيءَ جي غائب ٿيڻ سان خلين جي وندجڻ وارو عمل تخفيفي وند I جي ٻئي اسٽيج (جنهن کي ميٽافيز I چئبو آهي) ۾ داخل ٿي ويندو آهي. ميٽافيز I

دوران هڪجهڙن ڪروموزومن جون جوڙيون خليي جي وچ ۾ اچي هڪ هنڌ گڏ ٿينديون آهن ۽ ڪروموزوم اسپينڊل جي ڏاڳن سان ڳنڍجي ويندا آهن ۽ انهيءَ سان گڏوگڏ ائنائيز I اسٽيج جي شروعاتي ويندي آهي. ائنائيز I دوران هڪجهڙا ڪروموزوم ته الڳ ٿيڻ شروع ٿيندا آهن، پر هڪ جهڙا ڪروموسم جيڪي هڪ ئي ڪروموزوم جا حصا آهن، الڳ نه ٿيندا، ڇو ته ٻنهي ڀاڱن (ڪروموسم) جي ڳنڍيندڙ ڳنڍ (Centromere) نه وڌيڪي آهي.

تخفيفي وند I جي آخري اسٽيج کي ٽيلوفيزا چئبو آهي ۽ هن اسٽيج دوران هڪ خليو ٻن خلين ۾ وندجي ويندو آهي ۽ ٻنهي نون ٺهيل خلين ۾ ڪروموزومن جو تعداد اڌو اڌ يعني هر خليي جي ڪروموزومن جو تعداد سندن اصل خليي جي ڪروموزومن جي اڌ جيترو هوندو آهي. هن اسٽيج تي پهچڻ کان پوءِ انهن خلين کي سيڪنڊري اسپرميٽو سائيٽ (Secondary spermatocyte) چئبو

آهي. پرائمري اسپرميٽو سائيت ۾ ڪروموزومن جو پورو تعداد ۽ سيڪنڊري اسپرميٽو سائيت ۾ ڪروموزومن جو تعداد مقرر تعداد جو اڌ هوندو آهي.

تخفيفي ونڊ II: تخفيفي ونڊ II ۾ به ساڳيا ئي ڌاڪا اچن ٿا يعني:

۱. پروفيز II

۲. ميتافيز II

۳. ائنائيز II

۴. ٽيلوفيز II

تخفيفي ونڊ II ۾ پروفيز II اسٽيج دوران ڪروموزوم وري ظاهر ٿيڻ شروع ٿيندا آهن. نيوڪليائي ڪل جيڪڏهن موجود هوندي آهي ته اها غائب ٿي ويندي آهي ۽ نوان اسپينڊل ڌاڳا ٺهندا آهن. ميتافيز II اسٽيج دوران ڪروموزوم خليي جي وچ (equator) ۾ اچي اسپينڊل ڌاڳن سان ڳنڍجي ويندا آهن. ائنائيز II اسٽيج ۾ هر ڪروموزوم جا هڪ جهڙا ڪروميٽڊس الڳ الڳ ٿي خليي جي آمهون سامهون وارن چيڙن ڏانهن چرڻ شروع ٿيندا آهن. ٽيلوفيز II دوران اسپينڊل ختم ٿي ويندو آهي نيوڪليائي ڪل خليي اندر موجود ڪروموزومن جي چوڌاري ٺهڻ شروع ٿي ويندي آهي. خليائي مادن جي ونڊ ورڇ ٿيندي آهي ۽ ٺهيل ٻن نون خليا منجهان چار خليا ٺهندا آهن ۽ انهن خليا کي اسپرميٽڊس (Spermatids) چئبو آهي ۽ اسپرميٽڊس ۾ ڪروموزومن جو تعداد اسپرميٽو گونيا جي ڪروموزومن جي اڌ جيترو هوندو آهي. اسپرميٽڊس هڪ اهڙي تبديلي واري عمل منجهان گذرندا آهن، جنهن ۾ هڪ مڪمل

اسپرمر جا سيئي جزا اسپرمر جي پيڙ ۽ منڍ تي ايڪروزوم (Acrosome) ٺهندا آهن. اهڙيءَ طرح هر هڪ اسپرميٽوس ڪجهه خاص تبديلين کان پوءِ بنا وندڙ جي هڪ مڪمل اسپرمر ۾ تبديل ٿي ويندا آهن، جنهن کي اسپرميٽوزون (Spermatozoan) چئبو آهي. مختصر هي ته هڪ اسپرميٽو گونيا پنهنجي ڪروموزوم جي پوري تعداد سميت وڌڻ کانپوءِ پرائمري اسپرميٽوسائيٽ ۾ تبديل ٿي ويندي آهي. تخفيفي وند II ۾ پرائمري اسپرميٽو سائيٽ وندجي ٻن سيڪنڊري اسپرميٽو سائيٽ جي صورت ۾ اچي ويندي آهي، جن ۾ ڪروموزوم جو تعداد اڌ هوندو آهي. اهي ٻئي سيڪنڊري اسپرميٽو سائيٽ تخفيفي وند II ۾ وندجي چار اسپرميٽو ٺاهيندا آهن ۽ اسپرميٽوس اسپرمر ۾ تبديل ٿي ويندا آهن. اهڙيءَ طرح هڪ اسپرميٽوگونيم منجهان چار مڪمل اسپرمر ٺهندا آهن.

اسپرمر ٺهڻ جو عمل: اسپرميٽوجينيس جو عمل بدن ۾ پيدا ٿيندڙ ڪن خاص قسم جي پاڻيائن جي ضابطي هيٺ هوندو آهي. انهن پاڻيائن کي هارمون (Hormones) چئبو آهي. هارمون مختلف قسمن جا ٿيندا آهن، پر اسپرميٽوجينيس کي باقاعدي هلائڻ ٻن هارمونن جي ضابطي هيٺ آهي: هڪ کي ليوتينائيزنگ هارمون - (Luteinizing Hormone) L.H) ۽ ٻئي کي فاليڪل اسٽيموليٽنگ هارمون (FSH-Follicle stimulating Hormone) چئبو آهي.

اهي هارمون خاص طور تي ليوتينائيزنگ هارمون (L.H) مردن جي خصين (Testis) اندر انٽرسٽيشل خليا (Interstitial cells) ۽ Lyding cells کي محرڪ ۾ آڻي مردن جو جنسي هارمون (Male)

(Sex Hormone) پيدا ڪندا آهن. مردن جي جنسي هارمون کي ايندروجن هارمون (Androgen hormone) چئبو آهي مڪمل اسپرم ٺهڻ لاءِ انهن ايندروجن هارمون جي ضرورت پوندي آهي.

تقريباً سو سال کن اڳ لاوليت (Lavalette) ڳولي لڌو ته مرد جا اسرندڙ يا ٺهندڙ جنسي خليا پاڻ ۾ ڳنڍيل هوندا آهن. فاسٽ (Fawcett) ۽ سندن ساٿي اليڪٽران مائڪرواسڪوپ (Electron Microscope) ذريعي اهو ٻڌايو ته اسپرمنيٽو سائيٽ، سائٽوپلازم ڳنڍين (Cytoplasmic Bridges) ذريعي جڪڙيل هوندا آهن وندجندڙ خلين ۾ اهي ڳانڍاپا هڪ اندازي موجب اسپرمنيٽوگونيا جي اڻپوري وندجڻ ڪري ٿين ٿا ۽ انهن ڳانڍاپن ڪري انهن وندجندڙ خلين منجهه سنهڙيون نليون (Channles) ٺهي پونديون آهن، جن رستي هڪ خليي کان ٻئي خليي ڏانهن ننڍڙن ماليڪيولن جو وهڪرو جاري رهي ٿو ۽ اهو ئي سبب آهي، جو هڪ ئي وقت ڪيترائي مڪمل اسپرم ٺهن ٿا. ڪامياب ڳڻجڻ (ٿرڄڻ) جو راز به گهڻن اسپرم ٺهڻ تي مدار رکي ٿو اهو به ممڪن آهي ته ”سرٽولي خليا“ ڪجهه اهڙي قسم جا ماليڪيول پيدا ڪندا هجن، جيڪي اسپرم کي تخم جي صورت تائين پهچائڻ (Sperm Maturation) ۾ مدد ڏيندا هجن.

هتي ڪجهه ڄم روڪ دوائن بابت ٻڌائڻ ضروري آهي، جيڪي سڌو (مرد جي) اسپرم تي اثر ڪن ٿيون انهن دوائن منجهان ڪيتريون ئي تجرباتي طور استعمال ڪري ڏنيون ويون آهن جن ۾ الفا - ڪلورو - هائيڊرين -3 (Alpha -chlorohydrin lamino,3) (chloro, 2 Propanol Hydrochloride) اچي وڃن ٿيون. اڃان تائين انهيءَ جي خبر نه پئجي سگهي آهي ته، اهي دوائون اسپرم تي

ڪهڙي هنڌ اثر ڪن ٿيون. ڪجهه تجربن منجهان اهي ثابتيون مليون آهن ته، اسپرم ۽ آني ٻنهي جي مٿاڇري تي ڪنڊ جا ذرڙا موجود هوندا آهن، اهڙي قسم جا ماليڪيول جن ۾ ”ليڪٽن“ (Lectins) ڪنڊ جي ذرڙن سان ميلاپ ڪندڙ پروٽين (Carbohydrate binding Protiens) ڳولي لڌا ويا آهن، اهي خاص طور تي اسپرم ۽ آني جي ڪنڊ جي ذرڙن سان ملن ٿا ۽ اهڙي طرح اسپرم ۽ آني جو ميلاپ روڪين ٿا. جيڪڏهن اسپرم ۽ آني پاڻ ۾ ملندا ته به ڳڻجن جو عمل نه ٿيندو ۽ ڳڻجن جو عمل نه ٿيندو ته ازخود ئي ڄم روڪ ٿي ويندي. هڪ اهڙي قسم جي ليڪٽن (جنهن کي Wheat germ agglutinin) ڪڻڪ جي جنسي خلين کي ڄمائيندڙ ليڪٽن چئبو آهي) ڳولي لڌي وئي آهي؛ جيڪا ٽٽائڻ جانورن جي ڳڻجن جو عمل به روڪي سگهي ٿي. اهو ئي سبب آهي جو ڄم روڪ جي دوائن ۾ هن قسم جي ليڪٽن پروٽين کي ملائڻ جون سفارشون ڪيون ويون آهن.

اسپرميٽڊ جو اسپرم ۾ تبديل ٿيڻ: اسپرميٽڊ جي اسپرم ۾ تبديليءَ واري عمل کي اسپرميٽو جينيسس (spermatogenesis) چئبو آهي. اسپرم ٺهڻ واري عمل کان اڳي پرائمري اسپرميٽو سائيٽ ٺهڻ دوران اهي ڪروموزوم جن تي نر (چوڪرو Boys-) پيدا ڪرڻ جي ذميواري هوندي آهي، مثال طور ”y“ ڪروموزوم تمام چست هوندا آهن. هڪ قسم جو نيوڪليائي تيزاب مسينجر آر اين اي (mRNA) ٺاهيندا آهن. هن قسم جي مسينجر آر اين اي جو پهريون ڪم اهڙي قسم جون پروٽين ٺاهڻ آهي. جيڪي نر (Maleness) پيدا ڪرڻ جون ذميدار

هجن، انهن پروٽين منجهان ڪجهه اهڙيون به پروٽين ٺهنديون آهن، جن تي اسپرميٽڊ منجهان اسپرم ٺهڻ جي تبديليءَ جي ذميواري هوندي آهي، پر اهو به وسارڻ نه گهرجي ته اسپرميٽڊ ۾ اڌ (haploid) ڪروموزوم هوندا آهن، جيڪي هر هڪ اسپرميٽڊ ۾ "X" يا "Y" ڪروموزوم جي الڳ الڳ خلين ۾ وڃڻ کان پهريائين نهن (يعني تخفيفي وڌ I (Meiotic division) کان اڳ ۾) اهڙي طرح اهي "Y" ڪروموزوم منجهان ٺهيل مسينجر آر اين اي پرائمري اسپرميٽو سائيٽ ۾ ٺهندا آهن ۽ اهي مسينجر آر اين اي سڀني جنسي خلين ۾ وريجي ويندا آهن ۽ سڀني سيڪنڊري اسپرميٽو سائيٽ ۾ اسپرميٽڊ منجهه اها "Y" ڪروموزوم منجهان ايندڙ جينيٽڪ انفريشن موجود هوندي آهي، جنهن ڪري اهي خاص قسم جون پروٽين ٺهنديون آهن ۽ انهن پروٽين جو ڪم آهي ”مڪمل اسپرم“ ٺاهڻ.

اسپرميٽڊ جي اسپرم ۾ تبديلي دوران گالجي ائپريٽس (Golgi apparatus) متجي اسپرم تي هڪ ٻئي شيءِ ٺاهيندي آهي، جنهن کي ايڪروسوم (Acrosome) چئبو آهي. ايڪروسوم جو ڪم ڳچڻ دوران آني جي ٻاهرين تهه کي ڦاڙي اسپرم کي آني اندر داخل ٿيڻ ۾ مدد ڪرڻ آهي. اهڙا اسپرم جن کي آني اندر داخل ٿيڻ جي ضرورت ڪونهي انهن ۾ ايڪروسوم ڪونه هوندو آهي. ايڪروسوم ۾ مختلف قسم جا مادا هوندا آهن، جن ۾ خاص اهميت انزائيم (Enzymes) کي هوندي آهي ۽ ڪڏهن ڪڏهن ايڪروسوم کي انزائيم جي ڳوٺري به سڏيو ويندو آهي. انهن انزائيم جو ڪم آني جي ٻاهرئين تهه کي ڪيميائي عمل ذريعي ٽنگ ڪرڻ آهي، جتان اسپرم آني اندر داخل ٿي وڃي.

اسپرم نهڻ وقت ڪجهه خاص قسم جون تبديليون اينديون آهن، جن ۾ هڪ ته ڪجهه اهڙي قسم جا پروٽين ٺاهين، جيڪي اسپرميٽڊ جي نيوڪليائي تيزاب (ڊي اين اي (DNA) کي اسپرم جي مغز ۾ سوڙهو ڪري بند ڪن ۽ ٻيو اسپرم جي پُچ کي ٺاهين، جنهن لاءِ پڻ خاص قسم جون پروٽين ٺهنديون آهن ۽ هنن پروٽين کي مائڪروٽيوبولس پروٽين (Microtubules) چئبو آهي. هن قسم جي پروٽين (پچ ٺاهيندڙ پروٽين) جي شروعات اسپرميٽڊ جي هڪ سينٽريول (Centriole) کان ٿيندي آهي.

آني نهڻ جو عمل

آني نهڻ دوران ٿيندڙ تبديلين جو مختصر احوال هن ريت آهي:

۱. پرائموريل جنسي خليا گوناڊس ۾ نه ٺهندا آهن، پر بدن جي ٻين حصن منجهان لڏ پلاڻ ڪري گوناڊس ۾ ايندا آهن.

۲. پرائموريل جنسي خليا وڌي ۽ وندجي اووگونيا ٺاهيندا آهن ۽ اووگونيا وري انن ۾ تبديل ٿينديون آهن.

۳. ڪجهه اووگونيا وڌڻ شروع ڪنديون آهن ۽ انهيءَ واڌ دوران هن اووگونيا جي واڌ تمام گهڻي ٿيندي آهي ۽ اصل ماپ کان 10,000 ڀيرا وڌيون ٿي وينديون آهن. هن قسم جي واڌ اووگونيا کي ڪجهه اهڙي قسم جا مادا موجود ڪري ڏيندي آهي، جن تي هو ٺهيل يا، ٺهندڙ ٻچوي ڳڻ (Embryo) جي نشو و نما ڪنديون آهن.

۴. ڪروموزوم جو ڊي اين اي (DNA) ٻيڻو ٿي ويندو آهي. هن قسم جي وڌندڙ يا ٺهندڙ خلين کي پرائمري اووگونيا (Primery Oo-gonia) چئبو آهي، پر شروع ۾ ٺهندڙ اووگونيا ۽ رواجي بدن جي

خلین جي ڪروموزومن جي ڊي اين اي (DNA) هڪجيترو هوندو آهي. جڏهن ته پرائمري اووگونیا ۾ ڪروموزومن جي ڊي اين اي (DNA) ٻيڻو ٿي ويندو آهي.

۵. پرائمري اووسائيت کي پرائمري اسپرميٽو سائيت وانگر خلین جي تخفیفی وندب منجهان گذرڻو پوندو آهي، تخفیفی وندب بعد انهن خلین ۾ ڪروموزومن جو تعداد اڌ (Haploid) رهجي ويندو آهي. اهڙيءَ طرح هيپلوئڊ آنا هيپلوئڊ اسپرم سان ملي هڪ ڊپلوئڊ (Diploid) ڳپيل آنو (Zygote) ٺاهي امبريوجينيسس (Embryogenesis) جو عمل شروع ڪندا آهن. امبريوجينيسس جو مطلب ڳپيل آني جي واڌ ۽ وندب آهي جنهن مان وڌيڪ خليا ٺهي ٻار يا، ٻچي جي ٺهڻ جو عمل شروع ڪندا آهن..

اسپرم ۽ آني ٺهڻ ۾ انهن جنسي خلین جي وندبڻ واري عمل دوران جينياتي ڦير گهير (Crossing over) ۽ ڪروموزومن جي ورڇ جي ترتيب جو سلسلو هڪجهڙو ٿيندو آهي. ٻنهي ۾ هڪ مکيه فرق سائٽوپلازم جي وندبڻ جو آهي. اووجينيسس ۾ هڪ پرائمري اووسائيت منجهان تخفیفی وندب I ۾ هڪ وڏي سيڪنڊري اووسائيت ۽ هڪ پولر باڊي (Polar Body) ٺهندي آهي؛ اها پولر باڊي اڳتي ٿي سگهي ٿي ته، ٻن پولر باڊيز ۾ وندبجي يا، نه سيڪنڊري اووسائيت تخفیفی وندب II ۾ هڪ وڏو ”مڪمل آنو“ ۽ هڪ ننڍڙي پولر باڊي ٺاهيندي آهي. اهڙي طرح ڪل ٽي پولر باڊيز ۽ هڪ ”مڪمل آنو“ ٺهندو آهي. اووسائيت ۾ سائيتو پلازم جي اڻپوري ورڇ جي اهميت اها آهي ته آني اندر سائٽوپلازم

جو مقدار وڌيڪ هوندو آهي ۽ ڪافي حد تائين ٻڇوي ڳپ (امبريو) جي واڌ لاءِ مادا موجود هوندا اٿس، جيڪي ٻڇوي ڳپ جي ڪامياب واڌ لاءِ ضروري آهن. آني ۽ اسپرم ٺهڻ ۾ ٻيو فرق اهو آهي ته اسپرميٽو جينيسس ۾ اسپرمينڊ، ”اسپرم“ ۾ تبديل ٿيندي آهي، جڏهن ته اووجينيسس ۾ تخفيفي ونڊ I ۽ II پوري ٿيڻ سان ئي بنا ڪنهن تبديليءَ جي مڪمل آئو تيار ٿي نڪرندو آهي.

مڪمل آني مان مقصد اهو آئو، جيڪو اسپرم سان ملي ڳيڃي سگهي. مڪمل آني ۾ نيوڪليائي تيزاب، پروٽين ۽ ٻيا مادا گهڻي انداز ۾ موجود هوندا آهن. پرائمري اووسائيٽ تخفيفي ونڊ I ۾ داخل ٿيڻ کان پوءِ پروفيز جي مختلف اسٽيجن يعني ليپوٽين (Leptotene) کان زائگوتين (Zygotene) پٽڪائي ٽين (Pachytene) منجهان گذرندي ڊپلوٽين (Diplotene) اسٽيج تي پهچندي آهي. ڊپلوٽين تي پهچڻ کان پوءِ پرائمري اسپرميٽو سائيٽ ۾ ڪروموزوم ٽلها (Condense) ٿي هڪ ٻئي کان الڳ ٿيڻ جي تياري ڪندا آهن ۽ پرائمري اووسائيٽ ۾ وري ڊپلوٽين تي پهچڻ کان پوءِ سندس ڪروموزوم تمام ڊگها ٿي ويندا آهن ۽ سندن مٿاڇري تي سنهڙين ٽاڳن جيئن لوپس (Loops) يا، ڪڙيون ٺهنديون آهن ۽ هن قسم جي ڪروموزوم کي چٽيدار ڪروموزوم (lamp brush) چئبو آهي. چٽيدار ڪروموزوم مختلف قسم جا آر اين اي ٺاهيندا آهن، جنهن جي ڪري ٺهندڙ آني جي واڌ ٿيندي آهي. هي آر اين اي انهن ڪروموزوم جي ڊي اين اي منجهان ٺهندا آهن. آر اين اي (RNA) جا مکيه ٽي قسم آهن :

۱. مسينجر آر اين اي (m RNA) پروٽين ٺهڻ ۾ امينو ايسڊ کان

ڪوڊ (code) ڪندڙ آر اين اي آهي.

۲. رائبوزومل آر اين اي (eRNA): رائبوزوم ٺاهيندڙ آر اين اي.

۳. ٽراسفر آر اين اي (tRNA): اهو آر اين اي جيڪو پروٽين ٺهڻ مهل مختلف امينو ايسڊ کي پنهنجي خاص جاءِ تي لڳائي.

چوڪرين ۾ پرائمري اووسائيت اڪثر ڪري ڊپلوٽين اسٽيج تي پهچڻ کان پوءِ بنا اڳتي وڌڻ جي ڪيترن ئي مهينن يا سالن تائين رهندي آهي. مثال طور: ماڻهوءَ (عورت) ۾ ڪجهه اووسائيت پنجاه سالن تائين رهنديون آهن. انهيءَ عرصي دوران هر مهيني صرف هڪ اوو سائيت ڀڄي راس ٿيندي آهي، هر مهيني هڪ اووسائيت جي ڀڄڻ جو دارو مدار هارمونن (Hormones) تي آهي. اڌوٽ عورتن مان جڏن يا نقصدار ٻارن ڄمڻ جو هڪ سبب اهو به آهي ته هن قسم جي اووسائيت (جنهن منجهان اهي ٻار ڄمن ٿا). ڊپلوٽين اسٽيج ۾ پنجن ڏهاڪن (Decades) لاءِ رهي ٿي، انهيءَ ڪري اهڙي قسم جي اووسائيت ۾ ڪروموزوم کي نقصان پهچڻ جا امڪان وڌيڪ هوندا آهن، انهيءَ ڪري خاص چوڻي آهي ته ”ٻار جواني جو سنو“.

ڇٽيدار ڪروموزوم منجهان ٺهندڙ آر اين اي (RNA) ۾ ڪجهه آر اين اي (RNA) ته مسينجر آر اين اي (RNA) هوندا آهن. اهي مسينجر آر اين اي ڪجهه اهڙي قسم جون پروٽين ٺاهيندا آهن، جيڪي پوءِ ٻچوي ڳپ (امبريو) جي واڌ لاءِ ڪم اينديون آهن. مسينجر آر اين اي سان گڏوگڏ رائبوزومل آر اين اي به تمام گهڻي انداز ۾ ٺهندا آهن. جيڪي رائبوزوم ٺاهيندا آهن، رائبوزوم خليي اندر اها جڳهه آهي، جتي پروٽين جي آميزش (Synthesis) ٿيندي آهي. رائبوزومل آر اين اي جي پيداوار هڪ اهڙي عمل ذريعي

ٿيندي آهي، جنهن کي خاص جيتن جي واڌاري وارو عمل (Selective gene Amplification) چئبو آهي. خاص جيتن جي واڌاري واري عمل ۾ ٻي اين اي جا اهي ٽڪرا جيڪي رڳو رائيٽوزومل آر اين اي ناهين ۽ انهن جي تعداد ۾ واڌارو ايندو آهي ۽ اهڙيءَ طرح رائيٽوزومل آر اين اي ناهيندڙ جينس (Genes) هزارن جي تعداد ۾ ٺهنديون آهن. ٻي اين اي جا اهي ٽڪرا گڏجي نيوكليولاءِ (Nucleoli) ٺاهيندا آهن، جيڪي رائيٽوزومل آر اين اي ٺاهيندا آهن. هڪ اووسائيٽ ۾ تقريباً هڪ هزار نيوكليولاءِ هوندا آهن ۽ سڀ جا سڀ رائيٽوزومل آر اين اي ٺاهيندا آهن.

چٽيدار ڪروموزم سڀني جاندارن ۾ ڪونه ٿيندا آهن. اهڙن جاندارن ۾ اووسائيٽ گهريل آر اين اي (RNA) سندس چوگرد خلين منجهان حاصل ڪندي آهي، مثال طور: ميون جي مک ڊروسوفلاءِ (Fruit fly, Drosophila) ۾ هڪ اووگونيم (Oogonium) چار ڀيرا وڌجي سورهن (۱۶) خليا ٺاهيندي آهي، جن منجهان صرف هڪ اووسائيٽ جو ڪم ڏيندو آهي، باقي پندرهن خليا اووسائيٽ جي مدد ڪندا آهن. هنن مددگار خلين کي خوراڪ مهيا ڪندڙ خليا (Nurse cells) چئبو آهي. خوراڪ مهيا ڪندڙ خلين جو ڪم اووسائيٽ کي کاڌ خوراڪ پهچائڻ آهي، ان کان سواءِ ٻيا به ڪيترائي مادا، جن ۾ يوڪ "Yolk" (جيڪو ٿڌائڻ جانورن جي جيري (ڌيري) ۾ پيدا ٿئي، اووسائيٽ ۾ پهچندو آهي) يوڪ سان گڏوگڏ گلائيڪوجن (Glycogen) چرٻي ۽ ڪيتريون ئي پروٽينون اووسائيٽ ۾ اچي گڏ ٿينديون آهن، جيڪي اووسائيٽ جي لاءِ ڪم ايندڙ طاقت مهيا ڪنديون ۽ ٻچي ڳي جي وڌ ۽ واڌ کي

وڌائينديون آهن.

تڻائت جانورن، مثال طور: ماڻهوءَ ۾ اووسائيت جو پڇڻ (Maturation) ڪيترن ئي هارمونن (Hormones) جي اثر هيٺ ٿيندو آهي. اووسائيت جنهن دائري اندر موجود هوندي آهي، ان کي فالیکل (Follicle) چئبو آهي. فالیکل مان آني جي ٻاهر نڪرڻ جو دارو مدار مٿين هارمونن تي آهي ڄم روڪ دوائون يا ڄم روڪ گوريون به اووسائيت کي ضابطي ۾ ڪرڻ وارن هارمونن جون ٺهيل هونديون آهن. انهن ڄم روڪ گورين ۾ ٻن قسمن جا هارمون استعمال ٿيل هوندا آهن: هڪ ايسٽروجن (Estrogen) ۽ ٻيو پروجيسٽران (Progesterone) جيڪي آني جي فالیکل کي ڪنٽرول ڪرڻ ۾ مدد ڏيندا آهن ۽ انهن جي واڌ انهن ٻن هارمونن جو ئي ڪم آهي. ڄم روڪ دوائن يا گورين ۾ انهن ٻنهي هارمونن جو مقدار يا، گهٽائي اهڙيءَ طرح استعمال ٿيل هوندي آهي، جيڪڏهن ڪا عورت اهي ڄم روڪ گوريون کائيندي ته سندس آني جو فالیکل منجهان نڪرڻ ۽ آني جي واڌ ٻئي بند ٿي ويندا ۽ اهڙيءَ طرح نه آني نڪرندو ۽ نه وري کيس پيٽ ٿيندو.

باب ڇهون

ڳيڄڻ (Fertilization)

ڳيڄڻ هڪ اهڙو عمل آهي، جنهن ۾ اسپرم، آني اندر ملي ويندو آهي ۽ اڪثر حالتن ۾ اسپرم جو صرف مٿو (جنهن ۾ کروموزوم هوندا آهن) يعني اسپرم خليي جو صرف مرڪز (Nucleus) آني اندر وڃي سگهندو آهي. اسپرم ۽ آني جي ميلاپ ڪري جيڪي به تبديليون ۽ ڪيميائي عمل شروع ٿين ٿا، انهن جي نتيجي ۾ آخرڪار پورو جاندار ٺهي تيار ٿئي ٿو.

ڳيڄڻ جا بنيادي جزا: اليڪٽران خوردبينيءَ ذريعي ماهر ڳيڄڻ جا ڪجهه وڌيڪ تفصيل معلوم ڪري سگهيا آهن. اسپرم ۽ آني جي جوڙجڪ ۾، ساڳي ئي جانور جي اسپرم ۽ آني جو هڪ ٻئي کي سڃاڻڻ ۽ ٽڪرڻ ۽ آني جي ٻاهرين ڪل تي ظاهر ٿيندڙ تبديليون اچي وڃن ٿيون:

اسپرم جي بناوت: جوڙجڪ جي بنيادن مطابق اسپرم ٽن حصن ۾ ورهايل آهي:

۱. مٿو (Head)

۲. ڳچي (Neck)

۳. پٺ (Tail)

اسپرم جي اڳئين ڌڙ يعني مٿي ۾ جينيٽڪ انفرميشن (جينيائي مادو)، ايڪروسوم (Acrosome) سمايل هوندا آهن. ايڪروسوم جو اهم ڪم آني جي ڪل کي ٽوڙڻ ۽ آني اندر اسپرم

جي جزن کي گهڙو لاءِ جڳه ناهي. اسپرم جي ايڪروسوم ۾ هڪ پروٽين بائنڊن (Bindin) ڳولي لڌي وئي آهي؛ هن پرزتين جو ڪم آني جي مٿاڇري جي سڃاڻپ ڪرڻ ۽ اسپرم کي آني جي ٻاهرئين ڪل سان ملائڻ آهي. ايڪروسوم ۾ بائنڊن پروٽين (Bindin) سان گڏ ڪجهه انزائيم به موجود هونديون آهن، جن کي گارينڊز (Lysin) انزائيم چئبو آهي. هنن گارينڊز انزائيم جو اهو ڪم آهي ته، جيئن ئي آني سان اسپرم ٽڪرجي ته آني جي ڪل کي انهيءَ جاءِ وٽان ڳاري ڇڏين ته جيئن اسپرم اُتان اندر لنگهي سگهي.

اسپرم جي مٿي (جنهن ۾ مرڪز هوندو آهي) جي پٺيان ئي اسپرم جي ڳچي هوندي آهي. اسپرم جي هن حصي ۾ مائٽوڪانڊريا (Mitochondria) ۽ سينٽرول (Centriol) جي سڃاڻپ ڪري سگهجي ٿي. مائٽوڪانڊريا جو ڪم اسپرم کي سگهه (طاقت - Energy) مهيا ڪرڻ آهي. جڏهن ته سينٽرول جو ڪم ڳپيل آني (جنهن کي ڳپ (Zygote) به چئبو آهي) جي شروعاتي ونڊجڻ واري عمل ۾ مدد ڪرڻ آهي. سينٽرول جو هڪ ٻيو تسر به اسپرم جي ڳچيءَ ۾ موجود هوندو آهي، جنهن جي ذريعي اسپرم جو پيچ سندس ڳچيءَ سان ڳنڍيل هوندو آهي. اسپرم جو پيچ مائڪروٽيوبول (Microtubule) پروٽين جي تندن (Filaments) جو ٺهيل هوندو آهي. هن پروٽين جو ڪم سسڻ ۽ وڌڻ آهي، جنهن جي ڪري اسپرم جي چرپر ٿيندي آهي ۽ اسپرم ڦرج (Vagina) اندر اڳتي وڌي سگهندو آهي.

آني جي بناوت ۽ آني جا ٻاهريان تهه: آني ۾ پروٽين ۽ نيوڪليائي تيزاب تمام گهڻي انداز ۾ جمع ٿي ويندا آهن، جن جي

ضرورت پڇوي ڳپ- امبريو (Embryo) جي واڌ دوران پوندي آهي. آني اندر پروٽين ۽ نيوڪليائي تيزاب سان گڏوگڏ ٻيا به ڪيترائي ڪيميائي مرڪب ٺهندا آهن، جن جي ضرورت ڳيڄڻ دوران ۽ انهي کان پوءِ به پوندي آهي. آني جي ٻاهرئين ڪل جي اندران ۽ سندس سائٽوپلازم ۾ ڪجهه اهڙا جزا به موجود هوندا آهن، جن کي ڪورٽيڪل گرنیولس (Cortical granules) چئبو آهي. هي گرنیولس آني جي گالجي ڪامپليڪس منجهان ئي ٺهندا آهن. هنن جي مٿاڇري تي هڪ قسم جون پروٽين هونديون آهن ۽ انهن پروٽين سان ڪنڊ جا ذرڙا ڳنڍيل هوندا آهن ۽ ڳيڄڻ دوران تمام اهم ڪم اسپرمر ۽ آني جو هڪ ٻئي کي سڃاڻڻ آهي ته واقعي ٻئي ساڳي جنس (جاندار) جا جنسي خليا آهن ۽ سندن ميلاپ سرانجام ڏيندا آهن.

آني ٺهڻ دوران سندس چوڌاري ڪيترائي تهه اچي ويندا آهن. انهن تهه جو ڪم آني جو بچاءُ ڪرڻ ۽ صحيح اسپرمر سان ميلاپ ڪرائڻ آهي. اڪثر جانورن جي آئن منجهه هڪ فرتيلائيزيشن ميمبرين (Fertilization Membrane) ٺهندي آهي. اهڙيءَ طرح سان آني جي ٻاهرين پلازما ميمبرين (Plasma Membrane) اندر هڪ ٻيو به تهه ٺهندو آهي. ڪُمين ۽ پکين جي آئن ۾ انهيءَ تهه يا، ڪل کي (Vitelline Membrane) وائيٽلائن ميمبرين چئبو آهي. مڇين ۾ ٺهندڙ هن قسم جي ڪل يا تهه کي (Chorion Membrane) ڪورين ميمبرين چئبو آهي. جڏهن ته ٿڌا جانورن ۾ هن تهه کي زونا پيلوسيدا (Zona Pellucida) چئبو آهي.

ڪارٽيڪل گرنیول ۾ انزائيم بناوٽي پروٽين ۽ پروٽين سان ڳنڍيل ڪنڊ جا ذرڙا موجود هوندا آهن. جيئن ئي ڪو اسپرمر آني

سان ٽڪرائيندو ته ڪارٽيڪل گرنیول منجهان ڪجهه انزائم ٺهي جي پلازما ميمبرين ۽ وائٽلائن ميمبرين وچ ۾ اچي وينديون آهن. جنهن جي ڪري ٺهي تي اسپرم چنبرڙ وارين جاين تي ٿوري تبديلي اچي ويندي آهي. اهو ئي سبب آهي جو پيو اسپرم انهيءَ ٺهي سان نه ملي سگهندو ۽ اهڙي طرح سان هڪ ٺهي سان صرف هڪ اسپرم جو ئي ميلاپ ممڪن آهي. پر انهيءَ کان پهرين فرتلائيزيشن يا اسپرم ۽ ٺهي جي ميلاپ کان پوءِ صرف هڪ سيڪنڊ ۾ ڪنهن حصي اندر ڪافي انداز ۾ سوڊيم جا آئنا (Sodium ions) ٺهي اندر اچي ويندا آهن، جنهن جي ڪري ٺهي جي مٿاڇري جي برقي وولٽيج (Voltage change) ۾ تبديلي اچي ويندي آهي، جنهن سان پهرئين اسپرم کان پوءِ پيو اسپرم ٺهي سان چنبرڙي نه سگهندو آهي ۽ نه وري ٺهي اندر داخل ٿي سگهندو آهي.

اسپرم ۽ ٺهي جو ميلاپ: جيئن ئي اسپرم ٺهي جي ٻاهرين ڪل تي چنبرڙندو آهي تيئن ئي اسپرم جي اڳئين حصي (Head) ۾ موجود ايڪروسوم (Acrosome) ڦاٽي پوندو آهي ۽ ٺهي ۾ اسپرم جون ٻاهريون ڪلون پاڻ ۾ ڳنڍجي وينديون آهن ۽ ايڪروسوم ۾ موجود ڳارينڊر (Lysin) انزائم ٺهي جي پلازما ميمبرين تي هارجي پونديون آهن، جنهنجي ڪري اها ڪل انهيءَ جاءِ وٽان ٽٽي پوندي آهي ۽ اسپرم کي ٺهي اندر وڃڻ ۾ تمام گهڻي مدد ملي ويندي آهي. جيئن ئي اسپرم جو ”مٿو“ تقريباً اڌ جيترو ٺهي اندر هليو ويندو آهي ته ٺهي جي ڪل منجهان ڪجهه مائڪروولي (Microvilli) اڀرنديون آهن. ساڳئي طرح اسپرم منجهان به مائڪروولي اڀرنديون آهن، اهڙي

طرح آني ۽ اسپرم ٻنهي جون مائڪروولي پاڻ ۾ ڳنڍجي وينديون آهن ۽ اسپرم جو مرڪز ۽ مرڪز سان لاڳو ٻيا جزا آني اندر هليا ويندا آهن. جنهن سان آني ۽ اسپرم جي ميلاپ جي عمل دوران سندن مٿاڇرا پوريءَ طرح پاڻ ۾ ملي هڪ ٿي ويندا آهن ۽ پوءِ هڪ مڪمل ڳريل آتو يا خليو تيار ٿي ويندو آهي ۽ ڪجهه ڪلاڪن کان پوءِ وندجڻ شروع ٿي ويندو آهي. پهريائين هڪ منجهان ٻه خليا، ٻن منجهان چار، چئن منجهان اٺ، اٺن منجهان سورنهن، سورنهن منجهان ٻٽيهه، ٻٽيهن منجهان چوهٺ ۽ اهڙيءَ طرح هزارن جي تعداد ۾ خليا ٺهي ويندا ۽ وڌندڙ ڳڻ رحم (Uterus) جي ڪل سان چمڙي ويندو آهي. اهڙي طرح وڌندڙ ڳڻ جي واڌ جاري رهندي ۽ سندس کاڌ خوراڪ ماءُ جي بدن مان پهچندي رهندي آهي ۽ مقرر وقت کان پوءِ نتيجي ۾ هڪ مڪمل جانور تيار ٿي ويندو.

باب ستون

ڪروموزوم ۽ انهن جي درجا بندي

تعارف : ڪروموزومن جو مختصر ذڪر ته اڳ ۾ خلين جي وندجڻ ۽ ڳيڻ واري حصي ۾ اچي چڪو آهي، پر هن باب ۾ ڪروموزوم تفصيل سان بحث هيٺ آندا ويا آهن. هن حصي ۾ ڪروموزومن جي بناوت، ڪيميائي جوڙجڪ، قسم ۽ درجابندي تي ٿيل ڪوجنا مطابق تفصيل ڏنا ويا آهن.

ڪروموزوم خليي جي صرف مرڪز ۾ موجود رهن ٿا، جيڪي تمام اهم نيوڪليائي جزن منجهان آهن. هر ڪروموزوم هڪ نرالي جوڙجڪ، حيثيت ۽ ڪم ۾ خود مختيار ماليڪيول جزو آهي. هو پنهنجو پاڻ واڌ جي قابل آهي ۽ موروثيت، جينيائي تبديلين ۾ ڦير گهير ۽ ارتقائي واڌاري ۾ اهم ڪردار ادا ڪري ٿو.

ڪروموزومن تي ڪوجنا ڪندڙ ڪن سائنسدانن جو ذڪر هيٺين طرح آهي:

ڊبليو فليمنگ (1879 W. Fleming) پهريون سائنسدان هو، جنهن ڪروموزومن جي ادوات ٿيڻ کي ظاهر ڪيو ۽ کين ڪرومٽين جو نالو ڏنو.

ڊبليو روءِڪس (1883 W. Roux) ۾ اهو شڪ ڏيکاريو ته ڪروموزوم موروثي خاصيتن جي تبديلي (هڪ نسل کان ٻئي نسل ڏانهن) ۾ خاص ڪردار ادا ڪن ٿا.

بينڊن ۽ بووري (Benden and Boveri) 1887 ۾ اها رپورٽ ڏني ته هر جاندار ۾ ڪروموزوم هڪ مقرر تعداد ۾ موجود هوندا آهن.

ڪروموزوم کي ”ڪروموزوم“ نالي ڏيڻ وارو ڊبليو والڊيئر (W. Walderyer - 1888) هو. اصل ۾ ڪروموزوم يوناني ٻوليءَ جو لفظ آهي ۽ ٻن لفظن مان جوڙيو آهي: (جنهن ۾ ڪرومو = رنگ + سوما يا زوما = بت يا، مادو) ۽ جڏهن ٻنهي لفظن کي ڳنڍيو ويندو ته، اهو ٿيندو ”ڪروموزوم“، جنهن جي لفظي معنيٰ آهي جلدي رنگجي ويندڙ مادا.

1902 ۾ ڊبليو. ايس. سوٽن (W.S. Sutton) ۽ ٽي بلووري (T. Boveri) اهو ٻڌايو ته ڪروموزوم موروثي خاصيتون کڻي ويندڙ طبعي مادا آهن.


مارگن (Morgan) 1933 ۾ سندس ڪوجنا مطابق اهو ٻڌايو ته، موروثي خاصيتن کي هڪ نسل کان ٻئي نسل تائين پهچائڻ ڪروموزومن جو ڪم آهي.

بهرحال ڪوجنا ۽ ايباس جيترو گهڻو ڪجي اوترو گهٽ آهي ۽ اڃان تائين ڪروموزومن تي ڪوجنا جاري آهي، پر هن وقت گهڻي ڪوجنا انهيءَ تي پئي هلي ته هڪ جين (Gene) ڪروموزوم جي ڪهڙي حصي ۾ واقع آهي. هن وقت سائنسدانن جو انهيءَ ڳالهه تي اتفاق آهي ته موروثي خاصيتن جي ذميداري 90 سيڪڙو يا اڃان به مٿي ڪروموزومن جي جوڙجڪ ۾ سمايل آهي ۽ ڪروموزومن ۾ هڪ ننڍڙي تبديلي به جاندارن جي واڌ تي تمام گهڻو اثر ظاهر ڪندي ۽ جي ڪنهن اهم جين ۾ تبديلي اچي وڃي ٿي ته اها ان جاندار لاءِ ڏاڍي هائيڪار ثابت ٿيندي.

تعداد جي لحاظ کان ڪروموزوم: پهريائين اهو ڏسجي ته ڇا ڪروموزوم تعداد جي لحاظ کان سڀني جاندارن ۾ هڪ جيترا هوندا آهن؟ جهڙي طرح هر هڪ جانور جي بناوت، قد ۽ بت هڪٻئي کان مختلف آهي، اهڙيءَ طرح ڪروموزومن جو تعداد به هر جاندار (جانورن توڙي وڻن) ۾ مختلف هوندو آهي، پر انهيءَ سان گڏوگڏ هڪ جاندار جي سڀني بدني خلين ۾ ڪروموزومن جو هڪ مقرر تعداد موجود هوندو آهي: يعني سڀني بدني خلين ۾ ساڳئي تعداد ۽ ساڳئي جنس واري جانور جي هڪ نسل کان ٻئي نسل ۾ به ڪروموزوم انهيءَ ساڳئي مقرر تعداد ۾ موجود هوندا آهن، مثال طور: هڪ بصر جي خليي ۾ ڪل 16 ڪروموزوم آهن ۽ جڏهن انهن بصرن جو ٻج ٻيهر پوکبو ته انهي ۾ پڻ 16 ڪروموزوم هوندا. اهڙي طرح سان هڪ ڪبوتر جي هر هڪ خليي ۾ 80 ڪروموزوم هوندا آهن ۽ سندس ٻچن جي هر بدني خليي ۾ به 80 ڪروموزوم هوندا. ٻي ڳالهه ته ڪروموزوم هميشه جوڙن جي صورت ۾ هوندا آهن، جيئن بصر ۾ ڪل 16 ڪروموزوم آهن ته، جوڙن جي صورت ۾ اهي اٺ 8 جوڙا ٿيندا ۽ ڪبوتر ۾ 40 جوڙا ٺهندا. نر ۽ ماديءَ ۾ ڪروموزومن جو ڪل تعداد ۽ جوڙن جو تعداد اڪثر ساڳيو ئي هوندو آهي، پر آني ۾ ڪل ڪروموزومن جو اڌ (تعداد ۾) يعني ڪبوتر جي آني ۾ صرف 40 ڪروموزوم هوندا آهن ۽ اهي جوڙن جي صورت ۾ نه هوندا آهن اهڙيءَ طرح اسپرم ۾ به ڪل ڪروموزومن جو اڌ يعني 40 ڪروموزوم هوندا آهن. لڳ (جنسي ميلاپ) کان پوءِ جڏهن آنو ماديءَ جي پيٽ ۾ ڳچي ويندو

آهي ته ڳڻيل آني ۾ ڪروموزومن جو تعداد وري ٻيڻو يعني 80 ٿي ويندو ۽ انهيءَ آني مان ڦٽندڙ ٻچي جي هر بدني خليي ۾ ڪروموزومن جو ڪل تعداد 80 هوندو.

اڪثر ماڻهن جي اها سوچ هوندي آهي ته جيئن جاندار يا جانور وڏو هوندو اوترو ئي سندس ڪروموزومن جو تعداد به گهڻو هوندو، پر اهو صحيح نه آهي. ماڻهوءَ جي هر بدني خليي ۾ چاڻايتاليهه 46 ڪروموزوم هوندا آهن؛ يعني 23 جوڙا، پر هڪ ميوي جي مک ۾ ڪروموزومن جو ڪل تعداد اٺ 8 آهي يعني چار جوڙا. جڏهن ته هڪ اميبا (Amoeba) جيڪو هڪ خليي وارو جاندار آهي انهيءَ ۾ 250 ڪروموزوم هوندا آهن. اهڙيءَ طرح هڪ ئي قسم جي جاندارن جي مختلف ذاتين (Species) ۾ به ڪروموزوم جي تعداد مختلف هوندو آهي. اهو به غلط آهي ته مختلف ذات وارن جانورن ۾ ڪروموزومن جو تعداد هڪجهڙو هوندو ته اهي جانور هڪجهڙا هوندا. بيشن بدڪ ۽ ڪيترن ۾ ڪل 80 ڪروموزوم (هر خليي ۾) آهن پر ٻئي مختلف ذات جا پکي آهن. ان جو ٻيو مثال؛ ڪڪڙ ۽ ڪتي جو آهي، ٻن جي خليا ۾ ڪل 78 ڪروموزوم هوندا آهن، پر اهي ٻئي مختلف ذات وارا جانور آهن. بدڪ ۽ ڪيترن ته زري به پکي آهن، پر ڪڪڙ پکين ۾ ۽ ڪيترن کير ڏيندڙ جانورن ۾ اچي رچي ٿو. انهيءَ سان گڏوگڏ هڪ ذات وارا جانور ٻين ۾ ڪروموزومن جو تعداد ته هڪ جهڙو هوندو آهي، پر هر هڪ شڪل نه هوندا آهن. هر ماڻهوءَ ڪنهن نه ڪنهن خاصيت ۾ هڪجهڙي کان



خاڪو ۸. ڪبوتر جي نسل جي واڌاري جو عمل جنهن ۾ ڪروموزوم جو مقرر تعداد هڪ نسل کان ٻئي نسل تائين هڪ جيترو رهي ٿو.

مختلف هوندو آهي. انهيءَ جو سبب به جينيائي ٽيرگهير (Crossing over) آهي، جيڪا اسپرم ۽ آني ٺهڻ وقت تخفيفي وند دوران ٿئي ٿي. ڪنهن به جانور جي واڌ ۽ بت، شڪل ۽ شبيهه جو دارو مدار ان ۾ موجود ڪروموزومن جي تعداد تي هوندو آهي ۽ جي انهيءَ کان ٿورو اڳتي هلبو ته معلوم ٿيندو ته اهو عمل ڪروموزوم ۾ موجود جينس (Genes) تي ٻڌل آهي. هر جاندار جي واڌ سندس جينس جي حڪمن مطابق ٿيندي آهي، جيئن ته هر ذات ۾ ڪروموزوم جو هڪ مقرر تعداد آهي ۽ هڪ ذات وارن جانورن جي وصف به اها آهي ته نر ۽ ماديءَ جي جنسي ميلاپ جي نتيجي ۾ سندن آڻو ڳيجي وڃي ۽ ان ڳيل آني جي واڌ ٿئي ۽ آخر ۾ ٻچو پيدا ٿئي، هن مختلف ذاتين جي جانورن ۾ پهريائين ته جنسي ميلاپ ٿي ڪونه ٿيندو پر جي ٿيو ته آڻو ڳيو ٿي ڪونه پر جي ڳيجي به ويو ته ان مان ڪا عجيب مخلوق پيدا ٿيندي. خچر جي پيدائش به انهيءَ قسم جو مثال آهي، گهوڙي ۽ گڏهه جي وچ ۾ جنسي ميلاپ ٿي وڃي ٿو، آڻو به ڳيجي وڃي ٿو ۽ ٻچو يعني خچر جي پيدائش به ٿئي ٿي ۽ ڏسڻ سان خچر ۾ ڪا خرابي به نظر ڪونه ايندي پر خچر پنهنجو نسل پيدا نه ڪري سگهندو، ڇو ته اهي جنسي طرح ڪڍڻا هوندا آهن.

مختلف جانورن ۾ ڪروموزوم جو تعداد:

ڪل	جوڙا	آنو	اسپرم	جاندار جو عام ۽ انگريزي ۾ نالو
30-40	15-20	-	-	پئراميشيم Paramecium
32	16	-	-	هائڊرا Hydra
24	12	-	-	راؤنڊ ورم Roundworm
54	27	-	-	ڪوڏ Helix
56	28	28	28	پٽ ڪينٽون Sialk worm
12	6	6	6	مڪ (گهريلو مڪي) House Fly
6	3	3	3	مچر Mosquito
32	16	16	16	ماڪيءَ جي مڪ Apis
100	50	50	50	گولڊ فش (سوني مچي) Carassius
376	188	188	188	ڪري فش Cray fish
26	13	13	13	ڏيڏر Frog
22	11	11	11	ڏيڏر Bufo
36	18	18	18	ڏيڏر Xenopus
78	39	39	39	ڪڪڙ Chicken
80	40	40	40	بدڪ Duck
40	20	20	20	ڪٽو Mouse
44	22	22	22	سهڙ (سهو) Rabbit
42	21	21	21	عام ڪٽو Rattus
78	39	39	39	ڪٽو Dog

جاندار جو عام ۽ انگري ۾ نالو	اسپرم	آنو	جوڙا	ڪل
بلي Cat	19	19	19	38
گهوڙو Horse	32	32	32	64
گڏھ Donkey	31	31	31	62
سوئر Pig	20	20	20	40
ريڊ Sheep	27	27	27	54
ٻڪري Goat	30	30	30	60
پولڙو Rhesus (Monkey)	21	21	21	42
گوريلا Gorilla	24	24	24	48
چيمپنزي Chimpanzee	24	24	24	48
ماڻهو Homo	23	23	23	46

ڪروموزومن جي ڊيگهه ۽ بناوت: ڪروموزومن، ۾ جينس سمائل هونديون آهن، جيڪي ڊي اين اي ۽ پروٽين جا ٺهيل آهن. ڪروموزومن جي ڊيگهه هر ذات جي جاندارن ۾ مختلف هوندي آهي.

ڊي اين اي (Deoxyribonucleic acid -DNA) هڪ نيوكليائي تيزاب موروثي مادو يا جينيائي مادو آهي: هي مادو ڊگهن وڪوڙيل تندن جي شڪل ۾ ڪروموزومن اندر موجود هوندو آهي ۽ جينس جو ٺهيل آهي، ڊي اين اي جو ڪوبه هڪ ٽڪر هڪ جين ٿي سگهي ٿو.

۽ هڪ ذات ۾ هڪ مقرر ڊيگهه وارا ڪروموزوم موجود هوندا آهن. ڪروموزومن جي ڊيگهه 0.2μ مائڪران کان 50μ مائڪران تائين ۽ گولائي 0.2μ مائڪران کان 20μ مائڪران تائين هوندي آهي، مثال

طور: ماڻهوءَ جي ڪروموزوم جي ڊيگهه 6۸ مائڪران تائين آهي. عام طور تي وڏا ڪروموزوم انهن جانورن ۾ هوندا آهن. جن ۾ سندن تعداد گهٽ هوندو آهي ۽ ساڳئي طرح ننڍا ڪروموزوم وري انهن جانورن ۾ هوندا آهن، جن ۾ سندن تعداد وڌيڪ هوندو آهي. خلين جي ونڊجڻ دوران ڪروموزوم جي شڪل بدلجندي رهندي آهي. هڪ خليي جو جڏهن ونڊجڻ وارو عمل پورو ٿيندو آهي ته ٻيهر ونڊجڻ جي عمل شروع ٿيڻ کان اڳي هڪ ڏاڪو اهڙو به ايندو آهي، جنهن کي ”خلين جي ونڊجڻ ۾ وقفو“ چئبو آهي. هن وقفي دوران ڪروموزوم تمام سنها، ويڙهيل، رٿر نما ڏاڳي جي شڪل جا هوندا آهن، جيڪي جلدي رنگيو ويندا آهن. پر ميتافيز ۽ ائنايفز اسٽيج دوران ڪروموزوم وڌيڪ وڪوڙيل ۽ ٿلها ٿي ويندا آهن ۽ هڪ عام خوردبينيءَ ذريعي به ڏسي سگهجن ٿا.

بناوت جي لحاظ سان ڪروموزوم ۾ هڪ چٽي ڳنڍ (Centromere) ٿيندي آهي، جيڪا ڪروموزوم کي سندن ڊگهائي مطابق ٻن اڌن ۾ ورهائيندي آهي، جن کي ڪروموزوم جون ٻه ٻانهون سڏيو ويندو آهي. ڪروموزوم جي ٻن ٻانهن کي جوڙيندڙ ڳنڍ يا سينٽروميئر جي بيهڪ هر ڪروموزوم ۾ مختلف هوندي آهي، جنهن مطابق ڪروموزوم کي سندن سينٽروميئر جي بيهڪ مطابق چئن قسمن ۾ ورهايو ويو آهي:

۱. ٽيلوسينٽرڪ (Telocentric): ڪروموزوم جي هن قسم ۾ سينٽروميئر، ڪروموزوم جي هڪ چيڙي تي بيٺل هوندي آهي.
۲. ايڪروسينٽرڪ (Acrocentric): هنن ڪروموزومن ۾

سينٽروميٽر، ڪروموزوم کي ٻن اڌن ۾ ته ورهائيندي آهي، پر هڪ ٻانهن تمام ننڍي ته ٻي تمام ڊگهي هوندي اٿن.

۳. سبميٽا سينٽروڪ (Submetacentric): هي ڪروموزوم انگريزي اکرن "L" يا "J" شڪل جا ٿيندا آهن ۽ سندن ٻنهي ٻانهن ۾ ٿورو فرق هوندو آهي.

۴. ميٽاسينٽرڪ (Metacentric): هي ڪروموزوم انگريزي اکر "V" جي شڪل جهڙا ٿيندا آهن ۽ ٻنهي ٻانهن جي ڊيگهه هڪ جيتري هوندي اٿن، ڇو ته سينٽروميٽر ڪروموزوم جي وچ تي هوندي آهي.

ماڻهوءَ جي ڪروموزومن جي درجابندي: ماڻهوءَ جا ڪروموزوم ٻه ٻين جاندارن وانگر جيوو خلين جي وندجڻ واري عمل ۾ ميٽافيز اسٽيج دوران الڳ الڳ ٿي ظاهر ٿيندا آهن. ميٽافيز اسٽيج دوران ڪروموزومن کي الڳ الڳ ڪري کين ٻن ٻن هڪجهڙن ڪروموزومن جي جوڙي ٺاهي هڪ مخصوص درجابندي (Standard classification) مطابق سندن ترتيب ڏني وئي آهي، جنهن کي ڪيريو ٽائپنگ (Karyotyping) چئبو آهي.

ڪروموزومن جي پهرئين درجابندي 1960 ۾ ڊينور (Denver) ڪالراڊو (Colorado) آمريڪا ۾ سائنسدانن (Cytogenetists) جي هڪ گڏجاڻي ۾ ڪئي وئي. هن گڏجاڻي ۾ ماڻهو جي ڪروموزومن کي ستن گروپن ۾ ورهايو ويو ۽ سڃاڻپ خاطر انهن ستن گروپن جا نالا انگريزي اکرن مطابق "A" کان "G" تائين رکيا ويا. ڪروموزومن جي هيءَ ترتيب هر هڪ ڪروموزوم جي مجموعي ڊيگهه ۽

سينٽروميٽر (Centromere) جي بيهڪ مطابق ڪئي وئي.

سينٽروميٽر جنهن کي پرائمري ڪنسٽرڪشن (Primary Constriction) به چئبو آهي ۽ هو لازمي طور هر ڪروموزوم ۾ موجود هوندي آهي. ماڻهوءَ جا ڪروموزوم سينٽروميٽر جي بيهڪ مطابق ٽن قسمن جا ٿيندا آهن:

۱. ميٽا سينٽرڪ ڪروموزوم Metacentric

۲. سب ميٽا سينٽرڪ ڪروموزوم Submetacentric

۳. ايڪرو سينٽرڪ يا سٽلائٽ ڪروموزوم Acrocentric or Satellite

جيئن ته ماڻهوءَ ۾ ڪروموزومن جا ڪل 23 جوڙا آهن، تنهن ڪري هڪ سيٽ يعني 23 ڪروموزومن کي نمبرن ۽ انگريزي اکرن ذريعي نالا ڏنا ويا آهن. 23 ڪروموزومن کي 1 کان 23 تائين نمبر ڏنل آهن، مثال طور: ڪروموزومن جي پهرئين جوڙيءَ جي ٻنهي ڪروموزومن کي هڪ نمبر "1" ڏنل آهي اهڙيءَ طرح 23 جوڙيءَ ۾ جنسي ڪروموزومن "X" ۽ "Y" اچي وڃن ٿا.

ماڻهوءَ جي ڪروموزومن کي نمبرن مطابق الڳ الڳ ڪري لکڻ:

۱. ميٽا سينٽرڪ ڪروموزوم: 1, 3, 16, 19 ۽ 20

۲. سب ميٽا سينٽرڪ ڪروموزوم، 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 ۽ "X"

۳. ايڪرو سينٽرڪ ڪروموزوم، 13, 14, 15, 21, 22 ۽ "Y"


ڪروموزومن جي چوٿين قسم کي ٽيلوسينٽرڪ ڪروموزوم چئبو آهي، جيڪي ماڻهوءَ ۾ ڪونه ٿيندا آهن، "Y" ڪروموزوم کان

سواء ماڻهو جي سڀني ايڪروسينٽرڪ ڪروموزومن ۾ ڪرومٽين
 مادا سنهڙن ڌاڳن ذريعي ڪروموزومن جي ننڍن ٻانهن سان ڳنڍيل
 هوندا آهن. انهيءَ جوڙ کي سيڪنڊري ڪنسنٽرڪشن (Secondary
 Constriction) چئبو آهي. ڪرومٽين ۽ سيڪنڊري ڪنسنٽرڪشن
 کي سٽلائيٽ (Satellite) چئبو آهي.

ميٽافيز اسٽيج دوران سٽلائيٽ پاڻ ۾ ملي (نيوڪليس)
 مرڪز اندر هڪ ننڍڙي چڱي جي صورت وٺندا آهن. جنهن کي
 نيوڪليولس (Nucleolus) چئبو آهي ۽ نيوڪليولس جو ڪم
 رائيٽوزومل آر اين اي (rRNA) ٺاهڻ آهي.

ڊينور (Denver) درجابندي مطابق ڪروموزومن جا ستئي گروپ
 سندن ڊيگهه مطابق يعني پهريائين ”ڊگها ۽ پوءِ ننڍا“ هيٺين ريت
 ورهايا ويا آهن:

- | | |
|--------|--|
| گروپ A | ڪروموزوم 3, 2, 1 . |
| گروپ B | ڪروموزوم 5, 4 . |
| گروپ C | ڪروموزوم 6 کان 12 ۽ "X" . |
| گروپ D | ڪروموزوم 13, 14, 15 (وڏا ايڪرو سينٽرڪ
سٽلائيٽ ڪروموزوم). |
| گروپ E | ڪروموزوم 16, 17, 18 . |
| گروپ F | ڪروموزوم 19 ۽ 20 . |
| گروپ G | ڪروموزوم 21, 22 ۽ "Y" (ننڍا ايڪرو سينٽرڪ
سٽلائيٽ ڪروموزوم). |



شکل ۳. اچيون Q ۽ G نڱيتو بينڊس

چٽيون ڪاريون Q ۽ G پازيتو بينڊس

هڪي ڪاري رنگ واريون ٿرندڙ گهرندڙ بينڊس



1971 ڌاري پيرس (فرانس) ۾ سائنسدانن جي هڪ ٻي گڏجاڻي ٿي، جنهن ۾ متفق طور فيصلو ڪيو ويو ته ڪروموزومن جي سڃاڻپ ۽ درجابندي سندن مختلف رنگن جي پٽين (Bands) مطابق ڪئي ويندي، ۽ اهي مختلف پٽيون مکيه ٻن قسمن جون آهن: هڪ جو نالو (Q.bands) ٻي جو (G- bands) رکيو ويو. هي ڪروموزومن جون مختلف پٽيون، ڪروموزومن کي مختلف رنگن (Dyes, stains) وجهڻ سان ظاهر ٿينديون آهن. Q ۽ G انهن رنگن جي انگريزي نالن جا پهريان اکر آهن: Quinacrine جو Q ۽ Giemsa جي G ڪٽناڪرين ۽ جيمسا ٻئي ڪروموزوم کي رنگڻ لاءِ ڪم ايندڙ ڪيميائي رنگ آهن.

ڪروموزومن کي رنگڻ: 1970 کان اڳي ڪروموزومن کي رنگڻ جو صرف هڪ ئي طريقو هوندو هو، جنهن ۾ ڪٽناڪرين ڊاءِ هائيڊروڪلورائيڊ (Quinacrine Dihydro chlorides) هڪ ڪيميائي رنگ کي استعمال ڪري ڪروموزومن جي سڃاڻپ ۽ درجا بندي ڪئي ويندي هئي، پر پوءِ ٻيا به ڪيميائي رنگ (Chemical dyes) استعمال ڪري ڪروموزوم کي رنگ ڪرڻ جا طريقا ڳولي هٿ ڪيا ويا، جن منجهان ڪجهه هيٺ ڏجن ٿا:


1. Q بينڊس: ڪروموزومن کي جڏهن ڪٽناڪرين سان رنگيو آهي ته ڪروموزومن جي هر جوڙيءَ ۾ تمام چٽا ۽ هلڪا پٽا نظر ايندا آهن، جن کي ڪيو-بينڊس (Q-Bands) چئبو آهي.

2. G بينڊس: هن طريقي ۾ پهريائين ڪروموزومن کي هڪ مرڪب ٽريپسن (Trypsin) سان عمل ڪرائبو آهي، جنهن ۾ ڪروموزومن جون پروٽين ڳري وينديون آهن ۽ پوءِ ڪروموزومن کي


جيمسا (Giemsa) ۾ وڌو ويندو آهي، جنهن جي ڪري ڪروموزومن تي ڪاري ۽ اڇي رنگ جا پٽا ظاهر ٿيندا آهن. انهن رنگين پٽن کي جي- بينڊس (G.Bands) چئبو آهي. اهڙيءَ طرح ٻيا به ڪيترائي ڪيميائي رنگ آهن، جن ذريعي ڪروموزومن کي رنگ ڪرائي سندن سڃاڻپ ۽ درجابندي ڪئي ويندي آهي.

ڪروموزومن جي بنياد تي جنسن جي سڃاڻپ ڪرڻ:

نر ۽ مادي ٿيڻ جو دارومدار هڪ جاندار ۾ موجود جنسي ڪروموزومن تي آهي. ڪروموزومن جي ڪل تعداد ۾ هڪ جوڙي جنسي ڪروموزومن جي هوندي آهي ۽ اڪثر جانورن ۾ انهن جنسي ڪروموزومن کي "X" ۽ "Y" ڪروموزوم جا نالا ڏنل آهن. هڪ عورت ۾ ۽ ميون جي هڪ مڪي (مادي) (*Drosophila*) ۾ به يعني "XX" ڪروموزوم هوندا آهن، مرد ۽ نر مڪي ۾ هڪ "X" ۽ هڪ "Y" (*XY*) ڪروموزوم هوندا آهن. نر ۽ ماديءَ جي جنسي ڪروموزومن جو هي فرق ڪرنگهي دار جانورن، ڪافي جيتن ۽ ٻين بنا ڪرنگهي وارن جانورن ۾ عام آهي، پر سڀني جاندارن ۾ جينيائي بنيادن تي جنس جو تعين ڪرڻ سڌائين هڪ جهڙو نه آهي. عام طور تي اسپرم نر جانور مان ۽ آنو مادي جانور مان (شرط اهو آهي ته نر ۽ مادي ٻئي هڪ ئي ذات وارا جاندار هجن) ايندو آهي پر ڪن حالتن ۾ اسپرم ۽ آنو ٻئي هڪ ئي جاندار ۾ ٺهندا آهن. جنسي ميلاپ ۾ اسپرم ۽ آنو جو هڪٻئي سان ملي وڃڻ کي گڏجڻ جو عمل چئبو آهي ۽ گڏيل آني منجهان نئين جاندار جي پيدائش ٿيندي آهي.



ڪروموزوم جو تعداد هڪ نسل کان ٻئي نسل ۾ هڪجهڙو رهندو آهي، ڇو ته خلين ۾ ٻن قسمن جي ونڊجڻ جو عمل ٿيندو آهي. گپيل خليي جي واڌ ”برابر ونڊجڻ“ واري عمل مطابق ٿيندي آهي، جنهن ۾ بدني خلين جي پيداوار وڌندي رهندي آهي



شڪل ۴. خلين جو برابر ونڊجڻ.

يعني، هڪ مان ٻه خليا ۽ ٻن مان چار ۽ چئن مان اٺ خليا، پر سڀني خلين ۾ ڪروموزوم جو تعداد ساڳيو هوندو آهي، جيڪو پهرئين يا اصل گپيل خليي ۾ هوندو آهي. اصل ۾ ڪروموزوم جو ساڳئي تعداد ۾ رهڻ خلين جي برابر ونڊجڻ واري عمل جو نتيجو آهي. خلين جي ٻئي ونڊجڻ واري عمل کي ”خلين جو تخفيفي ونڊجڻ“

وارو عمل " چئبو آهي ۽ هي عمل صرف جنسي خلين ۾ ٿيندو آهي. جنسي خلين جي تخفيفي وندجڻ واري عمل ڪري ٺهندڙ جنسي خلين (اسپرم ۽ آڻو) ۾ ڪروموزومن جو تعداد سندن ڪل تعداد جو اڌ ٿي ويندو آهي. جنسي ميلاپ کان پوءِ اسپرم ۽ آڻو هڪ ٻئي ۾ ملي ويندا آهن، ته نتيجي ۾ ڳييل آڻو ٺهندو آهي. ڳييل آڻي ۾ ڪروموزومن جو اصل تعداد بحال ٿي ويندو آهي، ڇو ته ڪروموزومن جو اڌ تعداد اسپرم ۽ اڌ تعداد آڻي کان ايندو آهي هتي هڪ ڳالهه چڻي ڪرڻ ضروري آهي ته آڻي جي ڳيڻ جو عمل صرف ان صورت ۾ ٿيندو، جڏهن نر ۽ مادي هڪ ئي ذات وارا جاندار هوندا. هڪ ئي ذات مان مراد گهوڙو ۽ گهوڙي يا ڪتو ۽ ڪتي آهي. مختلف ذاتن جي جاندارن ۾ ٿوڙي جنسي ميلاپ هلندو به رهي تڏهن به انهن ۾ ڳيڻ وارو عمل ڪڏهن به نه ٿيندو. هتي اهو ٻڌائڻ به ضروري آهي ته ڳييل آڻي ۾ ڪروموزومن جو ڪل تعداد انهيءَ جاندار جي ڪنهن به بدني خليي ۾ موجود ڪروموزومن جي برابر هوندو آهي، سواءِ تيار ٿيل جنسي خلين (اسپرم ۽ آڻي) جي. جيڪڏهن هڪ اسپرم يا آڻي ۾ ڪروموزومن جي تعداد کي "N" ذريعي لکجي ته پوءِ هڪ ڳييل آڻي ۾ ڪروموزومن جو تعداد "2N" ڪري لکيو ويندو. هاڻي جڏهن ڳييل آڻي جي واڌ ۽ وند شروع ٿيندي "جنهن مان آخر جو هڪ گهڻن خلين وارو جاندار پيدا ٿيندو" ته انهي جاندار جي هر بدني خليي ۾ ڪروموزومن جو تعداد "2N" ئي رهندو، پر جڏهن اهو جاندار وڏو ٿي جنسي خليا ٺاهيندو ته انهن خلين ۾ ڪروموزومن جو تعداد "N" هوندو آهي، يعني تعداد ۾ اڌ ڪروموزوم هوندا. ڪروموزومن جي هن "N" سيٽ کي

”هپلوئائڊ“ (Hplloid) سيت چيو ويندو آهي.

اهڙا جانور جن ۾ نر ۽ مادي الڳ الڳ جاندار آهن، انهن کي
ڊپلوئائڊ ($2N$ Diploid) جاندار چئبو آهي. انهن جانورن ۾ سندن
ڪروموزوم جوڙن جي صورت ۾ موجود هوندا آهن، ڇو ته جوڙي ۾
هڪ ڪروموزوم اسپرم کان ۽ ٻيو ڪروموزوم آني کان ايندو
آهي. ڪروموزوم جي هڪجهڙين جوڙين کي ”ساڳي نسبت واريون
(Homologous) جوڙيون“ چيو ويندو آهي، جن ڪروموزومن جي
ساڳي نسبت واري جوڙي نه ٿئي انهن کي بغير نسبت واري
(Non-homologous) جوڙي چيو ويندو آهي، نر ۽ ماديءَ جي
ڪروموزومن جي هڪ جوڙي بغير نسبت واري جوڙي هوندي آهي.
ڪروموزومن جي انهي بغير نسبت واري جوڙي کي جنسي
ڪروموزوم (Sex chromosome) چئبو آهي. ڪرنگهيدار جانورن،
ڪيترن نر جيٽن، پوپٽ جي مادين ۽ مادي پکين ۾ جنسي
ڪروموزوم بغير نسبت وارين جوڙن ۾ موجود هوندا آهن. جن کي
”X“ ۽ ”Y“ (XY) جا نالا ڏنا ويا آهن ۽ اهي ٻئي ڪروموزوم هڪ
ٻئي کان مختلف هوندا آهن. اهڙي طرح سان انهن جانورن جي مخالف
جنس يعني ڪرنگهيدار جانورن جي مادين، ڪيترن مادي جيٽن،
پوپٽ جي نرن ۽ نر پکين ۾ جنسي ڪروموزوم ساڳي نسبت وارين
جوڙن جي شڪل ۾ هوندا آهن، جن کي ”XX“ ڪروموزوم چئبو
آهي. ڪن جاندارن ۾ ”X“ ڪروموزوم ڪونه هوندو آهي ۽ انهيءَ
ڪري نرن کي ”XO“ (O جو مطلب ٻڙي آهي) ۽ مادين ۾ ”XX“
جنسي ڪروموزوم هوندا آهن.

ميون جي مک ۽ ٻين جانورن ۾ جنس جي سڃاڻپ
ڪرڻ؛

ميون جي هن مک ۾ نر ۽ ماديءَ جي سڃاڻپ جو طريقو
ساڳيو ئي "X" ۽ "Y" ڪروموزوم وارو آهي ۽ نرن ۾ "Y"
ڪروموزوم جو هجڻ ضروري آهي. "Y" ڪروموزوم جي غير
موجودگي ۽ هڪ "X" ڪروموزوم جي موجودگي ۾ اها مک شڪل
شبيهه (Phenotype) ۾ نرن وانگر هوندي، پر اسپرم پيدا ڪونه
ڪندي ۽ جنسي طرح کڏڙي هوندي. اهڙيءَ طرح سان مادي
مکين ۾ جيڪڏهن ٽي "XXX" ڪروموزوم هوندا ته اها ڏسڻ ۾ ته
مادي ايندي، پر نسل پيدا ڪرڻ جي قابل ڪونه هوندي. اڪثر
ڪري هن قسم جون ماديون جلدي مري وينديون آهن.

اصل ۾ ميون جي هن مک جي جنس جو مدار "X"
ڪروموزوم ۽ آٽوزوم (A) جي نسبت تي هوندو آهي. هڪ مک ۾
جيڪڏهن "XX" جنسي ڪروموزوم ۽ ٻه آٽوزوم (AA) هوندا ته اها
مادي رواجي طرح پنهنجي نسل پيدا ڪرڻ جي قابل هوندي آهي.
اهڙي طرح هڪ نر ۾ هڪ "X"، هڪ "Y" ۽ ٻه آٽوزوم (AA)
هوندا ته اهو نر رواجي طرح اسپرم پيدا ڪندو ۽ پنهنجي نسل جي
واڌ ڪرڻ جي قابل هوندو. نر هجڻ لاءِ "Y" ڪروموزوم ضروري
ڪونهي، ڇو ته صرف هڪ "X" ڪروموزوم واريون مڪيون "XO"
به نر آهن. پر "Y" ڪروموزوم اسپرم جي پيدائش لاءِ ضروري
آهي. ماڻهوءَ ميون جي هن مکي ۾ جنس جي پرک ڪرڻ ۾ اهو فرق
آهي ته ماڻهو ۾ مرد ٿيڻ لاءِ "Y" ڪروموزوم جو هجڻ لازمي آهي. پر

ميوي جي مک ۾ "Y" ڪروموزوم جو هجڻ ضروري نه آهي. پکين ۽ پوپٽن جي نرن ۾ "XX" ڪروموزوم هوندا آهن ۽ سندن مادين ۾ "XY" يا "XO" ڪروموزوم هوندا آهن. ("O" جو مقصد "Y" ڪروموزوم جي غير موجودگي آهي). هن قسم جي جانورن جي جنسي ڪروموزومن جي جوڙي يا نر ۽ ماديءَ کي "Z" ۽ "W" جا نالا ڏنا ويا آهن. اهڙي طرح نر "ZZ" ۽ مادي "ZW" يا "ZO" ڪري لکيا ويندا آهن.

مڪڙن ۾ به جنس جو تعين "XO" واري طريقه ڪار مطابق ڪيو ويندو آهي. "XO" نر ۽ "XX" ماديون هونديون آهن. ماکيءَ جي مکين ۽ ماکوڙين ۾ وري جنسي ڪروموزوم ٿيندا ئي ڪونهن. ڊپلوائڊ '2N' آئن مان نر مکيون يا مكا پيدا ٿيندا آهن. ماکيءَ جي مکين ۾ ڳپيل آئن مان ماديون ڄمنديون آهن ۽ اڻ ڳپيل آئن مان نر ڄمندا آهن. مادي مکيون کدڙيون هونديون آهن؛ سواءِ راڻيءَ جي، راڻي ٿيڻ لاءِ هڪ مادي مکي جي پرورش لاءِ کيس پيدا ٿيڻ کان وٺي هڪ خاص خوراڪ تي رکيو ويندو آهي ۽ هڪ ماناري ۾ گهڻو ڪري هڪ راڻي هوندي آهي.

ماڻهوءَ ۾ جنسي سڃاڻپ ڪرڻ: ڪروموزوم صرف خوردبيني ذريعي ئي ڏسي سگهجن ٿا. ماڻهو جي ڪروموزومن جي ڳڻپ اڪثر ڪري رت جي اڇن خلين منجهان ڪئي ويندي آهي. هر ڪروموزوم جوڙي جي صورت ۾ موجود هوندا آهن. ساڳين يا هڪجهڙن (هم نسبت) ڪروموزومن جون جوڙيون سندن ڊيگهه شڪل ۽ بناوت مطابق ٺاهيون وينديون آهن. سڀني ڪروموزومن جي

جوڙن ٺاهڻ کان پوءِ هڪ خليي جي انهيءَ ڪروموزوم جي ترتيب کي ”ڪيريو ٽائپ“ (Karyotype) چئبو آهي؛ (ڪيريو معنيٰ نيوڪليس يعني خليي جو مرڪز). ڪروموزوم جي ”ڪيريو ٽائپ“ ڪرڻ سان ماڻهن ۾ ڪيترن ئي ڪروموزوم جي بي قانديگي جي خبرگيري به ڪري سگهجي ٿي.

ماڻهوءَ ۾ ڪُل ڇائيتاليم (46) ڪروموزوم يا ٽيوپه جوڙا ٿيندا آهن. جڏهن ماڻهوءَ جي ڪروموزوم جي ”ڪيريو ٽائپ“ ڪبي ته پهريائين ٻاويهه (22) جوڙا ٺهندا جن کي آٽوزوم (Autosome) چئبو آهي. مردن جي ڪروموزوم ۾ هڪ جوڙو (ٽيوپهون جوڙو) هڪجهڙو يا ساڳي نسبت وارو نه ٺهندو آهي، هن جوڙي ۾ هڪ ڪروموزوم وڏو هوندو آهي ۽ ٻيو ننڍو. جڏهن ته عورتن ۾ ٽيوپهين جوڙي جا ڪروموزوم به هڪجهڙا ۽ هڪجيترا (ساڳي نسبت وارا) ٿيندا آهن ۽ عورتن ۾ هن ٽيوپهين ڪروموزوم جي جوڙي جي سڃاڻپ به ٿي ويندي آهي. مردن ۾ هن ٽيوپهين جوڙي ۾ ”XY“ ڪروموزوم هوندا آهن، جن ۾ وڏي ڪروموزوم کي ”X“ ڪروموزوم ۽ ننڍي ڪروموزوم کي ”Y“ ڪروموزوم چئبو آهي. عورتن ۾ ٽيوپهين جوڙي جا ٻئي ڪروموزوم ”XX“ هوندا آهن ۽ ”Y“ ڪروموزوم ڪونه هوندو اٿن. عورت ۽ مرد ٻنهي ۾ ڪروموزوم جي هن ٽيوپهين جوڙي کي جنسي ڪروموزوم (Sex chromosome) چئبو آهي. جڏهن مرد ۽ عورت جو جنسي ميلاپ (جماع) ٿيندو آهي ته جنسي (خلين اسپرم ۽ آني) جو هڪٻئي سان ملي وڃڻ جا امڪان هوندا آهن ۽ جي ملي ويا ته نتيجي ۾ هڪ

ڳييل آڻو ٺهندو ۽ پوءِ ان ڳييل آڻي جي واڌ عورت جي پيٽ ۾ ٿيندي ۽ آخر ۾ ٻار ڄمندو. چوڪرو ۽ چوڪري هجڻ جو مدار مرد جي اسپرم تي آهي ڇو ته مرد ٻن قسمن جا اسپرم ڪروموزوم پيدا ڪندو آهي: هڪ "X" ڪروموزوم ۽ ٻيا "Y" ڪروموزوم، پر عورت صرف هڪ ئي قسم جا: يعني "X" ڪروموزوم وارا آڻا پيدا ڪندي آهي. چوڪرو يا چوڪري جو ڄمڻ امڪاني هوندو آهي ۽ ٺهندڙ ٻچي ۾ 50 سيڪڙو چوڪرو ۽ 50 سيڪڙو چوڪري پيدا ٿيڻ جا امڪان هوندا آهن، جيڪڏهن آڻي سان "Y" ڪروموزوم واري اسپرم جو ميلاپ ٿيندو ته چوڪرو ڄمندو پر جيڪڏهن "X" ڪروموزوم وارو اسپرم آڻي سان ملي ويندو ته اها چوڪري ڄمندي، اهڙي طرح ڄمندڙ ٻار جي جنس جي مناسبت يا، تناسب هڪ تي هڪ (1.1) هوندي آهي.

♂ = نر لکڻ جي نشاني
 ♀ = مادي لکڻ جي نشاني
 عورت هر مهيني ۾ صرف هڪ آڻو ٺاهيندي آهي.



لفظ ۽ اصطلاح

Active Cytoplasm	چست سائيتوپلازم (حياتياتي مادو)
Adaptation	مطابقت، پيٽ
Agriculture	زراعت، پوک
Anaphase	اٽنائيز (خلين جي ونڊ ۾ ٿيون ڏاڪو)
Anatomy	جاندارن جي اندرين ۽ ٻاهرين جوڙجڪ جو علم
Animal kingdom	جانورن جي دنيا، عالم
Animal Cells	جانورن جا خليا
Animal Behavior	جانورن جي روش، هلت چلت
Applied Science	عملي سائنس
Atmosphere	وايو منڊل، ماحول
Atom	اٽو، پرمائو
Bacteria	بئڪٽيريا، (ننڍڙا جيو جن مان ڪجهه ماڻهن ۾ بيماريءَ جو سبب بڻبا آهن)
Beginning of life	زندگيءَ جي شروعات
Biochemistry	حياتياتي ڪيميا
Biological Systems	حياتياتي سرشتا
Biological Research	حياتياتي کوجنا، تحقيق
Biological Miracle	حياتياتي ميراث، ڪرشمو
Biology	حياتيات (جانورن ۽ وڻن جو سائنسي علم)
Biophysics	حياتياتي فزڪس (طبعي علم)
Birth Control	ڄم روڪ

Birth Control Pills	ڄم روڪ ٽڪيون
Botany	نباتات
Branches of Zoology	حيوانات جون شاخون
Carbohydrate	نشاستو
Catalyst	مددگار (ڪيميائي)
Cell	خليو، جيو گهرڙو
Cell Membrane	خليي جي ٻاهرين ڪل يا پوش
Cellular Differentiation	خليائي تبديليون (خاص خلين جو ٺهڻ)
Cellular Respiration	خلين جي مٽاڇري تي گيسن جي مٽ سٽ
Chemical Bonds	ڪيميائي ٻنڌڻ
Chemical Energy	ڪيميائي شڪتي (طاقت)
Chemical Stains	ڪيميائي رنگ
Chemical Reaction	ڪيميائي عمل
Chemical Compound	ڪيميائي مرڪب
Chemical Composition	ڪيميائي جوڙجڪ
Chromatid	ڪروموزوم جو هڪ ڀاڱو
Chromosome	ڪروموزوم (جلدي رنگجي ويندڙ نيوكليائي جزا)
Classification	درجابندي
Colloidal (System)	ڪئور نما، ڳنڍيدار (سرشتو)
Condense	سوڙهو ٿيڻ، گهاٽو ٿيڻ
Conductor	پسرايندڙ
Creative	تخليقي

Crossing Over	جينياتي ڦيرگهير جو عمل (خلين جي ونڊ دوران)
Cytoplasm	حياتياتي مادو
Defective Children	نقصدار ٻار
Deoxy-Ribonucleic Acid (DNA)	نيوڪليائي تيزاب
Development	واڌ (ترقي)
Diakinesis	هڪ جهڙن ڪروموزومن جو الڳ ٿيڻ
Diplotene	ڪروموزوم جي هر ڀاڱي جو ٻيڻو ٿيڻ
Earthworm	سڀ، سانڀا
Ecology-Environmental Biology	ماحوليات
Embryo	ٻچوي ڳچ
Embryology	ڳچيل آني جي واڌ جو علم
Entomology	جيتن جو علم
Equator	وچ، خط اسطو
Eukaryotype Cells	وڏن جاندارن (جانورن ۽ وڻن) جا خليا جن ۾ مرڪز نمايان طور تي موجود هجي
Evolution	ارتقا
Evolutionary Change	ارتقائي تبديلي
Evolutionary process	ارتقائي سلسلو عمل، سرشتو
Evolutionary Tree	ارتقائي چار
Extinct	فنا ٿيڻ، مٽجي وڃڻ
Fertilization	ڳچڻ، ڦرجڻ
Fossil	پنڊ پھڻ

Free Ribosome	آزاد رائبوزوم
Gel Phase	نيم سخت روپ (لڳڙيدار)
Generation	پيڙهه، نسل
Genes	موروثيت جو بنيادي ايڪو، جين
Genetic Material	جينياتي مادو
Genetic Engineering	جينياتي ٽوڙ جوڙ جو علم
Genetics	موروثيت
Germ Cells	بنيادي جنسي خليا
Germes	جيوڙا
Glands	خلين جا جهڳٽا، ڇڳا
Granular	دائيدار
Helminthology	پيت جي ڪيئن جو علم
Herpetology	ڪرڙين ۽ ناگن جو علم
Histology	خليائي جهڳٽن (ڇڳن) جو علم
Homologous Chromosomes	هم نسبت يا هڪجهڙا ڪروموزوم
Hydrophilic	پاڻي سان ملي ويندڙ جزا
Hydrophobic	پاڻي کان پري ڀڄندڙ جزا
Ichthyology	مڇين جو علم
Inorganic Salts	غير نامياتي لوڻ
Interphase	خلين جي وندجڻ دوران وقفو
Invertebrate	بنا ڪرنگهي وارا جانور
Investigations	تفتيش ڪرڻ، ڳولا ڪرڻ، سائنسي کوجنا ڪرڻ

Lamp Brush Chromosome	چٽيدار ڪروموزوم
Leptotene	سنهي ڏاڳي جهڙا (ڪروموزومن جو سنهي ڏاڳي جي شڪل ۾ هجڻ)
Life	زندگي، حيات
Lipid (Fat)	چرٻي، سٽپ
Living matter	زنده مادو (حياتياتي مادو)
Lizard	ڪرڙي
Lysin Enzymes	ڳاريندڙ انزائيم
Mammology	ڪير ڏيندڙ (ثنائتن) جانورن جو علم
Mature	پڇي راس ٿيڻ، پڪل، پڇڻ
Meiosis	خلين جي تخفيفي وند
Metabolism	ڪيميائي پيچ ڊاهه
Metaphase	ميٽافيز (خلين جي وند ۾ ٻيو ڌاڪو)
Mitochondria	خليي جو طاقت گهر (هائوس)
Mitosis	خلين جي هڪجيتري (بڪسان) وند
Morphology	جانورن ۽ وڻن جي بناوت جو علم
Multicellular Organism	گهڻخليائي جاندار
Muscle Cells	مشڪن (ماس) جا خليا
Natural Sciences	فطرتي سائنس، طبعي سائنس
Natural Balance	فطرتي هم آهنگي
Natural Selection	فطرتي چونڊ
Non-Homologous Chromosomes	ڌار نسبت وارا ڪروموزوم
Nucleotide Sequence	نيوڪليوٽائيڊ سلسلا (ترتيبون)

Nucleus	مرکز
Nurse Cells	خوراک مهيا ڪندڙ خليا
Oogenesis	آني ٺهڻ جو عمل
Opposite Poles (in cells)	آمهان سامهان ڇيڙا
Organ	عضوو
Organic Compound	نامياتي مرڪب
Origin of life	زندگيءَ جي شروعات، اصليت
Origin of Animals	جانورن جي اصليت، بنياد
Ornithology	پکين جو علم
Ovum (Egg)	آڻو
Pachytene	تلھو ٿيڻ (ڪروموزوم جو)
Paleontology	پنڊيهڻ جو علم
Parasitology	مفتخور (ڳجهون) جاندار جو علم (اهڙا جاندار جيڪي پنهنجي خوراڪ ٻين جاندارن مان حاصل ڪن)
Peptide Bonds	پروٽين ٺاهيندڙ ڪيميائي ٻنڌڻ
Phenotype	شڪل
Photosynthesis	آمیزش (سج جي روشني ۾ وڻن ۾ کاڌي - خوراڪ ٺاهڻ جو عمل)
Physical Nature	طبعي حالت
Physiology	علم بدن
Pisces	مڇيون
Plant Cells	وڻن جا خليا

Plasma Membrane	جانورن جي خلين جي ٻاهرين ڪل
Pollution	آلودگي / گدلائي
Prediction	اڳ ڪٿي ڪرڻ
Prokaryotype Cells	شروعاتي خليا جن ۾ مرڪز نمايان نه هجي
Proleptotene	خلين جي تخفيفي ونڊ ۾ لپيٽوٽين کان پهريون ڌاڪو
Prophase	خلين جي ونڊ ۾ پهريون ڌاڪو - پروفيز
Protein	پروٽين
Protoplasm	حياتياتي مادو (خلين ۾)
Protozoology	شروعاتي (هڪ خلين وارا جاندار) جانورن جو علم
Ratio	نسبت
Recombinant DNA	گاڏڙ نيوڪليائي تيزابيت (ڊي اين اي)
Relationship with living and Non-living things	جاندار ۽ بي جان شين جو لاڳاپو
Reproduction	نسل جي واڌ
Reproductive age	ٻچا پيدا ڪرڻ ۽ لڳ ڪرڻ واري عمر
Reproductive System	نسل جي واڌ وارو سرشتو
Ribonucleic Acid (RNA)	رائبو نيوڪلائيڪ تيزاب (آر اين اي)
Rough Endoplasmic Reticulum	ڪهري انڊوپلازمڪ ريٽيڪيوليم
Saturated Solution	گهاٽو ڳار
Secretions	پاڻيائون (خليائي)
Selection	چونڊ (ارتقائي)
Selective Gene	خاص جينن جي وڌي پيماني تي واڌ
Amplification	(تعداد ۾)

Sertoli Cells	مددگار خليا
Sex Chromosomes	جنسي کروموزوم
Silkworm	پت ڪيئون
Single Cell organisms	هڪ خلياڻي جاندار
Smooth Endoplasmic Reticulum	لسي انڊوپلازمڪ ريتي ڪيوليم
Social Behavior	سماجي رويو
Skill	مهارت
Sol phase	پاڻيائو روپ
Solution	ڳار
Somatic Cells	بدني خليا
Species	ذات
Sperm	اسپرم، تخم، نرجزا
Spermatid	اڻ ونديل جنسي خليو (مردن ۾)
Spermatogenesis	اسپرم ٺهڻ جو عمل
Spindle	گري
Structure	بناوت
Structure and Function	بناوت ۽ ڪم
Study	سڪيا، تفتيش
Synapsis	هڪجهڙين کروموزومن جو ميلاپ
Synthesis	آمیزش
System	سرشتو
Taxonomy	جاندارن جي سڃاڻپ ۽ ترتيب

Telophase	ٽيلوفيز (خلين جي ونڊ دوران چوٽون ۽ آخري ڌاڪو)
Test Tube	آزمائشي نلي
Tissue	خلين جا جهڳٽا، ڇڳا
Tissue Physiology	خليائي جهڳٽن جي ڪم بابت علم
Transparent	شفاف
Unicellular Organism	هڪ خليائي جاندار
Uterus	رحم - ڳڀ دائي
Vertebrates	ڪرنگهي وارا جانور
Virus	بيماريون پيدا ڪندڙ ننڍڙا جيو - وائرس
Vitamin	حياتين
Waste	ڦوڳ
White Blood Cells "WBC"	رت جا اڇا خليا
Zoogeographical Distribution	زمين جي مٿاڇري تي جانورن جي ورڇ
Zoology	حيوانات
Zygotene	ڪروموزومي جوڙي (ڪروموزومن جو جوڙي ۾ هجڻ)



