




سازش

ماهواره

مئي
۴ دون
۱۹۷۶ع



صلاحڪارن جو پورب

ڊاڪٽر آغا ثنا الله

(ڪيميا)

ڊاڪٽر عبدالحسين شاه

(طبعيات)

ڊاڪٽر هدايت الله ابڙو

(نباتيات)

ڊاڪٽر عبدالقادر انصاري

(حيوانيات)

ڊاڪٽر لال بخش بوزدار

(ارضيات)

ڊاڪٽر سليمان شيخ

(طب ۽ جراحي)

ڊاڪٽر محمد يوسف پنهوڙ

(زراعت)

ڊاڪٽر عبدالاحد ابڙو

(انجنيئرنگ)


مسٽر رحيم بخش سپايو

(رياضي)

سيد ظفر حسن

(جاگرافي)

آرٽسٽ : منصور عالم ابڙو



[سال ۶] - مئي ۴ جون ۱۹۷۶ع [پر چو ۵-۶]

سرپرست

وزير اعليٰ سنڌ

باني

الحاج سيد غلام مصطفيٰ شاه

چيف ايڊيٽر

ڊاڪٽر ممتاز علي قاضي

ايڊيٽر

ڊاڪٽر شاهنواز عارباڻي

محمد شريف ميمڻ

اسسٽنٽ ايڊيٽر

عابد بلوچ

انچارج ”پارن جا صفحا“

غلام حسين پنوهار

آفيسون

ايڊيٽر: فريش واٽر بائلاجي شعبو منڊ يونيورسٽي

سرڪيوليشن انچارج - منظور حسين قاضي

انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي منڊ يونيورسٽي

ٻه رپيا

قيمت: في پر چو

۴۴ رپيا

سالانه چندو

فهرست

وڌن جا صفحا

صفحو

لکندڙ

مضمون

۵

پروفيسر افتخارالدين احمد آرائين
انسٽيٽيوٽ آف ڪيمسٽري، سنڌ يونيورسٽي

• آس - معدني پارٽن -
جي کوٽ جو حل

۱۵

عدنان علي شير بهڻ
گورنمينٽ هاءِ اسڪول، ڀنگو بهڻ، (خيرپور)

• سمنڊ

۱۹

علي مرتضیٰ ڌاريجو،
ليڪچرار، زولاجي ڊپارٽمينٽ، سنڌ يونيورسٽي

• حيوانن جي دنيا

۲۴

ترجمو: عبدالرحمن عالماني - آخري سال
ايم-بي؛ بي-ايس، لياقت ميڊيڪل ڪاليج، ڄامشورو

• رت جي گهٽتائي
وارو مرض

۲۷

منظور حسين شاه ڏنو قاضي،
اداره سنڌ شناسي، سنڌ يونيورسٽي

• انساني زندگيءَ ۾
مڇيءَ جي اهميت

۳۰

عبدالرزاق شيخ، ڊڙي محلو، لاڙڪاڻو

• وڇون يا ڀٽون

ٻارن جا صفحا

۳۷

عبدالملڪ ميمڻ - انجنيئرنگ ڪاليج، ڄامشورو

• برقي چڪر

۴۰

عبدالرزاق شيخ - ڊڙي محلو، لاڙڪاڻو

• سائنسي معلومات

۴۴

فياض احمد قاضي - قاضي محلو، نصرپور

• سائنسي گلدستو

۴۷

عبدالستار - ٻاٽني شعبو، سنڌ يونيورسٽي

• ذهني آزمائش

۴۷

عبدالرزاق شيخ -

• طبي ماهرن جون

غير طبي ايجادون


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ
زُرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَدُّهُ
مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَذِكْرًا لِلأُولَى الْأَلْبَابِ.

(زمر - ۲۱)



چا تو نه ڏٺو ته الله آسمان مان پاڻي
لاڻو پوءِ ان کي زمين جي چشمن ۾ وهائين.
وري ان سان جدا جدا رنگن جي ٻوڪ ڄمائي
ٿو، وري اها سڪي وڃي ٿي، پوءِ تون انکي
هيٺو ٿيل ڏسين ٿو. وري انکي ذرا ذرا ڪري
ٿو. بيشڪ ان ۾ عقل وارن لاءِ نصيحت آهي.



ڪجهه رسالي جي باري ۾

ماہوار ”سائنس“ هن هرچي جي اشاعت سان گڏ ساڍا پنج سال پورا ڪري چڪو آهي. انهيءَ ڊگهي مدت دوران هي پرچو مختلف مرحلن مان لنگهيو آهي، جنهن ۾ رسالي جي سائيز، صفحا ۽ خريداري جا اگهه شامل آهن. ان کانسواءِ پرچن ۾ شامل مواد ۾ پڻ تبديلي پئي آهي. ان باري ۾ پڙهندڙن وٽان ڪڏهن ڪي شڪوه شڪايتون به پئي مليون آهن، ته ڪڏهن ڪي سهڻيون صلاحون به ڏنيون ويون آهن. اسان هميشه شڪايتن کي دور ڪرڻ ۽ مليل صلاحن جي روشنيءَ ۾ رسالي کي سهڻو بنائڻ لاءِ پاڻ پئي پتوڙيو آهي، تنهن هوندي به ڪي اهڙيون شڪايتون ضرور آهن جن کي ختم نه ڪري سگهيا آهيو ۽ ڪن صلاحن تي عمل نه ٿي سگهيو آهي، جنهن ڳالهه جو اسان کي اعتراف آهي؛ ليڪن ان جو سبب هن اداري جون ڪي مجبوريون به آهن. جيڪڏهن اسانجا پڙهندڙ

سڄيءَ دل سان اسان سان ٻانهن ٻيلي ٿي بيهن ته هن رسالي کي بهتر کان بهتر معيار جو رسالو بنائڻ ڪو ڏکيو ڪم نه رهندو.

سڀ کان پهرين ڳالهه، خريداري جي آهي. ان سلسلي ۾ پڙهندڙن تي فرض لاڳو ٿو ٿئي ته اهي وڌ ۾ وڌ خريدار هن رسالي لاءِ هٿ ڪن. سنڌي ٻوليءَ ۾ پنهنجي موضوع جو هيءُ اڪيلو رسالو آهي، جيڪڏهن ههڙي اهم موضوع واري رسالي لاءِ وڌ ۾ وڌ خريدار نه ملي سگهيا ته پوءِ ڪيئن ٿي اسيد ڪري سگهجي ته ٻين موضوعن جا رسالا به نڪرن ۽ باقائدي هلي سگهن.


ڪنهن به رسالي کي باقائدي ڪيڻ ۽ ڪيس معياري بنائڻ لاءِ اهم ڳالهه رسالي جي مالي حالت جو مضبوط هجڻ آهي. مالي حالت لاءِ خريداري کانپوءِ ٻئي نمبر تي اهم شئي رسالي کي اشتهارن جو ماسٽر آهي. پڙهندڙ حضرات ان سلسلي ۾ پڻ اسانجي مدد ڪري سگهن ٿا. سنڌي ٻوليءَ ۾ نڪرندڙ معياري رسالي ڪي مالي طور تي مضبوط بنائڻ ۾ مدد ڪرڻ هر هڪ سنڌيءَ جو فرض آهي، جيڪو کين ضرور پورو ڪرڻ گهرجي.

اسانجا ڪي پڙهندڙ رسالي ۾ شامل مواد کان مطمئن آهن، ته ڪن کي شڪايت آهي. شڪايت ڪندڙ پڙهندڙن کي گذارش آهي ته مهرباني ڪري رڳو شڪايت ۽ تنقيد

(بقايا ڏسو صفحو ۴۸)

اُس

معدنی بارڻن جي کوٽ جو حل



هي مضمون ۱۹۷۵ع ۾ ٽين سالياني سائنس ڪانفرنس نواب شاه ۾ ڪيميائي علم جي صدارتي خطبي طور پڙهيو ويو هو. مضمون جي اهميت جي لحاظ کان ان کي هتي شايع ڪري رهيا آهيون. (ادارو).

جي سگهه ۽ ٻين لفظن ۾ سچ جا ڪرڻا يعني اُس ۾ اهڙا وسيلآ آهن، جيڪي روايتي بارڻن جي جاء پري ٿا سگهن. ٻئي وڏي امڪان وارا آهن. ٻين ٽيهن ورهين ۾ اڻڻي سگهه ڪي وڏي هٿي ملي آهي. دنيا ۾ جتي ڪٿي اربها رهن جي خرچ سان اڻڻي ڪارخانا (ري ايڪٽر) برها ڪيا ويا آهن. جيتري سگهه ۱۵۰۰ ٽن ڪوئلي بارڻ سان ملي ٿي، تيتري يورينيم (Uranium) جو هڪڙو پاڻونڊ ڏيئي سگهي ٿو. اڻڻي سگهه جو اهو وڏو فائدو آهي، ته ان جا ڪارخانا ضروري ناهي ته شهرن جي ويجهو لڳن، نه ڪو ڪچي مال پهچائڻ جو مسئلو ٿئي ٿو، ۽ نه ئي وري انهيءَ وسيلي جي ڪٽڻ جو اڃا ڪو امڪان آهي.

پر تڏهن به ان مان ڪي نقصان به آهن، جن کي هوند آڳا چئجي. اڻڻي ڪارخانن ۾ جيڪا تابڪاري پيدا ٿئي ٿي، سا تندرستيءَ لاءِ هاجيڪار آهي، ۽ ڪارخانن جي عملي کي ان کان بچائڻ لاءِ جيڪي اپاءَ ورتا وڃن ٿا، تن

اربن ورهين کان گڏ ٿيل معدني بارڻ جهڙوڪ ڪاٺ، ڪوئلو، پيٽرول ۽ قدرتي گئس هاڻ ڪٿن تي آهن. تيل ۽ گئس هلي هلي به ڪي ورهيه ڏهاڪا هلندا ۽ ڪوئلو ڪي صديون. چين، روس ۽ ڪنهن حد تائين آمريڪا کي ڇڏي، ٻيا سڀ صنعتي ملڪ ڪو زمانو ٿيو جو انهن ۾ پاڻ ڀرو نه رهيا آهن، جڏهن ته صنعتي ملڪن ۽ ترقي ڪندڙ ملڪن جو روايتي بارڻن تي انحصار جيئن پوءِ ٿيڻ وڌندڙ آهي، توانائيءَ جا اهي وسيلآ جيئن ڪٽندا ٻيا وڃن، تيئن ٿيڻ مهانگا ٿيندا ٻيا وڃن، ۽ دنيا تي، بارڻن جي ڪوٽ جي شڪل ۾، جهڙي ڏکي ساعت هاڻ آئي آهي تهڙي اڳ ڪڏهن ڪانه آئي هئي. انسان ٻيا اهڙا بارڻ ڳولڻ شروع ڪري ڏنا آهن، جن ۾ هو پنهنجي پورٽ پاڻ ڪري سگهي. ”زور انهيءَ ڳالهه تي آهي ته توانائي يا سگهه فضا مان حاصل ڪئي وڃي، اهڙيءَ ريت جيئن وسيلن جي کوٽ به نه ٿئي ۽ فضا صاف رهي.“ اڻڻي سگهه ۽ سچ

تي ڳرو خرچ اچي ٿو. تمام ٿوريءَ جاءِ ۾ تمام گهڻي گرمي پيدا ٿئي ٿي ۽ انهيءَ گرميءَ جي تبديل (Heat transfer) لاءِ تمام اثرائتا طريقا اختيار ڪرڻا پون ٿا. سڀني ۾ ڳرو مسئلو آهي: ائتمي ٽوڳ جو نڪال. جڏهن ائتمي ڪارخانن جي ٻارڻ کي وري ڦيرائي (recycle) ٻيهر ڪم ايندڙ يورينيئم ۽ پلوٽونيئم (Plutonium) الڳ ڪيا وڃن ٿا، تڏهن هڪ پوري رنگ جي زنگيل هائڊروجن (Fluid) بچي ٿي. اها هائڊروجن ئي ائتمي ٽوڳ آهي. ان ۾ ٿئي تابڪار جزا اسٽرانٽيئم-90 (Strontium-90) زرڪونيئم-95 (Zirconium-95) ۽ سيزيم-137 (Sesium 137) ٿين ٿا. اهي جزا ايترا طاقت وارا ٿين ٿا، جو انهن کي هزارين سال الڳ (isolated) رکجي، تڏهن وڃي ڪا انهن جي تابڪاري بي ضرر ٿئي ته ٿئي. انهن تنهي جزن ۾ اسٽرانٽيئم-90 ۽ تمام گهڻو هاجيڪار آهي. ان جو ترورو وڏيءَ تڪ سان پيهي وڃي ٿو. معدي ۾ ويو ته وڃي هڏن جي خلين ۾ رهندو ۽ پروانن مان (tissues) کي ناس ڪري ڇڏيندو. تازو آمريڪا ۾ انهيءَ ٽوڳ کي لوڻ جي ٺهري ڳنڍي ۾ مٿائڻ شروع ڪيو اٿن. ڪٿ ڪٿي ويئي آهي ته آمريڪا وٽ 1947ع تائين ٽوڳ جي اهڙن لوڻ-ڳنڍن جا 3 لک 80 هزار ٽن ٿي ويندا، جيڪي شيهي جي دهن ۾ بند هوندا. ڪو نه ٿو ڄاڻي ته ان ٽوڳ جو ڇا ٿيندو. ٿورا ورهيه اڳ، ڳري ائتم جي ٻن هلڪن ائتمن ۾ ورڇ (Nuclear Fission) يا ائتمي ڳهڻ-ورڇ کي دنيا جي ٻارڻن جي گهرجن جو حل ڄاڻي ويو. پر هاڻ ٽوڳ جي نڪال واري مسئلي سڄي دنيا جي طبيعيات جي ماهرن کي سائنس

ٻيهر سوچ ۾ وجهي ڇڏيو آهي. چيو ٿو وڃي ته هيءَ جو حفاظت جون ضرورتون ايتريون سخت آهن ان ڪري اسان کي ڪي به جوڪا نه کڻڻ گهرجن. جيئن گهڻا ملڪ ائتمي ڪارخانا پيا هڻن، ٽوڳ جي نڪال جو سوال ٿيڻ اڳرو پيو ٿيندو وڃي. هاڻ اچو ته سچ جي ڪرڻن يعني آس مان ملندڙ سگهه تي نظر وجهون.

سچ جڏهن کان وجود ۾ آيو آهي، تڏهن کان ان جا ڪرڻا ڌرتيءَ تي پهچي رهيا آهن، ۽ تيسرائين اسان سان رهندا، جيسٽائين اسان انهن کي ڪتب آڻڻ لاءِ باقي آهيون. ان سگهه تي نه ته ڪو خرچ ٿو اچي ۽ نه ئي ان ۾ ڪو جوڪو آهي. سچ هميشه انسان جي ڪم ايندو رهيو آهي. سچ جي گرمي هوائن کي هلائي ٿي، اسان جا ٻارڻ پيدا ڪري ٿي ۽ اسان جا کاڌي ۽ تانڊوري وارا فصل آيا اٿائين. سچ مان ملندڙ سگهه بي انداز، پاڪ صاف، فضا-ن-بگاڙيندڙ ۽ اڻڪٽ آهي. اها ڪيترين ئي شڪلن ۾ ملي ٿي: هوائون، وڏا سامونڊي وهڪرا يا نجني آجري اس. سوال ٿو اٿي ته آخر ماضيءَ ۾ ان صنعتي توڙي ترقي ڪندڙ ملڪن جي سگهه وارين گهرجن کي پوري ڪرڻ ۾، وڌيڪ ڀاڳ ڇو ڪونه ورتو. ان جو جواب سادي سودي اقتصاد جو آهي. سچ جي سگهه هلڪي درجي جي آهي، يا اها گهٽ گهٽائيءَ واري آهي، يا ائين ڪٿي پهچي ته تمام گهڻي ورڇيل آهي، جنهنڪري ان کي گڏ ڪرڻ ۽ ڪم ۾ آڻڻ مهانگو ٿو پوي. جيڪي ٻاٽ-ٽربائين (turbine) معدني ٻارڻن يا ائمي سگهه تي هلن ٿا، تن جي ڀيٽ ۾ اس تي هلندڙ ٽربائين تمام گهٽ ڪارڪردگي ڏيکارين ٿا. مئي ۽ جون 1946ع

معديني ٻارڻ مهانگا ۽ ان لپ ٿيندا ٻيا وڃن، ان ڪري ٽي ماڻهوءَ کي سگهه جي هن وسيلي مان فائدي وٺڻ جو خيال آيو آهي.

۱۹۷۲ع ۾ گڏيل قومن جي تعليمي، سائنسي ۽ ثقافتي اداري (يونسڪو) ۽ فرانس سرڪار جي سهاري هيٺ پئرس ۾ هڪ ڪانفرنس ٿي، جنهن ۾ سموريءَ دنيا مان ڇهن سون سائنسدانن بهرو ورتو. ڪانفرنس جو موضوع هو: ”سج انسان ذات جي خدمت ۾“. ساڳي ئي سال آمريڪا جي سائنس ۽ ٻولار واري اداري (Nasa) انهيءَ سوال کي کنيو ته آيا سج آمريڪا جهڙي سڌريل ملڪ جون جيڪي سگهه ۽ بجليءَ جون گهرجون آهن، تن جو چڱو ڇوڪو ڀاڱو پورو ڪري سگهي ٿو يا نه. اداري جو جواب هاڪار ۾ هو.

سج ۽ ان جي سگهه جي ذخيرن کي وٺو. سج زمين کان 9,29,13,000 ميل پري آهي. ان جو قطر 8,64,000 ميل آهي، ۽ ان جا ذخيرا اٽڪل روءِ 1.785×10^{54} ergs ڇيا وڃن ٿا. اهو 3.86×10^{93} ergs/Sec جي حساب سان سگهه جا ڪرڻ جي شڪل ۾، خارج ڪري ٿو. پر ڌرتي کي ان جو تمام ٿورو ڀاڱو نصيب ٿئي ٿو، يعني 3.78×10^{23} ergs/Sec. ان جو مطلب آهي ته اجري اس ۾ زمين جي هڪ چورس سينٽي ميٽر کي سج جي روشنائيءَ جي هڪڙي ڪلوري في منٽ ملي ٿي، يا ائين کڻي چئجي ته اٽڪل ڏيڍ چورس ميٽر کي گرميءَ جو هڪڙو ڪلووات ملندو. مصيبت اها آهي ته اسان ايتري پڪڙيل گرميءَ مان نه ته ڪو ڪم وٺي ٿا سگهون، نه بجلي ئي ٿا پيدا ڪري سگهون. ڪارڪردگي ڏهين پتي هجي (جا پڻ ڪوڙ آهي)، تڏهن به بجليءَ جي

سائنس

هڪڙي ڪلووات پيدا ڪرڻ لاءِ اسان کي اس جا ڏيڍ سو چورس فٽ گهريا. رڻ پتن ۾ هڪڙي چورس ميٽر تي هڪ سال ۾ جيڪا اس پوي ٿي، تنهن مان سراسري طرح ٻه هزار ڪلووات ڪلاڪ يا 2×10^9 ڪيلوريون ٻارڻ پيدا ٿي سگهي ٿو. آمريڪا جهڙو ملڪ هڪ سال ۾ جيڪو ٻارڻ ڪپائي ٿو، سو مقدار ۾ ريگستان جي ۴۰۰ چورس ميلن تي ٻوٽڙ اس جيترو ٿئي ٿو.

سجاري (سج جي) سگهه مان جا ٽي ذريعا آهن: ميداني، ٻولاري ۽ سامونڊي. پهرين ٻن مان ٻوٽڙ (Incident) سگهه، ملي ٿي، جڏهن ته سامونڊي مرستو ٻوٽڙ توڻي سمنڊ ۾ ڪروڙن ورهين کان ڪٺي ٿيل سگهه ڏي ٿو. ميداني ذريعن مان سج جي سگهه حاصل ڪرڻ لاءِ ٻه طريقا عام آهن. پهرئين طريقي ۾ اس کي سڌي طرح گرمي ڪري ڪتب آندو وڃي ٿو، يا ان کي مشيني (mechanical) سگهه ۾ مٽائي استعمال ڪيو وڃي ٿو. ٻئي طريقي ۾ اس جي سيلن (Solar cells) رستي بجلي ۾ مٽايو وڃي ٿو.

سجاري گرميءَ وارا سرشتا :

SOLAR HEAT SYSTEMS

اهي سرشتا سجاري سگهه کي جاين ۽ گهرن کي گرم يا ٿڌي رکڻ لاءِ ڪتب آڻين ٿا. هن وقت انهيءَ ڏس ۾ جيڪو ڪوچنا ۽ تحقيقات جو ڪم ٿي رهيو آهي، سو يا ته شخصي شوق رکندڙ ماڻهو ڪري رهيا آهن، يا وري يونيورسٽين جا محقق. خرچ گهڻو ڪري عام پلائيٽ ۽ واريون جماعتون ڪنديون آهن. نتيجي طور، انگلنڊ، آمريڪا ۽ وچ اوڀر ۾ ڪئين اهڙا گهر ٺاهيا ويا آهن، جن کي سجاري سگهه سان گرم يا ٿڌو رکيو

مئي ۽ جون ۱۹۷۶ع

لنگهندي ڪوسي ٿي وڃي ٿي ۽ نلين منجهان لنگهندي ڪمرن کي گرم ڪري ٿي. اهڙي ريت يوٽيڪٽڪ لوڻ واري ٽانڪي گرمي پد هڪجهڙي رکڻ ۾ مدد ڪري ٿي. پروفيسر بوئر جي هڪ ٻي اهم ايجاد آهي ڪيڊميئم سلفائيڊ جا سيل (cell)، جيڪي هـو آس ڪني ڪنڊڙ مٿاڇري جي مٿان چٽ جي (panels) ۾ استعمال ڪري ٿو. اهي سيل آس ڪني سڌيءَ طرح بجليءَ ۾ تبديل ڪن ٿا. هن ڪٽ ڪٽي آهي ته اهڙيءَ طرح هـو ڏينهن ۾ ۲۰ ڪلووات ڪلاڪ بجلي پيدا ڪري سگهي ٿو، جيڪا ۱۲ وولٽن (volts) جي ۹ بيٽرين ۾ ذخيره ڪري سگهجي ٿي. انهن بيٽرين کي پاڻ ۾ ڳنڍي ۱۱۰ وولٽن جو ڪرنٽ وٺي سگهيو.

آمريڪا ۾ مساجوسٽس آنڊوبون سوسائٽيءَ (Massachusetts andubon society) جي نالي سان هڪ جماعت آهي، جنهن جو مقصد فضا ۽ ماحول کي محفوظ رکڻ آهي. ان جماعت هڪ گهڻو ماڻهوارت اڏاڻن جو اعلان ڪيو آهي، جنهن جي گرميءَ ۽ ٽڌڪار جي گهرجن جو سٺ سيڪڙو آس وسيلي پورو ڪيو ويندو.

آمريڪا ۾ اهڙيون ڪيتريون ئي رٿائون عمل هيٺ آهن. سو سڄي سگهه جي استعمال ۾ انقلاب ڄاڻ آيو.

انگلنڊ ۾، جتي سراسري طرح ڏينهن ۾ اٽڪل ۲ ڪلاڪ آس لڪري ٿي، اتي جيڪي سڃاري سگهه ڪتب آڻيندڙ ڪلون لڳايون پيون وڃن، تن جي ڪري جاين کي ڪوسي رکڻ تي ايندڙ خرچ جو ۳۰ کان ۴۰ سيڪڙو بچي سگهندو انهن اوزارن تي جيڪو خرچ ٿيندو، سو ستن

مئي ۽ جون ۱۹۷۶ع

وڃي ٿو. اهڙو هڪڙو سرشتو جارج لوف (George Lof) ٺاهيو آهي، جيڪو آمريڪا جي ڪالورادو اسٽيٽ يونيورسٽيءَ ۾ سول انجنيئر آهي. ان سرشتي ۾ ڪارائيل تري مٿان ڪاٺي جي سنهين تختين جون ۶ قطارون رکيل آهن. هـو جو گرمي پد ۹۵ ڊگريون سينٽي گريڊ تي پهچائي، ان کي ڪمرن ۾ لڳل گرمي - نلين مان لنگهائو وڃي ٿو ۽ ذخيري وارن سلينڊرن مان پڻ. سلينڊرن ۾ بجلي پري انهن کي بهري (basement) کان ڇت تائين هنيو وڃي ٿو. اهو سرشتو سياري ۾ گهريل گرميءَ جي چوٽين پتي مهيا ڪري ٿو. آمريڪا جي ڊيلاوير (Delaware) يونيورسٽيءَ جي پروفيسر ڪي ڊبليو بوئر (K. W. Boer)، ’سولر هڪ‘ (Solar One) جي نالي سان هڪ گهر جوڙي راس ڪيو آهي. اهو سمهن جي چئن ڪمرن سان هڪ آزمائشي گهر آهي، جنهن کي آس سان گرم رکيو وڃي ٿو. ان ۾ ۷۲ چورس ميٽرن جي مٿاڇري تي آس جهٽي وڃي ٿي. ان آس کي پوءِ هـو وسيلي هڪ ٽانڪيءَ ۾ موڪليو وڃي ٿو، جنهن جي گنجائش ۸ مڪعب ميٽر آهي. ان ٽانڪيءَ ۾ يوٽيڪٽڪ (Eutectic) لوڻ هوندو آهي، جنهن جو رجڻ پد ۴۸ ڊگريون سينٽي گريڊ ٿئي ٿو. ڪوسي هـو لوڻ کي رجائي ٿي، مرڪب (fusion) گرمي مهيا ڪري ٿي ۽ ٿڌي ٿي وڃي ٿي. اها ٿڌي هـو پوءِ نلين مان لنگهي ڪمرن کي ٿڌو ڪري ٿي. رات جو ٿڌي هـو ڪوسي يوٽيڪٽڪ لوڻ واري ٽانڪيءَ منجهان پمپ ڪئي وڃي ٿي. يوٽيڪٽڪ لوڻ جملي وڃي ٿو ۽ پاڻ مان مرڪب گرمي خارج ڪري ٿو. اندر ايندڙ ٿڌي هـو ٽانڪيءَ منجهان

کان ننڍيون هونديون آهن. ”سو اسان وٽ اهڙو مٿاڇرو هجڻ کپي، جيڪو ڪارو هجي، يعني انهيءَ لهر-ڊيگهه جي وٿيءَ ۾ جذب ڪري سگهي.“ اهڙو مٿاڇرو خيال ۾ آڻي سگهجي ٿو، جيڪو ۱۶۳ مائڪران کان ننڍي لهر-ڊيگهه لاءِ ڪارو هجي ۽ ۱۶۳ مائڪران کان وڏي لهر-ڊيگهه تي گهٽ خارج ڪري، يعني آرسِيءَ جو ڪم ڏي. اهڙو مٿاڇرو گرم ٿي سگهي ٿو، ڇاڪاڻ جو اهو گرميءَ جي فوٽانن (Photons) کي خارج ٿيڻ نه ڏيندو. اهڙيون خاصيتون ڪيترن ئي طريقن سان پيدا ڪري سگهجن ٿيون. پهرئين طريقي ۾ داخل اندازڇاڻيءَ (interference filter) کان خاص ڪري ذاتوءَ جي ڊاءِ اليڪٽرڪ گهٽ-تهي ڍڳن (Stacks) ۾ ڪرڻ جي دخل جي اثر کان ڪم ورتو وڃي ٿو. انهن ڍڳن کي اسپيڪٽرم جو ذري گهٽ هر پاسيرو ڏيک (Profile) پيدا ڪندي ڏٺو ويو آهي. راجرشمڊ (Roger Schmidt) ۽ جي اي جانسين (J.E. Jansen)، هانسي وئل (Haney well) تجربوگاهه، ۽ جي. هاس (G. Hass) ۽ اي. ايف. ٽرنر (A.F. Turen) انهن ڍڳن جا ڪئين قسم تيار ڪيا آهن. اوريئنٽل سائنس سينٽر جي بي. او. سيرافيم (B.O. Seraphim) نئين سيمي-ڪنڊڪٽر ٽريڪيب لاءِ باق گڏ ڪرڻ جو ڪيميائي طريقو ڪم آندو آهي. هن هڪ آس ڪني ڪندڙ مٿاڇرو جوڙي راس ڪيو آهي، جيڪو ٻڌو ڪم ڪري ٿو، جيڪو آس کي پٽيءَ تان گهٽي ۾ گهڻو جذب ڪري ٿو ۽ ڪاري پاسي کان گهٽ ۾ گهٽ خارج ڪري ٿو.

اهڙيءَ ريت، ڇهنڊڙ (Selective Absorber) جي نالي سان آس ڪني ڪرڻ لاءِ اهڙا مٿاڇرا جوڙي مئي ۽ جون ۱۹۷۶ع

ورهين انڊر معيشتي پارٽن ۾ بحيثيت سان نڪري ايندو.

برسٽل جي هڪ ڪارخاني ”مارڪ ۳“ جي نالي سان ستارن جي (Stellar) گرميءَ تي هلندڙ ڪل ٺاهي آهي. ان ڪل ۾ ايلومينم جون ۶ چادرون ٽين ٿيون، جن کي وچ ۾ پاڻيءَ جون سنهيون نليون رکي پاڻ ۾ ملايو ويو آهي. انهن نلين تي هڪ خاص قسم جو ڪارو رنگ ڪيل آهي. اهڙيءَ چادر جو هڪ چورس ميٽر اٽڪل ۱۵۰۰ رپيا ڪاٽي ٿو. اهو خاص ڪارو رنگ اصل ۾ پولار-گاڏين (Space vehicles) لاءِ تيار ڪيو ويو هو ۽ ۶۲۵ رپيا في گيلن ڪاٽي ٿو، پر ۲۵ سيڪڙو وڌيڪ سڃاري سگهه ڇڏي ٿو. ايلومينم جي چادر جي ۶۵ چورس ميٽرن تي، ڪلاڪ کن آجري آس پوندي رهي ته ۱۰ گيلنن واري ٽانڪيءَ ۾ پاڻي اڀڙڪا ڏيڻ لڳندو.

ڪئمبرج يونيورسٽيءَ ۾ اليگزينڊر پائيڪ (Alexander pike) هڪ خودمختيار گهر ٺاهڻ ۾ مصروف آهي. ان ۾ آس جهڙيندڙن (Collector) جون اڪيچار قطارون هونديون؛ ڇت تي هڪڙو نفيس هوا پيدا ڪندڙ (generator) هوندو؛ هڪڙو مينهن جي پاڻيءَ کي آس سان پئڻ جوڳو بڻائيندڙ اوزار هوندو؛ ڪني پاڻيءَ جي نيڪال جو هڪ ميٿين (Methane) گئس ٺاهيندڙ جنريٽر هوندو؛ ۽ ان جي هيٺان هڪ وڏي محفوظ (insulated) ٽانڪي هوندي، جنهن ۾ اونهاري جي گرمي گڏ ڪري سياري ۾ ڪم آندي ويندي.

سولر اسپيڪٽرم : SOLAR SPECTRUM

سولر اسپيڪٽرم ۾ اٽڪل ۹۰ سيڪڙو اهڙيون لهر-ڊيگهون هونديون آهن، جيڪي ۱۶۳ مائڪران

سائنس

جي هڪ بجلي گهر ٺاهڻ جي قومي رٿا پيش ڪئي آهي، جيڪو اڄ کان ۲۵ ورهيه پوءِ آمريڪا کي گهريل بجليءَ جو ۵۰ سيڪڙو موجود ڪندو. سندن رٿا لاءِ ۱۴ هزار چورس ميل ايراضي گهرجي، جيڪا ٽلهي ليکي آمريڪا جي سڀني ريگستانن جو ڏهه سيڪڙو ٿئي ٿي. ان ايراضيءَ کي اس جو کيت بڻايو ويندو. اس-جهتيندڙ ڪم آڻي، ۲۰۰ ڊگريون سينٽي گريڊ گرمي پيدا ڪري باقي ٺاهي ويندي، جيڪا تربائين هلائي بجلي پيدا ڪندي. اهو کيت به اوتروئي خرچ ڪائيندو، جيترو ساڳي گنجائش واري ائتمي بجلي-گهر ٺاهڻ تي اچي ٿو. پر ان جو هڪ وڌيڪ فائدو اهو آهي ته هاجيڪار ڦوڳ جي ليڪال جو مسئلو نه هوندو.

ميساچوسٽس يونيورسٽي، آمريڪا جي ڊاڪٽر فورڊ (Ford) ۽ ڊاڪٽر ڪين (Kane) سڄ جي گرميءَ جي هڪ ٻئي سرشتي جي رت ڏني آهي جو پڻ وڏي پئماني وارو آهي. هنن سجاري سگهه (اس) کي هم ڪرڻ لاءِ فريسنل (Fresnel) آتشي شيشن کي ڪم آڻڻ جو سوچيو آهي. اهي شيشا پلاسٽڪ جا ٺهيل ٿين ٿا ۽ تمام سهانگا آهن. ان بعد هم ڪرڻ ٿيل اس سان پاڻيءَ کي ۱۵۰۰ ڊگريون سينٽي گريڊ تائين ڪوسو ڪري باقي ٺاهي سگهجي ٿي. ان گرمي پد تي باقي جو ٿورڙو پاڻو ڇڄي هائيڊروجن ۽ آڪسيجن تي پوندو. هائيڊروجن کي ڪن ڪيميائي مرڪبن ۾ کڻو يا جذب ڪري سگهجي ٿو، جڏهن ته آڪسيجن کي خارج ڪري ٻارڻ طور ڪتب آڻي سگهجي ٿو.

سگهجن ٿا، جن ۾ گهڻي ڪان گهڻي ڇهڻ ۽ گهٽ ۾ گهٽ اخراج جا گڻ هجن. ان جي نتيجي ۾ جهنڊڙ جي گرمي وڌندي ته انفراريڊ (Infra-red) ڪرڻن جو ٻيهر اخراج تمام گهٽ ٿيندو، ۽ اهڙيءَ ريت وڌ ۾ وڌ گرمي گڏ ڪري سگهندڙ پائندو (reservoir) موجود ٿي ملندو. گرمي پد ۱۰۰۰ ڊگريون فارنهائيٽ تي به پهچي سگهي ٿو. بهرحال ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته پوندڙ اس کي هم ڪرڪز (concentrate) ڪيو وڃي. جيڪڏهن ائين ٿي پيو ته پوندڙ اس جو ۹۰ سيڪڙو ڪم آڻي سگهجو.

تجارتِي سرشتا (Commercial Systems)

اٽريزونا يونيورسٽي، آمريڪا ۾ ڊاڪٽر مائيل مينل (Meinel) پنهنجي گهر واري سان گڏجي، ”چونڊي جهنڊڙ“ استعمال ڪندي تجارتي بنيادن تي سجاري سگهه مان گرمي حاصل ڪرڻ جو هڪ سرشتو مڪمل ڪري رهيو آهي. ان سرشتي جو نالو ”سولر هڪ“ آهي. ان سرشتي ۾ ڇا ٿيندو ته گرمي کي ۱۰۰۰ ف پد تي پائين سوڊيم ۾ ذخيره ڪيو ويندو، جيڪا باقي-تربائين جي چڪر کي هلائڻ واسطي گرمي جي پائندي طور ڪم اچي سگهي ٿي. ان سرشتي ۾ سڄ جي ڪرڻن کي هم ڪرڻ لاءِ نه ته آتشي شيشا ڪتب آندا ويندا، نه ئي آرسيون. ان جي ڪارڪردگي ۳۰ سيڪڙو هوندي ۽ هڪڙو ڪلووات ڪلاڪ اٽڪل ۳ هزار رپيا ڪائيندو.

اڳي جن ڇت وارن اس-جهتيندڙن جو ذڪر ڪيو ويو آهي، تن ۾ ڊاڪٽر مائيل ۽ سندس زال هڪ رت وسيلي نهايت دلچسپ پهلو پيدا ڪيو آهي. اها رت آهي اس جو کيت. ٻنهي سائنسدان ۳۴ لکن ميگاواٽن

آس سان پاڻي چڪاڻڻ

آس سان پيئڻ لاءِ پاڻي چڪاڻڻ جو پهريون ڪارخانو چليءَ جي لوڻ وارين ڪاٺين تي هنيو ويو هو. اهو ڪارخانو پاڻيءَ جا ۵۵۰۰ گئالن چڪائيندو هو، يعني سيٽريل مٿاڇري جي هڪڙي فٽ تي سراسري طرح پاڻيءَ جو هڪ پاؤنڊ چڪائي ڏيندو هو. هن وقت سڄيءَ دنيا ۾ ڪيترائي اهڙا ڪارخانا ڪم ڪري رهيا آهن. انهن مان هڪڙو يونوج سمنڊ ۾ هاتوماس نالي يوناني ٻيٽ تي آهي، جيڪو روزانو تازي پاڻيءَ جا ۳۸ هزار لٽر (Liters) تيار ڪندو آهي. اٽليءَ ويجهو پاٽيليريا نالي ٻيٽ ۽ ايراني نار وارن ملڪن ۾، جتي پاڻيءَ جو ڪو پيو وسيلو ڪونهي، ڪئين آس سان پاڻي چڪاڻڻ جا ڪارخانا هلي رهيا آهن. ۱۹۵۴ع ۾ اٽليءَ جي بولوني (Bologne) ۽ باري (Bari) يونيورسٽين ۾ مارڪيٽ ريسرچ واري اداري طرفان سامونڊي پاڻيءَ کي چڪاڻڻ جي سوال جو رٿائتو جائزو ورتو ويو. وري ۱۹۵۵ع ۾، سڄ جي سگهه مان فائدي وٺڻ جي موضوع تي هڪ عالمي مذاڪروڻيو، جنهن ۾ ۳۳ ماڪن مان ۸۰۰ کان وڌيڪ ماهرن سامونڊي ۽ ڪاري پاڻيءَ کي چڪاڻڻ جي مسئلي تي ڪافي سوچ ويچار ڪيو. گهٽ ترقي ڪيل ملڪن ۾ ڪئين اهڙا گهائي آباديءَ وارا علائقا آهن، جتي نه ته پاڻي آهي، نه ٻارڻ ۽ نه ئي بجلي. اتي پيئڻ جي پاڻي هٿ ڪرڻ جو هڪڙو ئي طريقو آهي، يعني آس سان چڪاڻڻ وارو.

تاشقند جي سولر ٽيڪنيڪل ليبارٽري جي ڪرشناووسڪي پاور انسٽيٽيوٽ هڪڙا ۳۳ فٽن جا مخروطي عڪس جهڙينڊڙ (Parabolic reflector)

تيار ڪيا آهن، ۽ هنن سجاري سگهه کي ڪم آڻي، ڪاراکم رڻ - پٽ جي چوڌاري جيڪي بٽ علائقا آهن، تن کي پاڻي موجود ڪري ڏيڻ جون وڏيون رٿون رٿيون آهن. ترڪيءَ لڳ-ارارات جي ميدانن ۾ هڪ ٻي رٿا اڳيئي عمل ۾ اچي چڪي آهي، جيڪا سجاري سگهه کان ڪم وٺي، هڪ سڄي ساري شهر کي پاڻ ۽ ڪوسو پاڻي مهيا ڪري ٿي.

سامونڊي پاڻيءَ کي چڪاڻڻ جو هڪ پروفائڊو آهي لوڻ جي پيداوار. زمين جي مٺي پٽي سمنڊ جو پاڻي آهي، جنهن جي سراسري اونهائي اڍائي ميل ٿيندي. ان پاڻيءَ ۾ ڪيترن ٻين لوڻن سان گڏ ۳ سيڪڙو سوڊيم ڪلورائيڊ به آهي. اهي لوڻ پاڻي چڪاڻڻ مان روٽڪ (bye-product) طور ملندا. ۱۹۵۸ع کان انهيءَ ميدان ۾ ڪافي ڪم ڪيو ويو آهي، ۽ ڪيتريون ئي نيون ۽ اهم اٽڪلون ڪڍيون ويون آهن.

آس جا سيل

سلڪا (Silica) معدنيات جا آس وارا سيل سجاري سگهه کي سڌيءَ طرح بجليءَ ۾ مٽائيندا آهن. اهي سيل ٻولار جي پروگرامن ۾ وڏي پئماني تي استعمال ڪيا ويا، جو انهن پروگرامن ۾ خرچ جي ڳڻتي ٿئي ٿي ڪانه. انهن سيلن جي ڪارڪردگي اٽڪل ۱۰ سيڪڙو آهي. هاڻ انهن کي تجارتي بنيادن تي ڪتب آڻڻ جي رٿ آهي. پر انهن سيلن ٺاهڻ ۾ وڏي ڏکيائي انهن جو خرچ آهي، جيڪو ڳاڻي ڀڳو ٿئي ٿو. سجاري سگهه کي بجليءَ ۾ مٽائڻ جا ڪيترائي طريقا آهن. (الف) سڌي تبديل: جيئن سليڪان يا ڪئڊميئم جهڙن رڳيل (doped) سيمي ڪنڊڪٽرن

(semi.conductors) ۾ بجليءَ جي فوٽانن Photons

جي جذب ٿيڻ سان ٿئي ٿو.

(ب) گرميءَ وسيلي تبديل: انهي ۾ گرميءَ

کي بجليءَ ۾ مٽائڻ لاءِ ٿرميائيڪ

(Thermoelectric) ٿرمواليڪٽرڪ (Thermo electric)

يا ميگنيٽو ڊائنامڪ (Magneto

hydro dynamic) طريقن کان ڪم ورتو

وڃي ٿو.

(ج) حياتياتي تبديل: ان طريقي ۾ فصل آبائي،

سڪائي ۽ ساڙي بجلي پيدا ڪئي وڃي ٿي.

گرميءَ کي اس جي سليڪان سيلن سان بجليءَ

۾ مٽائڻ جو عمل هاڻ چڱو اڳتي وڌي چڪو آهي

ان عمل کي پولار واري ٽيڪنالاجيءَ ۾ ڪتب

اچڻ ڪري وڏي هٿي ملي هئي. جيڪو وڏي ۾

وڏو نقص اڃا دور نه ٿي سگهيو آهي. سو آهي

خالص سليڪان سيل تيار ڪرڻ جو ڳاڻي پڳو

خرچ. ان جو هڪڙو واٽ (Watt) ڪيئي هزار

رهيا کائي وڃي ٿو. ان طريقي جي ٻي ڏکيائي

هيءَ آهي ته سڄاري سگهڻ هڪڙو پيرو بجليءَ

۾ مٽائجي ٿي ته پوءِ ان کي ٿوري خرچ سان

ذخيرو ڪرڻ (Store) مسئلو ٿيو پوي. ذخيري

ڪرڻ لاءِ بيٽريون استعمال ڪري سگهجن ٿيون،

پر اهي پڻ مهانگيون آهن، ۽ تڳن به ٿورو ٿيون.

اميد آهي ته جڏهن اهي سيل وڏي پئماني

تي تيار ٿيڻ لڳندا، تڏهن انهن جي لاڳت گهڻي

گهٽجي ويندي. لاڳت گهٽائڻ جا ٻيا به ڪيترائي

ڏس ڏنا ويا آهن. اچو ته انهن تي هڪ

نظر وجهون.

(۱) جيڪڏهن اسان سج جي ڪرڻن کي آڻشي

شيٽن ۽ آرسين سان فوڪس (Focus) ۾ آڻي

سائنس

هم مرڪز ڪريون ته اس جي سيلن جو گهربل
تعداد گهٽجي ويندو.

(۲) سيلن جي ڪارڪردگيءَ کي ۱۰ سيڪڙي

کان وڌايو وڃي. اميد آهي ته ڪارڪردگيءَ

جو سيڪڙو ۱۰ کان وڌي ۳۰ ٿي ويندو، جنهن

ڪري لاڳت ٽين هتي رهجي ويندي.

(۳) مٿان مٽنڊوچ (Sandwich) سيل ٺاهڻ ممڪن

ٿي پوي. اهي سيل سڄاري سگهڻ جي اسپيڪٽرم

جو وڏو حصو ڪم آڻي سگهندا. انهن سيلن جي

ڪارڪردگي ۶۰ سيڪڙي تائين پهچڻ جو

امڪان آهي.

(۴) اس جي سيلن جا ٻيا قسم به ڪم آڻي

سگهجن ٿا. هڪڙو اهڙو سيل ڪنڊيميم سلفائيڊسيل

آهي. ان سيل جي خوبي اها آهي ته ان جي لاڳت

سليڪان سيل جي سوين هتي آهي ۽ ان لاءِ رڳو

هڪڙي سنهي ٻالي ڪرسٽلائن فلم (Polycrystalline

ne film) جي گهرج پوي ٿي.

آس جون بيٽريون جيتوڻيڪ مهانگيون ٿين ٿيون

پر انهن جا ڪيترائي فائدا آهن. اهي ڪيميائي

بيٽرين کان وڌيڪ ڪمائتيون ٿين ٿيون، سدائين

هلن ٿيون، نه ته انهن جو ڪو ٻرڙو گسي ٿو ۽

نه ئي وري انهن ۾ ڪي پاڻيون (Fluids) مٽائڻيون

پون ٿيون. انهن بيٽرين ۾ جيڪو سڄاري سگهڻ

کي بجليءَ ۾ مٽڻ جو ڪم ٿئي ٿو، سو ڪڏهن

به ختم نٿو ٿئي ۽ کين وري چارج ڪرائڻو نٿو

پوي. انهن ڳالهين جي ڪري اهي بيٽريون پولار

جي لاڳتي کوجنا لاءِ تمام ڪارگر آهن. ڪيٽريون

ٽي اهڙيون شيون نڪتيون آهن، جن ۾ اس جي

بيٽرين کي ٽرانزسٽرن ۽ ننڍين ذخيري بيٽرين سان

ڳنڍي استعمال ڪيو ويو آهي ته جيئن عام ماڻهو

انهن مان فائدو وٺي سگهن.

مئي ۽ جون ۱۹۷۶ع

گرمي - بجلي ٽڪسات :

THERMO - ELECTRIC DEVICES

اهي ٽڪسات گرمي - جوڙي (thermo couple)

جي اصول تي ٻڌل آهن . جڏهن گرمي - جوڙي جي هڪڙي پچاڙيءَ کي ڪوسارجي (heat) ٿو ۽ ٻي کي ٽڌڪارجي (cool) ٿو ته اهڙي ريت جيڪا گرمي سگهه پيدا ٿئي ٿي، تنهن جو ۱۰ سيڪڙو سڌيءَ طرح بجليءَ ۾ مٽائي سگهجي ٿو . ڪوسارن جو ڪم هم مرڪز ٿيل سڄاري سگهه سان ٿي سگهي ٿو . زبردست ڪوجنا کان پوءِ اهڙا ارجنڊر ٽائو (Ceramics) ٺاهڻ ممڪن ٿي پيو آهي، جن جا وڏي گرمي پد تي گرمي - بجلي (thermo electric) اثر وڌا، جن جي پاڻ مان گرمي لنگهائڻ جي سگهه (conductivity) گهٽ ۽ بجلي لنگهائڻ جي سگهه (thermo elements) گهڻي ٿئي ٿي. گرمي - عنصرن (thermo elements) کي تيار ڪرڻ تي تمام گهٽ خرچ اچي ٿو ۽ اهي هلندي گسي ڪونه ويندا آهن . هن وقت ٿيندڙ تحقيق جو مقصد اهڙا گرمي - عنصر تيار ڪرڻ آهي، جن جي لاڳت ٿوري ۽ ڪارڪردگي گهڻي هجي . اندازو آهي ته چئن فٽن جو هڪ اس پچائڻو (solar cooker) ۲۵ کان ۵۰ واٽ بجلي ڏيئي سگهندو .

ڊولار ۾ اس سيلن جو سرشتو

ڊاڪٽر گليزر (Glaser) جي صلاح آهي ته زمين جي استوائِي ليڪ جي چوڌاري ٺهڪندڙ مدارن ۾ هٿرادو گرھ چوڙيا وڃن . انهن گرھن ۾ اس سيل هجن، جيڪي سڄاري سگهه کي ڪنوڪري بجليءَ ۾ مٽائين . اها بجلي پوءِ مائڪرو ويو (micro - wave) شعاعن جي شڪل ۾، زمين تي لڳل جهٽن (collecting antennas) کي موڪلي

سائنس

سگهجي ٿي . پوءِ انهن مائڪرو ويو شعاعن کي سڌي ڪرنٽ واري يعني ڊي - سي بجليءَ ۾ مٽائي، واپرائي سگهجي ٿو . ان سرشتي جو فائدو اهو آهي ته زمين جي فضا ۾ سڄ جي ڪرڻ جو زور زمين جي مٿاڇري کان پيٽو ٿئي ٿو، ان ڪري ڪارڪردگي وڌي وڃي ٿي . اهو سرشتو معدني ٻارڻن جي لاڳت کان تين چوٿون ڪاٺي ويندو .

سمند جا ٿرمل سرشتا

سمند کي، ان جي مٿاڇري کي ۽ ان ۾ موجود گرميءَ کي بجلي پيدا ڪرڻ لاءِ استعمال ۾ آڻڻ جي رٿ به آهي . ان جا ٻه طريقا هوندا هڪڙي ۾ سمند جي مٿاڇري تي هڪ پليٽ فارم تاريو ويندو، ۽ سامونڊي پاڻيءَ کي ٽاريندڙ (coolant) طور ڪم آندو ويندو . ٻئي ۾ مٿاڇري وارن گرم تنهن ۽ هيٺين ٿڌن تنهن جي ٿرمل گريڊيئنٽ کان ڪم ورتو ويندو .

ڊبليو - جي - ڊي - ايسچر (W. J. D. Escher) جي رٿ آهي ته جهڙا پليٽ فارم زمين تي هوندا آهن، تهڙا سمند جي مٿاڇري تي تاريا وڃن . انهن پليٽ فارمن تي محرابي (concavul) آرسين لڳل هونديون، جيڪي اس کي هڪ وڏي ٽهڪائڻي (boilar) تي فوڪس (focus) ڪنديون . اهو ٽهڪائڻو

باق ٺاهيندو، جنهن تي ٿرٻائين هلائي بجلي پيدا ڪئي ويندي . سمند جو ٿڌو پاڻي ٺارڻو ڪري ڪم آندو ويندو ۽ پيدا ٿيندڙ بجليءَ سان پاڻيءَ کي ان جي مرڪب جزن ۾ جدا ڪيو ويندو . اهڙيءَ طرح جيڪا هائيڊروجن ملندي، سا جهازن رستي امائي سگهجي ٿي يا نلن رستي پمپ ڪري سگهجي ٿي . اهو ڪارخانو تازو پاڻي به ٺاهيندو ۽ سامونڊي پاڻيءَ مان معدنيات پڪيندو . ان سرشتي


مئي ۽ جون ۱۹۷۶ع

جي وڏي خرابي آهي ان جي لاڳت جيڪا اٽمي بجلي - گهرجي لاڳت کان ٿيڻي چوڻي هوندي . اينڊرسن ۽ ٻين ڪيترن ئي محققن سمند ۾ جيڪو ٿرمل گريڊيئنٽ آهي تنهن کان ڪم وٺي بجلي پيدا ڪرڻ جي صلاح ڏني آهي . مٿاڇري جي پاڻيءَ جي گرمي پد (اٽڪل ۷۹ ڊگريون ف) ۽ مٿاڇري کان ۲۰۰۰ فٽ هيٺ واري پاڻيءَ جي گرمي پد (اٽڪل ۵۴ ڊگريون ف) ۾ اٽڪل ۳۵ ڊگريون فارنهایت جو فرق آهي . ڪرنل جو سائيڪل ٻنهي گرمي پدن جي وچ ۾ ڪم ڪندي ۽ ڇهه سيڪڙو ڪارڪردگي ڏيکاريندو . اها ڪارڪردگي تمام گهٽ آهي ۽ پر ساڳئي وقت ٻارڻ تي خرچ ٿي ٿئي . ان طريقي جو اصول اهو آهي ته ٽوبو (Submerged) پليٽفارم هجي . مٿاڇري وارو ڪوسو پاڻي پروپين (Propene) گئس کي وڏي دٻ تي ٽهڪائڻ جو ڪم ڪندو . اها گئيل گئس ٽربائين هلائيندي ۽ بجلي پيدا ڪندي . سمند جو اونهو پاڻي گئس کي ناري ٽهڪائڻي ڏانهن موٽائي ڇڏيندو .

حياتياتي مٽاسٽا: BIOLOGICAL CONVERSION

اسين الگي ۽ مڪئي يا ڪمند جهڙا فصل اپائي ۽ لٽي ۽ ان مان ميٿين (methane) اسپرٽ ٺاهيندا آهيون . يا وري انهن کي جيئن جو ٿيئن ساڙي پاڻ سگهه ٺاهيندا آهيون . پر سگهه پيدا ڪرڻ جي ان طريقي سان مسئلو اهو آهي جو ان جي ڪارڪردگي تمام گهٽ يعني هڪ سيڪڙو آهي . تنهن ڪانسواءِ ان لاءِ ضروري آهي ته وڏيون وڏيون ايراضيون هجن ۽ جن ۾ فصل پوکيا وڃن . ائين ڪرڻ سان بجلي پيدا ڪرڻ جو خرچ گهڻو

چڙهيو وڃي ۽ معدني ٻارڻ جي لاڳت کان ٿيهوڻو ٿيو وڃي . پر ڪمند جي فصل سان اها ڳالهه لاڳو ناهي ۽ جو ان جي ڪارڪردگي اٽڪل چار سيڪڙو آهي . فلپائن جي ٻيٽن تي گهڻي بجلي پيدا ٿي ڪمند جي ڦوڳ مان ڪندا آهن . فوٽو سينٿيسز (Photo-synthesis) جو عمل اسان لاءِ ڪاڌو ۽ آڪسيجن سان ڀرپور آبهوا مهيا ڪري ٿو . معدني ٻارڻ جيڪي هن وقت استعمال ۾ آهن سي پڻ لکين ورهيه اڳ ٿيل سينٿيسز جي عمل جو نتيجو آهن . سو جيڪڏهن اسان واهر لاءِ ان عمل ڏانهن واجهائون ته بيواجبي نه ٿيندو . اچو ته ڏسون ته سجاري سگهه کي ڪيميائي سگهه ۾ مٽائي ذخيري ڪرڻ ۾ ٻوٽن جي ڪارڪردگي ڪيتري آهي . ٻوٽن جي حالت ۾ جيڪڏهن اسين هڪڙي چورس ميٽر تي اڀايل فصلن جي ڪلورين جو ۽ هڪڙي سال ۾ ان زمين جي ٽڪري تي پيل اس جو جائزو وٺون ته ڪارڪردگي هڪ سيڪڙي کان به ٿوري ٿي اچي ۽ جيڪا هٿرادو طريقن جي ڏهه سيڪڙو ڪارڪردگيءَ کان گهڻي گهٽ آهي . انهيءَ گهٽ ڪارڪردگيءَ جو هڪڙو سبب اهو آهي ته ڪلوروفل (Chlorophyll) مادو سڄ جا ۴۰۰ ۽ ۷۰۰ ملينائيڪران جي وچ وارا ڪرڻا ڪم آڻي ٿو . اهو سولر اسپيڪٽرم جي اڌ جيترو مس آهي . ٻيو سبب اهو آهي ته ان کي آڪسيجن جي مول ٺاهڻ لاءِ ۱۱۴ ڪلو ڪلوريون ۽ هينٽين ڪيميائي رد عمل پٽاندر گهرجن ٿيون .



اڄڪلهه هڪ گهرڙي وارن ٻوٽن ۽ جهڙوڪ (بقايا ڏسو صفحو ۲۳)

سمند (Sea)



اسان جي ڌرتيءَ تي زندگيءَ جو وجود هوا، روشنيءَ ۽ پاڻي جي ڪري قائم آهي؛ ۽ پاڻي جو سڀ کان وڏو ذريعو سمند آهي جو زمين جي مٿاڇري جو اٽڪل $3/4$ حصو والاريو ٿيو آهي. جيڪڏهن سڄي ڌرتي جو مٿاڇرو مٿيون مٽو يا هموار هجي ها ته جيڪر سموري زمين تي سمند جو ٻه ميل اونهو پاڻي بيهي سگهي ها. سمند جي باري سائنسدانن نهايت مفيد معلومات حاصل ڪئي آهي. انهن سمند جي گهراين ۾ هيٺ وڃي يا مختلف اوزارن جي وسيلي لڪل راز معلوم ڪيا آهن ۽ ان معلومات جي وسيلي سمند ۽ ان جي خزانن مان بيشمار فائدا حاصل ڪيا ويا وڃن.

خشڪي وانگر سمند ۾ به مختلف قسمن جي مخلوق آهي. جڏهن ڌرتي تي زندگي جا ڪي به نشان موجود نه هئا تڏهن به سمند ۾ جاندار مخلوق موجود هئي. هن وقت اٽڪل ڏهن لکن کان به وڌيڪ قسمن جا ساهوارا ۽ ٻوٽا سمند ۾ ملن ٿا.

جاندار: سمند ۾ ملندڙ ٻوٽا عام طرح ننڍا ٿين ٿا، تنهن هوندي به انهن جو تعداد بي انداز آهي. اوهان کي گهڻو ڪري سمند جي مٿاڇري تي گهڻائي ننڍڙا ٻوٽا ترندي نظر ايندا، جن مان ڪي شڪل ۽ صورت ۾ هڪجهڙا نظر ايندا ۽ ڪي هڪٻئي کان گهڻو مختلف ٿيندا آهن. هنن ننڍڙن ٻوٽن جي پرورش، سمند جو پاڻي سڄ جي

گرمي کي جذب ڪري ڪندو آهي. انهن خوبصورت ٻوٽن مان ڪن کي سمند جي ڪناري وارين ڇپن جي ننڍن سوراخن مان نڪرڻ جو وجهه ملي ويندو آهي ۽ ٻاهر نڪري نروار ٿيندا آهن، ڪي وري سمند جي تري ۾ واري گپ ۽ چڪ ۾ پنهنجون پاڙون کڙيندا آهن. اهي ٻوٽا جيڪي سمند ۾ پيدا ٿين ٿا سي سمند ۾ رهندڙ جانورن لاءِ خوراڪ مهيا ڪن ٿا، ۽ اهي ئي ٻوٽا دوائن ٺاهڻ جي ڪم ايندا آهن، ۽ وري ڪن خاص قسم جي ٻوٽن مان جيلي ۽ صابن پڻ تيار ڪيو ويندو آهي.

ٻوٽن کان سواءِ سمنڊ ۾ بيشمار جانور به ملن ٿا، جن ۾ سڀني کان وڌيڪ مشهور مڇيون آهن. مڇين جا به هزارين قسم آهن ۽ اهي قد شڪل ۽ رنگ ۾ هڪ ٻئي کان مختلف ٿينديون آهن، ڪي مڇيون ننڍي قد جون هونديون آهن ته وري ڪن جو قد پنجاه فوٽن کان به مٿي هوندو آهي؛ وڏين مڇين ۾ وهيل ۽ شارڪ مڇيون تمام گهڻو مشهور آهن. گرم پاڻي ۾ رهندڙ مڇين جا رنگ تمام خوبصورت ٿيندا آهن، ۽ کين ڏسڻ شرط اهو احساس ٿيندو آهي ته دنيا جي ڪنهن مشهور آرٽسٽ مٿن ويهي ڪافي وقت تائين مختلف رنگن ۾ گل چٽيا آهن.

سامونڊي غذا دنيا جي وڏندڙ آدمشماريءَ لاءِ خوراڪ جي مسئلي جي ڪوٽ ڪي پوري ڪرڻ لاءِ وڏي مدد ڏيئي سگهي ٿي، اسان کي پنهنجي خوراڪ جي ڪوٽ پوري ڪرڻ لاءِ سمنڊ جي انهن عظيم مادي خزانن مان پورو پورو فائدو وٺڻ گهرجي ۽ انهن کي گهڻي کان گهڻو استعمال ڪرڻ گهرجي. سمنڊ ۾ رهندڙ مڇين کانسواءِ ڪيترا ٻڪري به سمنڊ جي ڪناري تي آڪيرا ٺاهي رهندا آهن، جيڪي پنهنجي خوراڪ سمنڊ جون مڇيون ۽ ٻيا جيت ماري حاصل ڪندا آهن.

سامونڊي ساهوارن ۾ سڀ کان وڌيڪ تعداد بئڪٽيريا جو آهي، جن مان ڪي ته ايترا ننڍا آهن جيڪي طاقتور خوردبين کانسواءِ ڏسي به ڪين سگهبا آهن. بئڪٽيريا سڄي روشنيءَ کان سواءِ زنده رهندا آهن. اهي ننڍڙن ٻوٽن کي کاڌي لاءِ استعمال ڪندا آهن ۽ پاڻ وري ٻين پاڻيءَ جي جانورن ۽ مڇين جو شڪار ٿيندا آهن.

سمنڊ جو ٿرو :- سمنڊ جي تري ۾ ڪافي

اهڙا جيت به ملن ٿا، جيڪي اسان جي باغن ۾ اڀرندڙ ٻوٽن وانگر خوبصورت مختلف رنگن جا ٿيندا آهن، انهن کي اينيمي نر (Anemones) چوندا آهن، ٻن ۽ پنڪڙين بدران انهن اينيمي نر کي ڊگهيون نوڪدار چهنون ٿينديون آهن، جن کي کاڌي کائڻ لاءِ استعمال ڪندا آهن، ۽ جڏهن اهي پنهنجي جسم کي ڦٽائيندا آهن تڏهن نهايت خوبصورت رنگن ۽ مختلف شڪلين ۾ نظر ايندا آهن پر خطرو محسوس ڪندي ئي اهي ٻاهي وانگر سسي يا وڻجي سنجي گولو بڻجي ويندا آهن. سمنڊ ۾ مختلف قسمن جون سڀون ۽ ڪوڏ به لڌا ٿا، جن ۾ سمنڊ جا ننڍڙا ساهوارا جانور پرورش پائين ٿا. اهي ساهوارا جڏهن انهن مان نڪري ٻاهر ٿيندا آهن، ته باقي سڀون ۽ ڪوڏ پورا رهجي ويندا.

سامونڊي پاڻي :- سمنڊ جي پاڻيءَ ۾ جيڪي شيون اڄڪلهه ملن ٿيون، انهن مان گهڻيون اڳ موجود نه هيون. شروعات ۾ سمنڊ جو پاڻي ڪارو نه هو، پر گهڻي عرصي تائين، جڏهن برسات جو پاڻي دريائن، ندين ۽ نالن جي وسيلي سمنڊ ۾ شامل ٿيندو رهيو، تڏهن کاڌي واري عام لوڻ کانسواءِ ٻيون گهڻيون ئي معدني شيون زمين جي مٿاڇري تان ڳاري گهلي کڻي آيو. ان کانسواءِ سمنڊ جو پاڻي سڄ جي گرمي ڪري ٻاڦ ٿيندو رهي ٿو، جنهن جي ڪري ٻيا معدني مادا سمنڊ ۾ رهيو وڃن، جن ۾ لوڻ جو تعداد وڌيڪ هوندو آهي، اهڙي طرح انهن ڳرندڙ شين جو مقدار آهستي آهستي وڌندو رهيو، ۽ اڄ به انهن جو مقدار برابر وڌي رهيو آهي. جيڪڏهن سمنڊ ۾ ڳرندڙ سڀني مرڪبن کي گڏ ڪري ڌرتيءَ

برومين (Bromine) ڌاتو پڻ سمنڊ ۾ جهجهو ملي ٿو، جيڪو فوٽو گرافي ۽ ٻين ڪيميائي مرڪبن ۾ استعمال ٿئي ٿو، انڪانسواءِ سامونڊي لوڻ ڪيترن ئي ڪيميائي صنعتن لاءِ ڪڇي مال جو ڪم ڏئي ٿو. سمنڊ جي پاڻي ۾ سون جهڙا قيمتي ڌاتو به ملن ٿا. هڪ عام اندازي موجب هڪ ڪعب ميل سمنڊ جي پاڻي مان ۵۵ ڪروڙ روپين جيترو سون حاصل ڪري سگهجي ٿو، پر افسوس جو اڃا تائين اهڙو طريقو معلوم ٿي نه سگهيو آهي، جنهن سان سون ڪڍڻ جو خرچ گهٽ ۽ آمدني زياده ٿئي.

سمنڊ جي پاڻي ۾ چرپر :- هوا گرمي ۽ چنڊ جي ڪشش اهڙيون طاقتون آهن جي سمنڊ جي پاڻي کي لاڳيتو چرپر ۾ رکن ٿيون، ۽ سمنڊ جي پاڻي جي چرپر جهاز راني ۽ سامونڊي ڪنارن جي آبهوا تي اثر وجهي ٿي.

سامونڊي لهرون :- لهرن جي پيدا ٿيڻ جو سبب کان وڏو سبب هـوا آهي، جيتريقدر هوا تيز هوندي اوتري قدر لهرون وڏيون هونديون. زمين تي زلزلي اچڻ ۽ سمنڊ جي تهه ۾ موجود ٻرندڙ مادن جي عمل سان به لهرون پيدا ٿين ٿيون، ۽ اهي هوا مان پيدا ٿيندڙ لهرن کان گهڻيون وڏيون ۽ طاقتور ٿين ٿيون. لهرن جي صورت ۾ پاڻي هيٺ مٿي حرڪت ڪري ٿو پر اڳتي نٿو وڌي. البت ڪناري ويجهو رنڊڪ جي ڪري پاڻي خشڪيءَ تي چڙهيو وڃي.

وهڪرا :- سمنڊ جي پاڻيءَ جا وڏا ريلا خاص طرفن ڏانهن وڌندا آهن. انهن وهندڙ ريلن کي وهڪرا چئبو آهي. ميداني دريائن جي ڀيٽ ۾ انهن جو ڀيٽ گهڻو وڏو هوندو آهي، اهي

جي خشڪ حصن تي وڇايو وڃي ته هوند آهن تي ۵۰ فوٽن جو تهه، جملي وڃي. نديون لڳاتار سمنڊ ۾ معدني شيون ۽ لوڻ گڏ ڪري رهيون آهن، ۽ ڪي گريل معدني مرڪب، سمنڊ اندر ڪيميائي عمل سبب ٻيون صورتون اختيار ڪندا آهن. سامونڊي ساهوارا به ڪن مرڪبن کي خوراڪ طور استعمال ڪندا آهن، پر مجموعي طور تي سمنڊ ۾ ڳرندڙ مرڪبن جو تعداد وڌندو رهي ٿو. سراسري طور سٺو پائونڊ سامونڊي پاڻي ۾ اٽڪل ساڍا ٽي پائونڊ معدني مادا ڳرن ٿا، انهن ۾ سڀ کان گهڻو مقدار ڪاڌي جي عام لوڻ جو آهي. ان کان سواءِ مئگنيشيم، ڪئلسيم، ۽ پوٽاشيم جا مشهور مرڪب به شامل هوند آهن. هيٺ ڏنل چارٽ ۾ انهن مرڪبن جو مقدار ڄاڻايل آهي:

گريل مرڪب

(۱۰۰ پائونڊ سامونڊي پاڻي ۾)

۱- سوڊيم ڪلورائيڊ	۲۶.۷۲	پائونڊ
۲- مئگنيشيم ڪلورائيڊ	۰.۳۸	“
۳- مئگنيشيم سلفيٽ	۰.۱۶	“
۴- ڪئلسيم سلفيٽ	۰.۱۳	“
۵- پوٽاشيم سلفيٽ	۰.۰۹	“
۶- ڪئلسيم ڪاربونيٽ	۰.۰۱	“
۷- مئگنيشيم برومائيڊ	۰.۰۱	“
ڪل وزن	۳۵.۰	پائونڊ

گريل مرڪبن مان ڪي مفيد ۽ قيمتي معدني شيون حاصل ٿين ٿيون. هڪ ڪعب ميل سمنڊ جي پاڻي اندر اٽڪل ۴۰ لک ٽن مئگنيشيم ملي ٿو، هيءُ ڌاتو هوائي جهازن ۽ ڪيترين ٻين شين ٺاهڻ جي ڪم اچي ٿو.

وهڪرا پنهنجي رفتار ۽ گرميءَ جي درجي ۽ بيهڪ مان سڃاڻا آهن. انهن جي پيدا ٿيڻ جو پهريون ۽ وڏو سبب هوا آهي، ڇو ته دنيا جا مشهور وهڪرا هوا جي ذريعي هلن ٿا. وهڪرن جي وهڻ جو ٻيو وڏو سبب مختلف هنڌن جي گرميءَ جي درجي جو فرق آهي، خط استوا وٽ گهڻي گرمي هئڻ ڪري ويجهڙائي واري سمنڊ جو پاڻي گهڻو گرم ٿيو وڃي، ۽ قطبن وٽ وري سرديءَ جي ڪري ويجهڙائي واري سمنڊ جو پاڻي ٿڌو هوندو آهي، جيئن ته ٿڌو پاڻي ڪجهه ڳورو هوندو آهي، تنهن ڪري پنهني قطبن جي ويجهو پاڻي جو مٿاڇرو ڪجهه گهٽ هوندو آهي، ۽ خط استوا جي ويجهو پاڻي جو وهڪرو خط استوا جي علائقن کان ٿڌن علائقن ڏانهن وهڻ شروع ڪري ٿو. هونئن ته وهڪرا تمام گهڻا آهن، پر انهن مان هيٺيان وهڪرا گهڻو مشهور آهن.

۱- خليجي وهڪرو :- هيءَ وهڪرو گرم پاڻي جو تيز وهڪرو آهي، جو ميڪسيڪو جي نار مان نڪري اتر آمريڪا جي اوڀر واري ڪناري سان لڳ وهي ٿو. هن جي رفتار پنج ميل في ڪلاڪ ۽ وڪر ۵ ميل هوندي آهي. بعد ۾ هيءَ وهڪرو اولهه جي هوائن جي اثر هيٺ اولهه کان اوڀر طرف وهڻ لڳي ٿو، اتي هن وهڪري کي ”اتر ائٽلانٽڪ سمنڊ جو وهڪرو“ چوندا آهن. خليجي وهڪرو اتر-الهندي يورپ جي آبهوا تي نهايت سٺو اثر وجهي ٿو ۽ گرم وهڪري هئڻ ڪري اهو سردي کي گهٽ ڪري ٿو. اهي بندر گاهه جيڪي برف سان سڄو سال ڍڪيل هجن ها، سي هن وهڪري جي ڪري سڄو سال واپار لاءِ کليل رهن ٿا.

۲- جپان جو وهڪرو :- هيءَ گرم پاڻي جو وهڪرو آهي، ۽ ايشيائي سامونڊي ڪنارن سان گڏوگڏ فلپائن جي ٻيٽن ڏانهن وهي ٿو، جتي هن جا ٻه حصا ٿي وڃن ٿا، هڪ حصو الهندي ڪناري سان گڏوگڏ وهندي اتر-اوڀر ڏانهن

پئسفڪ سمنڊ جي اتر واري وهڪري ۾ تبديل ٿي وڃي ٿو. هن وهڪري جو گرم پاڻي جڏهن برٽش ڪولمبيا ۽ الاسڪا جي ڪناري جي ويجهو پهچندو آهي تڏهن اتان جي آبهوا کي سخت سرد ٿيڻ کان بچائي ٿو.

۳- هندي وڏي سمنڊ جو ڏاکڻيون خط استوائي وهڪرو :- هندي سمنڊ جي ڏکڻ ۾ ڏاکڻيون خط استوائي وهڪرو اوڀر کان اولهه طرف وهي ٿو. آفريڪا جي اڀرندي ڪناري جي ويجهو پهچي هڪ وهڪرو ڏکڻ طرف رخ رکي ٿو ۽ ”موزمبيق جو وهڪرو“ سڏجي ٿو. آفريڪا جي انتهائي ڏکڻ ۾ هن جو پاڻي ڏکڻ آرڪٽڪ وڏي سمنڊ جي سرد پاڻي جي وهڪ ۾ ملي اولهه کان اوڀر طرف هلي ٿو ۽ آسٽريليا جي الهندي ڪناري جي ويجهو پهچي ٿو ۽ اتي کيس ”اولهه آسٽريليا جو وهڪرو“ سڏجي ٿو.

۴- سرد وهڪرا :- انهن گرم وهڪرن کانسواءِ سمنڊ ۾ سرد وهڪرا به هوندا آهن. جتي گرم ۽ سرد وهڪرا ملن ٿا اتي آبهوا پوري ٻئي ٿئي ٿي، جيڪو سرد وهڪرو ڏکڻ آفريڪا الهندي ڪناري سان گڏوگڏ اتر ڏانهن هلي ٿو، اهو ”ليبريڊار جو سرد وهڪرو“ آهي ۽ ڪناري سان گڏوگڏ وهندو فائونڊلينڊ جي ويجهو خليجي وهڪري سان ملي وڃي ٿو. هن وهڪري ۾ تمام گهڻي برف به وهندي رهي ٿي، تنهنڪري جهازن کي به نقصان پهچي ٿو.

۵- ڪئلفورنيا جو وهڪرو :- هيءَ وهڪرو ڪئلفورنيا ۽ ميڪسيڪو جي مغربي ڪنارن سان گڏوگڏ وهندو، اتر واري استوائي وهڪري سان ملي وڃي ٿو.



۽ جهڙا پيا جانور "Sevrew" کان لهرائيندا آهن ۽ هي جانور ٻين تي نه رڳو غالب آهي پر سندن ڪياج به اهي ئي هوندا آهن.

هن جانور جو زهر پڪ جهڙي پاڻي ۾ ٿئي ٿي. جيئن وڏا جانور پڪ پندا ڪندا آهن تيئن هي جانور وري اهو زهر پندا ڪندو آهي؛ يا ائين ڪئي چئجي ته اها پڪ ئي سندس زهر هوندو آهي، جيڪو پنهنجي بچاء لاء استعمال ۾ آئي ٿو.

سوئر ۽ زهريلي جانور جو چڪ:

سوئر تي زهريلي جانورن جي چڪ جو اثر ڪو نه ٿئي، خاص ڪري نانگ جو. نانگ جڏهن کيس چڪ پائيندو آهي ته سوئر تي انهي جو اثر بلڪل نه جهڙو يا ٿورڙو ٿئي ٿو. اهو انهيءَ ڪري جو سوئر جي ڪل هيٺان چرپيءَ جو هڪڙو وڏو تهر ٿيندو آهي. ان ڪري جڏهن کيس ڪوبه

مئي ۽ جون ۱۹۷۶ع

زهريلو چڪ هڻندڙ ٿڻ وارو جانور

ٿڻ واري گروه سان تعلق رکندڙ ڪوئي جهڙي ڪٽر بندڙ جانور "Sevrew" جو چڪ زهريلو ٿيندو آهي. گهڻو وقت اڳي جڏهن ڳوٺاڻا اها ڳالهه ڪندا هئا، ته جيوعلم جا ماهر انهيءَ ڳالهه کي ڪوڙ ۽ اجائي ڪٿا سمجهندا هئا؛ پر گهڻن تجربن کان پوءِ اهو ثابت ٿيو آهي ته واقعي هن جانور جو چڪ زهريلو ٿئي ٿو ۽ سائنسدان انهيءَ ڳالهه تي ڳوٺاڻن سان متفق آهن.

هي ڪوئن جهڙا جانور گهڻي باقي اتر آمريڪا ۾ ملن ٿا. هن جي زهر جون سيون جڏهن ڪوئن ۽ سيهڙن کي هنيون ويون ته اهي ٿورڙي ئي وقت اندر مري ويا. انهيءَ کان سواءِ "Sevrew" جي چڪ پاڻل ڪوئن جو جڏهن اڀياس ڪيو ويو ته انهن ۾ گهڻي تبديلي ۽ ڪين گهڻي وقت تائين لوڙيندو ڏٺو ويو. انهيءَ ڪري هن جيترا

مائٽس

ڪناري جي ويجهو هئي، اتي ڪيس ڪيترائي
قتيل ۽ بيمار پينگوئن پکي ڏسڻ ۾ آيا، وڌيڪ
کوچنا مان اهو ثابت ڪيائين ته انهيءَ ڏيند جي
تري ۾ ڪيترائي مثل پکي پيا هئا جيڪي گهڻي
تڌ هئڻ ڪري جملي پهن جهڙا ٿي ويا هئا ۽
سڄي جا سڄا سلامت هئا، جو گهڻي تڌي پاڻي
ڪين ناس ٿيڻ کان بچائي رکيو هو. هن جو
وڌيڪ خيال هو ته اهي پکي جيڪي مرڻ ڪنڌي
تي پهچندا هئا ته انهيءَ ڏيند ۾ اچي پوندا هئا
۽ اهڙي نموني سان پنهنجو گڏيل قبرستان
جوڙيو هئائون.

پکيءَ جو سڀ کان وڏو آڻو

اڻ پکيءَ جو آڻو، سڀني پکين جي آڻن کان
وڏو ٿئي ٿو. مشاهدن ۾ اهو ثابت ڪيو ويو آهي ته
اڻ پکيءَ جي هڪڙي آڻي ۾ ۱۲ کان ۱۸ تائين
ڪڪڙ جا آڻا اچي سگهن ٿا. هن پکي جو آڻو
ڇهن کان ستن انچن تائين ڊگهو ۽ پنجن کان
ڇهن انچن تائين ويڪرو ٿئي ٿو.

هڪڙو ٻيو پکي جيڪو هن وقت اڻ لپ آهي
انهي جي آڻي جو قد ۱۳ انچن تائين ۽ گهڻو
سايڻ نون انچن تائين ڏنو ويو هو. هن پکيءَ
جي آڻي ۾ ايتري گنجائش هئي جو منجهس ٻه
کيلن مواد ماڀي سگهجي ها. هن جو آڻو اڻ پکيءَ
جي آڻي کان ڇهونو وڏو ۽ ڪڪڙ جي آڻي کان
ڏيڍ سو دفعا وڌيڪ هو.

پکي ۽ آڻن تي آرو.

گهڻو ڪري سڀ پکي پنهنجن آڻن تي
ويهي آرو ڪندا آهن، پر ڪي وري اهڙا به آهن
جي پنهنجن آڻن تي آرو ڪونه ڪن؛ جن مان
هڪڙو آسٽريليا جو ”Mound“ پکي پڻ آهي. هي

مئي ۽ جون ۱۹۷۶ع

زهريلو جانور چڪ پائيندو آهي ته انهيءَ جو زهر
سندس چرٻيءَ جي تهر ۾ ئي جذب ٿي وڃي ٿو؛
يا ڪن حالتن ۾ جي اهو رت ۾ شامل به ٿئي
ويندو آهي ته ٿورڙي مقدار ۾ هئڻ ڪري ڪيس
گهڻي تڪليف ۾ ڪونه وجهي.

ساڳي نموني سان ڄاهو پڻ نانگ جي چڪ
کان محفوظ آهي؛ يا ائين ڪڏي چئجي ته هن تي
نانگ جو اثر ڪونه ٿئي. جنهن جو پهريون سبب
هي آهي ته ڄاهو نانگ کان وڌيڪ ڦڙت ٿئي ٿو ۽
ٻيو ته سندس بت تي ڪندا ٿين ٿا. جڏهن هي
هڪ ٻئي تي حملو ڪندا آهن ته ڄاهو ويڙهجي
سيڙهجي گول مول ٿي ويندو آهي ۽ نانگ جو
هو وار سندس لاءِ ئي وبال جان ٿيندو آهي جو سندس
هر وار ڄاهي جي ڪهري ۽ ڪنڊن واري بت تي
پوندو آهي ۽ موت ۾ وري ڄاهو مٿس اهڙو ته
پرڀور حملو ڪندو آهي جو ويچارو نانگ موت
کي ويجهو وڃي ٿئي.

پکين جو گڏيل قبرستان

هاڻين لاءِ اها چوڻي مشهور هئي ۽ آهي ته
انهن جو هڪڙو گڏيل قبرستان ٿئي ۽ سڀ هاڻي
هڪڙي هنڌ وڃي مرن. پر سائنسدانن ۽ جيو-علم
سان چاه رکندڙن اها ڳالهه ڪوڙي ثابت ڪئي
آهي ته سندن ڪو گڏيل قبرستان نٿي.

پڻ (پينگوئن) پکيءَ لاءِ اهو چيو ويندو آهي
ته انهن جو هڪڙو گڏيل قبرستان ٿئي ۽ اها
ڳالهه اميريڪن ميوزم آف - نچرل هسٽري جي
ڊاڪٽر رابرٽ ڪشمين مرفيءَ گهڻو وقت اڳ
ثابت ڪئي هئي ته هي پکي هڪڙي هنڌ مرندا آهن.
هڪ دفعي هو گهمندو ڦرندو هڪ اهڙيءَ ڏيند
وت وڃي نڪتو جيڪا سمنڊ جي

جانور ۽ انهن جا ڏند

دنيا ۾ ڪي ساهوارا اهڙا به آهن، جن جا ڏند عمر جي لحاظ سان پنهنجي پوري قد ۽ ماپ تائين پهچڻ کانپوءِ بند ٿي ويندا آهن، جن ۾ ماڻهو ۽ انهيءَ گروه وارا ٻيا ڪي ساهوارا اچي وڃن ٿا. پر ڪي ساهوارا اهڙا به آهن جن جا ڏند هميشه وڌندا رهن ٿا، جن ۾ ڪٽریندڙ جانور، هائي ۽ سوئر وغيره آهن. انهن جي ڏندن جي وڌڻ جو وڏو ۽ مکيه سبب هي آهي جو هنن جانورن جي ڏندن جون پاڙون کليل ٿين جنهن ڪري اهي ڏند ڪي هميشه نڪرڻ ۾ مدد ڪن ٿيون؛ جڏهن ته باقي جانورن جي ڏندن جون پاڙون ٿورڙي وقت کانپوءِ هميشه لاءِ اهڙيون نه بند ٿي وينديون آهن جو وڌيڪ ڏند ڄمڻ يا ڦٽڻ جو سوال ئي پيدا نٿو ٿئي.

ڪٽریندڙ جانورن جي ڏندن جو هميشه نڪرڻ هنن جانورن جي ڏندن جي خاصيت آهي، ڇاڪاڻ ته، هي هميشه ڪٽریندا رهن ٿا ۽ ڪٽڻ جي ڪري سندن ڏند گسندا رهندا آهن؛ انهيءَ مصيبت کان بچڻ لاءِ فطرت کين اهڙو نظام ڏنو آهي. سندن ڏند جيترا گسندا ويندا ته اوترائي ٻيا ڄمندا ۽ نڪرندا رهندا. ڪيترين حالتن ۾ سندن هڪ يا ٻه ڏند ڏنگا پڻ ٿي ويندا آهن جن جو مکيه سبب انهن جو استعمال ۾ نه اچڻ آهي، ۽ اهي مٿين جاڙيءَ کان به ٻاهر نڪري ايندا آهن. ڪن ٿورڙن جانورن ۾ اهو پڻ ڏٺو ويو ته، اهي وڌندڙ ڏند استعمال ۾ نه اچڻ ڪري مٿين جاڙي ۾ اندر گهڙي ويل هئا يا اڃا به اڳتي هلي مٿي ۾ کپيل هئا؛ اهڙن جانورن لاءِ پنهنجو وات کولڻ ناممڪن ٿيو پوي. مطلب ته اهڙن

پکي آنا لاهڻ کانپوءِ ننڍيون ڪانيون، پن ۽ اهڙيون ٻيون شيون گڏ ڪري آڻي انهيءَ ۾ رکي ڇڏيندو آهي ۽ پوءِ اهو اس مان گرمي حاصل ڪري آهستي آهستي ڦٽندو آهي. هڪڙو ٻيو پکي ”Crocodile bita“ جيڪو آفريڪا ۾ پوندو آهي، اهو وري پنهنجا آنا واريءَ ۾ پوري ڇڏيندو آهي ۽ اهي به ساڳئي نموني سان اس مان گرمي وٺي ڦٽندا آهن.

ڇا ڪو پکي آني مان ڦٽڻ کانپوءِ هڪدم ئي اڏامي سگهي ٿو؟

گهڻو ڪري سڀ پکي آني مان ڦٽڻ کانپوءِ اڏامي ڪونه سگهن. پر ڪجهه اهڙا به آهن جيڪي ڦٽڻ کانپوءِ تڙت ئي اڏامي سگهندا آهن، جن مان آسٽريليا جي ”Mound“ پکيءَ جو مثال ڏيئي سگهجي ٿو. هي پکي آني مان ڦٽڻ کانپوءِ انهيءَ ڪري اڏامي سگهندو آهي جو کيس آني مان نڪرڻ سان ئي کين جو پورو پردو هوندو آهي جيڪو کيس اڏامڻ ۾ مدد ڪري ٿو.

دنيا جو وڏي ۾ وڏو پکي

قد بت ۽ وزن جي لحاظ کان دنيا جو وڏي ۾ وڏو پکي آفريڪا جو اٺ پکي آهي. هي گهڻو ڪري اٺ فوٽ يا ان کان به وڏو ٿئي ۽ سندس وزن ٽي سئو پائونڊن تائين ٿئي.

هڪڙو ٻيو ”Maos“ پکي جيڪو هن وقت اڻ لپ آهي، اهو اٺ پکي جهڙو هوندو هو ۽ نيوزيلينڊ ۾ پوندو هو. ان جي هڏائين پچري مان اهو اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته هي پکي ۱۲ فوٽن تائين ڊگهو ٿيندو هو.

جانورن جا ڏند هميشه لاءِ مرڻ ڪنڌيءَ تائين
چمندا رهندا آهن.

جانورن جي اکين جو ڀرڻ

اسان مان ڪيترن رات جي وڳڙي ۾ گهڻن
جانورن جون اکيون ڀرندي ڏٺيون هونديون. ڀرڻ
جو مطلب ته جڏهن روشني انهن جي اکين تي
پوندي آهي ۽ هو اوندهه ۾ هوندا آهن ته انهن
جون اکيون ڀرندڙ محسوس ٿينديون آهن؛ سچ ۽ سچ
انهن جانورن جون اکيون ڀرڻ ڪونه. انهن جي
اکين ۾ هڪڙي خاص قسم جو مادو يا مواد ٿئي،
جنهن سان روشني لڳي موت کائيندي آهي
(روشني جي ترورن جي موت)، ته اسان ڪي
اهي ڀرندڙ لڳنديون آهن. اهڙيون اکيون هنن
جانورن کي رات جي وقت ۾ يا اوندهه ۾ ڪنهن
حد تائين ڏسڻ ۾ مدد ڪن ٿيون.

هنن جانورن مان ڪن جون اکيون اهڙيءَ
روشنيءَ ۾ ڳاڙهيون، ته ڪن جون اڇيون لڳنديون
آهن؛ جنهن جو واحد سبب اک ۾ رت جي نسن
جو گهٽ وڌ هجڻ آهي. جنهن جانور جي اکين
۾ رت جون نسون وڌيڪ هونديون انهن جون
اکيون ڳاڙهيون ۽ ٻين جون اڇيون لڳنديون آهن.

باندڙ ۽ ڀولڙن جا وار

اوهان ڀولڙن ۽ باندڙن کي چڙيا گهرن ۾
جئونئن وغيره ڪڍندي ڏٺو هوندو، جيڪي هو
پنهنجي ۽ ٻين جي بت مان چونڊي کائيندا آهن.
اسان سڀ ائين سمجهندا آهيون ته هو اهو ڪم
رڳو جونءَ ۽ ليڪڪن کان پاڻ بچائڻ لاءِ ڪندا آهن،
پر حقيقت ۾ ائين نه آهي. هو اصل ۾ پنهنجي
بت مان لهندڙ چمڙيءَ جي ننڍڙين ٽڪرين ۽ انهن
سان لڳل سندن بت مان خارج ٿيندڙ لٺ جي

ڳولها ڪندا ۽ کائيندا آهن جيڪو سندن وڻندڙ
کاج هوندو آهي. مشاهدن دوران اهو ثابت
ڪيو ويو آهي ته ڪين جوئن ۽ ليڪن کان ايترو
خوف ۽ خطرو ڪونه ٿئي، پر جي اهي ڪين
ملي به وينديون آهن ته کائي کپائي ڇڏيندا آهن.

واڳون پکي

آفريڪا ۾ هڪڙي پکي کي واڳون پکي
سڏيو ويندو آهي؛ انهي جي ڪري نه ته هو
واڳون جهڙو هوندو آهي، پر انهيءَ ڪري ته هو
واڳون سان لهه- وچڙ ۾ گهڻو رهي ٿو ۽ انهيءَ
جي ئي وات مان پنهنجو ڪاڌو ڪڍي کائيندو
آهي. واڳون جڏهن پاڻي مان ٻاهر ٽڙڪي تي
ايندو آهي تڏهن اڪثر ڪري وات پٽي ۽
اکيون بند ڪري، سمهيو پيو هوندو آهي؛ انهي
وقت هي پکي سندس وات ۾ گهڙي ڏندن جي
وٿين مان ڪاڌو ۽ چورون پٽي کائيندو آهي،
جيڪي تراڪڙي پاڻي مان واڳون جي وات ۾
گهڙي چهتي پيون هونديون آهن. انهيءَ نموني
هي پکي هڪ پاسي کان واڳون جي وات مان
چورن جهڙين ڪننن بلائن جو خاتمو ڪندو
آهي ته ٻئي پاسي پنهنجو پٽ قوت.

انهي ڏي وٺ ۽ ايتري مهرباني کانپوءِ به
هي پکي واڳون تي اعتماد ڪونه ڪري ۽ جيئن
ٿئي پنهنجو ڪاڌو پورو ڪري ته هڪدم واڳون
جي وات مان اڏامي پري ٿئي.

اٺ پکي ۽ سندس منڍي.

اٺ پکيءَ لاءِ اها ڳالهه عام چئي ويندي آهي
ته شڪاري جڏهن کيس پڪڙڻ جي ڪوشش
ڪندا آهن ته هو پاڻ بچائڻ لاءِ منڍي واري ۾

(بقايا — " آس ")

ڪلوريلا (Chlorella) اڀاڻن جي زبردست ڪوشش ڪئي پئي وڃي. اهي ٻوٽا کاڌي لاءِ غير نامياتي مادا، جهڙوڪ ڌاتوئي لوڻ، فاسفيٽ، ڪاربن ڊاءِ آڪسائيڊ، امونيا وغيره، گهرندا آهن. انهن ٻوٽن کي هٿرادو روشنن تي گهر اندر اڀائي، ۱۵-۲۵ سيڪڙو ڪارڪردگي حاصل ڪئي ويئي آهي. ان جي ابتڙ، جيڪڏهن انهن کي گهر کان ٻاهر قدرتي روشنيءَ تي تاتيو ويندو ته ٻن کان ڏهه سيڪڙو ڪارڪردگي ملندي. هاڻ اهڙا بيگهرڙيا (Cell-free) عرق تيار ڪرڻ ممڪن ٿي پيو آهي، جيڪي فوٽو سنٿيسز جو عمل ڪندي پاڻيءَ جا جزا جدا ڪن. ان جي نتيجي ۾ هائيڊروجن گئس پيدا ٿيندي، جنهن کان ٻارڻ جو ڪم وٺي سگهيو. اڄڪلهه وڏي سرگرميءَ سان اها ڪوجنا پئي ڪئي وڃي ته اينزائمس (enzymes) کي ڪم آڻي آس-سيل تيار ڪجن.

سجاري سگهه کان سواءِ، جن ٻين طريقن تي تحقيقات ڪئي پئي وڃي، سي هي آهن:

- (۱) ڪوئلي کي گئس يا پاڻيائي ٻارڻ ۾ مٽائڻ،
- (۲) بريدڊر قسم جا ائتمي ڪارخانا (reactor) تيار ڪرڻ، ۽

(۳) فيوزن ري ايڪٽر ٺاهڻ، جيڪي سامونڊي پاڻيءَ ۾ موجود ڊيوٽيريم مان بجلي پيدا ڪن.

سو انسان سگهه جي وڌيڪ ۽ نون وسيلن جي ڳولا ۾ هر گهٽ گهمي رهيو آهي. سڄيءَ دنيا ۾ ان مقصد لاءِ ڏينهنون ڏينهن وڌيڪ رقمون خرچ ڪيون پيون وڃن.

وجهي ماڻ ڪري بيهي رهندو آهي ۽ ائين سمجهندو آهي ته جيئن آءٌ ٻين کي ٿڌو ڏسان تيئن ٻيا به مون کي نه ڏسندا هوندا، ۽ پوءِ شڪاري يا ته اچي ڪيس پڪڙيندا آهن يا سندس ٻچ پٽيندا آهن.


مشاهدن مان ثابت ٿيو آهي ته مٿين ڳالهه غلط آهي. ان پکي منڍي هئي ماڻ ڪري ويهي نه رهندو آهي، پر پاڻ بچائڻ لاءِ زمين تي سڌو ويهي ڳچي زمين جي سنوت ۾ ڪري چڏيندو آهي، ۽ اهڙي نموني سان پنهنجو بچاءُ ڪندو آهي.

ان پکي جو کاڌو

ان پکيءَ لاءِ مشهور آهي ته کيس جيڪا به شئي ڏجي ته کائي ڪپائي ڇڏيندو، پوءِ چاهي اهو کلي پٿر جو ٽڪر ئي ڇو نه هجي يا ڪا ٻي غير هضم شي؛ کيس ايترو عقل ئي ڪونهي جو ڏسي ته اها شي سندس لاءِ نقصانڪار نه ٿيندي.

ڇيو وڃي ٿو ته ان پکي ڏاڍو حرفتي ۽ حرڪتي ٿئي ٿو ۽ گهڻي ڀاڱي ماڻهن جي سنڌ ۾ رهندو آهي؛ انهيءَ جي موت ۾ ماڻهو کيس جيڪا به شيءِ جهڙوڪ ميسوا ۽ انسڪريم وغيره ڏيندا آهن ته جلد کائي ويندو آهي؛ پر حقيقت ۾ ائين ڪونهي. ڇڙيا گهرن ۾ پاليل ان پکي واقعي اهڙيون شيون کائي ويندا آهن جو کين اتي ايترو کاڌو ڪوئو ملي جيترو آزاد هوندي کائيندا آهن، پر ائين ڪرڻ سان ڪيترن ئي ان پکين جو موت پڻ ٿيو آهي؛ سو اها ڳالهه غلط آهي ته هو هر هڪ شيءِ ڳڙڪائي ويندو آهي. ائين رڳو پاليل ان پکي ڪن ٿا. جي ائين هجي ها ته هيءَ پکي گهڻي ڀاڱي ناس ٿي وڃن ها.

رت جي گهٽتائي وارو مرض



هي مضمون ۸ سال اڳ ”پاڪستان جي سائنسي ۽ صنعتي تحقيقات واري مجلس“ جي ۳۰ ماھي رسالي ۾ ڇپيو هو. مضمون جي اھميت جي اعتبار کان ان جو ترجمو پڙھندڙن جي خدمت ۾ پيش ڪجي ٿو. (ع - ع)

پاڪستان، هندستان ۽ آفريڪا جي مختلف ملڪن جي رھاڪو گھڻن ئي ماڻھن جي رت ۾ عام طور تي مختلف خرايونون ٿين ٿيون. اھي اصل ۾ رت جون خرايونون ئي ھونديون آھن جيڪي ھڪ نسل کان ٻئي نسل تائين ورثي طور منتقل ٿين ٿيون. برطانيه جي طبي محققن ان ڏس ۾ تحقيقات ڪئي آھي ۽ ڪجهه حقيقتون معلوم ڪيون آھن. رت جي ڳاڙھي ھٿن جو سبب ھي ڇو ٿو وڃي تہ ان جو اٽڪل اڌ مقدار انھن جرن (Cells) مان ٺھي ٿو جن ۾ رت جو رنگين مادو ٿئي ٿو. اھو ڳاڙھو رنگ اصل ۾ ھڪ اھڙي لحمه يعني پروٽين جو آھي جنھن ۾ لوھ بہ شامل ھوندو آھي. رت جا اھي جزا ھوا مان آڪسيجن حاصل ڪري ان کي جسم ۾ پھچائين ٿا جتي ڪاڏي کي توانائي ۾ بدلائڻ جو عمل جاري رھي ٿو، ۽ اھڙي ريت انساني جسم توانائي حاصل ڪندو رھندو آھي؛ ۽ قائم رھي ٿو. تنھن ڪري سٺي صحت جو دارو مدار ھن ڳالھ تي مڃيو وڃي ٿو تہ رت جا اھي جزا پنھنجو ڪم ڪيتري ھدائين صحيح طور تي انجام ڏيئي رھيا آھن؛ پر جيڪڏھن بدن ۾ انھن جرن جي گھٽتائي ٿي وڃي ۽ ھي عمل ھڪ ڊگھي مدت تائين جاري

رھي تہ انسان جي جسم ۾ رت گھٽجي وڃي. رت جي گھٽتائي واري شڪايت معمولي بہ ٿي سگھي

مئي ۽ جون ۱۹۷۶ع

ٿي ۽ تمام زوردار پڻ. انهيءَ قسم جي ڪن بيمارين جو علاج ته آسانيءَ سان ٿي سگهندو آهي، پر ڪيترين ئي ٻين بيمارين جو علاج گهڻو ڏکيو ٿئي ٿو.

موروثي بيماريون

رت جي گهٽتائي جون ورثي ۾ ملندڙ بيماريون اهي هونديون آهن جيڪي هڪ نسل کان ٻئي نسل ڪي منتقل ٿين ٿيون. هي بيماريون جينس (genes) جي ذريعي منتقل ٿين ٿيون. اهي جينس دراصل خانداني خصوصيت تي ٻڌل هوندا آهن. هر خانداني خصوصيت لاءِ گهٽ ۾ گهٽ جين جو هڪ اهڙو ”جوڙو“ هجڻ ضروري ٿئي ٿو جيڪو ماءُ ۽ پيءُ ٻنهي جي نمائندگي ڪندو هجي. جيڪڏهن ماءُ ۽ پيءُ ٻنهي مان ڪوبه پنهنجي اولاد ۾ رت جي جـزن جي لاءِ غير معتدل جينس (Genes) منتقل نٿو ڪري ته ٻار جي رت جا جزا معمول مطابق رهن ٿا، پر جيڪڏهن ماءُ ۽ پيءُ مان ڪو هڪ به غير معتدل جينس ٻار ۾ منتقل ڪري ٿو ته پوءِ ان ٻار ۾ رت جا معتدل ۽ غير معتدل جزا هوندا جن کي توهان ماءُ ۽ پيءُ جي خاصيتن وارا جينس چئي سگهو ٿا، پر جي ماءُ ۽ پيءُ ٻئي پنهنجي ٻار ۾ غير معتدل جينس منتقل ڪن ته پوءِ ٻار جي رت جا سڀئي جزا غير معتدل هوندا. هيءَ آخري صورت خطرناڪ نتيجا پڻ پيدا ڪندي آهي، پر خوشقسمتي سان هيءَ صورت ٿوري پيدا ٿيندي آهي. ٻار جي رت جا سڀ جزا غير معتدل هجڻ واري صورتحال فقط تڏهن پيدا ٿيندي آهي. جڏهن ماءُ ۽ پيءُ ٻنهي جي رت جا جزا غير معتدل هجن، ٻي حالت ۾ ائين نه ٿيندو آهي ۽ اهو به چئن ٻارن مان فقط هڪ ئي ٻار ۾ غير

معتدل جزا منتقل ٿيندا. هن قسم جي خصوصيت کي عام طور تي ”Sicklecell“ خصوصيت سڏيو وڃي ٿو، ڇو ته جڏهن ٻار هن جـزن مان آڪسيجن نڪري وڃي ٿي ته هي جزا ذاتي جهڙي عجيب و غريب شڪل اختيار ڪري وٺندا آهن. ماءُ ۽ پيءُ ٻنهي جون خاصيتون ٻار ۾ منتقل ٿيڻ جي ڪري جـزن ۾ ذاتي جي شڪل پيدا ٿي رت جي گهٽتائي ٿيو وڃي، ۽ اها صورت جسم ۾ ان وقت پاڻ پيدا ٿي ويندي آهي جڏهن ڪنهن عنصر ۾ آڪسيجن جي گهٽتائي ٿي پوي. اهڙي حالت ۾ ذاتي جي شڪل وارا جزا رت جي گردش ۾ خرابي پيدا ڪري وجهندا آهن جنهن جي نتيجي ۾ رت جي شرنارين ۽ هڏين کي نقصان پهچڻ جو انديشو پيدا ٿي پوندو آهي.

غير معتدل رت جي جـزن جا ٽيهر، قسم آهن ۽ انهن مان فقط ٿورا اهڙا آهن جيڪي مٿين حالت کي ٺٽا پهچڻ ۽ پنهنجي اصلي حيثيت برقرار رکڻ ٿا.

آفريڪا ۾ گهڻا هنڌ اهڙا آهن جتي جي آبادي ۾ ڏهن مان هڪ ماڻهو اها خاصيت رکي ٿو. اڀرندي آفريقي قبيلن ۾ ته ان جو تعداد اڃان به وڌيڪ آهي يعني هر ڏهن ماڻهن مان چار ماڻهو رت جي انهيءَ خرابي ۾ ورتل آهن. ان کانسواءِ هڪ ٻي پڻ غير معتدل خاصيت آهي جنهن کي سولائي لاءِ ”HB - C“ سڏيو وڃي ٿو، اها خاصيت الهندي آفريقا جي ڪن علائقن ۾ هر ڏهن مان ٽن ماڻهن ۾ ملي ٿي.

علاج:

جيئن ته هي صورت حال موروثي ٿئي ٿي تنهن ڪري ڪنهن ٻئي ملڪ ۾ منتقل ٿي وڃڻ مٿي ۽ جون ۱۹۷۶ع

جن عورتن ۾ ڏاڻي جي شڪل وارا جزا موجود هوندا آهن انهن کي پيا خطرا به پيدا ٿي پوندا آهن. زچگي وقت گهڻو رت ضايع ٿيڻ جو خطرو هوندو آهي ۽ جيڪڏهن زچگي وقت سن ڪري ڇڏڻ واريون دوائون استعمال ڪيون وڃن ته اوچتو ڪو ٻيو حادثو پيدا ٿي پوندو آهي، ڇو ته انهن دوائن جي استعمال وقت آڪسيجن جي فراهمي گهٽجي ويندي آهي.

هي موروثي بيماريون جيتوڻيڪ نقصانڪار ۽ خطرناڪ آهن، تنهن هوندي به انهن مان هڪ فائدو هي آهي ته ڏاڻي جهڙن رت جي جزن وارو موروثي مريض مليريا کان محفوظ رهي ٿو. مليريا جيتوڻيڪ عام هر گرم ملڪن ۾ هڪ خطرناڪ بيماري آهي. اها ڳالهه يقيني آهي ته رت جي گهٽتائي وارا مريض مليريا کان بچيل رهندا آهن، پر اها ڳالهه اڃان تائين معلوم نه ٿي سگهي آهي ته مليريا جا مچر اهڙن مريضن کي عام ماڻهن جي مقابلي ۾ گهٽ نقصان ڇو ٿا پهچائين؟ بهرحال مائٽسي تحقيقات جاري آهي ۽ اهو ڏينهن پري ناهي جڏهن هن بيماري تي پڻ مڪمل ضابطو ٿي ويندو.

”سائڊس“ جو سول ايجنٽ

ماهوار ”سائڊس“ جي سول ايجنسي

محمد عبدالڪريم نيوز ايجنٽ کي ڏنل آهي.

ايجنٽ حضرات پنهنجا آرڊر بوڪ

ڪرائڻ لاءِ سڌي ريت هيٺين ايڊريس تي

سائڊس لهر وڇڙ ۾ اچن.

محمد عبدالڪريم نيوز ايجنٽ

”محمدي منزل“ ۾، گهٽي، پڪو قلعو،

حيدرآباد سنڌ.


جي باوجود به هي خاصيتون انهن ماڻهن ۾ موجود رهن ٿيون. مثال طور ڏاڻي جي شڪل وارن رت جي جزن جون موروثي خاصيتون آمريڪا ۽ ويسٽ انڊيز ۾ رهندڙ آفريڪي نسل وارن ماڻهن ۾ ڏهه سيڪڙو لين ٿيون ۽ جيئن ته هيءَ خاصيتون موروثي ٿين ٿيون تنهن ڪري علاج جي وسيلي انهن کي روڪي نٿو سگهجي. تنهن هوندي به هاڻي ڊاڪٽر مريض ۾ رت جي گهٽتائي جو اصل سبب معلوم ڪري سگهن ٿا ۽ جيترو به ٿي سگهي ٿو ان جو علاج پڻ ڪن ٿا.

رت جي گهٽتائي واريون هي بيماريون جيڪي ماءُ ۽ پيءُ ٻنهي وٽان منتقل ٿين ٿيون، نهايت ڏکئي نموني جون ٿين ٿيون.

معمولي خاصيتون رکڻ وارن ماڻهن ۾ هيءَ بيماريون گهڻو تيز ۽ مايوس ڪندڙ ٿيون ٿين. البت جيڪڏهن ڪو ماڻهو غير معمولي جسماني محنت ڪندڙ هجي ته اهڙي حالت ۾ هي بيماريون تڪليف جو سبب بنجي سگهن ٿيون. هي صورت حال عورت جي ٻار ڄڻ واري حالت ۾ خاص طور تي پيدا ٿئي ٿي. رت جي گهٽتائي جو موروثي مرض زچگي ۾ رت جي گهٽتائي جي عام سببن، مثلاً، لوهه جي جزن جي گهٽتائي جي حالت ۾ پيچيدگي پيدا ڪري وجهندو آهي. لنڊن جي هڪ اسپتال ۾ هڪ جائزو ورتو ويو آهي جنهن ۾ اهڙين ۳۰۰ حامله عورتن جو ڊگهي عرصي تائين لوهه جي جزا شامل ڪيل دوائن سان علاج ڪيو ويو، جن ۾ رت جي گهٽتائي هئي، پر انهن ۾ رت جي جزن جي عام سطح قائم نه ٿي سگهي. ڏاڻي جي شڪل جي جزن وارن مريضن جي مقابلي ۾ HB-C جي مريض عورتن تي انهن دوائن جو اثر ڪيو.

مائٽس

انساني زندگيءَ ۾ مڇيءَ جي اهميت



شڪار جي قديم ترين شڪل آهي. ”مسٽر مارائس“ جو خيال آهي ته پوک جو ڌنڌو اختيار ڪرڻ کان اڳ انسان شڪار ڪرڻ تي گذران ڪندو هو. ان ڪري دنيا ۾ مڇي مارڻ جي صنعت ٻين سڀني صنعتن کان جهوني صنعت ليکي وڃي ٿي. سامونڊي مڇيءَ ۽ قومن جي زندگيءَ تي ڪيتري قدر اثر ڪيو آهي، ان جو هڪ دلچسپ مثال هيءُ آهي ته فرانسيسي مهاڻا ”ڪاڊ“ مڇيءَ جي شڪار جي شوق ۾ ائٽلانٽڪ سمنڊ ۾ اڳتي وڌندا ويا ۽ انهن جي انهيءَ شوق سبب ئي هڪ ڏينهن ڪئناڊا دريافت ٿي ويو.

براعظم ايشيا جي ڪيترن ئي علائقن ۾ ۽ گهڻو ڪري چين ۽ فلپائن جي ٻيٽن ۾ شارڪ مڇيءَ جي پکن جي تجارت ڪئي ويندي آهي. پکن کي مڇيءَ جي جسم کان ڌار ڪرڻ کان پوءِ چن يا لوڻ لڳائي اس ۾ خشڪ ڪيو ويندو آهي، پوءِ انهن پکن مان ٻيڻ لاءِ سوپ تيار ڪيو ويندو آهي. اهڙي نموني چپاني باسندا شارڪ مڇيءَ جي گوشت مان هڪ ٻيو لذت ڪاڌو تيار ڪندا آهن جيڪو اتي ”شارڪ فليش پيسٽ“ جي نالي سان مشهور آهي.

دنيا جي ڪن ملڪن ۾ گهڻو ڪري خط استوا جي ڀر وارن ملڪن ۾ تازي پاڻيءَ جي مڇين کي انساني خوراڪ طور استعمال ڪرڻ جي ڏاڍي اهميت آهي، پر حقيقت ۾ ڏنو وڃي ته اهي سامونڊي مڇيون ئي آهن جيڪي غذائي اعتبار کان گهڻي مقدار ۾ موجود آهن ۽ جن جي ڪري خوراڪ ۾ هر ماڻهوءَ جو حصو وڌي ويندو آهي. برطانيه، روس، ڪئناڊا، آمريڪا ۽ جاپان ۾ مڇيءَ جي ماليات پيداوار مڇي دنيا جي جملي پيداوار جو ۷۰ سيڪڙو آهي.

مڇيءَ ۾ ۶۰ سيڪڙي کان ۸۰ سيڪڙو پاڻي، اٽڪل ۱۲ کان ۲۰ سيڪڙو لمحيات ۽ ڪي سٺپ به موجود هوندا آهن. ان کان سواءِ ان ۾ گهڻيون ئي ٻيون حياتين به هونديون آهن جيڪي انساني جسم لاءِ تمام فائديمند آهن. مڇيءَ ۾ لمحيات تمام سٺا هوندا آهن ۽ انهن جو ۹۴۲ سيڪڙو انساني جسم ۾ هضم ٿي وڃي ٿو. مڇيءَ جي چرٻيءَ جو ۹۵۲ سيڪڙو انساني جسم ۾ هضم ٿي جذب ٿي وڃي ٿو.

سمجهيو وڃي ٿو ته مڇيءَ جو شڪار،

هوندو آهي. مڇيءَ جي گوشت کي ڪڪڙين ۽ بدن کي ڪارائڻ سان هو وڏا آنا لاهڻ شروع ڪنديون آهن ۽ انهن جو وزن به وڌي ويندو آهي.

هڇيءَ مان ڪنٺور:

مڇيءَ جي هڏين، ڏندن ۽ استعمال ۾ نه ايندڙ حصن مان هڪ سٺي قسم جو ڪنٺور ٺاهيو ويندو آهي. هي ڪنٺور گهڻو ڪري ڪاڊ، پوليڪ هيڊيڪ ۽ هيڪ مڇين مان حاصل ڪيو ويندو آهي. آيسن ۽ جلد سازن جي خاص ڪمن کان سواءِ فلم سازيءَ جي صنعت ۾ هن ڪنٺور جي خاص اهميت آهي.

آئسن گلاس:

هي هڪ خالص ليس دار مادو آهي. هي مادو مڇيءَ جي ڪلبن (Swim - Bladder) مان حاصل ڪيو ويندو آهي. آئسن گلاس کي گهڻو ڪري شراب ۽ ٻيٽر صاف ڪرڻ ۽ جملي تيار ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي. ايشارڪ مڇيءَ جي ڪل کي ڪاٺ مان تيار ٿيل سامان جي صفائيءَ لاءِ استعمال ڪندا آهن. شارڪ مڇيءَ جي ڪل کي چڱيءَ طرح صاف ڪرڻ کان پوءِ ان مان شاگرين حاصل ڪيو ويندو آهي، جيڪو زيورن جون دٻيون ٺاهڻ جي ڪم ايندو آهي. فلپائن جي جزيرن ۾ گلوب مڇي ۽ پار ڪيو پائن مڇيءَ جي ڪل مان ٽوپيون ٺاهيون وينديون آهن. جاپاني باشندو هاڻ به پهر نالي مڇيءَ جي ڪل مان بتيءَ جي لاپ جو ڪم وٺندا آهن. اهو ان ريت جو بتيون تيار ڪرڻ لاءِ مڇيءَ جي پٺ چيرڻ کان پوءِ ان کي ڏاڳي سان تنگي ان جي اندر ميڻ بتي رکي ڇڏيندا آهن، هيءَ مڇي صاف و شفاف شيشي وانگر هوندي آهي.

ميرنگ، سارڊين، سلمن، مين هيڊن ۽ ميڪرل نالي مڇين مان تيل کڍيو ويندو آهي. تيل کڍڻ جو جديد ۽ سولو طريقو هي آهي ته مڇي جي چيري کي هڪ اهڙي ٿانو ۾ وجهندا آهن، جنهن مان باقي ٻاهر نڪري نه سگهي. ان ٿانو کي چئن ڪلاڪن تائين ۱۰۰ ڊگرين سينٽي گريڊ تائين گرمي پهچائي ويندي آهي. اهڙي نموني جيڪو تيل جدا ٿيندو آهي، ان کي هڪ نليءَ رستي ٻاهر کڍيو ويندو آهي. اهو تيل صاف ۽ بي رنگ هوندو آهي. ڪاڊ ۽ اهڙي قسم جي ٻين مڇين ۾ تيل گهڻو ڪري چيري ۾ موجود هوندو آهي. خام شڪل ۾ هن تيل کي چمڙي جي ڪارخانن ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي. ”ڪيمو آئس“ چمڙي جي هڪ سٺي جنس آهي تنهن لاءِ هي تيل ڏاڍو ڪارائتو آهي، ۽ هن جي هڪ معمولي خوراڪ به انسان جي جسم ۾ حياتين جي کوٽ کي پورو ڪري ڇڏي ٿي. مڇيءَ جي چيري جو تيل پنهنجي حيرت انگيز طبعي خاصيتن جي ڪري گلي ۽ چاٽيءَ جي مرضن ۾ گهڻو استعمال ٿيندو آهي، ان کان سواءِ صابن ٺاهڻ جي صنعت ۾ به ڪم اچي ٿو.

زراعت جي ميدان ۾ به مڇيءَ جو پاڻ گهڻو ڪري سڀني پاڻن کان وڌيڪ فائديمند آهي. هن ۾ ڪيلشيم، فاسفورس ۽ نائيتروجن جي جزا گهڻي مقدار ۾ موجود آهن. اهي جزا زمين جي زرخيزيءَ کي وڌائڻ ۾ مدد ڏيندا آهن ۽ اهڙي نموني پنڊاوار ۾ به واڌ ايندي آهي.

هڇيءَ جو غذا طور استعمال:

مڇيءَ جي گوشت ۾ ۲۰ سيڪڙو لمحيات ۽ ۱۶-۲۵ سيڪڙي تائين ڪيلشيم ۽ فاسفيٽ موجود

هيٺ ڏنل چارٽ مان خبر پئجي سگهي ٿي
 ته مڇيءَ ۾ غذائيت ۽ ڪڪڙ ۽ ٻين جانورن جي
 گوشت کان ڪنهن به نموني گهٽ نه آهي.

گوشت جو قسم	پاڻي	لمحيات	چرپي
مالن مڇي	٦١٤م	١٤٤٥	١٨٤٨
سڪرل مڇي	٤٣٤م	١٨٤٤	٤٤١
ڳاڻو گوشت	٦١٤٣	١٩٤٥	١٩٤م
ٻاڪرو گوشت	٦٤٤م	١٥٤٨	١٢٤م
ڪڪڙ جو گوشت	٦٣٤٤	١٩٤٣	١٦٤٣

جيئن شروع ۾ بيان ڪيو ويو آهي ته مڇيءَ ۾ لمحيات، روغنيات، حياتين، ڪيلشيم ۽ فاسفورس گهڻي مقدار ۾ موجود هوندو آهي. اهڙين غذائن جو استعمال ڪرڻ، جن ۾ حياتين جي مناسب مقدار موجود هجي، تمام ضروري آهي. جسم ۾ حياتين جي گهٽتائيءَ ڪري ڪيترائي مرض پيدا ٿي پوندا آهن. جيئن ته حياتين (A) جي واپرائڻ سان بڪين ۾ پٿري پيدا ڪانه ٿيندي آهي ۽ ان جي ابتڙ ان جي گهٽتائيءَ ڪري اکين تي ڏند (انڌياري = Night-Blindness) جو مرض ٿي پوندو آهي. مڇيءَ ۾ حياتين A ڪافي مقدار موجود هوندو آهي، ان ڪري ان جي استعمال سان انهن مرضن جو ڊپ ڪونه ٿو رهجي.

دنيا جي چند دريائن جي ڊيگهه

دریا جو نالو	ملک جو نالو	میل
۱۔ سالوین	(برما)	۱۹۰۰
۲۔ پورس	(ڈکٹی آمریکا)	۱۸۵۰
۳۔ ڈینوب	(یورپ)	۱۷۲۵
۴۔ برہمپترا	(بنگلہ دیش)	۱۶۸۰
۵۔ نیلن	(کنڈا)	۱۶۶۰
۶۔ زیمبیزی	(آفریکا)	۱۶۰۰
۷۔ آمو	(ترکستان)	۱۵۰۰

”وچون“ يا ”پٽون“ (SCORPION)

جرمنيءَ جي ڏاکڻين حصي ۾ به پکڙيل آهي. ان کان سواءِ آمريڪا ۾ به وچون ملن ٿا. وچونءَ جا ڪيترا قسم ڪن خاص علائقن ۾ پڻ ٿا. مثلاً: ”Isometrus Maculatus“ قسم دنيا جي سڀني گرم ملڪن ۾ لڌو ويندو آهي ۽ ”Scorpio Maurus“ اٽلاٽڪ کان وٺي هندوستان تائين لڌو ويندو آهي. ڪي وچون تمام مٿا هن هنڌن تي به ملن ٿا.

ورهاست

سڄي دنيا ۾ وچون جا پنج سئو کان به وڌيڪ قسم لڌا وڃن ٿا جنهن ڪري انهن جي قسمن کي سڃاڻڻ مشڪل ٿي پوندو آهي، ڇاڪاڻ ته انهن جون خاصيتون هڪٻئي سان گهڻو ڪونه ملنديون آهن. جديد ورهاست جي مطابق وچون کي بناوت جي خاصيتن جي بنياد تي ورهايو ويو آهي، مثلاً: ڇاتي جو ٽڪر، ٻانهن، ننهن ۽ ٽنگون، وچون کي ڇهن خاندانن ۾ ورهايو ويو آهي، جن مان ”Buthidae“ خاندان وڏي ۾ وڏو ۽ سڀ کان وڌيڪ اهم آهي. هن ۾ ۶۰۰ کان وڌيڪ ذاتين جا قسم (Species) آهن. اهو فرانس ۽ اتر آفريڪا ۾ پڻ ٿو. ”Diplocentridae“ ميڪسيڪو وغيره ۾؛ ”Scorpionidae“ آفريڪا، مڊگاسڪر، ايشيا ۽ آسٽريليا ۾؛ ۽ ”Vejovidae“ ايشيا ۽ آمريڪا ۾؛ ”Chactidae“ ايشيا، آمريڪا ۽ ڏکڻ يورپ ۾ ۽ ”Bothriuridae“ آسٽريليا ۾ ملندو آهي.

وچونءَ کي انسان قديم زماني کان سڃاڻيندو ۽ ان کان بچندو آيو آهي. هن کي هر ڪو انجي ڏنگڻ واري خاصيت جي ڪري سڃاڻي. ننڍو توڙي وڏو، سڀ ٻيا هن کان پاسو ڪندا ته متان ڏنگ نه هڻي.

اندازو لڳايو ويو آهي ته وچونءَ جو نسل دنيا ۾ ٽيهه يا چاليهه ڪروڙ سالن کان آهي، پر ان جي باوجود ان جي شڪل شبيهه ۾ چاليهه ڪروڙ سالن ۾ به ڪا خاص تبديلي ڪانه آئي آهي، جيتوڻيڪ قديم زماني جي مخلوق ۾ ڪافي تبديليون اينديون رهيون آهن ۽ ڪن جانورن جا ته نسل ئي نسل وڌيا. حيوانات جي ماهرن جو چوڻ آهي ته قدرت وچونءَ کي مڪمل شڪل ۾ پيدا ڪيو آهي، انڪري وچون بلڪل ساڳي حالت ۾ موجود آهي.

وچونءَ کي عام طور تي جيت ڪري سمجهيو ويندو آهي، پر هي جيت نه آهي، ڇاڪاڻ ته جيتن کي ڇهه ٽنگون هونديون آهن، جڏهن ته وچونءَ کي اٺ ٽنگون آهن. وچون حقيقت ۾ فائيلم آرٿروپوڊا جي ڪلاس (ايڊا) سان واسطو رکي ٿو.

لپڻ جو هنڌ:

جيتوڻيڪ وچون اڪثر ڪري گرم ملڪن ۾ پڻ ٿا، ته به اهي رڳو انهن جاين تائين محدود نه آهن. يورپ، يونان، اٽلي، اسپين ۽ بلڪنس ۾ هن جا ڪيترائي قسم پڻ ٿا، ۽ هڪ قسم

هنن ۾ ”ڪارو وڇون“ سڀ کان وڌيڪ زهريلو ۽ رنگ جو گهاٽو ڪارو هوندو آهي ان جي ڊيگهه ۶ کان ۸ انچن تائين ٿئي ٿي. عام وڇون وري ميثائين رنگ جو هوندو آهي، جو اسان وٽ سنڌ ۾ به ملندو آهي.

بناوت

وڇون جي ڊيگهه ۾ تمام گهڻو فرق آهي. ڪي قسم ۾ ۱۳ ملي ميٽر (اڌ انچ) ڊگها ته ڪي وري ۱۷۵ ملي ميٽر (۷ انچ) ڊگها آهن. وڇون جا قسم، جسم ۽ ڊيگهه جي لحاظ کان، هڪٻئي کان گهڻو مختلف هوندا آهن، پر هر هڪ وڇون ۾ هيٺيون بناوتون ضرور هونديون آهن.

وڇون جي منهن جي اڳيان ٻن مضبوط ۽ طاقتور ٻانهن جو جوڙو هوندو آهي، جن کي ”جهڻا پير“ يا ”پيڊي پلپس“ (pedipalps) ڪري چيو ويندو آهي. هنن کي مڇون ڪري سمجهيو ويندو آهي، پر اصل ۾ اهي ٻانهون اٿس. جيئن ته هنن کي هٿ ڪونه هوندا آهن، انڪري قدرت کيس انهن ٻانهن جي چيڙن تي ڪنڊن وانگر وريل تڪا نهن عطا ڪيا آهن. انهن کي هو سدائين مٿي ۽ نيزي وانگر سامهون جهليندو آهي. اهي نهن هو پڪڙيل شڪار جي جسم ۾ لنگهائي کيس ماريندو آهي.

وڇون جو جسم ٻن حصن ۾ ورهايل هوندو آهي هڪ کي ”پٺت جو اڳيون حصو“ pre-abdomen ۽ ٻئي کي ”پٺت جو پٺيون حصو“ (post-abdomen) ڪري چيو ويندو آهي. پٺت جو اڳيون حصو ان جي مٿي ۽ ان سان ڳنڍيل سڀني تي مشتمل هوندو آهي ۽ ان ۾ ڪل ست ”ڳريون“ يا ”ٽاڪون“ (Segments) هونديون آهن؛

مائٽس

اهو ان جو ٻچ هوندو آهي، جنهن جي آخري چيڙي تي زهريلن غدودن جو هڪ جوڙو هوندو آهي. انهن جي منهن تي هڪ سخت، مڙيل ۽ جهنڊار ڪنڊو هوندو آهي، جنهن کي ”ڏنگ“ چوندا آهن. ڏنگ جو موڙ ڪجهه اهڙي نموني هوندو آهي جو جيستائين وڇون پنهنجي پٺت جي پٺن حصي کي مٿي نه ڪري، ڏنگ ڪم نه ڪندو. ڏنگ هلڻ لاءِ وڇون پنهنجي پٺت جي پٺن حصي کي مٿي کڻي، اڳتي ڦٽو ڪندو آهي. ان جي ڏنگ ۾ هڪ سوراخ هوندو آهي جنهن جي ذريعي هو پنهنجي شڪار جي جسم ۾ زهر داخل ڪندو آهي.

وڇون جي معدي جي هيٺيان پيدائش جا ٻه عضوا هوندا آهن، جي وڇون کي ايتو ڪري ڏسي سگهجن ٿا. ان جي ڪلبن جي ڍڪڻ جي هيٺان هڪ ڦٽين جهڙو جوڙو هوندو آهي، جن کي ”ڦٽيون“ (pectines) ڪري چيو ويندو آهي. اهي شيون وڇون ڪانسواءِ ٻئي ڪنهن به جانور ۾ ڪين ڏٺيون ويون آهن. هر ”ڦٽي“ کي مشڪون ۽ تنن مليل هونديون آهن ۽ شايد انهن جو ڪم زميني تحرڪ کي معلوم ڪرڻ آهي. پٺت جي اڳين حصي ۾ ٻن کان وٺي پنجن تائين ۽ ڪن حالتن ۾ اٺن تائين اڪيون هونديون آهن. وڇون جو منهن معدي جي طرف اڳين ۽ پٺن ڇپن جي وچ ۾ آهي. کيس اٺ تنگيون ٿين جي ڊگهيون هونديون آهن. هلڻ جي وقت ٻچ مٿي ڪڍو ڪري هلندو آهي ۽ انهن تنگن جي مدد سان تيز ڊوڙي به سگهندو آهي.

وڇون کي ڪي ساهه کڻي ڪڍڻ جي لاءِ پٺت جي هر هڪ پاسي کان تنگن وٽ چار مٿي ۽ جون ۱۹۷۶ع

ننڊيون ڳوٺريون ٿينديون آهن ، جي کيس ڦڙن جو ڪم ڏينديون آهن . پيرن تي تمام سنها وار ٿيندا اٿس جي آواز جي معاملي ۾ بيحد حساس ٿيندا آهن . هن کي هڏا بلڪل ڪونه ٿين .

وچون فطري طور تي ڏاڍو شرميلو ، اڪيلائي پسند ، صالح پسند ۽ ”رات جو باسي“ Nocturnal آهي ، يعني رات جو گهمڻ جو هيراک آهي . ڏينهن جو سستي وٺي ويندي اٿس ۽ ان جي ڏسڻ جي قوت گهٽجي ويندي آهي . سڄ کان ائين پڄندو آهي جيئن ڪانءُ ٿهي ڪمان کان . شڪار جي ڳولا ۾ رات جو نڪرندو آهي ۽ ڏينهن جو بدبودار ۽ اونداھين جاين تي رهندو آهي . پاڻي ۽ پوسل واريون جايون ته وچونءَ جون دل گهريون جايون آهن . خشڪ موسم يا گرميءَ جي موسم ۾ زمين جي اندر سوراخ ڪري خاموش زندگي گذاريندو آهي ، ان ڪري ڏسڻ ۾ ڪونه ايندو آهي . جيئن ئي برسات جي مند شروع ٿيندي آهي ته زمين سطح تي ظاهر ٿيندو آهي ۽ پٿرن جي پاسن ۾ شڪار جي ڳولا ۾ ويهندو آهي . اڪثر ڪري چيٽن ، ڪاٺين ۽ ٻوٽن وغيره ۾ ملندو آهي .

کاڌو

ننڍڙا جيت جڻيا وچونءَ جي دلپسند خوراڪ آهن ، انڪري ننڍڻ ، ڪوليون ، تڏيون وغيره ڏاڍي مزي سان کائيندو آهي . وچونءَ جي ڪاٺن جي رفتار ڪولين وانگر سست هوندي آهي ۽ ننڍي جيت کي به ڪاٺن لاءِ هڪ ڪلاڪ کان وڌيڪ وقت وٺندو آهي . وچونءَ ۾ اهڙيون ته غدودي رسون ٿين ٿيون ، جي خلين ۾ ڪيميائي عمل پيدا ڪري انهن جي هضم ڪرڻ جي نظام کي درست حالت ۾ رکنديون آهن .

مانئس

وچون ڪيترا ڏينهن بنا ڪنهن کاڌي جي به رهي سگهي ٿو . هڪ اندازي جي مطابق وچون هڪ سال کان به وڌيڪ عرصي تائين بغير ڪنهن کاڌي جي جيئرو رهي سگهي ٿو . جيڪي وچون پوسل وارين جاين تي رهندا آهن ، انهن کي پاڻيءَ جي گهرج وڌيڪ هوندي آهي پر جهنگ ۾ لينڊڙ وچون پاڻيءَ کان سواءِ مهينن جا مهينا جيئرا رهي سگهن ٿا .

حيوانيات جي ماهر هينري فيبر وچونءَ جي رهڻي ڪهڻيءَ جو غور سان مطالعو ڪيو آهي . هن ڏٺو ته وچون آڪٽوبر کان وٺي مارچ تائين ڪجهه نه کاڌو ، ايتريقدر جو پنهنجي پسندوارن کاڌن جي ويجهو به ڪين ويا . مارچ جي وچ ڌاري وچون ۾ غذا جي ضرورت پيدا ٿي ۽ انهن جيت ڪاٺن شروع ڪيا ، پر اها ڳالهه اڃا حيوانيات جا ماهر پروڙي ڪين سگهيا آهن ته وچون بڪهڙ ٿال ڇو ڪندو آهي ۽ ان عرصي جي دوران هو کاڌو ڪٿان حاصل ڪندو آهي؟ خاص ڪري الجزائر جو وچون ته چوڏهن مهينن تائين بنا ڪنهن کاڌي جي جيئرو رهي سگهي ٿو .

وچون اڪثر ڪري کاڌي جي لاءِ جاڪوڙ ڪونه ڪري پر شڪار جي انتظار ۾ ڪنهن هڪ جاءِ تي ويهي رهندو آهي . جڏهن وچونءَ کي ڪو شڪار هٿ ايندو آهي ته ان کي ٻانهن ۾ قابو ڪري مارڻ شروع ڪندو آهي . ان کي پنهنجي سخت خول يا ڍڪ جي هيٺان ٻيو گيسائيندو ، ايستائين جو ويچاري جو ساھ نڪري ويندو . ان کان پوءِ وچون شڪار جي جسم ۾ زخم پيدا ڪندو آهي ۽ ڪيميائي عمل ڪرڻ وارن پروٽين کي ان جي اندر داخل ڪندو آهي ، جيڪي

مئي ۽ جون ۱۹۷۶ع

ان جي هاضمي جي نظام کي بگاڙڻ کان بچائيندا آهن. انهن پروٽين جي اثر هيٺ شڪار جو جسم پاڻيائت ۾ تبديل ٿي ويندو آهي. جنهن کان پوءِ وچون پنهنجي ڪاڪڙي سان هوا خارج ڪندو آهي، جا ان پاڻيائت کي خشڪ ۽ ٺوٺ بنائيندي آهي. تنهن بعد ئي وچون ان کي کائيندو آهي. دلچسپ ڳالهه اها ته وچون ڪاڪڙي کان نه رڳو پمپ (هوا خارج ڪرڻ) جو ڪم وٺندو آهي، پر ڇاڻي ۽ جو به. ان ڇاڻيءَ جي ذريعي شڪار جي هر ان حصي کي پٽ ۾ داخل ٿيڻ نه ڏيندو آهي، جو ان جي هاضمي جي سرشتي جي خرابيءَ جو باعث بنجي سگهي. وچون شڪار جو جسم هڏن کان سواءِ باقي سڄو چٽ ڪري ويندو آهي. غذا کي معدي ۾ داخل ٿيڻ کان پوءِ مختلف مرحلا طئي ڪرڻا پوندا آهن. سڀ کان پهريائين اها خوراڪ آندِي ۾ ويندي آهي. ان مرحلي تي وچونءَ جا غدود ۽ خليا، ان ۾ ڪيميائي عمل ڪرڻ وارا پروٽين شامل ڪري کاڌي کي هاضميدار بنائيندا آهن؛ باقي بچيل خوراڪ نيڪال جي سوراخ جي رستي (جيڪو ٻچ جي پڇڙيءَ تي ۽ ڏنگ کان ٿورو اڳتي هوندو آهي) نيڪال ٿي ويندي آهي.

وچون جي عام زندگي ڏاڍي سادي هوندي آهي. هڪٻئي تي ڪين پياڙين، نڪي ڪنهن جي ڪاڻ ڪين، هر وچون خود مختيار ۽ آزاد زندگي بسر ڪندو آهي ۽ ٻين سان ملڻ کان شرمائيندو ۽ لهرائيندو آهي. ڪڏهن ڪڏهن هڪٻئي جي منهن پون ته وڙهڻ شروع ڪن. جيڪو زور ٿئي، اهو ٻئي کي هڙپ ڪريو ڇڏي. وڏن پچرن ۾ گهڻا وچون رکي سگهجن ٿا،

پرائين جيئن هڪ وچون ٻئي جي حدن ۾ داخل اندازي نه ڪري. پر جي پچرو ننڍو هجي ته ان ۾ رڳو هڪ ئي رکي سگهجي ٿو، نه ته سڀئي پاڻ ۾ وڙهي پورا ٿيندا ۽ ”جيڪو ڏاڍو سو گابو“ جي مصداق اهو وڃي بچندو جو ڏاڍو هوندو.

وچون اڪثر ڪري آواز ڪن ڪن. پر ڪن وڏن قسمن مثلاً: *Palamnaeus Swammerdami* کي جهڙو خطرو محسوس ٿيندو آهي ته نونگي هڻڻ جهڙو آواز ڪندو آهي.

سڀني ارڙو ٻوڊا فائيلم جي جانورن وانگر وچون جي واڌ به ڪلن لاهڻ (Moulting) جي ذريعي ٿيندي آهي. ڪلن جو تعداد مختلف قسمن ۾ مختلف ٿيندو آهي، ايتريقدر جو ساڳين ذاتين جي قسمن ۾ به فرق آهي. مثلاً: *Palamnaeus Longimanus* کي انءَ *Androctonus Australis* کي ست ڪلون لاهيئون پونديون آهن. اهو عمل جسم جي سڀني حصن ۾ ٿيندو آهي. وچونءَ جي بالغ ٿيڻ تي ئي ان جي جنس سڃاڻي سگهبي آهي. وچونءَ جو ٻچ ڊگهو ۽ جسم سنهو سڀڪ ٿيندو آهي. ان جي ابتڙ ماديءَ وچونءَ جو ٻچ ننڍو ۽ جسم ڪجهه ٿلهو متارو ٿيندو آهي. وچونءَ جي عمر ٽي يا چار سال کن ٿيندي آهي.

پيدائش

پهريائين نر ماديءَ کي پاڻ ڏانهن متوجه ڪرڻ لاءِ ناچ ڪندو آهي. پوءِ نر زمين ۾ سوراخ ڪيندو آهي يا ڪنهن نڪتل سوراخ ۾ ٻئي گهڙي ويندا آهن، اتي هو ٻئي لڳ ڪندا آهن. نر ۾ پيدائشي عضوا عارضي ”خاص عضوو“ (Penis) ٺاهيندا آهن، جنهن جي ذريعي ماديءَ

وچون جو زهر :

جيئري وچونءَ کان ان جو زهر برقي تحريڪ جي ذريعي حاصل ڪري سگهجي ٿو. هيءُ زهر پاڻي يا گلسرين ۾ ڳري سگهي ٿو. ڏکڻ آفريڪا جي هڪ وچونءَ جي زهر ۾ % ۲۰ کان % ۲۵ تائين اهڙو مادو هوندو آهي، جو سڪائڻ تي نهرو بنجي پوندو آهي. اهو مادو پروٽين جهڙو هوندو آهي. ان جا اثر خشڪ علائقن ۾ گهڻي عرصي تائين باقي رهندا آهن، پر اڌ ڪلاڪ تائين ان کي گرم پاڻيءَ ۾ اپاريو وڃي ته ان جا سڀ زهريلا اثر ضايع ٿي ويندا. وچونءَ جي زهر جو مقدار ان جي قد ۽ بت تي آهي. اتر فرانس ۾ هڪ وچونءَ مان ۸ ملي گرام پاڻيائ زهر ڪڍيو ويو. فلسطين ۾ شام ۽ ڏکڻ آفريڪا جي وچونءَ جي خشڪ ڪيل زهر جو وزن ۶ ملي گرام هوندو آهي.

هر وچونءَ جي زهر جو اثر هڪٻئي کان مختلف ٿئي ٿو؛ پر گهٽ ۾ گهٽ وچونءَ جي زهر جا ٻه قسم ٿين ٿا، انهن مان هڪ ته عام آهي ۽ ماڻهوءَ لاءِ جو کائڻو ڪين آهي، ۽ اهو عام وچونءَ ۾ ٿئي ٿو. ٻئي جو اثر نانگ جهڙو ٿئي ٿو ۽ اهو ڪاري وچونءَ ۾ ٿئي ٿو. عام وچونءَ جو مثال "*Euscorpis Italicus*" آهي ۽ ڪاري وچونءَ جو مثال "*Centruroides Sculpturratus*" آهي. ڪن وچن جا زهريلا غدود گهڻيل ٿين ٿا. عام وچون جي ڏنگڻ جو اثر اهو ٿيندو آهي جو ڏنگيل جاءِ تي سخت سور ٿيندو آهي ۽ اهو هٿ سڄي پٿر ٿي پوندو آهي. ڪن حالتن ۾ ان جاءِ تي سوزش به ٿي پوندي آهي ۽ اها جاءِ بلڪل بي حس ٿي پوندي آهي. ڪن ماڻهن

۾ اسپرمس داخل ڪيا ويندا آهن. سيلاپ ڪمان بڪدم پوءِ مادي، نر وچونءَ تي حملو ڪندي آهي ۽ جي وچون ڀڄي نه وڃي ته ان کي هڙپ ڪري ويندي آهي.

سيلاپ ڪرڻ کان ڪجهه ڪلاڪ پوءِ ماديءَ جي ٻيٽ ۾ ننڍا ننڍا آنا پيدا ٿيڻ شروع ٿي ويندا آهن، جن مان هڪ هفتي کن ۾ ننڍڙا ٻچا پيدا ٿيندا آهن. هڪ اندازي مطابق انهن جو تعداد ۳۰ کان وٺي ۶۰ تائين هوندو آهي. انهن ننڍن ٻچن ۾ اهي سڀ خاصيتون هونديون آهن، جي وچونءَ جو ورثو آهن، پر قد بت ۾ پنهنجن والدين کان ننڍا هوندا آهن. ان مرحلي تي هنن جي ڪاڪڙي ۾ بيضي جي زرديءَ جهڙو چنڊڙندڙ مادو هوندو آهي، جنهنڪري هو کاڌو کائي نه سگهندا آهن ۽ نه ئي وري انهن کي کاڌي جي ضرورت محسوس ٿيندي آهي. پيدا ٿيڻ کان پوءِ سندن ماءُ انهن جو ڏاڍو خيال ڪندي آهي ۽ هڪ هفتي تائين انهن کي پنهنجي چيل ۾ تي کڻي گهمندي آهي. ان جي چيل ۾ ٽي هڪ ٽيلهي ٺهيل هوندي آهي، جنهن ۾ ٻچا پيا هوندا آهن ۽ هڪ هفتي تائين پنهنجي ڪاڪڙي ۾ ٺهيل مادي تي گذارو ڪندا آهن. ان عرصي جي دوران سندن ماءُ ڪجهه ڪارائيندي پياريندي اٿن. هڪ هفتي کان پوءِ پهريون ڪل لهڻ وارو عمل شروع ٿيندو آهي ۽ انهن جو جسم هڪ بالغ وچونءَ جهڙو نڪري ايندو آهي، ان کان پوءِ هو هميشه لاءِ ماءُ جي پٺيءَ تان هيٺ لهي ايندا آهن ۽ آزاد زندگيءَ جي شروعات ڪندا آهن. انهيءَ عرصي ۾ انهن جو ليسدار مادو ختم ٿي ويندو آهي ۽ هنن کي بک لڳندي آهي، جنهن لاءِ هو ڀڄ ڊڪ شروع ڪري ڏيندا آهن.

ڪلاڪن کان پوءِ ڇڏي ڇڏي ٿي وئي. تجربن مان اها ڳالهه ثابت ٿي آهي ته وچونءَ جي زهر سان انسان جي رت جون رڳون ڪمزور ٿي وينديون آهن ۽ آهستي آهستي اعصابي نظام ختم ٿي ويندو آهي. مشڪن جي ڇڪڻ جي ڪري رت جو دٻ وڌي ويندو آهي ۽ معدي ۾ نيري رنگ جو ليسدار مادو به پيدا ٿي پوندو آهي.

ڇيو ٿو وڃي ته وچونءَ جي چوڌاري باه جو ڇڪرو هجي يا کيس اس ۾ ڦٽو ڪيو وڃي ته پنهنجو پاڻ کي ڏنگي ماري ڇڏيندو آهي، پر اها ڳالهه صحيح نه آهي، مثالاً "palmanaecs Scaber" پنهنجي زهر جي ڪري ڪين مرندي آهي، وري "Androctonus Australis" کي جڏهن ان جي پنهنجي زهر مان انجيڪشن پري هڻي وڃي ته مري سگهي ٿو، پر ان جو مقدار گهڻو هئڻ ڪري. اهو مقدار ان کان به سٺو هوندو آهي، جيڪو هڪ سوئر کي مارڻ لاءِ ڪافي هوندو آهي.

علاج

وچون جي زهر جو بهترين علاج تماڪ جي ڦلهياري، پاڻياٺ حالت ۾ امونيا يا خشڪ حالت ۾ نوشادر، رجيل چرٻي، ليمي جو ست يا پوٽاشيم پرميگنيٽ آهي. انهن مان جيڪو به ملي، اهو لڳائجي. امونيا سنگهائڻ سان به ڪافي فائدو پهچندو آهي. برازيل، ميڪسيڪو، لنڊن ۽ الجيريا ۾ ته وچونءَ جي ڏنگ لاءِ خاص انجيڪشنون تيار ڪيون ويون آهن.

چون ٿا ته جنهن ماڻهو کي وچون گهڻا دفعا ڏيڳيندو آهي، اهو "پوائزن پروف" بنجي ويندو آهي، يعني ان تي وچون جي ڏنگ جو اثر ڪونه (بقايا ڏسو صفحو ۴۸)

۾ ته اهو وهڪرو ويٺل آهي ته ڏنگن کان پوءِ جيستائين وچون جيئرو رهندو، اهو سور وڌندو ويندو. اهو سور چوويهه ڪلاڪن تائين هوندو آهي، پر ان جاءِ جي سوڄ ۽ سوزش بن ڪلاڪن ۾ ختم ٿي ويندي آهي. هن ۾ ماڻهوءَ جي زندگيءَ کي ڪو به خطرو ڪونه هوندو آهي ۽ ان جو اثر ائين هوندو آهي، جن ڪنهن جيت ڇڪ پاتو هجي.

ڪاري وچونءَ جي زهر جو اثر بلڪل ڪاربرهه نانگ جهڙو هوندو آهي. ڏنگن جي ڪري سخت سور، سامه ڪڍڻ ۾ تڪليف، بي آرامي ۽ وات مان گگ وهندي آهي؛ دل جو ڌڙڪو وڌي ويندو آهي ۽ هٿن پيرن جا ننهن نيرا ٿي ويندا آهن، ۽ ماڻهو ۴۵ منٽن کان وٺي ۱۰ - ۱۲ ڪلاڪن جي اندر مري به سگهي ٿو. ڊراگو، ميڪسيڪو ۽ وچ آمريڪا ۾ ڪيترائي ماڻهو هن جي ڪري مري ويا آهن. ڪاري وچونءَ جي خشڪ ڪيل زهر جو ۱.۵ ملي گرام مقدار پاڻيءَ ۾ ڳاري، جي هڪ وچولي عمر جي ڪتي کي انجيڪشن لڳائي وڃي ته هو مري ويندو.

وچونءَ جي زهر جو اثر مختلف ملڪن جي مختلف جانورن ۾ مختلف نوعيت جو ٿيندو آهي؛ مثلاً: يورپ ۾ لينڊرڙ ڇاهي ۽ نانگ تي ان جو اثر ڪين ٿيندو آهي. اهڙيءَ طرح آفريڪا جي وڏن جانورن ۽ گيانا جي سوئرن تي ان جو اثر ايترو ڪين ٿيندو آهي، جيترو انسانن تي ٿيندو آهي؛ پر ڪتا، ڏيڏر، مڇيون، ٻڪري وغيره زهر جي ڪري جلدي مري ويندا آهن. ايريزونا ۾ هڪ وچونءَ کان هزار پيريءَ کي ڏنگايو ويو ته جلد ئي ان جا هٿ پير ٽڻا ٿي ويا، پر ڪجهه

سنڌالاجي طرفان لاٽبريرين ۽ ڪتب خانن لاءِ ڇپايل ڪتاب

رپيا

- ۳- علمي آئينو ۱۹۷۲ع سنڌي ۲۰۰۰
- ۴- ” ” ” ۱۹۷۳ع ۲۰۰۰
- ۵- ” ” ” ۱۹۷۴ع ۲۰۰۰
- سنڌي ادب جو معلوماتي مواد
- ۱- سنڌي ليکڪن جي دائريڪٽري ۶۰۰
- ۲- سنڌي ديني ادب جو ڪيٽلاگ ۵۰۰
- ۳- سنڌي ميخزنن جو ڪيٽلاگ ۶۰۰
- ۴- سنڌي ڪتابن جي بيبلوگرافي ۲۰۰۰
- ۵- سنڌز ڪنٽريميموشن ٽو انگلش ۱۰۰۰

ٽيڪنيڪل

- ۱- سنڌي شارٽ هئند ۱۵۰۰

سوشل سائنس

- ۱- بين الاقوامي اقتصاديات ۲۰۰۰
- ۲- سياست جا اصول ۲۰۰۰
- ۳- اقتصادي فڪر جي تاريخ ۲۰۰۰
- ۴- اڪانامي آف سنڌ ۱۰۰۰

تاريخ

- ۱- تاريخ تمدن سنڌ ۲۰۰۰
- ۲- هسٽري آف ارغون ايندڙ طرخان آف سنڌ ۲۵۰۰
- ۳- عرب ڪنگڊم آف المنصوره ۳۰۰۰
- ۴- داستان اندلس ۳۰۰۰

سائنس

- ۱- جيو هيڊرالاجي آف رور انڊس ۳۰۰۰
- ۲- غرت الزيجات (البيروني) ۷۵۰۰

ڊڪشنريون

- ۱- سنڌي-اردو لغت ۲۰۰۰
- پڪو جلد
- ۲- اردو-سنڌي لغت ۱۵۰۰
- سول ايڇنٽ :-

هيشرز: ادبيات تلڪ ڇاڙهي

اسپتال روڊ حيدرآباد سنڌ

ادب

رپيا


- ۱- شاه جو رسالو پڪو جلد ۲۰۰۰
- شاه جو رسالو ڪچو جلد ۱۵۰۰
- ۲- منتخب ديوان فاضل ۱۰۰۰
- ۳- سنڌي غزل جي ارتقا ۲۰۰۰
- ۴- سنڌي افسانو ۲۰۰۰
- ۵- شاه لطف الله قادريءَ جو رسالو ۱۰۰۰
- ۶- ياد گيريون ۳۰۰۰
- ۷- سنڌيون ۳۰۰۰
- ۸- سنڌي مرثيه نويسي ۳۰۰۰
- ۹- تمر فقير جو ڪلام ۳۰۰۰
- ۱۰- سنڌي لوڪ ادب جي ارتقائي تاريخ ۳۰۰۰
- ۱۱- دائري وارن جي سنڌي ۲۰۰۰
- ۱۲- شاه شريف پاڏائيءَ جو ڪلام ۱۵۰۰
- ۱۳- جهانپان خاندان ۱۵۰۰
- ۱۴- چونڊ سنڌي افسانا ۱۰۰۰
- ۱۵- غزلن جو غنچو (ختم ٿي ويل) ۳۰۰۰
- ۱۶- مثنوي بو علي قلندر ۵۰۰۰
- ۱۷- ٻاراڻا ٻول ۱۰۰۰

مذهبي


- ۱- شاه ولي الله جي تعليم پڪو جلد ۱۵۰۰
- ” ” ” ڪچو جلد ۱۲۰۰
- (ٻئي ختم ٿي ويل)

جرنلس ۽ مخزنون

- ۱- جرنلس آف دي انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي Vol. I انگريزي ۴۰۰
- ۲- بليٽن آف دي انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي Vol. II, III, IV انگريزي ۳۰۰



برقی چکر Electrical circuits



(شکل نمبر-۱)

اسانجي روزاني زندگيءَ ۾ عام استعمال ٿيندڙ بجليءَ تي هلندڙ اوزارن، جهڙوڪ، ريڊيو، ٽي-وي، اسٽري، پکو، فرج ۽ ٻيا وغيره ۾ مختلف قسمن جا برقي چکر (Electrical circuits) ٿين ٿا. ساڳيءَ طرح گهرن، ڪارخانن، دڪانن، هوٽلن يا سينيمائڻ ۾ بجليءَ کي مختلف ضرورتن آهر ڪم آڻڻ لاءِ ٻن مختلف قسمن جا برقي چکر استعمال ڪيا وڃن ٿا. هتي مختلف قسم جي چکر کي شڪلين وسيلي بيان ڪجي ٿو.


۱- کليل چکر (Open circuit)

شکل نمبر ۱ ۾ ٽارچ جي هڪ ننڍڙي

کي ڳنڍڻ سان چڪر ۾ بجلي جو ڪرنٽ وري وهڻ لڳندو. اهڙي چڪر کي بند چڪر (Closed circuit) چئبو آهي.

ياد رکڻ گهرجي ته فقط بند چڪر ۾ ئي ڪرنٽ وهندو ۽ بلب ڀرندو، جيڪڏهن چڪر کليل هوندو ته ڪرنٽ نه وهندو جنهنڪري بلب نه ڀرندو. گهرن ۾ جڏهن بٽن کي هيٺ (on) ڪبو آهي ته بند چڪر ٿي پوندو آهي ۽ بلب ڀرڻ لڳندو آهي، (جيئن شڪل نمبر ۱ ۾ آهي)

۳- شارٽ چڪر (Short circuit)



(شڪل نمبر ۳)


بلب کي سيل جي واڌو ۽ ڪاٺو ڇيڙي سان ملائيندڙ تارن کي هڪ ٻي تار AB وسيلي پاڻ ۾ ڳنڍيو وڃي ٿو. ڏسنداسين ته بلب نه ڀرندو (جيئن شڪل ۳ ۾ ڏيکاريل آهي) ڇو ته اسان کي خبر آهي ته ڪرنٽ هميشه اهڙي

مئي ۶ جون ۱۹۷۶ع

هڪ سيل ذريعي ٻاريو ويو آهي. بلب کي ٻارڻ لاءِ سيل بجليءَ جو ڪرنٽ مهيا ڪري ٿو جيڪو سيل جي واڌو (+) ڇيڙي کان تار وسيلي، بلب مان لنگهي سيل جي ڪاٺو (-) ڇيڙي ۾ داخل ٿئي ٿو ۽ بلب ڀري پوي ٿو.

هاڻي جيڪڏهن تار کي ڪنهن جاءِ تان ڪٽي ڇڏجي (جيئن شڪل ۲ ۾ ڏيکاريل آهي)، ته بجليءَ جي ڪرنٽ جي وهڪري بند ٿي ويندي ۽ بلب وسامي ويندو. اهڙي سرڪٽ کي جنهن ۾ بجليءَ جي ڪرنٽ جي وهڪري مڪمل نه هجي تنهن کي کليل چڪر (Open circuit) چئبو آهي. گهرن ۾ بٽن کي مٿي (Off) ڪرڻ سان کليل چڪر پيدا ٿئي ٿو جنهن ڪري بلب يا پکو وغيره بند ٿي وڃي ٿو.


۲- بند چڪر (Closed circuit)



شڪل نمبر ۲- ۾ ڪٽيل تار جي ڇيڙن

پئي نمبر بلب جو ٻيو چيٽو ٿيڻ بلب سان. اهڙيءَ طرح آخري بلب جو ٻيو چيٽو وري بيٽريءَ جي (-) ڪاٺو چيٽي سان ملايل هجي. (جيئن شڪل نمبر ۾ ڏيکاريل آهي) هن طريقي سان ملايل ڇڪر ڪسي سلسليوار چڪر (Series Circuit) چئبو آهي. هن قسم جا چڪر اوهين شاديءَ جي موقعي تي ڏسندا آهيو؛ ننڍڙا رنگارنگي بلب جيڪي قطارن ۽ لڙهين جي صورت ۾ هوندا آهن سي سلسليوار چڪر ۾ ڳنڍيل هوندا آهن. هن چڪر وسيلي ڳنڍيل مختلف رڪاوٽن (Resistances) وارن بلبن ۾ ڪرنٽ جو مقدار به مختلف ٿئي ٿو. يعني جنهن بلب ۾ رڪاوٽ وڌيڪ هوندي ته ان مان ڪرنٽ جو مقدار گهٽ هوندو ۽ جنهن بلب جي رڪاوٽ گهٽ هوندي تنهن مان ڪرنٽ جو گهڻو مقدار هوندو.

۵- پور وچوت چڪر (Parallel Circuit)



(شڪل نمبر ۵)


ٻن يا ٻن کان وڌيڪ بلبن کي تارن (بقايا ڏسو صفحو ۳۳)

مئي ۽ جون ۱۹۷۶ع

رستي مان وهندو آهي جنهن ۾ کيس گهٽ رڪاوٽ هوندي. هاڻي جيئن ته بلب جي فلئمينٽ ۾ تمام گهڻي رڪاوٽ آهي ۽ تار AB ۾ تمام گهٽ رڪاوٽ آهي، تنهنڪري سيل مان ڪرنٽ بلب ڏانهن وڃڻ بدران AB تار مان لنگهندو. جنهن ڪري بلب نه ٿو ٻري. اهڙي چڪر کي شارٽ چڪر (Short circuit) چئبو آهي.


شارٽ چڪر ۾ رڪاوٽ (Resistance) جيئن ته گهٽ ٿئي ٿي تنهن ڪري ڪرنٽ تمام تيزيءَ سان وهي ٿو. گهڻي ڪرنٽ جي وهڪ سبب گرمي پيدا ٿئي ٿي جنهن ڪري تارن ۽ ٻين جزن جي رجن يا زيان ٿيڻ جو امڪان رهي ٿو.

۴- سلسليوار چڪر (Series circuit)



(شڪل نمبر ۴)

ٻن يا ٻن کان وڌيڪ بلبن کي پاڻ ۾ تارن وسيلي اهڙيءَ طرح ملايو جو پهرين بلب جو چيٽو بيٽريءَ جي (+) واڌو چيٽي سان ملايل هجي ته ٻيو چيٽو ٻئي بلب سان وري



ويڊيڪون

هن جي مدد سان مال گاڏين جي اچ وڃ تي نظر رکندو آهي. ڪي مريض اهڙن موذي مرضن ۾ مبتلا هوندا آهن جو انهن جي ڪمري ۾ داخل ٿيڻ جي ڊاڪٽر اجازت نه ڏيندا آهن؛ ته اهڙن مريضن سان ٽيليويزن ڪيميرا جي ٻئي نظام جي وسيلي ڳالهه ٻولهه ڪري سگهجي ٿي.

ايٽمي واچ

برطانيه جي قومي تجربگهه ۽ آمريڪا جي بحري رصد گاه گڏجي هڪ اهڙي ايٽمي واچ تيار ڪئي آهي جا صحيح وقت ٻڌائي ٿي. ڪهڙي به سٺي ۾ سٺي واچ هن جي مقابلي ۾ رکجي ته ٽيهن ورهين ۾ سيڪنڊ جي ڏهين حصي جيتري به گهٽ وڌائي ٿي سگهي ٿي. ايٽمي واچ ۾

هڪ نئين ٽيليويزن ڪيميره ٺاهي وئي آهي جنهن جو وزن رڳو ڇهه پائونڊ آهي. ڪئميرا جو نالو ”ويڊيڪون“ آهي، ۽ اڄڪلهه آمريڪا ۾ عام جام استعمال ڪئي پئي وڃي. هن ڪيميرا جو استعمال حيرت انگيز آهي. مثلاً هن ڪيميرا کي تحقيقاتي تجربگهان ۾ خوردبين سان گڏ ننڍن ساهوارن جي تصويرن کڻڻ لاءِ استعمال ڪيو پيو وڃي. دڪانن ۾ ان کي چورن کي پڪڙڻ لاءِ ۽ بينڪن ۾ مشڪوڪ ماڻهن کي سڃاڻڻ لاءِ استعمال ڪيو پيو وڃي.

ڪيترائي ڪاروباري ادارا ۽ صنعتي پلانٽ هن ٽيليويزن کي رات جو محافظ جي حيثيت ۾ استعمال ڪندا آهن. ريلوي جو محڪمو

پينڊولم (لڏڻي) جو اصول استعمال ڪيو ويو آهي، پر ان ۾ ڪا به ذاتوءَ جي لٽ لرزش نه ڪندي آهي؛ پر سيزيم جو ايتم لرزش ۾ هوندو آهي. گهڙيال جو پينڊولم هڪ سيڪنڊ ۾ هڪ ڀيرو پورو ڪندو آهي، پر سيزيم مان نڪرندڙ شعاع هڪ سيڪنڊ ۾ ۹،۱۹،۲۶،۱۳،۷۷۰ ڀيرا چر ڀر ڪندو آهي. ان واچ کي هٿرادو گرھ جي رستي جي گراف، بحري آمدورفت ۽ ريڊيائي رهنمائيءَ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.

سائنسدانن فلڪياتي دورين جي ذريعي اندازو لڳايو آهي ته زمين جي محوري رفتار بدلجندي رهي ٿي. ۱۹۵۵ع کان ۱۹۵۸ع تائين ان ۾ هڪ سيڪنڊ جي هزارين حصي جيتري گهٽتائي پيدا ٿي آهي ۽ وري ۱۹۵۸ع ۾ ان ۾ واڌ ٿي. ان جي ڪري دنيا جي سڀني واچن جا وقت غلط ٿي ويندا آهن، پر سيزيم واري ايتمي واچ جي ذريعي اها ڳالهه مشڪل نه رهي آهي ته وقت کي صحيح رکي سگهجي.

فائر پروف رنگ

ڪيميادانن هڪ قسم جو فائر پروف رنگ يا روغن ڳولهي لڌو آهي، جو جيڪڏهن ڪنهن ڪاٺ واري جاءِ تي لڳائجي ته باهه ان کي ڪوبه جوکو نه ٿي رسائي سگهي. ان رنگ ۾ اهم جزو ڪلورين جو آهي، جا باهه کي وڌڻ کان روڪيندي آهي. اها

سائنس

عجب جهڙي ڳالهه آهي ته قديم مصري رهاڪن کي به ان حقيقت جي ڄاڻ هئي ۽ هو پنهنجي گهرن کي ٺاهڻ کان اڳ ۾ ڪاٺ ۽ ڪانن وغيره کي سمند جي پاڻي ۾ چڱيءَ طرح ٻوڙيندا هئا. سمند جو پاڻي سوڊيم ڪلورائيڊ يعني لوڻ جي ڪاٺ آهي، جنهن ۾ ڪلورين شامل هوندي آهي.

جڏهن باهه جو شعلو ان روغن تائين پهچندو آهي ته ٻيا جزا ته پري ويندا آهن پر ڪلورين گيس، ڪاٺ ۽ باهه جي وچ ۾ رڪاوٽ بڻجي ويندي آهي. ڪلورين گيس هونئن ته زهريلي آهي ۽ ٿورو وڌيڪ مقدار ساهه ذريعي اندر وڃي ته ماڻهو مري به سگهي ٿو، پر هن نئين روغن ۾ ان جو مقدار ايترو ته ٿورو رکيو ويو آهي جو گهر وارن کي ڪنهن به قسم جو نقصان نٿو پهچي سگهي.

ٽرانزسٽر ذريعي مرض جي سڃاڻپ

اڄڪلهه ٽرانزسٽر کي مرض جي سڃاڻپ لاءِ استعمال ڪيو پيو وڃي. برقي لهرن پيدا ڪرڻ واري هڪ ٽرانزسٽر کي پلاسٽڪ جي ڪپيسول ۾ محفوظ ڪيو ويندو آهي، مريض ان ڪپيسول کي ڳيهي ڇڏيندو آهي. اهو ان جي معدي ۽ آندڻ مان گذرندو آهي، پر ان سان گڏوگڏ هڪ قسم جا اشارا (سگنل) به موڪليندو رهندو آهي. ان کي پنهنجي سفر پوري ڪرڻ لاءِ پندرهن کان مئي ۽ جون ۱۹۷۶ع

وٺي چوويه، ڪلاڪن تائين وقت لڳندو آهي. ان عرصي دوران ڊاڪٽر هڪ ريڊيو رسيور مريضن جي جسم سان لڳائي رکندو آهي ته جيئن اندران ايندڙ سگنل وصول ٿي سگهن. اهڙي طرح مريض جي اعصابي چڪ ۽ رياحي دٻاءَ جي متعلق ضروري معلومات حاصل ٿي ويندي آهي؛ ۽ پوءِ ان جو تدارڪ ڪيو ويندو آهي.

زخمن جي لاءِ جيلائين جو استعمال هونئن ته سرجري جي دوران زخمن کي ٽاڪا هڻي بند ڪيو ويندو آهي، پر هاڻي نيويارڪ جي سائنس اڪيڊمي جي هڪ ڊاڪٽر سي. ڊبليو. ڪوپر جانورن جي ڪٽيل اوچن مان جيلائين مادو تيار ڪيو آهي، جو پنهنجي بناوت ۽ ماهيت اعتبار کان انساني اوچن سان گهڻي مشاهبت رکي ٿو. هن مادي ۾ چمڙيءَ سان جهٽل جي خاصيت موجود آهي. ان سلسلي ۾ جانورن تي جيڪي تجربا ڪيا ويا، انهن ۾ دل، ڦڦڙن، بڪين ۽ جيري جي سرجريءَ کان پوءِ زخم کي ٽاڪن هڻڻ جي بجاءِ جيلائين مادي سان ڳنڍيو ويو. هي مادو جيئن ته حيواني اوچن مان تيار ڪيو ويو آهي، انڪري گوشت تي جهليءَ وانگر پکڙجي ويندو آهي ۽ ڦٽ جي ٻاهرين سطح ليڪ ٿي ويندي آهي. خيال آهي ته انساني آپريشن ۾ به ان خاص مادي جيلائين جو استعمال ڪيو ويندو.

خلا ۾ مٽي ڪٿان ٿي اچي؟

زمين کان هزارين ميل مٿي مٽي جا گهاٽا ڪڪر ڇانيل رهن ٿا. اها مٽي ڪٿان ٿي اچي؟ ڇا اها زمين تان اٿي آهي يا ڪنهن ٻئي گرهه مان آئي آهي؟ انهن سوالن جو جواب هارورڊ ڪاليج جي ڊاڪٽر فريڊ ڏيندي ٻڌايو ته نڪو اها مٽي زمين تان ٿي اٿي ۽ نه ئي وري ڪنهن ٻئي گرهه مان ٿي اچي. پر جڏهن چنڊ جي سطح سان شهاب ثاقب ٽڪرائجندا آهن ته ان جي مادي مان ذرا چڻي پوندا آهن، جيڪي مٽيءَ جي ڪڪرن جي شڪل ۾ خلا ۾ پکڙجي ويندا آهن.

مٽي جي وارن جو چڻڻ

مٽي تي اٽڪل هڪ لک کن وار هوندا آهن. انهن مان ۲۵۰۰ وار چڻي پون ته ٺوڙ ظاهر ٿيڻ شروع ٿيندي آهي. ذهني يا اعصابي دٻاءَ جي ڪري هڪ سو کان وٺي يارنهن سون تائين وار چڻڻ لڳندا آهن. عورتن جي مٽي جي ٺوڙ ٿورو دير سان ظاهر ٿيندي آهي. اعصابي چڪتاڻ وارن جي ڪرڻ جو وڏو سبب بنجندي آهي. هڪ دفعي هڪ ماڻهو کي موت جي سزا ٻڌائي وئي، ان ڳڻيو ته ٽن هفتن ۾ سراسري يارنهن سؤ روزانو جي حساب سان ان جا وار ڇڻندا رهيا. عجب جي ڳالهه اها ته جڏهن ان جي موت جي سزا معاف ڪئي وئي ته وار وري تڪڙا پيدا ٿي ويا. ايڪس ري سان به وار ڪرندا آهن.

رت جو داپ ۽ ٻانهون

ڪوئن جي وزن جو $\frac{1}{70,000}$ حصو ڳار
انهن لاءِ خطرناڪ ثابت ٿيو. هڪ
شريو جي غدود ۾ ايترو ته زهر موجود آهي،
جو ان مان هڪ سو ڪوٺا مري سگهن ٿا.

(يقايا — ”برقي چڪر“)

ڪي وسيلي بيٽريءَ سان اهڙيءَ طرح ملايو
جو هر هڪ بلب جا ٻئي چيٽا ساڳئي وقت
بيٽريءَ جي ٻن چيٽن سان ٻه مليل هجن ۽
ٻئي نمبر بلب جي ٻن چيٽن سان ٻه ڳنڍيل
هجن. ۽ اهڙيءَ طرح وري ٻئي نمبر بلب جا
ٻئي چيٽا پهرين ۽ ٽئين نمبر بلبن جي ٻنهي
چيٽن سان مليل هجن سان گڏوگڏ پهرين
نمبر بلب جي معرفت بيٽري جي ٻنهي چيٽن
سان ٻه سڌيءَ طرح مليل هجن، (جيئن شڪل ۵
۾ ڏيکاريل آهي). هن طريقي سان ڳنڍيل
بلبن ۽ بيٽريءَ جي چڪر ڪي پور وچوت
چڪر (Parallel circuit) چمبو آهي.

اسان جي گهرن ۾ استعمال ٿيندڙ بلب،
ٽيوب لائيت، ريڊيو، پڪو، استري هيٽر،
ٽيليويزن ۽ ريڊيو جيٽر وغيره عام طور تي پور
وچوت چڪر ۾ ڳنڍيل هوندا آهن.



جارج ٽائون يونيورسٽي جي ڊاڪٽر
ميرانڊنيو تجربو ڪيو آهي ته رت جو داپ
(بلڊ پريشر) ٻانهن جي حالت مطابق بدلاجي
وڃي ٿو. جي ٻانهون نارمل حالت ۾ لڙڪيل
هجن ته داپ ۵ کان ۲ سيڪڙي تائين وڌي
وڃي ٿو. اها حالت چڱي چوڪي ماڻهوءَ
کي به ڊاڪٽري معائني ۾ ناڪام ڪري
سگهي ٿي. اهو تجربو هڪ ماڻهوءَ
تي ڪيو ويو. ڏٺو ويو ته جڏهن مريض جون
ٻانهون ميز تي آرام واري حالت ۾ رکيل
هيون ته ان وقت داپ معمول مطابق هيو،
پر جڏهن ميز ڀري ڪئي وئي ۽ ٻانهون سٺ
ڊگرين تي هيٺ لڙڪايون ويون ته معائني
ڪرڻ تي معلوم ٿيو ته رت جو داپ ۵ کان
۲ سيڪڙي تائين وڌي ويو آهي.

زهريلو ڪير پياڪ


گهڻي وقت تائين سائنسدان اهو سمجهندا
هئا ته رڳو جيت جليا زهريلو ٿيندا آهن، پر
بعد ۾ ڏکڻ آمريڪا جي ڪير پياڪ جانور
شريو (Shrew) تي کوجنا دوران خبر پئي ته
ان جا پڪ پيدا ڪرڻ وارا غدود زهريلو آهن.
شريو ڪوئي جهڙو ٿيندو آهي ۽ جيت جليا
کائيندو آهي. او - پي . پئرسن ڪجهه غدودن
کي پنهنجن لوڻ جي ڳار ۾ شامل ڪيو،
هن ان ڳار جو ٽڪو ڪوئن کي هنيو
ته ڪوٺا بيوس ٿي ويا ۽ پوءِ مري ويا.

سائنسي گلدستو

۱۔ کاغذی برتن ۾ بیدو اڀارڻ .

شڪل نمبر ۱ ۾ هڪ کاغذی برتن ۾ پاڻيءَ اندر بیدي جي اڀارجڻ کي ڏيکاريو ويو آهي . عام ماڻهو چوندو ته بیدو کاغذ

جي برتن ۾ ڪئين اڀاري سگهجي ٿو؟ پر هيءَ هڪ سائنسي حقيقت آهي . اوهان خود تجربو ڪري ڏسو، چو ته ذاتي مشاهدو انسان کي وڌيڪ مطمئن ڪندو آهي .



سوال آهي ته ڇو کاغذ

نه ٿي سڙي ٿو ۽ نه ئي پاڻي وهي شعلي کي

شڪل نمبر ۱

وسائي ٿو؟ سبب ڪٿي هيئن ڏجي ته ڪنهن کليل برتن ۾ پاڻيءَ کي سندس ٽهڪڻ پيد ٿيڪا 100°C آهي تائين گرم ڪري سگهيو. پر جيئن ته پاڻيءَ جي گرمي جذب ڪرڻ جي گنجائش تمام گهڻي آهي، انڪري پاڻ کاغذ جي اضافي گرمي - (Extra heat) جذب ڪري کاغذ جي گرميءَ جي درجي کي 100°C کان گهڻو وڌيڪ هجڻ کان محفوظ

رکي ٿو، جيڪو کاغذ کي ساڙڻ لاءِ ڪافي ڪونهي .


اها ئي هڪ اهڙي خاصيت آهي، جنهن ڪري اهي برتن جن تي ٽانڪي يا گنڍ طور مصالحو لڳل هوندو آهي انهن ۾ جيڪڏهن ڪافي پاڻي پري ڪين باهه تي رکي ڪم ڪار ڪبو آهي ته به جوڙ ڏاڍو هوندو آهي، پر جيئن ئي انهن کي پل ۾ يا ڄاڻي پهچي خالي گرم ڪبو ته مصالحو جي جاءِ وٽان جوڙ کلي پوڻ جا امڪان وڌيڪ هوندا آهن. ساڳي طرح تاس جي پتي مان هڪ

ننڍي صندوقچي ٺاهي، ان ۾ شيهي جي دائي (Pellet) کي پگهرائي سگهيو ٿا ! جيئن ته شيهو گرميءَ جو سٺو پسرئيندڙ آهي انڪري اهو کاغذ جي گرمي تيزيءَ سان جذب ڪري پوئين شيءَ کي سندس پگهرجڻ پد جيڪو 335°C آهي، کان وڌيڪ گرم ٿيڻ کان بچائي ٿو، ۽ انهيءَ ۾ ڪوبه شڪ ڪونهي ته 335°C گرميءَ تائين اهو کاغذ شعلي جي شڪل نٿو وٺي. حاصل مقصد ته مناسب مقدار ۾ ڪنهن گرميءَ جي خراب پسرئيندڙ جسم مان گڏ گهڻي گرمي جذب ڪرڻ جي گنجائش واري ڪا پائيت يا گرميءَ جي سٺي پسرئيندڙ نوس جسم جو استعمال ڪرڻ سان پهرئين جسم جي گرمي برداشت ڪرڻ جي صلاحيت وڌائي

۽ ان حالت ۾ اسپرنگ ڪانٽو (Spring balance) ۱۰۰۰ گرامن بدران وزن ۲۵ گرام ڏيکاريندو. ڪشش ثقل جي قاعدي موجب زمين شين کي پنهنجي مرڪز ڏانهن ائين ڇڪي ٿي جڏهن سندس سڄو مایو مرڪز ۾ ڳڻيل آهي، ۽ اهو ڪشش ثقل جو زور زمين ۽ جسم جي مرڪزن جي وچ ۾ سڌي مفاصلي (Linear distance) جي مربع سان ابتي نسبت (Inverse Proportion) ۾ هوندو آهي. مثيئن مثال ۾ مفاصلو قطر = ۲ ۾ نيم قطر جي هو، جنهن ڪري ۲ جو مربع (Square) چار ٿئي ٿو، ۽ ان سان ابتي نسبت جو مقصد ٿيو ته قوت $\frac{1}{4}$ حصو رهي يا $2^2=4$ دفعا گهٽجي ويندي.

سگهجي ٿي، يا ٻين اکرن ۾ انجي گرميءَ جو درجو گهٽائي سگهجي ٿو. پهرين حالت ۾ انجو گرميءَ جو درجو پائيت جي ”ٺهڪڻ پد“ تائين ۽ ٻيءَ حالت ۾ نوس جسم جي ”پگهرڻ پد“ تائين لڳ ڀڳ قائم رهي ٿو. هر جي ڪڏهن خراب پسرائيندڙ جسم جي گرمي برداشت ڪرڻ جو درجو پائيت جي ٺهڪڻ پد يا نوس جي پگهرڻ پد کان گهٽ هوندو ته اهڙي صورت ۾ ڪا ڪيميائي (عموماً آڪسيجن جي) تبديلي يا طبعي تبديلي ٿيندي آهي.

نسبتاً وڌيڪ گرا جسم



جيئن ئي اسان مٿي وينداسين، تيئن ئي زمين جي چڪ گهٽبي ويندي. جيڪڏهن هڪ ڪلوگرام وزني شيءَ کي اسان ۶۳۰۰ ڪلو ميٽر مٿي، زمين جي مرڪز کان سندس قطر (diameter) جي برابر پري کڻي وينداسين ته ڪشش جي قوت $2^2=4$ دفعا گهٽجي ويندي،

ماهور سائنس مخزن ۾ طبي سائنس جو صفحو ايندڙ مهيني کان شروع ڪيو پيو وڃي. هن صفحي ۾ مشهور طبي ماهر پنهنجي شعبي متعلق ليک لکندا ۽ ان کانسواءِ پراڻن مريضن جي مسئلن تي پڻ راءِ ڏيندا. سائنس مخزن جا پڙهندڙ هن صفحي تي ڇپيل فارم پوري ان سان گڏ پنهنجو طبي مسئلو لکي موڪلين ته جيئن سندن تڪليف لاءِ صحيح راءِ مهيا ڪري سگهجي. سنڌ جي طبي سائنس جي ماهرن کي به گذارش ٿي ڪجي ته هو پنهنجا ليک هر مهيني جي پنجن تاريخ تي اسان کي روانا ڪن. ذهني مسئلن جا پڻ جواب ڏنا ويندا. (ايڊيٽر)

فرض ڪريو ته ساڳيو وزن $12,800 =$
 نيم قطر (زمين جو) $3 \times$ ڪلوميٽر، زمين جي
 مٿا چري کان مٿي آهي. ان حالت ۾ ڪشش
 ثقل جي قوت $g = 3^2 = 9$ دفعا گهٽجي ويندي ۽
 اسپرنگ ڪاٺو 1000 گرام وزن بدران صرف
 111 گرام وزن ڏيکاريندو.

شايد توهان ان نتيجي تي پهتا هوندا
 ته جيڪڏهن ڪا شيءِ زمين اندر جيئن وڌيڪ
 گهرائي ۽ (Depth) ۾ لائي ويندي تيئن ان جو
 وزن وڌندو ويندو، ڇو ته اهڙيءَ حالت ۾
 جسم جي مرڪز ۽ زمين جي مرڪز جي
 وچوارو سڌو مفاصلو گهٽبو ويندو؛ جنهن جو
 نتيجو ڪشش ثقل جي قوت ۾ واڌ ٿيندو.
 بحرحال، جيڪڏهن زمين جي اندر گهرائي ۽
 ۾ لهندڙ جسم متعلق توهان ائين سوچيو
 آهي ته توهان غلط آهيو. اهڙي صورت حال

۾ وزن وڌي ته ڪونه ٿو، پر ان جي ضد
 ۾ گهٽجي ٿو! سمجهائڻو ته اسانجي
 ننڍن سائنسدانن کي هيءَ ڳالهه تعجب ۾
 وجهيو ويئي آهي ۽ ان منطق کي في الحال
 انهن جو ننڍو ذهن سمجهي نه سگهيو آهي. ته ها!
 وضاحت ڪرڻ لازمي ٿي پيئي آهي... حقيقت
 ۾ جڏهن جسم زمين جي مٿا چري تي يا
 ان کان مٿي هوندو آهي ته مٿس زمين جي
 چڪ هڪ - طرفي هوندي آهي، ۽ اهڙي
 حالت ۾ جيئن زمين جي مرڪز ويجهو هجيو
 تيئن ڪشش ثقل جي قوت وڌندي ويندي، پر
 جيڪڏهن جسم کي زمين اندر گهرائي ۾
 لاڻو ويندو ته مٿس زمين جي ڪشش جا زور
 چوڌاري اثر انداز ٿين ٿا، جنهنڪري زمين
 جي مرڪز ڏانهن مائل چڪ ۾ قدري
 گهٽتائي اچيو وڃي ۽ انڪري ئي انجو وزن
 گهٽجي وڃي، تانجو مرڪز تي پهچڻ وقت
 شيءِ بي وزني ٿيو وڃي. اهڙي تصور جي
 عڪاسي شڪل نمبر ۲ ۾ ڪوه ۾ هيٺ لاٿل
 جسم تي هڪئي وقت هيٺ مٿي ۽ چوڌاري
 ڏيکاريل قوتن ذريعي ڪئي ويئي آهي.

نت:- شين جو وزن زمين جي مٿا چري
 تي گهڻي ۾ گهڻو هوندو آهي ۽ انهيءَ وزن
 ۾ بلنديءَ ڏانهن وڌندي يا گهرائي ۾ لهندي
 جيئن پوءِ تيئن ڪمي ايندي ويندي (پر انهيءَ
 ۾ وڌيڪ صحيح ٻڌڻ تڏهن ٿيندي جڏهن
 فرض ڪجي ته زمين جي گھاٽائي (density)
 جتي ڪٿي هڪجهڙي - (homogeneous) هجي.

حقيقت ۾ جيئن زمين جي مرڪز ڪي
 ويجهو وڃيو تيئن زمين جي گھاٽائي ويندي
 وڌندي، انهيءَ ڪري قوت ڪشش ۾ ڪجهه
 مفاصلي تائين ٿوري واڌ ٿئي ٿي ۽ ان کانپوءِ
 ان ۾ گهٽتائي اچڻ شروع ٿي ويندي آهي.

(پنهنجي تڪليف متعلق مڪمل
 احوال صاف اکر ۾ پني جي هڪ پاسي
 لکي هن ڪوپن سان جدا لڳائيندا).


ڪوپن

نالو: _____

عمر: _____

مڪمل پتو: _____

انچارج: عبدالستار
 باڻهي شعبو
 سنڌ يونيورسٽي



ذهني آزمائش

سوال ۷- هوا جي رفتار ۽ طاقت ماپڻ ۾
 ڪتب ايندڙ اوزار جو نالو ٻڌايو؟
 سوال ۸- پاورجي ايڪائي (Unit) جونالو ٻڌايو؟
 سوال ۹- شيشو ڪهڙين شين جو مرڪب آهي.
 سوال ۱۰- ”سم واري زمين“ مان اوهان جي
 ڇا مراد آهي؟
 (ذهني آزمائش جا جواب ڏسو صفحو ۴۸)

سوال ۱- پنبه پھڻ (Fossil) ڇا آهي؟
 سوال ۲- اها ڪهڙي شيء آهي جنهن جي
 ڪري ٻوٽا ساوا رهن ٿا؟
 سوال ۳- پلازما (Plasma) بابت اوهان ڇا
 ٿا ڄاڻو؟
 سوال ۴- ڪيمسٽر ڇو ٿيندو آهي؟
 سوال ۵- اوباسي ڪڏهن ايندي آهي؟
 سوال ۶- دنيا جو گري ۾ گرو ذاتو ڪهڙو آهي؟

عبدالمازق شيخ

طبي ماهرن جون غير طبي ايجادون

ڪيو ويو. هن ڪاروبار بعد ۾ ايتري ته ترقي
 ڪئي جو هن جو نالو دنيا جي سڀ کان
 پهرين انشورنس ايجنٽ جي حيثيت سان
 ليکيو ويو.

● اسڪاٽ لينڊ جي ڊاڪٽر جيمز سائمن
 (۱۷۹۹-۱۸۷۰ع) ڪپڙي کي واٽر ڀروف
 (پاڻيءَ کان محفوظ) بنائڻ لاءِ ان تي رپڙ
 جي تهر ڇاڙهڻ جو طريقو ايجاد ڪيو. (اها
 ايجاد بعد ۾ چارلس ميڪٽوش جي نالي سان
 پيٽينٽ ڪئي وئي.) اهڙيءَ طرح ڊاڪٽر
 سائمن چٽيءَ جو موجد مڃيو ويو.

● فلوريڊا جي ڊاڪٽر جان گوري

سئي؛ جون ۱۹۷۶ع

ڪن ماهرن اهڙيون ته شيون ايجاد
 ڪيون آهن، جيڪي انهن جي ڌنڌي سان
 ڪنهن به نموني واسطو نه ٿيون رکن اهڙيون
 چند ايجادون هن ريت آهن:

● ڪيمبرج جي ڊاڪٽر ٽموٽي برائٽ
 (۱۵۵۱ع-۱۶۱۵ع) شارٽ هئند ايجاد ڪئي.
 ● لنڊن جي ڊاڪٽر نڪولس (وفات
 ۱۶۹۸ع) فائر انشورنس (باهه جي ويهي)
 جو بنياد وڌو. ۱۶۶۱ع ۾ لنڊن ۾ باهه لڳڻ
 جو جيڪو تاريخي واقعو ٿيو، ان کان متاثر
 ٿي هن هڪ آفيس قائم ڪئي، جتي باهه
 جي نقصانن کان بچڻ لاءِ ويهي جو انتظام

جواب

- ۱- اهڙا جانور يا ٻوٽا جيڪي گهڻو وقت اڳي زمين تي هئا ۽ هينئر انهن جا رڳو نشان ملن ٿا. ۲- کلوروفل (Chlorophyll)
- ۳- رت جو پاڻيائو حصو جنهن ۾ ڳاڙها ۽ اڇا گهرڙا (Cells) هوندا آهن. ۴- جڏهن جسم جا صحتمند گهرڙا (Cells) پنهنجي عام واڌ جي رفتار کان تيز رفتار مان وڌندا آهن ۽ هڪ مختلف شڪل اختيار ڪندا آهن ۽ جسم جو اهو حصو پنهنجو ڪم نه ڪري سگهندو آهي. اهڙي علامت ڪي ڪينسر چئبو آهي. ۵- جڏهن جسم آڪسيجن (Oxygen) جي کوٽ محسوس ڪندو آهي.
- ۶- ايريڊيم (Iridium). ۷- بيو فورت سڪيل (Beaufort scale). ۸- واٽ (watt). ۹- مٿي (Silica) سوڊا ۽ چن جو. ۱۰- اها زمين جيڪا پنهنجي وزن جي تناسب کان وڌيڪ پاڻي کڻي ان کي سم واري زمين چئبو آهي.

(بقايا — ”وڇون“)

ٿيندو آهي. هڪ ماڻهو تي ان جو تجربو ڪيو ويو ۽ ان کي وڇون کان هر ڏنگايو ويو، آخر ڪار اها حد آئي جو زهر ان جي لاءِ بلڪل بي اثر بنجي ويو.

وڇونءَ جا دشمن

وڇون انسانن ۽ ٻين جانورن جو ته دشمن آهي پر ان جي لاءِ به دشمن جي کوٽ ڪانهي. ميڪسيڪو ۽ وچ آمريڪا ۾ ڪولين جي سڄي فوج انهن تي اڇي ڪڙڪندي آهي ۽ وڇون ڇڏي نظر ايندا آهن. آفريڪا جو باندر ان جي ٻچ کي ڌار ڪري، باقي سڄو جسم هڙپ ڪندو ڪندو آهي.

(۱۸۰۳-۱۸۵۵ع) هٿرادو ريفريجريشن (ٿڌي ڪرڻ) جو طريقو ايجاد ڪيو. سڀ کان پهرين هن هوا کي ٿڌي ڪرڻ جو اصول ڳولي لڌو. اهوئي اصول اڄڪلهه برف خانن ۽ ايئر ڪنڊيشننگ ۾ استعمال ٿيندو آهي.

● بوسٽن جي ڊاڪٽر وليم (۱۸۲۰-۱۹۰۱ع) اليڪٽريڪل فائر الارم (باھ وارو برقي گھگھو) ايجاد ڪيو، جو اڄ به سڄي دنيا ۾ استعمال ٿئي ٿو.

(بقايا — ”ايڊيٽوريل“)

ڪرڻ کي پنهنجو فرض پورو ڪرڻ سمجهي ماڻ ڪري نه ويهن پر سٺي کان سٺا مضمون لکي يا هٿ ڪري اسان کي ڏياري موڪلين جيئن اهي رسالي ۾ شامل ڪري سگهجن. مٿين سڀني ڳالهين کان علاوه هڪ شڪايت رسالي جو وقت تي نه نڪرڻ آهي. اسان انهيءَ شڪايت کي ختم ڪرڻ لاءِ هن پيري مٿي ۽ جون جو پرچو گڏي ڪڍي رهيا آهيون ته جيئن اڳتي هر مهيني جي پهرين تاريخ پرچو پڙهندڙن جي هٿن ۾ پهچائي سگهون. ڪوشش اها ڪئي ٿي وڃي ته پڙهندڙن وٽان ملندڙ شڪايتن کي ختم ڪيو وڃي ۽ مليل صلاحتن تي ممڪن حد تائين عمل ٿئي. جيڪڏهن پڙهندڙن جو تعاون جاري ۽ وڌندو رهيو ته پوءِ هي رسالو چند ڏينهن اندر سندن پسنديدہ معيار مطابق ڪري سگهجو ۽ اسين پنهنجن پڙهندڙن کان ان باري ۾ بهتر اميدون ٿا.

MONTHLY Science MAGAZINE

Approved by the Directorate of Education, Hyderabad Region.

Vol: 6

MAY & JUNE 1976

No. 5-6

خوش ذوق ۽ جدت پسند حضرات جي خدمت ۾

**نئون ڪي ٽو
ڪنگ سائرفلٽر**

ڪي ٽو جيڪا في بنا و مقبوليت حاصل ڪئي آهي
ان ڇا سڀ هر خاصو عام في وڌيڪ آهن جي ڪري ڪي ٽو مقبوليت ۾
اڀري آيو آهي جي بنا تي ڪي ٽو پڻ اڻڌاري لاءِ ڀرپور ڪم ڪري ٿو آهي



۸۵ ملي ميٽر



مقامي ۽ بين الاقوامي صنعت ۾
فراڊل ۽ ڊوڊل جي ادارو