




SCIENCE


اگست ۱۹۷۳ء

SCALE IN FRACTIONS OF AN INCH



ماھوار

سائنس



پرچو [۸]

آگست ۱۹۷۳ع

سال [۳]

فھرست

صفحہ	مضمون
۵	● ھڪ گھرڙا جانور
۹	● نفسيات جو حقيقتون، معلومات ۽ حاصلات
۱۳	● ذیابیطس
۱۷	● گندگام ۽ انهن کان بچاء جا طريقا
۲۱	● ذهني ٽڪاوت
۲۳	● سٺي گوشت جي سڃاڻپ

ٻارن جا صفحا

۲۵	● خلائي لباس
۲۶	● سائنسي وندر
۲۷	● زندهہ ڪوڏر ۽ زندهہ ٽوڪري
۲۹	● پوپٽ
۳۳	● سائنس ڪلب
۳۵	● والريٽس (ٽرانسميٽر) سيٽ ٺاهڻ جو طريقو
۳۶	● سائنسي معلومات
۳۸	● پڇو ۽ پرايو

باني

الحاج سيد غلام مصطفيٰ شاھ
وائيس چانسلر، سنڌ يونيورسٽي، سنڌ

چيف ايڊيٽر

ڊاڪٽر ممتاز علي قاضي

ايڊيٽر

ڊاڪٽر سيد وڏل شاھ
محمد شريف ميمڻ

اسسٽنٽ ايڊيٽر

غلام مرتضيٰ ڀٽي

انچارج ٻارن جا صفحا

الهوڏايو سهاڳا

آرٽسٽ

دارا اڀڙو

آفيسون

ايڊيٽر: انسٽيٽيوٽ آف ڪيمسٽري

سنڌ يونيورسٽي - ڄامشورو

مئنيجر: انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي

سنڌ يونيورسٽي - ڄامشورو

قيمت

سوا رپيو

۱۴ رپيا

في پرچو

ساليانه

هن پرچي جا سينگاريندڙ

نثار احمد حداد

ليڪچرار زولاجي

گورنمينٽ سپرنٽنڊنٽ ڪاليج - خيرپور ميرس



سيد محمد صالح شاهه

پبليڪيشن آفيسر، سنڌ بڪسٽ بوڪ بورڊ، حيدرآباد



ڊاڪٽر امير بخاري

ايم. ايل. سي اسپتال، حيدرآباد



محمد قاسم رند

ايم. ايس سي (انگريڪيچر) ٽنڊو ڄام



بشير بلوچ

غونپور محلو - لاڙڪاڻو



نصر الله پنهور

شاگرد پنجون سال، ڊي. وي. ايم

ڪاليج آف النيمل هسبنڊري - لاهور



ٻارن جا صفحا

ممتاز علي ميمڻ - لاهوري محلو، لاڙڪاڻو



سيد آفتاب علي شاهه لڪياري - قمبر



مظفر احمد ڀٽو - ڀٽا روڊ، مکر



منير احمد ڀٽي - دينوءَ جو پڙ، حيدرآباد



عبدالرزاق شيخ - رڻيس رائي مل، ڊڙي محلو، لاڙڪاڻو





اسد الله بلوچ - ريفريجريشن ايئرڪنڊيشن سپروائيزر

انسٽيٽيوٽ آف ڪيمسٽري، ڄامشورو



ممتاز عباسي - محمد پور محلو، لاڙڪاڻو




وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَافِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ
وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَفَحْنُ الْوَارِثُونَ
الحجر (۱۵-۲۳)



” ۽ هوائن ڪڪرن ڪٽندڙن کي موڪليندا
آهيون، پوءِ آسمان مان پاڻي وسائيندا آهيون، پوءِ
اهو (پاڻي) اوهان کي پياريندا آهيون ۽ اسين ئي
جياريندا ۽ ماريوندا آهيون ۽ اسين سڀ ڪنهن
جا وارث آهيون.“



سائنسي تعليم لاءِ نئون نصاب



ماهرين تعليم جي هڪ جماعت طرفان پرائمري ۽ مڊل اسڪولن ۾ سائنس پڙهائڻ لاءِ هڪ نئون نصاب تيار ڪيو ويو آهي. هن نصاب جو مقصد اهو آهي ته شاگردن جي انهيءَ رجحان کي بلڪل بدلايو وڃي جنهن موجب اهي سائنسي حقيقتن کي سمجهڻ ۽ پروڙڻ بدران رڳو طوطي وانگر ياد ڪريو ڇڏين ۽ امتحان ڏيڻ کانپوءِ هنن کي انهن ڳالهين سان ڪا به دلچسپي نٿي رهي. جن ماهرن اهڙو نصاب تيار ڪيو آهي تنکي پڙهائڻ جو وسيع تجربو آهي ۽ نصاب جي تياريءَ ۾ مهارت رکن ٿا. انهن پنهنجي رپورٽ ۾ لکيو آهي ته پرائمري ۽ مڊل اسڪولن ۾ سائنس پڙهائڻ جو موجوده طريقو شاگردن جي ذاتي تجربن ۽ سندن ماحول سان ڪوبه تعلق نٿو رکي تنهنڪري کين امتحان ۾ پاس ٿيڻ کان سواءِ ٻيو ڪوبه فائدو نٿو پهچائي. ماهرن پنهنجي راءِ ڏيندي چيو آهي ته سائنسي تعليم جو قدرتي ماحول سان گهرو تعلق هئڻ گهرجي ڇو ته شاگردن کي ڪتابن مان ايتري معلومات حاصل نٿي ٿئي سگهي جيتري هننجي آسپاس موجود آهي. ماهرن جي خيال مطابق اسڪولن ۾ ڪتابي علم سيکارڻ سان گڏوگڏ ٻارن ۾ تجسس جو مادو پڻ پيدا ڪرڻ گهرجي ۽ سائنسي تعليم ۾ ڪتابن بدران عملي ڪم کي بنياد بنائڻ گهرجي. انهيءَ خيال جي مدنظر هنن اهڙا نصاب تيار ڪيا آهن جن ۾ سائنس جي مختلف شعبن، مثلاً علم طبعي، علم ڪيميا ۽ علم حيات کي تقسيم ڪرڻ جي بدران سائنس کي ٽن گروپن ۾ ورهايو آهي، پهريون زنده شيون، ٻيو ماده ۽ توانائي ۽ ٽيون زمين ۽ ڪائنات. ماهرن طرفان انهن طريقن تي تفصيل سان روشني وڌي وڃي آهي جيڪي سائنس جا استاد شاگردن کي سائنسي نصاب پڙهائڻ لاءِ اختيار ڪندا. اهڙن طريقن ۾ ان ڳالهه تي خاص زور ڏنو ويو آهي ته شاگرد پاڻ پنهنجن مشاهدن ۽ استادن طرفان ڪيل عملي مظاهرن، زباني هدايتن، تصويرن، نقشن ۽ اوزارن جي ذريعي علم سکڻ.

اسانجي خيال ۾ ماهرن طرفان پيش ڪيل رپورٽ

۾ سائنسي تعليم جي موجوده سرشتي سان ٻن خاص خاصين کي دور ڪرڻ جي ضرورت ٿي زور ڏنو ويو آهي. هڪ اها ته شاگرد سائنسي حقيقتن کي پوري ريت سمجهڻ کان سواءِ ئي ٻر زبان ياد ڪري ڇڏين ۽ ٻي اها ته سائنسي تدريس جو تجربن ۽ آسپاس جي قدرتي ماحول سان سڌو سنئون واسطو نٿو رهي تنهن ڪري شاگردن ۾ جستجو ۽ تجسس جو مادو پيدا نٿو ٿئي.

سائنسي تعليم جو اصل مقصد، قدرت جي لڪل اسرارن کي ڳولڻ ۽ انهن کي انسان ذات جي ڀلائي لاءِ ڪم آڻڻ آهي. اهو مقصد انوقت تائين حاصل نٿو ٿئي سگهي، جيستائين شاگردن جا ذهن سائنسي حقيقتن کي قبول ڪرڻ لاءِ تيار نه هوندا. تنهنڪري اسڪول جي زماني ۾ ئي هننجي دماغي صلاحيتن کي اهڙيءَ راه تي لڳائڻ جي ضرورت آهي. ٻارن ۾ هونءِ ئي فطري طور تي تحقيق ۽ جستجو جو لاڙو موجود هوندو آهي پر سائنسي تعليم جو موجوده طريقو انهن جي فطري لاڙي کي اپارڻ لاءِ ڪوبه موثر ڪردار ادا نٿو ڪري. انجو نتيجو هي نڪري ٿو ته اهڙن ٻارن جون فطري صلاحيتون مايوسي ۽ عدم دلچسپيءَ جو شڪار ٿي ضايع ٿيو وڃن ۽ هو اڳتي هلي پنهنجي سر ڪوبه نمايان يا تخليقي ڪم ڪرڻ جي قابل نٿا رهن. جيڪڏهن اسڪول جي زماني کان ئي سندن قوت مشاهده ۽ تجسس جي مادي کي مناسب تربيت ڏني وڃي ته اهڙا شاگرد يقيني طور تي تعليم جي آئنده مرحلن ۾ بهتر تحقيقي ۽ تخليقي صلاحيتن جو مظاهرو ڪري سگهندا.

اسين حڪومت جي تعليمي اختياريءَ وارن جي سجاڳيءَ جو داد ڏيون ٿا جن سائنسي تعليم جي هلندڙ سرشتي ۾ سڌرا ۽ تبديليون آڻڻ لاءِ جوڳو قدم کنيو آهي. سائنسي تعليم ۽ تدريس ۾ هڪ عرصي کان انقلابي تبديليون آڻڻ جي ضرورت محسوس ڪئي پئي وڃي. حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته اسانجي ملڪ ۾ سائنسي تعليم ته گذريل ڪيترن ئي سالن کان ڏني پئي وڃي پر اسانجا نوجوان تحقيق ۽ ايجاد جي ميدان ۾ ايترو اڳتي نه وڌي سگهيا آهن، جيترو کين هئڻ گهرجي.

سائنس

بلانڪ، انجو وڏو سبب وسيلن جي گهٽتائي رهي آهي. پر اسڪولن ۾ ناقص سائنسي نصاب ۽ تعليم ۽ تدريس جي پراڻن طريقن جو به ان ۾ وڏو دخل آهي. تنهنڪري ان مقصد لاءِ حڪومت کي گهڻي کان گهڻيون رقمون مهيا ڪرڻ گهرجن ته جيئن جديد سائنسي اوزارن ۽ ٻين وسيلن جي گهٽتائي نئين نصاب جي ڪاميابيءَ ۾ رندڪ نه وجهي. سائنس جي تدريس معيار کي بهتر بنائڻ لاءِ استادن جي ترتيب تي به توجہ ڏيڻ جي ضرورت آهي ڇو ته سٺو نصاب، سٺن استادن کان سواءِ بیکار ٿي ويندو. سائنس تي آسان ۽ دلچسپ لٽريچر جي به گهڻي گهٽتائي آهي. حڪومت کي گهرجي ته ٻارن لاءِ سائنس جا دلچسپ ۽ معياري ڪتاب لکندڙن جي همت افزائي ڪري ۽ انلاءِ ڪو موثر پروگرام تيار ڪري. اهڙيءَ طرح ريڊيو ۽ ٽيليويزن جهڙن نشرو اشاعت جي عام ۽ مقبول ذريعن کي به انهيءَ مقصد لاءِ استعمال ڪرڻ گهرجي.

سائنسي تعليم کي ترقي ڏيارڻ ۽ بهتر بنائڻ جي انلاءِ به ضرورت آهي جو اڄوڪي دور ۾ هڪ ترقي ڪندڙ ملڪ جي خوشحاليءَ جو سمورو دار مدار سائنس ۽ ٽيڪنالاجي جي فروغ تي رهي ٿو. زندگيءَ جو هر شعبو، زراعت کانوٺي ملڪ جي دفاع تائين سائنس ۽ ٽيڪنالاجيءَ جو محتاج آهي. نه رڳو هن برصغير ۾ پر دنيا ۾ هر هنڌ مسلمان قوم جي زوال جو هڪ وڏو سبب اهوئي رهيو آهي ته اها سائنس ۽ ٽيڪنالاجيءَ ۾ ٻين قومن کان پوئتي رهجي وئي آهي. سائنسي ترقيءَ جي ميدان ۾ اسانجي ۽ ترقي يافتہ قومن جي وچ ۾ هڪ ڊگهو فاصلو پيدا ٿي چڪو آهي جيڪو وقت سان گڏوگڏ وڌندو رهي ٿو. انهيءَ فاصلي کي رڳو انقلابي تيز رفتاريءَ سان ئي مٽائي سگهجي ٿو. اهو فاصلو جيترو گهٽ ٿيندو ويندو، اسين ترقي يافتہ قومن جي معاشي ۽ سياسي پننجي مان آزاد ٿيندا وينداسين. تنهنڪري اسين سائنسي تعليم ۾ انقلابي تبديليون آڻڻ جي پروگرام جي گرمجوشيءَ سان آڃيان ڪريون ٿا ۽ اميد رکون ٿا ته اسانجو تعليم پرائيندڙ طبقو به ان مان پورو پورو فيض حاصل ڪندو.

آگسٽ ۱۹۵۳ع

هڪ گهرڙا جانور (Protozoa)

بيماريون به پيدا ڪن ٿا. انسان ۾ ڪيتريون ئي بيماريون جهڙوڪ مليريا ۽ پيچش وغيره، جن جو علاج اڄڪلهه جو طبي مسئلو آهي، هڪ گهرڙن جانورن جي ڪري ئي ٿين ٿيون.

بناوت جي لحاظ کان هڪ گهرڙن جانورن کي چئن مکيه درجن ۾ ورهايو ويو آهي.

۱- ڪوڙن پيرن وارا هڪ گهرڙا (Rhizopoda or Sarcodina)

۲- جهپڪ وارا هڪ گهرڙا (Mastigophora)

۳- ڊگهڙن وارن وارا هڪ گهرڙا (Ciliata)

۴- غير جنسي ٻجن وارا هڪ گهرڙا (Sporozoa)


۱- ڪوڙن پيرن وارا هڪ گهرڙا :- هيءَ جماعت اهڙن هڪ گهرڙن جي آهي جن کي ڪوڙا پير (Pseudopodia) ٿيندا آهن. ڪوڙا پير عارضي طرح جسم جي ڪنهن حصي تي ٺهن ٿا ۽ جلدي ڊهي وڃن ٿا. هي پير سنڀا ۽ آڱر جهڙا يا ويڪرا ۽ پکڙيل هوندا آهن.

هن جماعت جو هڪ عام فرد (Genus) جيتا مڙو (Amoeba) آهي. هي پاڻيءَ جي تلاءُن جي تري ۾ رهندو آهي. خوردبينيءَ ۾ ڏسڻ سان معلوم ٿيندو ته هي ننڍڙو جانور ماس (Protoplasm) جو هڪ ذرڙو ٿئي ٿو جيڪو سنهي پردي ۾ ويڙهيل هوندو آهي. هن کي ڪا خاص شڪل ڪانه ٿيندي آهي ۽ هر وقت پنهنجي شڪل بدلائيندو رهندو آهي. جنهن طرف چرڻ چاهيندو، سندس جسم جي ان طرف کان هڪ ننڍو آڱر جهڙو ڪوڙو پير نڪري ايندو ۽ سڄي جسم جو ماس ان ۾ وهي ويندو. ان طرح هو هڪ جاءِ کان ٻي جاءِ تائين چرڻ ڪري ٿو. جيتامڙي کي هٿ ۽ وات ڪونه ٿين تنهن هوندي به هو کاڌو پکڙي

ڪائنات جي خالق جي عجيب ڪاريگري مان تلاءُ جي پاڻيءَ جو اهو هڪ ڦڙو آهي جنهن کي خوردبينيءَ هيٺان ڏسڻ سان ان ۾ ڪيترن ئي قسمن جا ننڍڙا جيو نظر ايندا. انهن مان ڪي ٽڪڙا ٽڪڙا اڳي پوءِ چرندا ڏسڻ ۾ ايندا ته ڪن جي چرپر نهايت ئي آهستي هوندي ۽ انهن مان ڪي وڏا وري پنهنجن ننڍن ساٿين کي کائيندا رهندا هوندا. مطلب ته زندگيءَ جو هر عمل جيڪو وڏن جانورن ۾ هوندو آهي سو هنن ننڍن جيون ۾ به ڏسڻ ۾ ايندو. اهڙا جيو ”هڪ گهرڙا جانور“ سڏبا آهن. هي دنيا جا پهريان جانور ليکيا وڃن ٿا. علم حيوانات جي ماهرن هنن جانورن کي حيواني راڄ (Animal Kingdom) جي پهرين ٽولي (phylum) ”پروٽوزوا“ (protozoa) ۾ شمار ڪيو آهي. هي جانور ظاهري طرح تمام مختصر آهن پر حقيقت ۾ اهي وڏن جانورن جهڙا سڀ ڪم ڪن ٿا. وڏا جانور جيڪي ڪروڙين گهرڙن جا ٺهيل آهن تن جي مختلف گهرڙن جي وچ ۾ ڪم جي ورڇ هوندي آهي. سندن ڪي گهرڙا هاضمي، ڪي اخراج ۽ ڪي نسل جي واڌاري جو ڪم ڪن ٿا. پر ”هڪ گهرڙن جانور“ مان هر هڪ جانور اهي سڀ ڪم اڪيلي سر پورا ڪري ٿو. عام طرح ائين سمجهڻ ۾ ايندو ته هي ننڍڙا جيو ڪا به اهميت نه ٿا رکن. ايترو ننڍڙن جيون جو تعلق انسان سان ڪيئن ٿي سگهي ٿو؟ پر حقيقت ان جي ابتڙ آهي. انهن مان گهڻا پاڻ کان وڏن انهن جانورن جو ڪاڇ آهن جيڪي وري ٻيا جانور کائي انساني غذا بلجن ٿا. تصوير جو ٻيو رخ ڏسڻ سان معلوم ٿيندو ته هي جانور انسان لاءِ صرف فائديمند نه آهن بلڪ انسان ۽ ٻين جانورن جي جسم ۾ مفت خوري جي زندگي گذاري انهن ۾ ڪيتريون ئي

سائنس

ڪائيندو آهي. سندس کاڌو ڪانس نڍڙا جيو آهن جيڪي هو ڪوڙن پيرن جي مدد سان پڪڙيندو آهي ۽ ٻي ٻي ويندو آهي. ان طرح سندس جسم ۾ کاڌي جي ذرڙي جي چوڌاري هڪ خال ٺهي پوندو آهي. سندس ماس هڪ هاضمي دار رس پيدا ڪري ٿو جيڪا کاڌي واري خال ۾ پهچي کاڌي کي هضم ڪري ٿي. ان هضم ٿيل کاڌو پالمرادو جسم کان ٻاهر نڪري ويندو اٿس. کيس زنده رهڻ لاءِ آڪسيجن جي ضرورت پوي ٿي جيڪا هو سندس چوڌاري پاڻيءَ ۾ حل ٿيل جذب ڪري وٺي ٿو. آڪسيجن جي سندس جسم ۾ داخل ٿيڻ ڪري ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ٺهي ٿي جا پڻ سندس جسم جي مٿاڇري کان ٻاهر نڪريو وڃي. جيتا مڙي جي جسم ۾ جيڪي غلاظتون پيدا



شڪل نمبر ۵. - جيتامو

ٽين ٽيون تن مان ڪجهه سندس جسم جي پردي (Plasma membrane) رستي ٻاهر نڪرڻ ٿيون ۽ ٻيون پاڻيءَ سميت هڪ خال ۾ جمع ٿين ٿيون جنهن کي سنڌڙ خال (Contractile vacuole) چئبو آهي. اهو خال آهستي آهستي وڏو ٿيندو وڃي ٿو ۽ آخر ۾ ان جي ٽوڪڻي وانگر ڦاٽڻ تي پاڻي ۽ غلاظتون جسم کان ٻاهر نڪري وڃن ٿيون. اهو خال پوءِ ننڍڙو ٿي وڃي ٿو ۽ وري ساڳيو عمل ٿئي ٿو. جيتا مڙي کي ڪو انتهائي سرشتو نه آهي تنهن هوندي به هو پوري طرح حساس آهي. کيس کاڌي جي ذرڙي ۽ واريءَ جي ذرڙي جي چڱي طرح خبر پوندي آهي. تيز روشنيءَ وقت تلاءَ جي تري ۾ هليو ويندو آهي ۽

سائينس

رات جي اونداهيءَ ۾ مٿاڇري تي نڪري ايندو آهي. هي ننڍڙو جانور ٻن طريقن سان پاڻ جهڙا ٻيا پيدا ڪندو آهي. پاڻي ۽ کاڌي جي گهڻي مقدار هئڻ جي صورت ۾ سندس جسم پورن ٻن حصن ۾ ورهائجي ويندو آهي ۽ هڪ جيتا مڙي مان ٻه ننڍا جيتا مڙا ٺهي پوندا آهن جيڪي کاڌو کائي وڌا ٿيندا آهن. جڏهن تلاءَ جو پاڻي سڪي ويندو آهي ۽ کاڌو پڻ ڪٽي ويندو آهي ته ان وقت جيتامڙو گول ٿي هڪ سخت ڪل ۾ بند ٿي ويندو آهي. اها ڪل سندس ماس مان نڪرندڙ رس جي سخت ٿيڻ تي ٺهندي آهي. ان ڪل ۾ اندر رهي جيتامڙو ڪيترن ئي ندين حصن ۾ ورهائجي ويندو آهي. ان کانپوءِ ساڳي تلاءَ ۾ پاڻي اچڻ تي ٻيا هوا وسيلي ٻئي پاڻيءَ واري تلاءَ تائين ڪڇي وڃڻ تي پاڻيءَ ۾ سندس اها ڪل ٻري ويندي آهي ۽ ڪيترائي ننڍڙا جيتا مڙا ڪل مان نڪري پاڻيءَ ۾ ترندا رهندا ۽ کاڌو کائي وڌا ٿي ويندا آهن.

ڪوڙن پيرن وارن هڪ گهرڙن جي جماعت جو هڪ ٻيو فرد جيڪو بناوت ۾ جيتامڙي جهڙو آهي تنهنکي ”اينٽاميبا“ (Entamoeba) چوندا آهن. هي انسان ۽ ٻين وڏن جانورن جي جسم ۾ رهندو آهي. هن جانور جو هڪ خاص قسم (Entamoeba histolytica) انساني آنڊي ۾ زخم پيدا ڪندو آهي جنهن ڪري پيشش ٿي پوندي آهي. سندس ٻيا قسم جيتوئيڪ انسان جي جسم ۾ رهن ٿا پر خطري جهڙا نه آهن.

هن جماعت جي ڪن ٻين فردن جو جسم سخت کوپي (Shell) ۾ بند هوندو آهي. هنن کي ”فورامينيفيرا“ (Foraminifera) ڪوٺبو آهي. هي نون ٺهندڙ جبلن ۽ ٽڪرين لاءِ بنياد جو ڪم ڏيندا آهن. مصر جا پٿر به هنن جانورن جي کوپن مان ٺهيل پٿرن جا ٺاهيا ويا هئا.

آگسٽ ۱۹۷۷ع

نيڪال بلڪل جيتا مڙي (Amoeba) وانگر آهي. هو ڊگھائيءَ ۾ ٻن حصن ۾ ورهائجي ٿو جنهن ڪري هڪ مان ٻه يوگليٽا پيدا ٿي ٿي ٿي ٿي.


هن جماعت جو هڪ ٻيو فرد جيڪو انسان ۽ ٻين جانورن لاءِ نقصانڪار آهي تنهنجو نالو ”ٽراپنوسوما“ (Trypanosoma) آهي. هيءُ هڪ گھڙو آفريڪا ۾ هڪ موتمار بيماري (African Sleeping Sickness) پيدا ڪندو آهي. هي هڪ انسان کان ٻئي انسان تائين هڪ خاص قسم جي مک (Tse-tse fly) جي ذريعي پکڙبو آهي. ان کانسواءِ هن جماعت جا ٻيا به گھڻائي اهڙا فرد آهن جيڪي انسان ذات لاءِ نقصانڪار آهن.

۳- ڊگھڙن وارن وارا هڪ گھڙو:- هن جماعت جا فرد اهڙن تلائن ۾ ٿين ٿا جن ۾ حيواني سادو سڙندو رهي ٿو. سڀني فردن جي جسم جي چوڌاري ڊگھڙا وار (Cilia) ٿيندا آهن. هنن وارن جي اڳتي پوئتي چڙڻ سان جانور جو جسم پاڻيءَ ۾ ترندو آهي. هن جماعت جو هڪ عام فرد ”پاراميشيم“

(Paramecium) آهي. هن جي شڪل بوٽ يا چمپل جي تري جهڙي ٿئي ٿي. سندس جسم هڪ لچڪيدار گل سان ڍڪيل هوندو آهي. هن گل جي لچڪيدار هئڻ سبب جسم کي مڙڻ کانپوءِ سڌو ٿيڻ ۾ مدد ملي ٿي. سندس جسم جي چوڌاري ڊگھڙا وار ٿيندا آهن جيڪي هڪ اسپرنگ وانگر ويڙهيل هوندا آهن. ان ڪري پاراميشيم پاڻيءَ ۾ اسپرنگ وانگر ترندو آهي. اندازو لڳايو ويو آهي ته اهڙي هڪ جانور کي اٽڪل ۲۵۰۰ ڊگھڙا وار ٿيندا آهن. هن هڪ گھڙي

جانور جي زندگيءَ جا گھڻا عمل جيتا مڙي (Amoeba) وانگر ٿين ٿا. تنهن هوندي به ٻنهي جي وچ ۾ ڪجهه فرق ضرور آهي. پاراميشيم، جيتا مڙي کان مختلف ان ڪري آهي جو هن جانور ۾ کاڌي

۲- چھبڪ وارا هڪ گھڙو:- هن جماعت جي فردن کي خاص شڪل ٿيندي آهي ۽ هڪ ڊگھي ڏاڳي جهڙي چھبڪ (Flagellum) جي هئڻ سان سڃاتا ويندا آهن. اهو چھبڪ کين پاڻيءَ ۾ ترڻ وقت مدد ڏيندو آهي. هن جماعت جو هڪ عام فرد ”يوگليٽا“ (Euglena) آهي. خورد بينيءَ هيٺان ڏسڻ سان معلوم ٿيندو ته هن جانور جي جسم ۾ پوٽن وانگر سائو مادو (Chlorophyll) هوندو آهي جنهن جي مدد سان هو پنهنجو کاڌو پاڻ تيار ڪندو آهي. ان سبب ڪري نباتات جا ماهر هن کي هڪ پوٽو تصور ڪندا آهن. جيڪڏهن تفصيل سان ڏٺو ويندو ته هن جي جسم ۾ ڪي ماضي دار رطوبتون پيدا ٿين ٿيون جن جي مدد سان هو پاڻيءَ مان حاصل ڪيل کاڌو هضم ڪندو آهي. ان ڪري هي پوٽي جهڙيون خاصيتون رکندڙ




شڪل نمبر (۲) - يوگليٽا

جانور ليکيو وڃي ٿو. چھبڪ جي ويجهو کيس هڪ ڳاڙهو اک جو نشان (Eye Spot) ٿئي ٿو جيڪو روشنيءَ لاءِ حساس ٿئي ٿو ۽ اک جو ڪم ڏئي ٿو. ”يوگليٽا“ جي رهڻ جو هنڌ، ساه ڪڍڻ ۽ غلاظتن جو

عام طرح ٻوٽن ۾ ٿيندا آهن پر جانورن جي فقط هن جماعت جا فرد اهو غير جنسي طريقو اختيار ڪندا آهن. هن جماعت جا ڪي ٿورا فرد انسان لاءِ نقصانڪار آهن. انهن مان هڪ مليرياڻي مفت خور (Malarial Parasite) آهي جيڪو انسانن ۾ مليريا جو ڪارڻ آهي. پراڻي زماني ۾ سمجهيو ويندو هو ته مليريا هڪ قسم جي خراب هوا جي اٿڻ ڪري ٿئي ٿي. مگر موجوده تحقيق جي روشنيءَ ۾ اهو پتو پيو آهي ته هي بخار هڪ قسم جي هڪ گهرڙي جانور جي انساني رت ۾ داخل ٿيڻ ڪري ٿئي ٿو. هي هڪ انسان کان ٻي انسان تائين زهري مچر (Anopheles) جي ماديءَ جي معرفت پکڙجي ٿو. سندس زندگيءَ جو ڪجهه حصو پهريئين ميزبان (Primary Host) انسان ۽ باقي حصو سندس ٻئي ميزبان (Secondary Host) مادي زهري مچر جي جسم ۾ گذري ٿو. مادي زهري مچر کي هي ڪوبه نقصان نه ٿو رسائي. مليرياڻي مفت خور کي سندس زندگيءَ جي هر موڙ تي هڪ خاص شڪل ٿيندي آهي. هن کي ڪوڙا پير، ڇهڪ يا ڊگهڙا وار ڪونه ٿيندا آهن. کيس گهمڻ ڦرڻ لاءِ ڪا به شي ڪانه ٿيندي آهي ڇاڪاڻ ته مفت خور هئڻ ڪري کيس ڪيڏانهن به هلي وڃڻ جي ضرورت نه پوندي آهي. هن جي زندگيءَ جا ٻه چڪر ٿين ٿا، هڪ غير جنسي زندگيءَ جو چڪر (Asexual Life cycle) ۽ ٻيو جنسي زندگيءَ جو چڪر (Sexual Lifecycle)، جيڪو مادي زهري مچر جي جسم ۾ ٿئي ٿو. هن مفت خور هڪ گهرڙي جا ٽي قسم ٿين ٿا جيڪي ٽن قسمن جو مليريا بخار پيدا ڪن ٿا. پهريون اهو قسم جيڪو واري جو بخار (هڪ نه ٻي ڏينهن) پيدا ڪري ٿو. مليرياڻي مفت خور جو ٻيو قسم اهو آهي جنهن ڪري بخار ٻه ڏينهن ڇڏي ٽئين ڏينهن ظاهر ٿئي ٿو ۽ ٽئين قسم جو مليريا ٽي مفت خور بي قاعدي مليريا جو ڪارڻ آهي. هي بخار روز ايندو آهي ۽ هڪ ٻه ڏينهن ڇڏي به اچي سگهي ٿو.

ڪاٺڻ لاءِ هڪ کليل سوراخ هوندو آهي ۽ ان هضم ٿيل کاڌو ٻاهر ڪڍڻ لاءِ پڻ هڪ جدا سوراخ ٿيندو آهي. ڪوڙن پيرن جي بدران هن جانور جا ڊگهڙا وار کاڌي جا ذرڙا ڦاسائي ڪاٺڻ واري سوراخ (وات) ڏانهن اماڻيندا آهن. اهي کاڌي جا ذرڙا جسم ۾ پهچي کاڌي جا خال (Food Vacuoles) ٺاهين ٿا. پٿراميشيم ۾ ٻه سسندڙ خال (Contractile Vacuoles) ٿيندا آهن. هر هڪ خال جي چوڌاري سنهڙيون ناليون ٿين ٿيون جيڪي جسم جي مختلف حصن کان پاڻي ۽ غلاظتون اُٿي سسندڙ خال ۾ وجهن ٿيون. پوءِ اهو خال پرڄي وڃڻ تي هڪدم ڦاٽي پوي ٿو. سسندڙ خال کي پرڄڻ ۽ خالي ٿيڻ ۾ فقط ۱۵ سيڪنڊ لڳن ٿا. هي هڪ گهرڙو جيتاڙي وانگر ساهه کڻندو آهي.



شڪل نمبر (۳) - پٿراميشيم

انجي نسل جي واڌ جسم جي ويڪرائيءَ پير ٻن حصن ۾ ورهائجڻ رستي ٿيندي آهي جنهن جي نتيجي ۾ هڪ مان ٻه پٿراميشيا پيدا ٿيندا آهن. تنهن کان سواءِ هنن جانورن ۾ جنسي طريقي سان به نسل جي واڌ ٿئي ٿي. هن طريقي ۾ به پٿراميشيا پاڻ ۾ ملن ٿا ۽ سندن مرڪزن (Nuclei) جي ڏي وٺ کانپوءِ هڪ ٻئي کان جدا ٿين ٿا. ان کانپوءِ هر جدا ٿيل پٿراميشيم جي مرڪزن ۾ ڪجهه تبديليون ٿين ٿيون ۽ آخر ۾ هڪ پٿراميشيم منجهان چار ننڍا پٿراميشيا پيدا ٿين ٿا. پٿراميشيم کانسواءِ ڊگهڙن وارن وارا هڪ گهرڙا ٻيا به ڪيترائي آهن. جن مان ڪي انسان ۽ چوهارن جي جسم ۾ رهي کين نقصان پهچائين ٿا.

(۴) غير جنسي پڄڻ وارا هڪ گهرڙا :-

هن جماعت جا سڀ فرد مفت خور هوندا آهن ۽ پنهنجي زندگيءَ جي چڪر (Life-Cycle) ۾ نسل وڌائڻ لاءِ غير جنسي بچ (Spores) پيدا ڪندا آهن. اهڙا بچ

نفسيات جون حقيقتون، معلومات ۽ حاصلات جا طريقا

مشاهداتي جا طريقا (Methods of observation)

سائنسي علمن تي جڏهن تحقيق ۽ کوجنا ڪجي ٿي تڏهن ان لاءِ ڪيترائي طريقا اختيار ڪجن ٿا ۽ هر قسم جي کوجنا جا طريقا پنهنجي پنهنجي نوعيت جي اعتبار کان هڪ ٻئي کان جدا هوندا آهن. مگر کوجنا لاءِ مشاهدي ۽ آزمائش جي هجڻ جو اصول پنهنجي جاءِ تي مڃيل ۽ ساڳيو آهي. جيئن ته نفسيات جو علم، هينئر سائنس جي علمن مان هڪ علم ٿو سڏجي تنهنڪري هي علم به، انهيءَ اصول کان آڄو قرار ڏيئي نٿو سگهجي. ايترو ضرور آهي ته هرڪنهن علم جي تحقيق جي طريقه ڪار جو انحصار ان علم جي حقائق ۽ انهن حقائق جي نوعيت تي هوندو آهي. علم نفسيات ۾ ذهني اعمال جو جائزو ورتو ويندو آهي ۽ ذهني عمل اهڙيون خاص قسم جون حقيقتون آهن جن جو تجربو صرف اهو اڪيلو شخص ڪري سگهي ٿو جنهن جي ذهن سان ان عمل جو واسطو آهي. فرض ڪريو ته اسان کي هڪ اهڙي شخص جي ذهني عمل جو جائزو وٺڻو آهي جنهن کي پيٽ ۾ سور آهي. اهڙي شخص جي منهن ۾ ٺهائڻ سان اهو ته معلوم ڪري سگهيو ته هن کي ڪا تڪليف آهي. سندس پيٽ ۾ هٿن وجهڻ ۽ مروٽن کائڻ سان اهو احساس ته ٿي سگهندو ته هن کي پيٽ ۾ سور آهي، ليڪن هن کي ڪيتري تڪليف آهي ان جو صحيح اندازو صرف اهو شخص پاڻ ئي لڳائي سگهندو. ڪو تقرير ڪندڙ يا ليکڪ پنهنجي احساسات، ميلانات ۽ ارادن کي تحرير يا تقرير ذريعي ظاهر ڪري ٻين تائين ضرور پهچائي سگهي ٿو ۽ پنهنجي ذهني عمل کان ٻين کي واقف ڪري سگهي ٿو، مگر ان هوندي به اهي خيال، اهي جذبات ۽ اهي لاڙا صرف انهيءَ شخص جا ئي سگهن ٿا ۽ اهو پاڻ ئي انهن جو صحيح اندازو لڳائي سگهندو. اهڙي قسم جي تجربي ۽ مشاهدي کي اندر جو مشاهدو يا مشاهدو باطن (Introspection) چئبو آهي.

ٻراڻي دور جي نفسيات جي ماهرن وٽ نفسيات جي مطالعي لاءِ فقط اهو هڪڙو ئي طريقو يعني پنهنجي اندر جو مشاهدو، تحقيقات جو مڃيل ذريعو هو. جيتوڻيڪ اهو آگسٽ ۱۹۵۷ع

نفسيات جي ماهرن، هن علم جي تحقيق جي سلسلي ۾ به اهي ساڳيا طريقا اختيار ڪيا آهن، جيڪي ٻين علمن جي تحقيق وقت اختيار ڪيا ويندا آهن. يعني نفسيات جون حقيقتون روزمره جي زندگيءَ مان حاصل ڪيون وينديون آهن. جهڙيءَ طرح ارضيات جا عالم زمين جي ورقن ۽ تبديلين کي نظر ۾ رکي پوءِ زمين جو مطالعو ڪندا آهن، ساڳيءَ طرح نباتات جا ماهر وري عام ٻوٽن ۽ وڻن جو مشاهدو ۽ مطالعو ڪندا آهن، اهڙيءَ طرح نفسيات جا ماهر زندگيءَ جي عام حقيقتن جو جائزو وٺندا آهن ۽ ان مان نتيجا اخذ ڪري ڪي اصول مرتب ڪندا آهن، انهن عام حقيقتن مان هيٺيون حقيقتون وضاحت جو ڳئون آهن: (۱) اسان جا پنهنجا ذهني اعمال، خيالات ۽ خواهشات وغيره، جن جو اسين پنهنجي ذهن ۾ مشاهدو ڪري سگهون ٿا.

(۲) اسان جا پنهنجا ۽ ٻين ماڻهن جا ڪم، چرچيون ۽ لڇڻ، جن جو تعلق ذهني علمن سان هجي. مثلاً، اسين هڪ ڪلندڙ ۽ مشڪندر مهاندي کي ڏسي اهو اندازو ڪري ٿا وٺون ته هي ماڻهو نهايت خوش آهي.

(۳) اهڙين تخليقن جو مطالعو، جن ۾ مصنف، شاعر ۽ مصور جي ذهن جون جهلڪون موجود هجن.

(۴) گفتگو، خط ۽ ڪتاب، جن ۾ ماڻهن پنهنجي ذهني اعمال جي مظاهرو ڪيو هجي.

(۵) اهي حقيقتون جيڪي نفسيات سان واسطو رکندڙ علمن، جهڙوڪ: علم اللسان (Phlology) علم الابدان (Physiology) ۽ علم الانسان (Anthropology) جي ماهرن وٽ آزمائيل ۽ سچيون هجن.

هڪ لحاظ سان ته ڪائنات جون ٻيئي قسمن جون حقيقتون، نفسيات جو مواد قرار ڏيئي سگهجن ٿيون. سڀ ڪنهن شيءِ جو علم ”چال جي عمل“ سان حاصل ٿئي ٿو ۽ چال جو عمل هڪ ذهني عمل آهي، جنهن جو سنئون سڌو تعلق، نفسيات سان آهي. تنهنڪري ڪائنات جون سڀ شيون ۽ حقيقتون جيڪي اسان جي تجربي يا شعوري دنيا ۾ اچي سگهن ٿيون، سي نفسيات جي مطالعي لاءِ بهترين مواد آهن.

سائنس

اينداسون ته انهن تي ڪهڙو اثر پوندو، ان جو به اندازو ڪري سگهون ٿا.

(م) عمر جي هر دور ۾ اسان تي جدا جدا حالتون، تڪليفون ۽ وقتن ڪهڙو اثر ٿئي ڪيو، ان کي آڏو رکي اهو سوچي سگهون ٿا ته انهن ساڳين حالتن جو ساڳي عمر وارن ماڻهن تي ڪهڙي قسم جو اثر پئجي سگهي ٿو. نفسيات جي ماهرن اندر جي نفسيات جا جتي فائدا بيان ڪيا آهن اتي ڪن نقصن جو به ذڪر ڪيو آهي. انهن مان چند نقص هي آهن:

(۱) پنهنجي اندر جي نفسيات جي مطالعي بعد جيڪي نتيجا ظاهر ٿين ٿا انهن جو تعلق عام نفسيات سان نه هوندو آهي، اهڙيءَ طرح انهي طريقي مان ظاهر ٿيل نتيجا فردن جي ذاتي ذهن جي تاريخ تي پوندا. (۲) هن طريقي موجب صرف بالغ انسان ئي پنهنجو مشاهدو ڪري سگهي ٿو باقي ٻار، ديوانا ۽ ٻيا اهڙي قسم جا ماڻهو ته هن سلسلي ۾ ڪجهه به ٻڌائي نه سگهندا. ان ڪري سندن خارجي ڪردار جو وڏو مشاهدو ڪرڻو پوندو.

(۳) نرم شعور، نجي شعور ۽ لاشعور جو مطالعو هن طريقي موجب ٿي نٿو سگهي.

(۴) هن طريقي ۾ سڀ کان وڏي خاسي هيءَ آهي جو ڪنهن به عمل وقت جڏهن اسان اندر جو مطالعو شروع ڪنداسون تڏهن اهو عمل تبديل ٿي ويندو. ان ڪري صحيح نتيجي جو ظاهر ٿيڻ مشڪل ٿي پوندو.

(۵) پنهنجي ذهني مطالعي وقت به ذهن درڪار آهي، هاڻي به ذهن هڪ شخص ۾ ڪٿان ايندا جو هڪ ذهن ٻئي جو مطالعو ڪري سگهي.

انهن نقصن هوندي به نفسيات جي ماهرن ڪجهه رستا ڏسيا آهن جن تي عمل ڪرڻ سان اهي خاميون ڪنهن حد تائين دور ڪري سگهجن ٿيون. هن سلسلي ۾ هيٺيون ڳالهون خيال ۾ رکي سگهجن ٿيون:

(الف) غير جانبداريءَ سان مشاهدو ڪرڻ.

(ب) پوري توجه سان مشاهدو ڪرڻ.

(ج) تازگيءَ ۽ سکون جي حالت ۾ مشاهدو ڪرڻ.

(د) ساڳيءَ حالت جو ذري ذري مشاهدو ڪرڻ.

آگسٽ ۱۹۷۳ع

طريقو ذاتي شعوري ۽ ذهني عمل جي مشاهدي لاءِ غلط نه آهي مگر هتي سوال ٿو اٿي ته نفسيات جي سائنس ۾ صرف پنهنجي ذهني عمل جو مشاهدو ڪافي نه آهي، هتي نه پن جي ذهني عملن جو اندازو به ڪرڻو آهي. ان حالت ۾ هي طريقو ايترو ڪار آمد ثابت نه ٿيندو. پن جي ذهني عملن ۾ مشاهدي لاءِ نفسيات تي تحقيق ڪندڙن کي انهن جي ڪردار ۽ عملن جو مشاهدو به ڪرڻو پوندو آهي. تنهنڪري نفسيات جي تحقيقات لاءِ به خاص طريقا ڪم آڻڻ ضروري آهن. جن کي اسان نفسياتي زبان ۾ (۱) مشاهدو باطن يعني پنهنجي ذهن جو اندروني مشاهدو ۽ (۲) پن جي ذهن جي خارجي مطالعي جو مشاهدو چوندا سون.

(۱) پنهنجي اندر جي نفسيات يا داخلي مشاهدو (Introspection or Subjective)

نفسيات جو هي طريقو نهايت قديم آهي. پنهنجي عمن کي چڱيءَ طرح ڏسڻ ۽ سمجهڻ جو نالو آهي ”اندر جي نفسيات“ يا ”داخلي مشاهدو“. مثال طور اسان کي ڪنهن وقت پيٽ ۾ يا مٿي ۾ سور پيو ان وقت اسان جي ڇا حالت هئي ۽ ڪهڙا ڪهڙا جذبات پيدا ٿيا هئا، يا ڪنهن حساب ڪيڻ وقت يا ڪنهن نظر ياد ڪرڻ وقت اسان جي ذهني حالتن جو ڪهڙو انداز هو يا ڪنهن نئين ڪم جي رٿا وقت ڪهڙي قسم جي ذهني ڪشڪش ۽ مبتلا هئاسون. اهي سڀ حقيقتون ۽ حالتون اندروني مشاهدي سان تعلق رکن ٿيون جنهن کي پن لفظن ۾ ”اندر جي نفسيات“ چيو وڃي ٿو.

اندروني نفسيات واري طريقي مان هيٺيان فائدا حاصل ٿين ٿا:

(۱) هي طريقو اسان کي ذهني ڪيفيتن کان سنئون سڌو ۽ جلد واقف ڪري ٿو، ان ڪري اسان پنهنجي ذهني عملن کي چڱيءَ طرح سمجهي سگهون ٿا.

(۲) جدا جدا حالتن هيٺ اسان تي ڪهڙا اثر ٿين ٿا ۽ ڪهڙيون ڪيفيتون پيدا ٿين ٿيون انهن کي آڏو رکي پن جو به مشاهدو ڪري، ان موجب نتيجا اخذ ڪري سگهون ٿا.

(۳) اسان سان هر معاملو ۾ پن جي جيڪا روش آهي، ان جو اسان تي ڪهڙو اثر پوي ٿو، ساڳيءَ حالت ۾ اسان جيڪڏهن پن سان اهڙي حالت سان پنهنجي

سائنس

به آهن جيڪي نفسيات جي طالب العلم لاءِ راه ۾ رندڪون پيدا ڪري سگهن ٿيون. نفسيات جي استادن انهن مان چند تڪليفن ۽ انهن کي ٺارڻ لاءِ هيٺيان اشارا ڏنا آهن:

(الف) خارجي مشاهدي وقت ڪردار جي پيمت پنهنجي حالات سان ڪمي آهي جيڪا معياري نه آهي ڇو ته ساڳئي عمل جو محرڪ اسان جي ڌيان ۾ ڪو هڪ واقعو آهي ته پوءِ اهو ضروري نه آهي ته جنهن ساهواري يا انسان جي عيان جو اسان خارجي مشاهدو ڪري رهيا آهيون ان تي به ساڳئي قسم جي واقعي جو اثر هجي. هن معاملي کي سلجهائيندي ”لائڊمارگن“ (Lloyd Morgan) چوي ٿو: ”جيڪڏهن ڪنهن حيواني ڪردار جي ٻن نمونن سان تشريح ڪري سگهجي، جن ۾ هڪ نمونو ڪنهن ادنيٰ (lower) ذهني عمل تي دلالت ڪري ۽ ٻئي نموني تحت ڪنهن مٿاهين عمل جو جائزو ورتل هجي، ان حالت ۾ پهرئين نموني موجب حاصل ڪيل نتيجا ذهن ۾ رکجن ۽ انهن کي اصول جي صورت وٺائجي.“

(ب) خارجي مشاهدي وقت اسين نه صرف ڪن حالتن ۾ ڪردار جي غلط ترجماني ڪري سگهون ٿا پر ڪن حالتن ۾ پڻ جي ڪردار کي سمجهي به نٿا سگهون، ڇو ته ٻار، لاسٽريٽ، پڪي جوان، ڪرڙوڍ ۽ ٻڍي انسان جي عملي جذبات ۾ وڏو فرق آهي. اهڙين حالتن هيٺ ڪنهن به قسم جو صحيح اندازو لڳائڻ مشڪل آهي. هن صورت ۾ ڪجهه نه ڪجهه ”اندروني نفسيات“ ڪم ڏيئي سگهي ٿي، ڇو ته مشاهدو ڪندڙ انهن منزلن مان ڪي منزلون ٻارن به طئي ڪري آيو آهي ان ڪري انهن جي ياد ڪرڻ ۽ انهن سان پيمت ڪرڻ سان ڪافي حد تائين صحيح نتيجا ڪڍي سگهجن ٿا.

(ج) اسان جا خيال ۽ احساس ظاهر ٿيڻ کان سواءِ پسرده به جاري رهي سگهن ٿا ۽ رهندا آهن. ان ڪري اهي مشاهدي ۾ اچي نٿا سگهن. ان جو مطلب اهو ٿيو ته هن حالت ۾ خارجي مشاهدو ڪابه معنيٰ ڪونه ٿو رکي. هن مختصر بحث جو نتيجو هي نڪتو ته رڳو خارجي مشاهدو نفسياتي تجزيه لاءِ ڪافي نه آهي.

تجربو (Experiment)

تجربات مان اهي طريقا مراد آهن جيڪي سائنس دان اصولن تي مبني هجن. نفسيات جي معاملي ۾ نتيجن اخذ ڪرڻ لاءِ صرف اهڙا عالم تجربا ڪري سگهن ٿا جن کي آگسٽ ۱۹۰۳ع

(د) هڪ ٻئي سان گڏجي ۽ تبادلہ خيالات ذريعي مشاهدو ڪرڻ.

(د) واقعي يا حالت جي گذري وڃڻ بعد، يادگيري ذريعي مشاهدو ڪرڻ.

() خارجي مشاهدو (External or objective observation)

خارجي مشاهدي وقت اسين ٻين ماڻهن ۽ ساهوارن جي حالت جو اندازو لڳائيندا آهيون. مثلاً هڪ ماڻهوءَ جون انگريون کڙيمون، ۽ منهن جو رنگ به ڳڙهو ٿي ويو آهي ۽ ڳالهائڻ وقت سندس چپ به ڏڪڻ پيا نه ڪندڻ سمجهي وينداسون ته هي تمام گهڻو چڙبل آهي. ڇو ته ڇڙ جي وقت اسان جو به اهو حال ٿي ويندو آهي. سچ پچ ته هن طريقي موجب به خارجي مشاهدي مان نتيجي ڪڍڻ لاءِ اندروني نفسيات جو سهارو وٺڻو پيو. ان جو اهو مطلب ڪونه ٿيو ته خارجي مشاهدو ڪارگر طريقو نه آهي. بلڪ حقيقت هيءُ آهي ته خارجي مشاهدي جا نتيجا ”اندروني يا اندر جي نفسيات“ جي نتيجن جي پيمت بعد ئي ظاهر ٿي سگهن ٿا.

”خارجي مشاهدي“ جي فائدين تي نفسيات جي ماهرن جدا جدا وقتن تي تبصره ٻڌي ڪيا آهن. انهن تبصرون کي پڙهجي ته معلوم ٿو ٿئي ته هنن صاحبن، هن طريقي جا جيڪي فائدا بيان ڪيا آهن انهن ۾ هي مکيه آهن:

۱- هڪ ذهن پنهنجي حالت جو ته مشاهدو ڪري سگهي ٿو، پر ٻين جي ذهن جو مشاهدو ڪرڻ ان لاءِ ممڪن نه آهي. ان جي مقابلي ۾ ٻئي جي اعمال يا ڪردار جو مشاهدو ٿي ڪري سگهجي ٿو. ان ڪري ”خارجي مشاهدو“ نفسيات جي طالب العلم لاءِ زياده آسانيون پيدا ٿو ڪري.

۲- خارجي مشاهدي جي وسيلي، ٻارن ۽ جانورن جي نفسيات ۽ ذهني ارتقا جو اندازو لڳائڻ سولو ٿيو ٿو پوي.

۳- هن طريقي موجب ”نفسات جو علم“ سائنسي علوم جي حيثيت حاصل ڪري چڪو آهي ۽ ان موجب ڪافي عمومي قانون ۽ نتيجا حاصل ٿي سگهن ٿا، يعني خارجي مشاهدو تجربن لاءِ اهم هٿيار آهي.

۴- هن موجب ڪيترائي آزمائشي طريقا (Testing Methods) تيار ڪيا ويا آهن، جن نفسيات جي علم لاءِ هڪ وسيع ميدان هموار ڪري ڇڏيو آهي.

جيتوڻيڪ هن طريقي جا ڪيترائي گڻ ۽ فائدا بيان ڪري سگهجن ٿا ان هوندي به، ڪي اهڙيون مشڪلاتون سائنس

حياتي ۽ ٻيڻ آيل واقعات جي مطالعي وارو طريقو (Case History Method)

هي طريقو تدريجي طريقي کي زياده ويجهو آهي. دراصل هي طريقو نفسياتي معالج استعمال ڪندا آهن ان ڪري هن کي ڪلينيڪل طريقي (Clinical Method) به چوندا آهن. هن طريقي موجب نفسيات جي مطالعي لاءِ ٻن قسمن جون راهون اختيار ڪيون آهن. هڪ ته خود انهيءَ ماڻهو کان سوال جوابن ذريعي سندس ذهني الجھن جي معلومات حاصل ڪرڻ ۽ مليل جوابن جي روشنيءَ ۾ مريض جي نفسيات جي تشخيص ۽ تحليل ڪرڻ ۽ ٻي راهه آهي نفسياتي مريض جي تعلق وارن ساڻهن کان هن بابت سوالن رستي معلومات حاصل ڪرڻ. پهرين تجربو ڪيل راهه موجب مريض کان ڪجهه ڳالهيون صحيح معلوم ٿينديون ۽ ڪي ڳالهيون هو لکائيندو ڇو ته اهي ڳالهيون اهڙيون هونديون جيڪي هو ظاهر ڪرڻ کان گھرنديون. جيتوڻيڪ اهڙي ئي حالت ۾ مريض کي سوالن ۽ ڇنڊڻ کان اها خاطري ملندي آهي ته تنهنجون ٻڌايل ڳالهيون پوريءَ طرح راز ۾ رکيون وينديون، پر تنهن هوندي به هو انهن ڳالهين جا ڪيترائي ڀاڱا ظاهر ڪين ڪندو آهي. ٻيءَ رٿا موجب وري هي خطرو ٿو رهي ته مريض جا واسطيدار جن کان ڪي ڳالهيون معلوم ڪرڻيون آهي سي جيڪي ڪجهه ٻڌائين ٿا يا ٻڌائيندا تن ۾ ڪيترو حصو برابر آهي ۽ صحيح روشني ٿو وڃي. اهي ڳالهيون ڪي نفسيات جا ماهر چون ٿا ته هن طريقي ۾ ٻئي رستا اختيار ڪجن. انهن ذريعي حاصل ٿيل معلومات کي ڀيڻي ڏسجي ۽ جيڪي حقيقتون ٻنهي ذريعي هڪ جهڙيون ملن انهن تي بنياد رکي مريض جي علاج لاءِ نسخو تيار ڪجي يا مشورو ڏجي.

شمارياتي طريقو (Statistical Method)

هن طريقي جو تعلق معياري ۽ مقداري پيمائشن سان آهي، جن جي مدد سان اسان سراسري يا سراسريءَ کان گهٽ يا وڌ جو اندازو لڳائي اهو معلوم ڪري سگهون ٿا ته ڪنهن فرد يا گروهه جي ڪردار جي بگاڙ يا تعمير ۾ حالات جو ڪيترو هٿ آهي. مثلاً اسان ڏوهن ۽ سڃاڻيءَ جي هڪ ٻئي سان تعلق ڳولڻ لاءِ هيءَ طريقو استعمال ڪري هن نتيجي تي پهچي سگهون ٿا ته ڏوهه ۽ افلاس جو تعلق اتفاقي آهي يا حقيقي ۽ جيڪڏهن حقيقي آهي ته ڪيتريءَ حد تائين؟

(بقايا - ڏسو صفحو ۲۴)

انهيءَ معاملي ۾ مڪمل دسترس هجي، ٻيءَ حالت ۾ نتيجا درست نڪري نه سگهندا. اهي تجربا ۽ انهن ۾ ظاهر ٿيل نتيجا ان حالت ۾ سائنٽفڪ سڌجڻ ۾ ايندا جڏهن سندن اطلاق هر ڪنهن قسم جي ذهن تي ٿي سگهي. ظاهر آهي ته اهڙا معياري نتيجا تڏهن نڪري سگهندا جڏهن تجربن لاءِ استعمال ڪيل طريقا معياري هوندا.

هن ڳالهه جي اظهار ڪرڻ ۾ ڪابه هڪ هٿ نه گهرجي ته ٻين سڀني علمن جي تجربن کان نفسيات جدا تجربا نهايت مشڪل آهن. مثلاً: هڪ ماهر نفسيات ڪنهن شخص کي تجربن طور آڏور کڻي ٿو ۽ ان کي چند هدايتون ڏيئي ڪنهن ڪتاب جي پڙهڻ لاءِ چوي ٿو ۽ پاڻ ڪاغذ ۽ قلم کڻي هيٺيون ڳالهيون نوٽ ٿو ڪري: (۱) پڙهڻ جي رفتار (۲) تلفظ جي اداڪاري (۳) خارجي ڪردار (۴) سوالن جي ذريعي ذهني حالات جو جائزو وغيره. نفسيات جي زبان ۾ هن کي ادراڪ جي وسعت (Span of Apprehension) جو تجربو چوندا آهن. هن تجربن مان اسان کي هيءَ اندازو لڳائڻ آسان ٿيو هجي ته ادراڪ جي هڪ عمل ۾ اسان ڪيترين حقيقتن کي ذهن ۾ آڻي سگهون ٿا.

تدريجي طريقو (Genetic Method)

هن طريقي موجب ذهن جو ابتدائي حالتن کان وٺي انجي ترقي پذير دور تائين ترتيبوار مطالعو ڪيو وڃي ٿو. ماهرين نفسيات هي ثابت ڪيو آهي ته اڄوڪو انساني ذهن جيڪو ٻاروتن کان ٻڌايي تائين جدا جدا منزلون پار ٿو ڪري، اهو سموريءَ انسانيت جو عڪس آهي. يعني ابتدائي دور جا انسان جيڪي سوچيندا هئا اهو اڄوڪو ٻار سوچي ٿو. ان کان پوءِ انسانيت جيڪي به دور ڏٺا ۽ ماڻيا آهن، ۽ سندس ذهن جيڪا بتدريج ترقي ڪئي آهي، پار ڪي به اهي جملي منزلون پار ڪرڻيون پون ٿيون. نفسيات جا ماهر هن تجربن لاءِ ورهين جا ورهيه جهنگلي ۽ اڻ سڌريل ماڻهن سان وڃي گذريا آهن ۽ اتي سندن ذهني مدارج جو مطالعو ڪيو اٿن، ان بعد ڪي نوس نتيجا ڪڍي سگهيا آهن.

هن طريقي موجب ٻارن، غير مهذب انسانن ۽ حيوانن جي نفسيات جو مطالعو ڪرڻ نهايت آسان ٿي پيو آهي ۽ سندن جبلتن (Instincts) جي پوري پروڙ حاصل ٿي سگهي آهي.

يائس

ذیابیطس

ذاتیاتی جائزو

ڪن ماڻهن جو خيال آهي ته ذیابیطس هڪ نئون مرض آهي ۽ ان جو تعلق موجود معاشري سان آهي، پر حقيقت ان جي ابتڙ آهي.

ذیابیطس جو آغاز انسان جي معاشرتي زندگيءَ سان گڏوگڏ شروع ٿيو. اڄ کان پنهنجيهم سو ورهيه پهرينائن (عيسوي سن کان پنڌرهين سو ورهيه اڳ) حضرت ابراهيم عليه السلام جي زماني جي، وڻ جي پنن تي لکيل چٽي ملي آهي جنهن تي اهڙي قسم جي بيماريءَ جو ذڪر ڪيل آهي. هن مان پتو پوي ٿو ته ذیابیطس جو وجود ان زماني ۾ به هو. مسيحي دور جي ابتدا ۾ (سن ۵ کان ۷ قبل مسيح) سيلسوس (Celsus) نالي هڪ يوناني طبيب ٿي گذريو آهي جنهن نه صرف هن مرض جي تشخيص ڪئي هئي پر ان تي نالو به ڏنو. ذیابیطس جو لفظ هڪ يوناني لفظ مان ورتل آهي جنهن جي معنيٰ آهي ”اخراج“ ۽ ميلائيٽس (Mellitus) لاطيني لفظ آهي جنهن جي معنيٰ آهي ”ماڪي“. ان لحاظ کان هن بيماريءَ کي ”Diabetes Mellitus“ چيو وڃي ٿو، جنهن جو مفهوم آهي جسم مان ڪنڊ جو خارج ٿيڻ.

آرٿيٽس (Arcatacus) نالي هڪ رومي طبيب لکي ٿو ته: ”ذیابیطس نالو آهي اهڙيءَ بيماريءَ جو جنهن ۾ جسماني گوشت ۽ عضوا گري پيشاب جي ذريعي خارج ٿي ضايع ٿين ٿا. هن بيماريءَ ۾ مريض جي جسم ۾ هر وقت پاڻي ٺهندو رهي ٿو ۽ اهڙي رفتار سان نڪرندو رهي ٿو جيئن ڪوئل گولي ڇڏجي. ان جو اثر اهو ٿئي ته مريض جو جسم جلدي سڪي وڃي ٿو ۽ سندس جيئن جنجال ٿيو پوي. هن حالت ۾ مريض تمام جلد مري وڃي ٿو. مريض کي هر هر اڃ لڳي ٿي ۽ هو ضرورت کان وڌيڪ پاڻي پيئندو رهي ٿو ۽ جيئن ته پيشاب هر وقت ٺهندو رهي ٿو ان ڪري اهو ممڪن ٿي نه هوندو آهي ته جسم ۾ پاڻي جي ٺهڻ کي روڪي سگهجي. ذیابیطس ڪري ٻيون به ڪيترن ئي شديد بيماريون ٿين ٿيون ۽ اهو خيال ڪيو ٿو وڃي ته گردي ۽ مثاني جي خرابي ڪري هيءَ بيماري شروع ٿئي ٿي.“

سائنس

گالين (Galen) (سن ۱۳۰ کان ۲۰۰ ع تائين) نالي هڪ يوناني طبيب، جنهن کي تجرباتي طب جو ابو سڏيو وڃي ٿو، بيان ٿو ڪري ته ذیابیطس گردن جي اهڙي ڪمزوري آهي جنهن ۾ گردن پاڻي روڪڻ جي صلاحيت ڇڏي ٿا ڏين. هي حڪم اهو به ٻڌائي ٿو ته ذیابیطس جي مريضن جي پيشاب ذريعي خارج ٿيل پاڻي ۾ جسماني استعمال دوران ڪابه تبديلي رونما نٿي ٿئي.

سن ۲۲۹ ع ڌاري لکيل چيني ادب ۾ هڪ اهڙي ڪيفيت جو ذڪر ڪيل آهي جنهن ۾ ماڻهو جي جسم ۾ موهيڙا نڪرن ٿا، کيس پيشاب تمام گهڻو اچي ٿو ۽ مٺي هئڻ سبب ان کي ڪتا چٽين ٿا. ڇهين صدي عيسوي ۾ هندستاني طبيبن ذیابیطس جو ذڪر ”مدهوماع“ (ماڪي جو پاڻي) جي نالي سان ڪيو آهي ۽ ان کي وڏن وڏن ماڻهن ۾ اميرن جي بيماري قرار ڏنو آهي. هنن جو چوڻ هو ته هي بيماري ڇانورن، اٿي، مثان ۽ ميڊي جي گهڻي استعمال ۽ گهڻي کائڻ ڪري پيدا ٿئي ٿي. انهن طبيبن اهو به ٻڌايو آهي ته هن بيماري ۾ پيشاب جو رنگ پاڻي جهڙو ٿيندو آهي ۽ ان جو ذائقو ڪمند جي رس جهڙو ٿيندو آهي.

ابو سينا (۱۵۳۷-۹۸۰) جيڪو پنهنجي وقت جو طبيب اعظم هو، اها دعويٰ ڪئي هئي ته ذیابیطس بذات خود به پيدا ٿي سگهي ٿي ۽ ٻين ڪن بيمارين جي اثرن ڪري به پيدا ٿئي ٿي. هن حڪم ذیابیطس جي وضاحت جنهن طريقي سان ڪئي آهي ان جي اڄ به تقليد ٿي رهي آهي. هن ٻڌايو ته هن بيماريءَ ۾ سخت بڪه ۽ اڃ لڳندي آهي. اعصابي ٽڪاوت جي شڪايت ۽ جنسي ڪمزوري ٿيندي آهي. بيمار ماڻهو جي مرضي هوندي آهي ته هو ڪوبه ڪم نه ڪري. ابو سينا جو خيال هو ته هن بيماريءَ جو ڪم ٿيڻ جو اثر پوي ٿو. اهو عين ممڪن آهي ته ابو سينا درونزد ذیابیطس (Bronzed Diabetes) جو ذڪر ڪيو هجي جيڪا ذیابیطس کان مختلف بيماري آهي. پر هن بيماري ۾ به پيشاب ۾ ڪنڊ اچي ٿي. ابوسينا جي مشاهدي مطابق ذیابیطس جي مريض جو پيشاب جڏهين بخار ٿي اڏامي وڃي ٿو ته آخر ۾ ماڪي جهڙي شي رهجي ويندي آهي ۽ ڪن حالتن ۾ ناسور، گبنگرين ۽ سلهه هن بيماري ۾ وڌيڪ پيچيدگيون پيدا ڪن ٿيون.

يورپ ۾ سترهين صدي عيسويءَ ۾ ولس (Wills) سڀ کان پهريون ڊاڪٽر هو جنهن اهو دريافت ڪيو

رھيو. هن سائنسدان ھمت نہ هاري ۽ پنهنجي تجربن جو ذڪر پنهنجي ھڪڙي ساٿي وان ميرنگ (Von - Merring) سان ڪيو، جيڪو هنن تجربن جي نتيجن کان تمام گهڻو متاثر ٿيو. هنن ٻنهي صاحبن وڌيڪ تجربا شروع ڪري ڏنا ۽ هڪ اهڙي ڪٽي جي لبلبي ٻاهر ڪڍي جنهن جو کاڌو مقرر ٿيل هو ۽ ان جي پيشاب جي مقدار ۽ وقتن جي به اڳواٽ ئي خبر هئي. لبلبي نڪرڻ بعد هن ڪٽي تي به اڳين ڪتن جهڙو اثر ٿيو يعني ان کي ذبابيطس ٿي پئي ۽ اهو بيهوش ٿي مري ويو.

سن ۱۸۸۸ع ۾ هنن ٻنهي سائنسدانن کي ان ڳالهه جي چڱي طرح خبر پئجي ويئي ته ذبابيطس ڪيئن ٿي پيدا ٿئي. ليڪن ان جو علاج ڪيئن ڪجي، اها ڳالهه سندن سمجهه کان ٻاهر هئي. پنهنجي جدوجهد جاري رکندي انهن هڪ ٻئي ڪٽي جي لبلبي ڪڍي پوءِ ان کي ٻئي جانور جي لبلبي ڪارائي. انهن جو خيال هو ته هن ڪٽي جي لبلبي ڪڍي ويئي آهي ان ڪري لبلبي ڪارائڻ سان اهي علامتون ختم ٿي وينديون جيڪي لبلبي ڪڍڻ سان پيدا ٿيون هيون، پر هن تجربي ۾ کين ڪابه ڪاميابي حاصل ڪانه ٿي ۽ هي ڪتو به مري ويو. ٻنهي سائنسدانن مايوس ٿي وڌيڪ تجربا ڪرڻ ڇڏي ڏنا.

سن ۱۸۹۰ع ۾ مٿي بيان ڪيل سائنسدانن جي شايع ڪيل رپورٽ واسيل (Vassale) نالي هڪ ٻئي طبيب جي دل ۾ شوق پيدا ڪيو ۽ هن انهي موضوع تي تحقيق شروع ڪئي. هن ڪٽي جي لبلبي ٽم ڪانه ڪڍي پر ڪٽي جو ٻيٽ ڦاڙي لبلبي کان آڏن تائين ويندڙ نلي کي ڏاڳي سان ٻڌي ڇڏيو ته جيئن لبلبي جي رطوبت آڏن تائين نه وڃي سگهي. سندس خيال هو ته ائين ڪرڻ سان ذبابيطس شروع ٿي ويندي. پر ائين نه ٿيو ۽ ڪتو صحتمند رھيو. پهرين ٻنهي ڪتن ۽ پنهنجي ڪٽي جو مقابلو ڪري هن اهو اندازو لڳايو ته لبلبيءَ ۾ ٻه مختلف رطوبتون پيدا ٿين ٿيون. پهرين آڏن ۾ هاضمي لاءِ عرق پهچائي ٿي ۽ ٻي جيڪا ذبابيطس کي ڪنٽرول ڪري ٿي. واسيل جي هن تجربي کيس حقيقت جي نه گهڻو ويجهو پهچايو پر لبلبيءَ جي ٻئي قسم جي رطوبت ۽ ان جي ڪارگذاري هن لاءِ اڃا تائين هڪ معمول بنيل هئي.

واسيل هن تجربي کي ڪيترن ئي ٻين سائنسدانن وري ڪري ڏنو. انهن ڪٽي جي لبلبيءَ کي ڪجهه وقت لاءِ ٻڌي ڇڏيو، ان بعد ان کي ٻاهر ڪڍي خوردبينيءَ

تہ ذبابيطس جي مريض جي پيشاب جو ڌاڻقو مٿو ٿيندو آهي. بروئر (Bruner) سن ۱۸۸۲ع ۾ تجربي وسيلي ٻڌايو ته جسم مان لبلبي ڪڍي ڇڏي ته سخت اڃ لڳندي ۽ پيشاب تمام گهڻو ايندو. اهڙا تجربا هن جانورن تي ڪيا هئا. پر ٻن سون سالن تائين بروئر جا مشاهدا ماڻهن نه سمجهيا. ڊابسن (Dobson) سن ۱۸۷۶ع ۾ اهو ثابت ڪيو ته هن بيماريءَ جي مريض جو رت مٿو ٿيندو آهي ۽ پيشاب ۾ کنڊ جي موجودگيءَ ڪري خمير پيدا ٿي وڃي ٿو. ڪولي (Colley) سن ۱۸۸۸ع ۾ سڀ کان پهريائين ذبابيطس جي مرض جي تشخيص ڪئي ۽ پيشاب ۾ کنڊ جي موجودگيءَ جو سبب ٻڌايو.

ان کانپوءِ هڪ جرمن طبيب لينگرهينز (Langerhans) ۱۸۶۹ع ۾ لبلبي جو معائنو ڪري ٻن قسمن جا خانا دريافت ڪيا. هڪ قسم جي خائن کي ”منتشر گروه“ (Islets of Langerhans) چئجي ٿو. اهو خيال ڪيو ويو ته ”Island Cells“ جو عرق تيار ڪري ذبابيطس جي مريض کي ڏنو وڃي ته مرض ئي ڪنٽرول ٿي ويندو. اهو سوچي تازن ڪمل جانورن جون لبلبيون ڪڍيون ويئون ۽ انهن جو قيمون ڪري سندن عرق ڪڍيو ويو ۽ ذبابيطس جي بيمارن کي پياريو ويو. معلوم ٿيو ته ان عرق ڪوبه فائدو نه ڏنو.

اوڻويهين صدي جي آخري ڏينهن ۾ منڪوسڪيءَ (Minkowski) اهو ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ته جانورن جي زنده رهڻ لاءِ ڪهڙن ڪهڙن جسماني عضون جي ضرورت آهي. هن انهي سلسلي ۾ ڪيترائي تجربا ڪيا. صحتمند ڪتن جا هڪ هڪ ڪري سڀئي عضوا ڪڍيا ويا. ڪٽي جي جڏهين لبلبي ڪڍي ويئي ته ڪٽي تمام گهڻو پاڻي پيتو ۽ ضرورت کان وڌيڪ ڪاڌو ڪاڌو. ان سان گڏوگڏ سندس پيشاب ۾ اضافو ٿيندو ويو، ۽ ڪتو ڏينهنون ڏينهن ڪمزور ٿيندو ويو ۽ آخرڪار مري ويو. منڪوسڪي اهو به ڏٺو ته جنهن ڪٽي جي لبلبي ڪڍي ويئي هئي ان جي پيشاب تي تمام گهڻيون مکيون ويئون ٿي. هن مشاهدي مان اهو اندازو لڳايو ويو ته ڪٽي جي پيشاب ۾ ڪنهن قسم جو مٺاڻ آهي. وڌيڪ تجربن ڪرڻ سان معلوم ٿيو ته ماکيءَ جهڙو لڳ لڳدار مادو پيشاب جي بخار ٿيڻ بعد بچي ٿو ۽ اهو مادو گلوڪوس سان مشابهت رکي ٿو. مطلب ته بروئرز (Bruners) وانگر منڪوسڪي به ذبابيطس کي سمجهڻ لاءِ تمام گهڻي معلومات گڏ ڪئي پر ان هوندي به هو ذبابيطس جي سڀني خصوصيتن کي سمجهڻ کان قاصر

جنهن کي ۱۲ جنوري ۱۹۲۲ع ۾ پهرئين دفعي انسولين ڏني وئي. بس ان کانپوءِ ذیابيطس جي علاج ۾ هڪ نئون دور شروع ٿي ويو، جنهن ڪري اڄڪلهه ذیابيطس جا مريض هڪ صحت مند زندگي گذارين ٿا.

ذیابيطس ميلائٽس جي باري ۾ گذريل پنجاه سالن ۾ وڌيڪ معلومات حاصل ٿي آهي. ۱۹۳۱ع ۾ ارجينٽائن جي بي. اي. هائوساي (B.A. Housay) ان ڳالهه جو انڪشاف ڪيو ته پڇوٿري (Pituitary) غدودن مان ڪجهه اهڙيون رطوبتون خارج ٿين ٿيون جن جو اثر انسولين جي برعڪس ٿئي ٿو. هن دريافت ڪري مخالف اثر وارن دوائن ۾ ٻين ڪيترن ئي سببن جي خبر پيئي. هنن مان ٽولهه به هڪ سبب آهي ڇاڪاڻ ته ٿلهي ماڻهوءَ ۾ انسولين ڪافي حد تائين بي اثر ٿيو وڃي.

۱۹۴۶ع ۾ اي. لائوئيباريگ (A. Louibatiereg) اوچتو اهو انڪشاف ڪيو ته جانورن کي انفڪشن جي علاج لاءِ جڏهن سلفونائل يوريا (Sulphonylurea) ڏنو وڃي ٿو ته انهن جي رت مان ڪنڊ گهڻي ڀاڱي گهٽجي وڃي ٿي، پر شرط اهو آهي ته انهن جي جسم ۾ لبلبي موجود هجي. هن دريافت سان ذیابيطس جي علاج ۾ هڪ نئين باب جو اضافو ٿيو ۽ ڪاٺڙ وارن دوائن جي به ايجاد ٿي. هنن دوائن جو انسان ذات تي استعمال سنه ۱۹۵۶ع کان شروع ٿيو.

انسولين جي ڪيميائي بناوت گذريل پنجاه سالن کان هڪ معمول بنيل هئي، جنهن کي ۱۹۵۶ع ۾ ڪئميرج (انگلنڊ) جي ايف. سنگر (F. Singer) حل ڪيو. سنه ۱۹۵۷ع ۾ بگٿنائيدز (Biguanides) نالي دوا گولي لڏي وئي. هيءَ دوا به خوراڪ جي صورت ۾ استعمال ٿئي ٿي ۽ سلفونائل يوريا کان مختلف آهي ۽ لبلبي جي ڪارڪردگيءَ کي تيز ڪري ٿي. بگٿنائيدز جي اثر هيٺ جيرو، رت مان ڪنڊ ڪٿي پاڻ ۾ جذب ڪري وٺي ٿو.

ذیابيطس جي متعلق تحقيقات اڃا تائين جاري آهي. ۱۹۶۱ع ۾ رت ۾ گهٽ ۾ گهٽ مقدار انسولين ماپڻ جو طريقو ايجاد ٿيو. هن وقت هڪ لک ۾ هڪ يونٽ انسولين به ماپي سگهجي ٿي. هن ڄاڻ تحت ذیابيطس کي ٻن مختلف قسمن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. پهريون ٻالڻي جي ذیابيطس جنهن ۾ جسم جي اندر يا ته تمام گهٽ انسولين پيدا ٿئي ٿي يا اها بلڪل ڪانه ٿي پيدا ٿئي. ٻي وڏيءَ آگسٽ ۱۹۷۳ع

سان ان جو مشاهدو ڪيو ويو. پتو پيو ته لبلبي جا ٻاهريا خليا (خانا) مري ويا آهن پر اندروني منتشر خليا، جيڪي گروهن جي صورت ۾ موجود هوندا آهن، اڃا تائين صحتمند آهن. هن تجربتي مان اهو ثابت ٿيو ته لبلبي ۾ ٻن مختلف قسمن جا خليا آهن ۽ انهن ٻنهي قسمن جا ڪم الڳ الڳ آهن. ٻاهريان خليا هاضمي ۾ مدد ٿا ڏين ۽ اندريان خليا ذیابيطس کي ڪنٽرول ٿا ڪن. هيءَ حقيقت لينگر هنز ويهر ورهه اڳ بيان ڪئي هئي.

پهرين مهياڀاري لڙائي تائين هن بيماري بابت ڪا به وڌيڪ معلومات حاصل ڪانه ٿي سگهي. ۱۹۲۰ع ۾ آمريڪا جي هڪ نوجوان ڊاڪٽر بينٽنگ (Banting) کي الله سائين هن مسئلي کي حل ڪرڻ لاءِ چونڊيو. هي هڏين جو ڊاڪٽر هو پر پنهنجون معاشي ضرورتون پوريون ڪرڻ لاءِ فزيالاجي (Physiology) ۾ پڇ پڙهائيندو هو. بينٽنگ بهريائين شايع ٿيل رپورٽون پڙهي چڪو هو جن مان هن کي اها معلومات حاصل ٿي ته لبلبي ٻن قسمن جي خاانن جي ٺهيل آهي. اندرين خاانن ۾ ذیابيطس کي ڪنٽرول ڪرڻ واري مادي سان گڏوگڏ پروٽين پڻ موجود آهي ۽ ٻاهرين خاانن ۾ هاضمي واري رطوبت، هن پوءِ ذیابيطس واري مادي کي ٻاهر ڪڍڻ تي تجربا شروع ڪيا. هن لبلبيءَ جي ناليءَ کي ٻڌي ڇهن کان اٺن هفتن تائين انتظار ڪيو ۽ ان کانپوءِ لبلبي کي جسم مان ڪڍي ان جو عرق ٻاهر ڪڍيو. هي عرق انسولين (Insulin) هو. اهڙيءَ طرح ۱۹۲۱ع ۾ انسويان ايجاد ٿي. هنن تجربن دوران بيسٽ (Best) نالي هڪ ميڊيڪل جو شاگرد به بينٽنگ سان همراہ هو.

انسويان کي ٻاهر ڪڍڻ جو موجوده طريقو اهو آهي ته لبلبي کي تيرابي بنائي ان ۾ موجود پروٽين جي اثر کي زائل ڪيو ويندو آهي. ان کانپوءِ انسولين جيڪا لينگر هينر خلين ۾ لڪل هوندي آهي، آسانيءَ سان ٻاهر نڪري ايندي آهي.

بينٽنگ ۽ بيسٽ ڪئناڊا جي ٿورنٽو شهر ۾ ۱۶ مئي ۱۹۲۱ع ۾ انسولين دريافت ڪئي جنهن جو استعمال پهريون دفعو ساڳئي سال ۲۷ جولاءِ تي هڪڙي ڪتي تي ڪيو ويو. هن ڪتي ۾ منڪوسڪي ۽ وان ميرنگ واري طريقي سان هٿرادو ذیابيطس پيدا ڪئي وئي هئي. پهريون انسان ليونارڊ ٿامپسن (Leonard Thompson) نالي هڪ چوڏهن سالن جو ڪئناڊا جو رهاڪو ڇوڪرو هو سائنس

عمر جي ذیابیطس جنهن ۾ جسم ۾ ڪافي مقدار ۾ ڪڏهن ڪڏهن وڌيڪ مقدار ۾ انسولون پيدا ٿئي ٿي .

ذیابیطس کي قبضي ۾ آڻڻ تي دنيا ۾ ڏينهن رات ريسرچ ٿي رهي آهي ۽ نتيجا تمام اميد افزا آهن. ويجهڙائي ۾ آمريڪا ۾ مريض جي لبلي تبديل ڪري هن مرض کان چوٽڪارو حاصل ڪرڻ ۾ ڪاميابي ٿي آهي. ڪجهه وقت اڳ سرچارلس بيسٽ، جنهن پنجاه سال اڳ پنهنجي تعليمي زندگيءَ دوران ڊاڪٽر فريڊرڪ بيمٽنگ سان گڏجي انسولون ايجاد ڪئي هئي، اها ڳالهه ٻڌائي ته تمام جلد هڪ اهڙي انسولون ايجاد ٿيندي جنهن جي هڪ انجڪشن جو اثر ڪيترن ئي مهينن تائين جسم تي رهندو. هن اهو به ٻڌايو ته هاڻي انسولون خوراڪ جي وسيلي به استعمال ڪري سگهجي.

ڇا ذیابیطس جو مريض صحت مند زندگي گذاري سگهي ٿو؟

عام ماڻهن جو خيال آهي ته ذیابیطس هڪ دائمي مرض آهي، ڇاڪاڻ ته ناسور (Carbuncle)، گينگرين (Gangrene)، سلھ، دل جي بيماري، موتيو ۽ ٻيا اهڙا موذي مرض هن سان وابسته آهن. انسولون جي ايجاد کان اڳ اها لعنت عام هئي، ليڪن ۱۹۲۱ع ۾ انسولون جي ايجاد کان پوءِ هن خطرناڪ مرض تي ڪافي حد تائين ڪنٽرول ٿي سگهيو آهي.

جديد دور جي علم جي برڪت ذیابیطس جي مريض کي هڪ عام صحت مند ماڻهو وانگر حياتي گذارڻ جي قابل ڪيو آهي. ان سان گڏوگڏ مريض جي عمر ۾ به اضافو ٿي سگهي ٿو، پر شرط اهو آهي ته هو پنهنجي صحت جي حفاظت ڪرڻ وارن اصولن کان چڱيءَ طرح واقف هجي. ذیابیطس جي مريض لاءِ هيءَ ڳالهه دلچسپي جو ڪارڻ بڻجي سگهي ٿي ته تمام گهڻين مشهور ۽ ممتاز شخصيتن هن مرض ۾ مبتلا رهڻ جي باوجود ڪافي عرصي تائين مڪمل ۽ صحت مند زندگي گذاري آهي. مثال طور مشهور برطانوي مصنف ايڇ. جي. ويلز (H.G. Wells) ۲۵ سالن کان وڌيڪ عرصو ذیابیطس جي مرض ۾ مبتلا رهڻ جي باوجود هر هفتي هڪ ناول لکي مڪمل ڪندو هو. هن پنهنجي عمر جا ٽيهه ورهيه انتهائي محنت ۽ جفاڪشي ۾ گذاريا ۽ اسي سالن جي وڏي عمر ماڻي. طب ۾ ۱۹۳۹ع مائس

جو نوبل انعام کٽندڙ ڊاڪٽر جارج منٽ (George Minot) کي به طويل عرصي لاءِ هن بيماريءَ جي شڪايت هئي. اهڙيءَ طرح آمريڪن بلي ٽيلبرٽ (Billy Talbert)، جيڪو ٽينس جو مشهور رانديگر هو، به جواني کان ئي هن مرض ۾ مبتلا هو. هن هڪ ڪتاب لکيو آهي جنهن جو عنوان آهي ”Diabetes is not necessarily a handicap“ يعني ذیابیطس جي مريض لاءِ معذور هئڻ لازمي نه آهي.

پاڪستان ۾ تمام گهڻا اهڙا حضرات آهن جيڪي ذیابیطس جا مريض هوندي به وڏن وڏن عهدن تي فائز آهن ۽ پنهنجا فرائض وڏي محنت ۽ خوش اسلوبي سان پورا ڪري رهيا آهن. منجهانئن ڪيترن جي ته عمر به ڪافي وڏي آهي. پاڪستان جو هڪ مشهور ۽ ماهر ناز قانوندان جنهن جي عمر ۷۰ سالن کان به ٿپي ويئي آهي سو به ذیابیطس جو مريض آهي. اتفاق جي ڳالهه آهي ته هڪ وقت مغربي پاڪستان جي وزارت ۾ ۷۵ سيڪڙي وزيرن کي هن مرض جي شڪايت هئي.

برطانيه جي ماهر ذیابیطس آر. ڊي. لارنس (R.D. Lawnce) کان پڇيو ويو ته ذیابیطس جا مريض صنعتي ادارن ۾ ڪم ڪري سگهن ٿا يا نه؟ هن جواب ڏنو ته جيڪڏهن اهڙا مريض تدبير ۽ فراست کان ڪم وٺي هن بيماريءَ جي اصولن تي ڪار بند رهندا ته پوءِ اهي هر ڪم چڱيءَ طرح ڪري سگهندا. زندگيءَ جي هر شعبي ۾ سوين اهڙا ماڻهو آهن جيڪي انسولون استعمال ڪرڻ ڪري پنهنجا فرائض تمام سهڻي نموني سان پورا ڪري رهيا آهن. مثال طور ويمبلڊن (Wimbledon) جي ٽينس ٽيم جا به رانديگر انسولين استعمال ڪن ٿا. اهڙيءَ طرح ڪيترائي ٻيا ماڻهو جن ۾ فٽ بال جا رانديگر به شامل آهن، انسولين استعمال ڪن ٿا. دنيا جو هڪ مشهور پهلو ان به ذیابیطس جي مرض ۾ مبتلا هو. ۱۹۵۱ع جي انگن اکرن مطابق برطانيه جا ۱۵۰ اهڙا ڊاڪٽر هئا جيڪي انسولون جو استعمال ڪندڙ هئا پر پنهنجا فرائض چڱيءَ طرح پورا ڪري رهيا هئا.

خوراڪ جي بنيادي اصولن تي سختي سان پابندي ۽ انسولون جي استعمال ۾ باقاعديگيءَ سان ذیابیطس تي ڪنٽرول ڪرڻ آسان آهي. ضرورت صرف ان ڳالهه جي آهي ته ذیابیطس جو مريض پنهنجي زندگي جي هر مرحلي (بقايا ڏسو صفحو ۲۲)

آگسٽ ۱۹۷۳ع



گندگاه ۽ انهن کان بچاء جا طريقا

ٻيٽ ۽ تڪڙو وڌي ٿو ۽ ان سان گڏ گهڻو ٻج پيدا ڪري ٿو جنهن جي روڪڻ تي خرچ تمام گهڻو ايندو آهي. ٻنيءَ ۽ گهڻو ڪري موسمي گندگاه ڦٽندو آهي. منڊ جي لحاظ کان موسمي گندگاه کي ٻن حصن ۾ ورهايو ويو آهي.

(الف) خريف منڊ جا گندگاه:- هي گندگاه بهار جي موسم ۾ ڦٽندا آهن، گرمين ۾ واڌ ڪندا آهن ۽ سرءُ ۾ ٻج تيار ڪري ختم ٿي ويندا آهن. جهڙوڪ:- ڀرت، لـوڻڪ، هزاردائي، ڪپهه، درياهي ٻوٽي، اڱاري دودڪ، ٻڪن ۽ لڙ وغيره.

(ب) ربيع منڊ جا گندگاه:- هي گندگاه سياري جي شروعات ۾ ڦٽن ٿا ۽ سڄي سياري ۾ وڌن ٿا، بهار جي منڊ ۾ ٻج جهلين ٿا ۽ اونهاري ۾ ختم ٿي وڃن ٿا. جهڙوڪ:- بصري ٻالون، مٺو، سنجي، پوهلي، ڪرنڊ، بي پاڙي، ڪاسني ۽ ڏنڪ وغيره.

(۲) مدامي يا ٻه سالا گندگاه (Biennial weeds) - هي گندگاه هڪ سال ۾ وڌن ويجهن ٿا ۽ ٻئي سال جي آخر ۾ ٻجي ختم ٿي وڃن ٿا. هي گندگاه اسان جي ملڪ ۾ نه ٿيندا آهن. هن ۾ تمام ٿورا گندگاه اچي وڃن ٿا جيئن ته جهنگلي ڪچر ۽ بل شتل وغيره.

(۳) دائمي گندگاه (Perennial weeds):- هي گندگاه ٻن سالن جي عرصي کان به وڌيڪ هلن ٿا. هنن جو وڌڻ ۽ گهٽجڻ ٻه ٻي وقتا هوندو آهي. جڏهن به هنن جي وڌڻ جون حالتون سازگار هونديون آهن ته اوڏي مهل هي وڌڻ شروع ڪندا آهن. هڪڙا دائمي گندگاه ٻج جي وسيلي وڌندا آهن ته ڪي وري نباتاتي طريقن سان وڌڻ شروع ڪندا آهن، جهڙوڪ:- ڇير، ٺاڙو، ڍپ وغيره.

گندگاه مان فصلن کي نقصان :- گندگاه مان فصلن کي هيٺين قسمن جا نقصان پهچن ٿا.

آگسٽ ۱۹۷۳ع

قدرتي ٻوٽا جيڪي پوکيل فصل ۽ بائمرادو اپرن، تن کي ”ويڊ“ (weed) يعني ”گندگاه“ چئبو آهي، پر مختلف سائنسدانن ان بابت پنهنجا جدا جدا رايا ڏنا آهن. ڊاڪٽر بيلس (Dr. Beals) جي چوڻ مطابق: گندگاه اهو آهي، جيڪو پنهنجي مخصوص جڳهه کان ٻاهر اڀري. مثال طور ووٽن جو ٻوٽو جوئر جي فصل ۾ ڦٽي ته ان کي گندگاه چئبو. جيتوڻيڪ ووٽن جو ٻوٽو مکيه فصل آهي، پر هو پنهنجي مخصوص جاءِ تي نه ڦٽو آهي تنهنڪري ان کي گندگاه ۽ شمار ڪجي ٿو. ويبسٽر (webster) نالي ٻيو ماهر ان کي هن طرح بيان ڪري ٿو: ”اهي ٻوٽا جيڪي مکيه فصل کي ڦاٽي جي ٻيٽ ۾ نقصان گهڻو پهچائين، انهن کي گندگاه چئبو آهي.“

گندگاه جا ٻوٽا سخت، رعبدار ۽ سڪهرا هوندا آهن. انهن جي اها خاصيت هوندي آهي، جو جتي هنن جي ضرورت نه هوندي آهي اتي اهي پائيهي ڄمي پوندا آهن يا ائين ڪئي چئجي ته گندگاه فصلن لاءِ ڄڻڪ اڻ ڪوٺيا مهمان آهن، جيڪي فصلن ۾ پيدا ٿي نه صرف سندن خوراڪ ۾ پائي جو حصو ختم ڪن ٿا، پر سندن هٿل ڪري فصلن جي ٻوٽن کي وڌڻ لاءِ مناسب جڳهه نه ٿي ملي ۽ نه وري پوري طرح روشني مهيا ٿي سگهي ٿي. انهيءَ ڪري فصلن جي ٻوٽن جي واڌ روڪجي ويندي آهي ۽ ان سان گڏ فصل جي پيدائش به گهٽ ٿي ويندي آهي.

گندگاه جي ورهاست. گندگاه کي وقت جي عرصي مطابق ٽن ڪلاسن ۾ ورهايو ويو آهي:-

(۱) موسمي گندگاه (Annual weeds) - هن قسم جو گندگاه هڪ سال جي اندر پنهنجي حياتي پوري ڪري ٿو يعني ٻوٽي جي ڦٽڻ کان پيچڻ تائين ڇهن مهينن کان وٺي سال تائين مدو لڳي وڃي ٿو. موسمي گندگاه ٻين گاهن جي سائنس

(۱) فصلن جي جڳهه والاري ۽ روشنيءَ کان محروم ڪرڻ:-
گندگهه جا ٻوٽا فصلن جي ٻوٽن کان تڪڙو وڌن ٿا، جيڪي فصلن جي ٻوٽن کي جلدي وڪوڙي ويندا آهن. انهيءَ ڪري ٻوٽا سج جي روشنيءَ کان محروم ٿي وڃن ٿا. خاص ڪري ويڪرن ٻن وارن گندگاهن ۾ واڌ تڪڙي ٿيندي آهي جيڪي ڪمزور فصل کي جلدي ڍڪي ڇڏين ٿا. وونئن ۽ گندگهه جو مسئلو اهم آهي ڇاڪاڻ ته اهو فصل دير سان وڌي ٿو ان جي پيٽ ۾ گندگهه تڪڙو وڌن ٿا ۽ ان کي جلندي وڪوڙي ويندا آهن. انڪري فصل ۾ روشني ۽ هوا جو گذر گهٽ ٿئي ٿو، جيڪي فصلن جي ٻوٽن لاءِ تمام ضروري آهن نه ته پيدائش ۾ تمام گهڻي گهٽتائي اچي ويندي.

(۲) زمين مان فصلن جا خوراڪي جزا چوسي وٺڻ:-
گندگهه زمين مان پاڻي ۽ خوراڪي جزا چوسي وٺن ٿا. جنهن ڪري فصل کي هڪ پاسي خوراڪي جزن ڏيڻ جي ضرورت هوندي آهي ته ٻئي طرف پاڻي ڏيڻ جي ضرورت پوندي آهي. تجربن مان اهو ثابت ٿيو آهي ته سرنگن (گندگهه جو هڪ سونو) ڪڍڪ جي هڪ ٻوٽي کان ٻي تي نائٽروجن، فاسفورس ۽ چئون تي پوئاشيم کڻي وڃي ٿو. ان مان ظاهر آهي ته گندگهه جي ڪري فصلن کي خوراڪي جزن جي گهڻي ضرورت پوي ٿي.

(۳) گندگهه کي ختم ڪرڻ لاءِ ٻوڪي تي گهڻو خرچ:-
اهو هڪ عيني مشاهدو آهي ته گندگهه کي روڪڻ لاءِ زمين تي گهڻي محنت ڪرڻي پوندي آهي. جيئن ته زمين جي تياريءَ وقت ۽ فصلن جي ٻوڪي وقت گندگاهن مان چند ڇڏائڻ لاءِ گهڻا هٿ پير هلائڻا پون ٿا، جنهن تي تمام گهڻو خرچ ايندو آهي.

(۴) فصل ۽ لاڀاري ڪرڻ ۽ تڪليف:- فصلن جي لاڀاري وقت جڏهن گندگهه وڌي وڏو ٿئي ٿو ته تڪليف ڏئي ٿو جيئن ته ڪڍڪ جي فصل ۾ ڪانڊيري جهڙو گندگهه ٿئي ٿو جنهن ڪري ڪڍڪ جي لاڀاري ڪرڻ وقت تڪليف ٿئي ٿي ۽ ان سان گڏ وقت به گهڻو لڳي ٿو.

(۵) نقصان ڪار جيت ۽ بيماريون:- هن قسم جا گندگهه گهڻو ڪري اڏن، ٻنن ۽ ٻنيءَ جي پاسن وٽ هوندا آهن، جيڪي بيمارين ۽ جيتن کي پناهه ڏين ٿا ۽ اهي پوءِ ايندڙ فصلن تي حملو ڪن ٿا. تنهن ڪري اهڙن گندگاهن جو اڏڻ ۽ ٻنن تي هجڻ تمام نقصانڪار ثابت ٿيو آهي.

سائنس

(۶) گندگهه ۽ فصلن جي ٻج جي ملاوت:- گهڻا گندگهه فصلن سان گڏ پڄندا آهن. فصل جي لاڀاري وقت اهي به ان سان گڏ لڳي ويندا آهن. انهيءَ ڪري فصل جي جنس جي قيمت مارڪيٽ ۾ گهٽ ملندي آهي.

(۷) واٽر ڪورس ۽ اڏن جي صفائي تي گهڻو خرچ:-
گندگهه گهڻو ڪري واٽر ڪورس ۽ اڏن تي ڦٽندو آهي جيڪو پاڻيءَ جي وهڪ کي روڪي ٿو. انهيءَ ڪري پاڻي نالين مان سمي ٿو ۽ اهو سيمو ٻنيءَ کي گهڻو نقصان پهچائي ٿو. ان کانسواءِ گندگاهن جي صفائي تي به گهڻو خرچ ٿئي ٿو.

(۸) گندگهه زهريلا ٿيڻ ٿا:- گندگهه جا ڪي قسم زهر جهڙو اثر رکن ٿا، جيڪي فصل جي واڌ ۽ پيدائش تي اثر ڪن ٿا، مثلاً ڇپر. انهيءَ جي اها خاصيت هوندي آهي ته اها گهڻو پکڙي آهي تنهنڪري وونئن جي فصل لاءِ نقصانڪار آهي ڇاڪاڻ ته هن جي ٻاڙن ۾ ڪجهه زهر ٿئي ٿو جيڪو وونئن جي فصل جي واڌ کي روڪي ڇڏي ٿو.

(۹) طفيلي گندگهه:- هي گندگهه مکيه فصل جي ويجهو ڦٽن ٿا جيڪي مکيه فصلن جو کاڌو ۽ خوراڪ جذب ڪري انهن کي بلڪل ڪمزور ڪري ڇڏيندا آهن. مثلاً بي پاڙي (Dodder) هيءَ برسيم ۽ لوسرن وغيره کي وڪوڙي وڃي ٿي ۽ انجو کاڌو خوراڪ جذب ڪري فصل کي بلڪل ڪمزور ڪري ڇڏي ٿي.

گندگاهه مان فائدا:- فصلن ۽ بيلن گندگاهه مان ته ڪوبه فائدو نه آهي، پر البت ويران زمينن ۽ هي زمين کي پاڻي ۽ هوا جي ڪٽاءِ (Erosion) کان بچاءُ ڪري ٿو.

(۲) گندگهه مال لاءِ چاري طور ڪم اچي ٿو.

(۳) گندگهه ڪچي حالت ۾ سائي پاڻ طور ڪم اچي سگهي ٿو.

گندگهه جو پکڙجڻ:- گندگهه جي پکڙجڻ جا مکيه ڪارڻ هوا، پاڻي ۽ حيوان آهن. هوا جي ڪري گندگاهن جا هلڪا ٻج پري تائين وڃي ڪرندا آهن. ڪن گندگاهن جا ٻج هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ پهچڻ لاءِ دريائن يا واهن جي پاڻي ۾ گڏجي ويندا آهن. ڪيترن گاهن جي ٻج مٿان ڪنڊا ٿيندا آهن جيڪي چوپائي مال جي بدن ۾ وڃڻي پوندا آهن. اهڙي طرح هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ پهچي ويندا آهن.

ڪن گندگاهن کي چوپايو مال کائيندو آهي ته ان جو ٻج انهن جي پيٽ ۾ هليو ويندو آهي. پوءِ مال جڏهن

آگسٽ ۱۹۷۳ع

آهي ته ان سان گڏ انهن جو ٻج به ان جي ٻيٽ ۾ ويندو آهي. اهو ٻج هضم نه ٿيندو آهي پر ساڳيءَ حالت ۾ ڇيٽي سان گڏ نڪرندو آهي. پاڻ جيڪڏهن چڱي طرح سان سڙيل هوندو ته ان ۾ گند گاهن جي ٻجن جي گهڻي عرصي تائين ڄمڻ جي شڪتي نه رهندي آهي. پر جيڪو پاڻ چڱي طرح گريل نه هوندو آهي ان پاڻ ۾ گند گاهن جا ٻج پنهنجي ڄمڻ جي شڪتي محفوظ رکندا آهن ۽ ڪنهن به سازگار حالتن ملڻ سبب ڦٽڻ شروع ڪندا آهن. انهيءَ لاءِ ضروري آهي ته ٻنيءَ ۾ وڻڻ جي پاڻ وجهڻ کان پهريائين انهيءَ کي چڱي طرح ساڙڻ گهرجي.

(۳) گند گاهن کي ٻجڻ نه ڏجي: ڪي گند گاهه تمام گهڻو ٻج پيدا ڪن ٿا. جيئن ته دريائي ٻوٽي (Conyza) جو هڪ ٻوٽو اٽڪل ۴۰۰۰ ٻج جا داڻا پيدا ڪري ٿو. اهڙي طرح جهنگلي جٽ (Corchorus) جو هڪ ٻوٽو اٽڪل ۱۲۰۰۰ ٻج جا داڻا پيدا ڪري ٿو. تنهن ڪري انهن گاهن کي ٻجڻ نه ڏجي ۽ اهڙن گاهن کي ڪڍي ۽ ٺي ختم ڪري ڇڏجي. جيڪڏهن ڪنهن گند گاهه جو ٻج ٻچي وڃي ته انهيءَ کي وڏي ساڙي ڇڏجي يا ڪڏ ڪوئي پوري ڇڏجي. (۴) پاڻي جي نالين ۽ اڏن تي بيٺل گند گاهه ختم ڪرڻ گهرجي:

پاڻيءَ جون نالين ۽ اڏون، ٻنيءَ جون ڪنڊون ڪاٺيل ۽ ٻيا وغيره گهڻو ڪري گند گاهه سان ڍڪيل هوندا آهن. جيڪڏهن انهن کي ٻج جهلڻ کان پهريائين لٽي ڇڏجي ته انهن جي واڌ روڪجي ويندي ۽ ان کانسواءِ بيمارين ۽ جيتن کان به چوٽڪارو ملندو جيڪي ايندڙ فصل لاءِ سوڙجو جهليو ويندا هوندا آهن.

(۵) ريڇ جا ٻه پاڻي ڏجن: زمين جي ريڇ ڪرڻ لاءِ ان کي ٻه پاڻي ڪڍي پڪي جا ڏيڻ گهرجن. پهريون ڪڍي جو پاڻي هلاڪو ڏجي ته جيئن گند گاهه نڪري اچن ۽ ٻئي پاڻي يعني پڪي جي پاڻي کان پوءِ زمين کي پوکي لاءِ تيار ڪجي ان کي سٺا ۽ اونها هر ڏيڻ گهرجن، ڇو ته ائين ڪرڻ سان جيڪي به گند گاهه زمين ۾ ڦٽندا سي سڀ ختم ٿي ويندا.

(۶) فصلن جو وارو ڪرڻ گهرجي: فصلي جي گند گاهه مان چند آزاد ڪرائڻ لاءِ فصلن جي هير ڦير تمام ضروري آهي. ڪو به هڪ فصل هر سال ساڳي زمين ۾ پوکيو رهيو ته ان ۾ ساڳئي فصل جو گند گاهه گهڻو ٿيندو. پر جيڪڏهن فصلن کي مٺي سٽي پوکيو ته هي انديشو بلڪل ختم ٿي

آگسٽ ۱۹۴۳ع

ٻئي هنڌ وڃي ٿو ته اتي هن جي ڇيٽي ۾ گند گاهه جو ٻج گڏجي ويندو آهي. گهڻا گند گاهه جيڪي ٻج گهڻي انداز ۾ پيدا ڪن ٿا، انهن کي روڪڻ تمام ڏکيو ٿيو پوي. جيئن ته دريائي ٻوٽي جو هڪ ٻوٽو هزارين ٻج پيدا ڪري ٿو جنهن ڪري هن کي روڪڻ ڏاڍو مشڪل ٿيو پوي.

ڪيترا گند گاهه اهڙا آهن جنکي وڍڻ سان اهي وري ڦٽڻ شروع ڪن ٿا ۽ اهي تمام جلدي وڏي ۽ پکڙجي وڃن ٿا. مثلاً ٻج ۽ ڇوڙ وغيره اهڙا گاهه آهن جيڪي نامائتي طريقي سان وڌڻ شروع ڪندا آهن.

ڪن گند گاهن جي ٻجن جي اها خاصيت هوندي آهي جو اهي ڄمندا آهن جيتوڻيڪ انهن کي ڄمڻ واريون سڀ حالتون ميسر هونديون آهن پر اهي آرام واري حالت ۾ هوندا آهن. انهيءَ جو سبب هي آهي ته انهن ٻجن جو مٿيون تهر سخت يا سٺو هوندو آهي جنهن ڪري اهي ۳۰-۴۰ سالن تائين به رهي سگهن ٿا ۽ ڪنهن به وقت ڦٽي سگهن ٿا. ڪيترن گند گاهن جا گل تمام ننڍڙا هوندا آهن ان ڪري سندن ٻج جهلڻ جو صحيح وقت معلوم نٿو ٿي سگهي. انهن کي ناس ڪرڻ کان پهريائين سندن ٻج زمين ۾ ڇڻي پون ٿا.

گهڻن گند گاهن ۾ بدبوءِ ٿيندي آهي يا زهريلا هوندا آهن. ان ڪري مال يا ٻيا جانور انهن جي ويجهو نه ويندا آهن جنهن ڪري هو ٻچي زمين ڪري پوندا آهن. ازانسواءِ گند گاهه سخت جان ٻوٽا آهن جيڪي خراب آبهوا گهٽ وڌ ٻئي ۽ بيڪار زمينن ۾ به پيدا ٿي وڃن ٿا.

فصلن ۾ گند گاهه روڪڻ جا اپاءَ

گند گاهن کي فصلن ۾ اڀرڻ کان پهريائين ختم ڪرڻ لاءِ هيٺيان اپاءَ وٺڻ گهرجن:-

(۱) پوکي لاءِ صاف ۽ سٺو ٻج: گند گاهن جو ٻج گهڻو ڪري فصلن جي ٻجن سان مليل هوندو آهي، جنهنجي پوکڻ سان گند گاهه وري فصل سان گڏ ڦٽڻ شروع ڪندو آهي. ان کانسواءِ ٻاهرين ملڪن مان جيڪو ٻج اچي ٿو ان ۾ پڻ نون قسمن جي گند گاهن جو ٻج مليل هوندو آهي تنهن ڪري اهڙن ٻجن کي تپاسي پوءِ پوکڻ گهرجن.

(۲) وڻڻ جي پاڻ کي چڱي طرح ساڙي پوءِ استعمال ڪجي:- گند گاهه جو ٻج وڻڻ جي پاڻ ۾ جام هوندو آهي، ڇاڪاڻ ته جڏهن چوپايو مل ٻنيءَ ۾ گند گاهه چرڻ ويندو

سائرس

ويندو. ڪامياب فصلن جي مٿا ستالاڙ زير زمين فصل ضرور هٿن گهرجي. جهڙوڪ بوهي منگ ۽ گجرون وغيره. انهن جي پوکڻ ڪري زمين جي چڱي طرح اٿل پٿل ٿئي ٿي تنهنڪري زمين جيڪوبه گندگانه هوندو آهي اهو سڀ ختم ٿي ويندو آهي.

گندگانه کي ناس ڪرڻ جا طريقا :- ٻنيءَ مان گندگانه کي ختم ڪرڻ لاءِ جيڪي مختلف طريقا ڪم اچن ٿا تن کي گڏ ڪيڏن يعني ويڊنگ (Weeding) چئبو آهي. گندگانه جي ختم ڪرڻ جا جيڪي مختلف طريقا آهن تن مان مکيه هيٺ ڏجن ٿا.

(۱) هٿن سان گندگانه ڪيڏن (Hand Weeding) :- هي هڪ پراڻو طريقو آهي پر اڄ به ڪامياب آهي. جيڪي ڪامياب نتيجا هن طريقي مان مليا آهن اهي ٻئي ڪنهن به طريقي مان نه مليا آهن. پر هي طريقو مهانگو آهي ۽ منجهس وقت به گهڻو ضايع ٿئي ٿو تنهن ڪري هي طريقو گهڻي ايراضي لاءِ ڪامياب نه آهي. هي طريقو اسان وٽ گهڻو رائج آهي. هن طريقي سان گندگانه کي هٿن سان پاڙڻ مان چڪي ٻاهر ڪڍبو آهي يا ڪري، ڏانن يا ڪوڏر وغيره سان گندگانه کي ختم ڪبو آهي.

(۲) ڪيميائي دوائن سان گندگانه کي ختم ڪرڻ :- گندگانه کي ختم ڪرڻ لاءِ جيڪي ڪيميائي دوائون ڪم اچن ٿيون انهن کي ويڊ سائيڊس (Weedicides) يا هربي سائيڊس (Herbicides) يعني ”گندگانه مار دوائون“ چئبو آهي.

گندگانه مار دوائن جو استعمال زراعت ۾ ۱۹۰۰ع صدي کان شروع ٿيو، جڏهن فرانس جي ”بونيت“ جرمنيءَ جي ”شلر“ (Schulz) ۽ آمريڪا جي ”بولي“ (Boley) نالي ماهرن اهو ثابت ڪيو ته ٽامي جي مختلف قسمن جا لوڻ جيڪڏهن فصلن ۾ استعمال ڪيا وڃن ته اهي موڪرن پنن وارن گاهن کي ختم ڪري ڇڏيندا.

۱۹۴۲ع ۾ گندگانه مار دوائن جي استعمال ۾ هڪ انقلاب آيو. ان وقت ٻي عالمگير لڙائي اوج تي هئي. انهيءَ وقت آمريڪا جي سائنسدانن D-4-2 ۽ برطانيه جي سائنسدانن M.C.P.A. دوائون ايجاد ڪري ورتيون. هنن دوائن کي ايجاد ڪرڻ جو مطلب اهو هو ته دشمنن جا فصل، وڻ ٽڻ ۽ ٻيلا ختم ڪجن، پر پوءِ ڏٺو ويو ته هنن دوائن جي گهٽ استعمال سان ڪي ٻوٽا ختم ٿي ويا پر ڪن ٻوٽن تي ڌرو به اثر نه ٿيو.

سائنس

اهڙيءَ طرح زرعي شعبي ۾ اناج وارن فصلن ۾ پيدا ٿيندڙ گندگانهن کي ختم ڪرڻ ۾ ڪافي ڪاميابي حاصل ٿي. ان کان پوءِ گاهه مار دوائن جو استعمال وڌندو ويو. هن وقت هزارن جي تعداد ۾ مختلف قسمن جون دوائون ايجاد ٿي ويون آهن.

هن وقت زرعي تحقيقاتي اداري ٽنڊي ڄام ۾ جيڪي گاهه مار دوائون مختلف فصلن ۾ گندگانهن کي ختم ڪرڻ ۾ ڪامياب ويون آهن سي هي آهن.

(۱) گريميڪرون (Gramaxone) :- هيءَ گاهه مار دوا پنن، اڏن، نالن ۽ رستن جي سڀني قسمن جي گندگانهن کي ختم ڪرڻ ۾ ڪم اچي ٿي ۽ ان کان سواءِ فصل جي پوکي کان هفتو کن اڳي گندگانه کي ناس ڪرڻ ۾ ڪم اچي ٿي.

(۲) ٽرائيڪزون (Triaxone-100) :- هي گاهه مار دوا ڪڻڪ ۽ سارين جي فصل ۾ پڻ جهڙي گاهه کي ختم ڪرڻ ۾ واهن ۽ ريلوي لائين تي ديوئيءَ جي وڻ کي ناس ڪرڻ ۾ ڪم اچي ٿي.

(۳) ٽو - فور - ڊي (D-4-2) :- هيءَ هڪ مشهور دوا آهي جيڪا موڪرن پنن وارن گاهن کي ختم ڪرڻ ۾ ڪم اچي ٿي. اها دوا خاص ڪري ووٽن جي فصل لاءِ وڌيڪ نقصانڪار ثابت ٿي آهي، پر سوڙهن پني وارن فصلن جهڙوڪ سارين ۽ ڪڻڪ جي گندگانهن کي ختم ڪرڻ لاءِ ڏاڍي ڪامياب آهي.

(۴) ٽرائيبونل (Tribunil) :- هيءَ گاهه مار دوا ڪڻڪ

جي فصل ۾ ٿيندڙ گندگانه کي ختم ڪرڻ ۾ ڪم اچي ٿي.

(۵) ٽرائيفلان (Triflan) :- هيءَ گاهه مار دوا ووٽن جي فصل ۾ ٿيندڙ گندگانه کي ختم ڪرڻ لاءِ ڪم اچي ٿي.

(۶) ڪارميڪس (Karmex) :- هيءَ گاهه مار دوا ڪمند

جي بيٺل فصل ۾ گندگانه کي ختم ڪرڻ لاءِ ڪتب ايندي آهي.

(۷) گيساپريم (Gesaprim) :- هيءَ دوا ڪمند ۽ مڪئي

جي فصلن ۾ گندگانهن کي ختم ڪرڻ لاءِ ڪم اچي ٿي.

(۸) سرڪوپر (Surcopur) :- هي دوا سارين جي فصل ۾

گندگانهن کي ختم ڪرڻ لاءِ استعمال اچي ٿي.

گندگانه مار دوائن جي استعمال ڪرڻ لاءِ هينن ڳالهين جو خيال رکڻ تمام ضروري آهي.

(بقايا ڏسو صفحو ۲۲)

آگسٽ ۱۹۷۳ع

ذهني ٽڪاوٽ



اڄڪلھ هر ڪو شخص پاڻ کي ٽڪل محسوس ڪري ٿو. ڪو مصروف ماڻهو هجي يا ڪو رولو شخص، ڪا اڌ ٻڙن ٻارن جي ماءُ هجي يا منجهند تائين سمهڻ واري شمع انجمن، ڪو ڪارخاني جو مزدور هجي، ڪنهن آفيس جو نوجوان ڪلارڪ هجي يا ڏهن سالن جو اسڪولي شاگرد، هرڪنهن جي زبان تي هميشه ”ٽڪ“ جي شڪايت آهي. حقيقت هيءُ آهي ته ڪوبه شخص هميشه يا هر وقت ٽڪل ڪونه ٿو ٿئي. ڪي ٿورائي اهڙا ماڻهو هوندا آهن جيڪي سچ پچ ٽڪل هوندا آهن. گهڻو ڪري ائين هوندو آهي جو اهي ماڻهو محض خيالي يا نفسياتي ٽڪل پر مبتلا هوندا آهن، هن قسم جو ٽڪل وظيفي هوندو آهي ۽ نه جسماني. جيتوڻيڪ اهو ذهني ٽڪل جسماني ٽڪل نه هوندو آهي، ڇو ته هن ۾ عضوا تندرست هوندا آهن، پر تنهن هوندي به ماڻهو پاڻ کي ٽڪل سمجهندو آهي ۽ ڏاڍو بيچين ٿي ويندو آهي.

اهڙي ذهني ٽڪل کي دور ڪري سگهجي ٿو. سڀ کان اڳ ته هي سمجهي وٺڻ گهرجي ته آيا هي ذهني ٽڪل آهي ڇا؟ درحقيقت هن کي ٽڪل چئي نٿو سگهجي. ٽڪل جو هي احساس محض خيالي هوندو آهي جيڪڏهن اوهين ٿورو غور ڪريو ته اهڙا ڪيترائي مثال اوهان کي ياد ايندا.

سائنس

مثال طور ڪنهن وقت اوهين تمام گهڻو ٽڪجي گهر آيا انوقت سڄي بدن ۾ سور محسوس ٿي رهيو هو ۽ مٿو ڦري رهيو هو. اوهين جلدئي آرام ڪرڻ لاءِ بستري تي ليٽي پيا. ايتري ۾ اوهان کي ڪنهن دوست ڏينهن تي فلم ڏسڻ تي دعوت ڏني ته اوهين هڪدم ڦوٽ ٿي ويا ۽ سڄي بدن ۾ ڄڻ ته بجلي جي لهر ڊوڙي ويئي. ٽڪ جو ڪونالو نشان به باقي نه رهيو. مزو ته وري اهو ڪو سیر و تفريح کان پوءِ اوهين اڌ رات ڌاري تازا توانا ٿي گهر موٽيا! اهو آهي ذهني ٽڪ جو هڪ عام مثال.

جيڪڏهن جاء يا ڪم جي تبديلي يا ڪنهن نئين دلچسپيءَ جي ڪري اوهان جي ٽڪاوٽ دور ٿي وئي هجي ۽ اوهين تازا توانا ٿي ويا هجو ته ائين سمجهو ته اوهان جو نام نهاد ٽڪ حقيقي نه هو. جڏهن ماڻهو پنهنجي ڪم مان ناخوش هوندا آهن تڏهن دل لڳائي اهو ڪم نه ڪندا آهن ۽ انهي ڪري کين ناڪامي ٿيندي آهي. اهڙيءَ حالت ۾ اهي ترقي ڪري نٿا سگهن، سندن دل ۽ بي اطميناني ٿيندي آهي جا کين هميشه بي قرار رکيندي آهي. ڄڻ ته سندن اندر ڪاچندو ويندو آهي جنهن ڪري انهن جي توانائي ختم ۽ فوٽ ضايع ٿيندي ويندي آهي. هن مسلسل ذهني بار کان اهي ماڻهو ٽڪ محسوس ڪندا آهن. انجو تدارڪ ائين ٿي سگهي ٿو ته اهڙا ماڻهو ڪو مرغوب مشغلو اختيار ڪن ۽ ان کي دل لڳائي پورو ڪن.

پرهن ڳالهه ۾ به شڪ ڪونهي ته ٽڪ جسماني به ٿيندو آهي جو جسماني خرابين ڪري پيدا ٿيندو آهي. بي خوابي يا ننڊ جي ڪمي هڪ عام جسماني سبب آهي. هن کان سواءِ ٻيا سبب به آهن، مثلاً بدعظمي، غير متوازي خوراڪ، قبض، نشي دار شين جو ڪثرت سان واهڻ، رت جي گهٽتائي، دل ۽ گردن جون بيماريون، ذیابيطس وغيره.

اهڙن جسماني بيمارين سببان پيدا ٿيل وارو ٽڪ اصلي هوندو آهي جيڪو رڳو جاء جي تبديلي، نئين دلچسپي يا نئين مشغولي اختيار ڪرڻ سان دور ٿي سگهي ٿو. انلاء طبي مشوري ۽ باقاعده علاج جي ضرورت آهي پر ”نفساني ٽڪ“ ذهني اختلال سببان پيدا ٿيندو آهي، اهڙين حالتن ۾ ماڻهو پنهنجي مقصد کان پري نڪري ويندو آهي ۽ ڪم ۾ دل لڳائڻ ۽ همت ۽ حوصلو منڍي بدران شڪ تهه ۾ مبتلا رهندو آهي. (بقايا ڏسو صفحو ۲۴)

آگسٽ ۱۹۷۳ء

(١٦٢) — ”ذیابیطس“

درجي جي ذیابیطس وارو مريض پنهنجي متوقع حياتيءَ جو ۹۰ سيڪڙو، وچولي درجي جي ذیابیطس جو مريض ۵۰ سيڪڙو ۽ سخت بيمار ماڻهو ۵ سيڪڙو زندهه رهي سگهي ٿو. آمريڪا جي بوسٽن شهر ۾ جوزلن ڪلينڪ ۾ گهڻا اهڙا مريض اچن ٿا جيڪي گذريل اڌ صديءَ کان هن ۾ مبتلا هئڻ جي باوجود صحت مند آهن. هي حالات ته ڪجهه عرصو اڳ جا آهن، ليڪن موجوده دور ۾ جراثيم ڪش (Antibiotics) دوائن جي فراهمي ڪري ذیابیطس جي مريضن جي متوقع عمر ۾ نمايان اضافو ٿيو آهي. ڇاڪاڻ ته ذیابیطس جي غشي (Coma) ڪو اتفاق سان ٿئي ٿي. انفڪشن جي موتمار اثرن تي گهڻي حد تائين ضابطو ڪيو ويو آهي.

مٿي ذڪر ڪيل ڳالهين مان ظاهر ٿو ٿئي ته ذیابیطس مريض جي خوشحال زندگي، گذارڻ ۾ ڪنهن به قسم جي رڪاوٽ ثابت نٿي ٿئي. پر شرط اهو آهي ته مريض کي ان ڳالهه جي پوري پوري پروڙ هئڻ گهرجي ته پنهنجي سار سنڀال ڪهڙي طريقي سان لهڻي آهي ۽ هو ان تي پابنديءَ سان عمل ڪندو هجي.



(بقايا — ”گلد گاهه ۽ انهن کان بچاءُ“)

- ۱- رڳو سفارش ڪيل دوا جو مقرر انداز ڪم آڻڻ گهرجي.
- ۲- سفارش ڪيل وقت موجب دوا استعمال ڪرڻ گهرجي.
- ۳- فصل ۽ ڪند گاهه جي عمر جي لحاظ سان دوا استعمال ڪرڻ گهرجي.
- ۴- موڪرن پنن تي اثر ڪرڻ واريون دوائون موڪرن پنن وارن فصلن جهڙوڪ ووتڻن ۽ پينڊي جي ويجهو استعمال نه ڪرڻ گهرجن.
- ۵- دوا جو ٿوهارو هڪجهڙو هلائڻ گهرجي.
- ۶- جڏهن هوا تيز لڳي ته ان وقت گاهه سار دوا جو ٿوهارو نه ڪرڻ گهرجي.
- ۷- جيڪو ٿوهارو هن دوا لاءِ استعمال ڪجي اهو ٿوهارو جيت مار دوائن لاءِ استعمال نه ڪجي.
- ۸- گاهه مار دوائن کي جيت مار دوائن جي ويجهو نه رکڻ گهرجي.

آگسٽ ۱۹۵۳ع

۾ نظم و نسق برقرار رکي. نظم و نسق جي اهميت کي نظر ۾ رکي برطانوي ذیابیطس ايسوسيئيشن پنهنجي رسالي جو نالو ”ميزان“ رکيو آهي. ميزان يا پيماني مان مراد آهي نظم و نسق ۽ پابنديءَ جي ۽ ذیابیطس جي مريض جي صحتمند ۽ خوشحال زندگي گذارڻ جو راز ان ۾ لڪل آهي. ۱۹۵۴ع ۾ هندستان جي هڪ فولاد جي ڪارخاني جي مزدورن جي سروي ڪئي ويئي. معلوم ٿيو ته انهن جا ۴۰۰ اهڙا مزدور هئا جيڪي هن مرض ۾ مبتلا هئا ۽ ذیابیطس تي ڪنٽرول رکندي پنهنجو ڪم پوري پابندي سان ڪري رهيا هئا. ست سال لاڳيتو مشاهدو ڪيو ويو جنهن مان پتو پيو ته اهڙا مريض صحتمند مريضن جي مقابلي ۾ گهٽ غير حاضر رهيا. پر اهڙن مزدورن لاءِ پن پابندن سان گڏ طبي نگراني به ضروري هئي.

مختلف ڌنڌن ۽ ڪاروباري دنيا سان تعلق رکڻ وارا اهڙا ڪيترائي ذیابیطس جا مريض آهن جن جيڪي پنهنجي جدوجهد ۽ بهتر ڪارڪردگي سبب وڏن عهدن تي فائز آهن ۽ اڃا تائين پنهنجا فرض خوش اسلوبي سان پورا ڪري رهيا آهن ۽ ان سان گڏوگڏ خوشحال زندگي پڻ گذاري رهيا آهن.

ويجهڙائي ۾ ذیابیطس جي مريضن جي تڪليفن ۽ موت جي شرح ۽ جيڪا تبديلي آئي آهي ان هن بيماري ۾ مبتلا ماڻهن جي دلين ۾ تمام گهڻي همت ۽ اميد پيدا ڪئي آهي. آمريڪا ۾ اڄڪلهه ۵۰ سيڪڙو اهڙيون انشورنس ڪمپنيون آهن جيڪي ذیابیطس جي مريضن کي انشور ڏکن ٿيون پر شرط اهو رکڻ ٿيون ته مريض باقاعده ڊاڪٽر جي نگراني ۾ رهي.

هن وقت فوج ۾ به ذیابیطس کي اهڙي بيماري تسليم ڪيو ٿو وڃي جيڪا فوجي فرائض پورا ڪرڻ ۾ رڪاوٽ ڪانه ٿي وڃي. اهو هن ڪري جو ذیابیطس جو مريض نظم و نسق جو پابند ٿي وڃي ٿو ۽ سندس پابندگيءَ سبب هو پنهنجي ڪم ڪرڻ لاءِ ايتروئي موزون سمجهيو وڃي ٿو جيترو هڪ عام صحت مند ماڻهو.

دنيا جي مشهور ذیابیطس جي ماهر ڊاڪٽر ايليٽ جوزلن (Dr. Elliot Joslin) اهو اندازو لڳايو آهي ته معمولي حالتن

سني گوشت جي سڃاڻپ ۽ ترڪيب

گوشت جون خاصيتون

(۱) رنگ (Colour): تندرست گوشت جو رنگ عام طور هلڪو ڳلابي هوندو آهي پر رنگ جو دارومدار جانور جي عمر ۽ صحت تي هوندو آهي. تنهن هوندي به پوڙهن يا بيمار جانورن جي گوشت جو رنگ تمام ڳاڙهو يا ڪارائ مائل ڳاڙهو هوندو آهي. اڪثر بيماريون خاص ڪري گوشت جو رنگ بدلائي ڇڏينديون آهن.

(۲) آڻپ، اٺ يا بناوت: گوشت زياده ڍلو ۽ پسيل نه هئڻ کپي. اهو مناسب طور سخت ۽ خشڪ هئڻ گهرجي جيئن هڪ لڳائڻ سان هڪ نه پسي. گوشت جون تندون (ريشو) بلڪل سنهيون هئڻ گهرجن. وڏيون ۽ ٿلهيون تندون وڏي عمر ظاهر ڪن ٿيون. وڌيڪ ڍلو ۽ پسيل گوشت بيماريون ظاهر ڪري ٿو.

(۳) بوءِ: گوشت مان هڪ خاص قسم جي بوءِ ايندي آهي جيڪا عام طور تي خوشگوار هوندي آهي. بوءِ جو جانور جي صحت ۽ عمر سان گهڻو لاڳاپو هوندو آهي. مثال طور وڏي عمر واري نر بکر جي گوشت مان هڪي پيشاب جهڙي بوءِ ايندي آهي. گوشت جي بوءِ مان جانور جي صحت ۽ عمر جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو پر ان لاءِ تجربتي جي ضرورت آهي.

(۴) چرپيءَ جون تندون :- تندرست گوشت جي تندن سان گڏ چرپي جا به تاندورا هوندا آهي جيڪي جانور جي صحت منڊي ظاهر ڪن ٿا اها هڪ سني گوشت جي نشاني آهي.

(۵) پاڻي جو مقدار: سني گوشت ۾ پاڻي جو مقدار ۶۳ کان ۷۰ سيڪڙو هئڻ کپي. گوشت کي باهه تي رکي سڪائڻ سان ان جي وزن ۾ ۶۲ کان ۷۰ سيڪڙو ڪمي ٿيڻ گهرجي. جيڪڏهن وزن ۾ انهي کان به وڌيڪ ڪمي ٿئي ته ان گوشت کي تندرست سمجهڻ نه گهرجي. گوشت جي ذائقي جو دارومدار به رطوبت تي آهي. مناسب رطوبت وارو گوشت ٻچڻ کان پوءِ نهايت سٺو ذائقو پيدا ڪندو آهي.

(۶) هڏا: سني گوشت ۾ هڏن جو مقدار ۲۰ سيڪڙو کان مٿي نه هئڻ کپي. هڏن اندر پيل گودو سخت ۽ بي داغ هئڻ

اسانجي وطن پاڪستان ۾ اينمئل هسپنڊري ڊپارٽمينٽ جي اندازي مطابق ڀولتري سميت ڪل جانورن جو تعداد ٻارهن ڪروڙ ويهه لک آهي جن جي گڏيل قيمت جو اندازو اٽڪل هڪ سو چاليهه ڪروڙ روپيه آهي. انهن مان جيڪي شيون لاهيون وڃن ٿيون يا جيڪي سڌي طرح انهن مان ملن ٿيون انهن جي ساليانه قيمت اٽڪل هڪ سو پنجاهه ڪروڙ روپيه آهي. انهن فائدين سان گڏوگڏ جانورن جو جاني نقصان به ٿيندو رهي ٿو. انهي نقصان جو اندازو هيٺين الگن الگن مان پئجي سگهي ٿو. ستر لک جانور ۾ ويهه لک ڪڪڙيون ساليانو مري وڃن ٿا. انهن سڀني جي گڏيل قيمت اٽڪل ڏهه ڪروڙ چاليهه لک روپيه آهي. هن وڏي نقصان جا اصل سبب هي آهن:

(۱) بي قاعدگي سان نسل ڪشي (۲) اڻپورو ۽ خراب کاتو (۳) بدنظمي (۴) بيماريون (۵) حادثا (۶) وڏي عمر (پيدا ٿيڻ)، سڀ کان وڌيڪ نقصان بيمارين جي ڪري ٿيندو آهي. جانورن مان اهم شي جا اسان کي حاصل ٿئي ٿي سو گوشت آهي، جنهن مان اسانجي نشوونما لاءِ پروٽين حاصل ٿيون. اسان جي ملڪ پاڪستان ۾ هر ماڻهوءَ کي ۳۷ گرام پروٽين روزانه جي ضرورت آهي پر هن وقت اسان کي صرف ۹ گرام پروٽين روزانو ملندو آهي. هن ترقي يافتہ دور ۾ ڪوششون ڪيون پيون وڃن ته جيئن انهيءَ گهٽتائيءَ کي پورو ڪري سگهجي.

گوشت جا حصا :- گوشت کي ٽن حصن ۾ ورهايو ويو آهي (۱) اصل گوشت (۲) هڏا (۳) چرپي.

موجوده دور ۾ ڪوشش ڪئي پئي وڃي ته جنين اصل گوشت گهڻي کان گهڻو پيدا ڪجي.

گوشت جا جزا :- پروٽين ۱۷ سيڪڙو (۲) چرپي ۲۰ سيڪڙو (۳) پاڻي ۶۲ سيڪڙو (۴) ٻيون معدنيات هڪ سيڪڙو. گوشت جسماني طاقت ۽ گرمي پيدا ڪندو آهي. اصل گوشت کان چرپي اڍائي دفعا مٿي طاقت پيدا ڪندي آهي. سراسري طرح جانورن مان ڳئون يا مينهن مان ۵۵ سيڪڙو بکرين مان ۵۰ سيڪڙو گوشت ملندو آهي. گوشت جي پيداوار جو دارومدار جانور جي صحت، نسل ۽ عمر تي هوندو آهي.

سائنس

(بقايا — "نفسيات جون حقيقتون")

فيڊلڊ سروي ميٿڊ (Field Survey Method)

هي طريقو معاشرتي ۽ حيواني نفسيات ۾ استعمال ٿئي ٿو. هن طريقي موجب حيوانن جي ڪردار جو مطالعو ڪري ڪين پنهنجي مرغيءَ موجب هيرائن ۽ سندن ڪردار کي بدلائڻ يا سلجھائڻ ۾ ڪامياب ٿجي ٿو. معاشرتي نفسيات جي معلومات ۽ تجربي لاءِ اسڪولن، ڪارخانن، خواه زرع، فارمن ۾ وڃي شاگردن، استادن، موزرن ۽ پورهيتن جي ڪردار جو مطالعو ڪري نتيجا اخذ ڪرڻا پون ٿا، ۽ فيلڊ ورڪر اسڪولن ۾ وڃي هي ڏسي ٿو ته ڪلاسن جي جدا جدا سائيزن، پڙهائڻ جي طريقن، شرارتي شاگردن جي جدا جدا قسم جي برتاءَ جا ڪهڙا نتيجا نڪرن ٿا. ساڳيءَ طرح ڪارخانن ۽ زرع فارمن ۾ وڃي هن ڳالهه جو مشاهدو ڪري سگهجي ٿو ته نگرانيءَ ۽ پيداوار جي مختلف طريقن ۽ موزرن سان جدا جدا قسم جي سلوڪ ڪرڻ بعد ڪهڙا نتيجا حاصل ٿين ٿا. هن طريقي موجب ڪم لاءِ مناسب ماڻهن ۽ ماڻهن لاءِ مناسب ڪم جي حاصلات ۾ آساني ٿئي ٿي. موجوده نفسيات انهن سڀني سائنسي طريقن کان، جيڪي ٻين سائنسن ۾ فائديمند ثابت ٿي رهيا آهن، زياده کان زياده استفادو ڪري رهي آهي.

کمي. جيڪڏهن اهو نرم ۽ ڪاراڻ مائل آهي ته اهو جانور بيمار تصور ڪيو ويندو آهي.

(۷) ڏانقو: ٻاهرين ملڪن ۾ تازي گوشت کي گرم گوشت چيو ويندو آهي. انهي کي ماڻهو کائڻ پسند نه ڪندا آهن. انهن ماڻهن جو طريقو هي آهي ته گوشت کي گهٽ ۽ گهٽ ۽ ڪلاڪن تائين ٿڌو ڪيو ويندو آهي جنهن سان سٺو ڏانقو پيدا ٿي ويندو آهي. انهي ڪري اهي ماڻهو جانور جي ڪل لاهڻ کان پوءِ پيٽ وغيره صاف ڪري ڊاڪٽري معائنو ڪرائي ٿڌي ڪمري ۾ ٽنڪي ڇڏيندا آهن. انهي ڪمري جي گرمي جو درجو چار ڊگريون سينٽيگريڊ هوندو آهي. جيڪڏهن گوشت کي وڌيڪ رکيو هوندو آهي ته اهو ڪاڌو ۲۰ ڊگريون کن ڪاڌو ۳۰ ڊگريون سينٽيگريڊ واري ڪمري ۾ رکندا آهن جتي ڪيترا هفتار کن سان به گوشت خراب نه ٿيندو آهي. سٺي ڏانقي جو دارومدار هيٺين ڳالهين تي آهي: (۱) عام جسماني صحت (۲) عمر (۳) پچائڻ جو طريقو (۴) چرڻ جو مقدار (۵) جالور جو نسل (۶) جانورن جي جنس. جيڪڏهن جانورن کي حلال ڪرڻ کان يڪدم پوءِ پچائيو ته اهو صحيح نموني نه ڳرندو آهي ۽ ان جي ڏانقي ۾ به فرق هوندو. جيڪڏهن ٿوري دير انتظار ڪيو وڃي ته گوشت ۾ هڪ عمل ٿيڻ شروع ٿيندو آهي جنهن کي "Rigormortis" سڏيو ويندو آهي انهي جي ڪري ڪن جڳهن تي گوشت ڏڪندو نظر ايندو آهي. جڏهن هي عمل بند ٿي ويندو آهي ته گوشت سٺي حالت اختيار ڪندو آهي ۽ پچائڻ سان جلدي ڳري ويندو آهي ۽ سندس ڏانقو پڻ بهترين هوندو آهي. گوشت کي پچائڻ تائين مڪين کان محفوظ رکجي نه جيئن ڪنهن وچڙندڙ بيماري جو شڪار نه ٿئي.

(بقايا ٺهلي ٽڪاوت)

مشغولين جي يڪساني ۽ يڪرنگي کي بدلائڻ رنگارنگي اختيار ڪرڻ سان به حيرت انگيز اثر ٿئي ٿو. تنهنڪري زندگيءَ جي راه تبديل ڪرڻ گهرجي. مثلاً ڪنهن هڪ ڪم کي چنبڙي نه پئو. ڪڏهن سائيڪل هلايو ته ڪڏهن ڪاٺي سواري. نيون نيون اخبارون، رسالا پڙهڻ، نئين نئين قسم جي لباس پائڻ، مختلف ٽوپين ۽ بوت استعمال ڪرڻ سان پڻ نفسياتي ٿڪ دور ٿي سگهي ٿو. مطلب ته نفسياتي ٿڪاوت اهڙا رنگ روپ اختيار ڪندي آهي جو ماڻهو جن هڪ قسم جي فريب ۾ ڦاسي پوندو آهي. تنهنڪري سمجهدار ماڻهن کي اهڙي ٿڪاوت جي خراب اثر کان بچڻ گهرجي.

سائنس

جنهن اديب ۽ ڪتاب جي باري ۾ سائين ڊاڪٽر

غلام علي الانا جن تبصرو ڪندي چيو:

"نجم عباسي سمجهه سان پنهنجي چوڌاري سماج

۽ سماجي ماحول جو مطالعو ڪندو رهيو آهي. هن

هڪ سچا ۽ سچ گو انسان وانگر سواءِ ڪنهن پڇاڙائيءَ

جي هر ڪهاڻيءَ ۾ سچ ڳالهايو آهي، سچ لکيو آهي

۽ سچ چيو آهي."

اهو ڪتاب آهي:

پتر تي ليکو


ليکڪ:- نجم عباسي

ويجهه ڪهاڻيون. ۴ سئو صفحا، چار رپيا ملهه.

ملن جو هنڌ:-

ادبيات، سول اسپتال رستو، حيدرآباد سنڌ


آگسٽ ۱۹۷۳ع



اوزارن جي ذريعي انهيءَ هٿرادو هوا کي ٿڌو رکيو ويندو آهي ۽ ان ۾ ضرورت آهر گئس جي گردش جو انتظام هوندو آهي.

پشتاره جي ايئر ڪنڊيشنگ نظام کي حيرت انگيز ڪم انجام ڏيڻو پوندو آهي، جيئن خلائي لباس ۾ هڪ آرام ڏيندڙ درجہ حرارت قائم رهي سگهي. پشتاره سان لاڳو اوزارن کي خلائي مسافر پنهنجي مرضيءَ مطابق هلائيندو آهي. سندس چيلهم سان ٻڌل ماپ جو اوزار لباس جو درجہ حرارت ٻڌائيندو رهندو ۽ خلائي مسافر انهيءَ پشتاره جي مدد سان هڪ ئي وقت ۾ گهٽ ۾ گهٽ چئن ڪلاڪن تائين چنڊ تي هيڏانهن هوڏانهن هلي چلي سگهي ٿو.

هاڻي وال ٿو پيدا ٿئي ته جيڪڏهن خلائي مسافرن مان ڪو هڪ مسافر چنڊ جي سطح تي بيمار ٿي پوي ته پوءِ ڇا ٿيندو؟ اهڙيءَ حالت ۾ بيمار (بقايا ڏسو صفحو ۲۸)



پارن
جا
صفحا

”خلائي لباس“

خلائي مسافرن لاءِ هڪ اهڙي قسم جو لباس هجڻ گهرجي جيڪو ۳۹ هزار ميل پري چنڊ ڏانهن سفر تي رواني ٿيڻ وقت هنن جي زندگيءَ کي محفوظ رکي سگهي. خلائي لباس ۾ چئن خلائي جهاز وانگر هوندو آهي. ان لباس ۾ اهڙيون خاصيتون هونديون آهن جو جڏهن خلائي مسافر پنهنجي خلائي جهاز کان پري ٿي وڃي تڏهن به هو امڪاني خطرن کان محفوظ رهي سگهي. يعني اهو لباس سردِي، گرمي ۽ چنڊ جي مٿاڇري تي (جتي هوا جو وجود ئي نه آهي) صحيح ۽ سلامت رکي سگهي.

خلائي لباس ۾ اهم حصو ان جو ”پشتاره“ آهي، جيڪو خلائي مسافرن جي پنن تي هوندو آهي. ان ۾ آڪسيجن پربل هوندي آهي، جيڪا خلائي لباس ۾ فضا جي دٻاءُ ۽ هوا جي گردش کي برقرار رکڻ ۾ استعمال ڪئي ويندي آهي. ڪن

ٺاھڻ جو طريقو : ڇيڙا لاک کسي ميٿيلينيڊ اسپرٽ ۾ وجهي بوتل کي هڪ ڏينهن اس ۾ رکجي. ڏينهن گذرڻ کان پوءِ ان ۾ ڪنهن به قسم جو رنگ ملائجي ۽ ان کي خوب گهمائجي. گهمائڻ کان پوءِ رنگ تيار ٿي ويندو.

مظفر احمد ڀٽو - سکر



سيد آفتاب علي شاهه لکياري

(۱) شيشي تي لکڻ واري پينسل

گهريل سامان :- چرهي صاف ٿيل - ٽي حصا، پيرامين ويڪس - ٻه حصا، سپرسٽي - چار حصا، ريڊ ليڊ - ڇهه حصا، پوٽاشيم ڪاربونيٽ - هڪ حصو. پينسل جهڙي ڪاٺ جو خالي ڍانچو.

ٺاھڻ جو طريقو : سپرسٽي، چرهي ۽ پيرامين ويڪس کي باهه تي رکي ٿورو پگهرائجي جڏهن پگهرجي وڃي تڏهن ان ريڊليڊ ۽ پوٽاشيم آهستي آهستي وجهي پوءِ ڪنهن ڪاٺي وغيره مان ان کي گهمائجي ۽ پوري طرح مان ملائي ڇڏجي ته مصالحو تيار ٿي ويندو. ڏهن پندرهن منٽن لاءِ ان کي ڇڏي ڏجي پوءِ ڪاٺ جي ڍانچي ۾ لاهي ان تي ڇڏي ڏجي ته هو پوري طرح جمجي. ان کان پوءِ ان کي ٻاهر ڪڍي پينسل وانگي شيشي تي استعمال ڪجي.

(۲) بجليءَ جي بلب کي رنگين بنائڻ

توهان اڪثر ڪري رنگين بلب ڏٺا هوندا ته اوهان کي ان جي ٿڌي روشنائي ڏاڍي وڻندڙ معلوم ٿيندي هوندي. هاڻي اسين بلب کي رنگ ڏيڻ سکون ٿا.

گهريل سامان : ڇيڙا لاک ٻه حصا، ميٿيلينيڊ اسپرٽ ۱۶ حصا، اسپرٽ ۾ پاڻيل ۾ حل ٿيندڙ رنگ ضرورت آهر.

سائنس

(۳) ربڙجي مهورن لاءِ مس

گهريل سامان : مصري سنگ واري ۲-ٽولا، ماکي ۲-ٽولا ۽ پاڻي ۵-ٽولا.

ٺاھڻ جو طريقو : اهي سڀ شيون ملائي باهه تي ڪنهن ٿانو ۾ پڇايو جيئن اهي شيون ملي وڃن. پوءِ ان کي باهه تان لاهي ڇائي رکڻ گهرجي ۽ ان کانپوءِ ان ۾ ضرورت آهر ڪوبه رنگ ملائي ڪم آڻجي.

(۴) ڪاربان ڪاغذ ٺاھڻ

گهريل سامان :- سرمو ٻه حصا، پاڻي چوٿون حصو ۽ ٿورو تيل (تيل پاڻيءَ کان به گهٽ هجي). ٺاھڻ جو طريقو : سرمي ۾ پاڻي ۽ تيل ملائي ان کي خوب گهوٽڻ گهرجي. پوءِ اچي ڪاغذ تي جنهنڪي ٺاهڻو هجي، ان جي هڪ پاسي کان لائجي. ڪاغذ ائين هڻو جيئن اهو ڪارو ٿي وڃي ۽ ان کان پوءِ اس ۾ رکجي ته ڪاربان ڪاغذ ٺهي پوندو.

(۵) ٽريسڊنگ پيپر ٺاھڻ

هن قسم جي ڪاغذ مان عڪس ورتو ويندو آهي، ۽ ڊرائنگ ۾ اڪثر ڪري استعمال ٿيندو آهي. ان ٺاھڻ لاءِ هيٺيون شيون گهرجن.

گهريل سامان : روغن ناريل ۱-ٽولو، روغن تارپين ۲-ٽولا. اهي شيون پاڻ ۾ ملائجن ۽ ڪنهن سنهي ڪاغذ جي پنهي پاسي برش سان لڳائجي ته سٺو ٽريسڊنگ پيپر تيار ٿي ويندو.

آگسٽ ۱۹۷۷ع

زنده ڪوڏر ۽ زنده توڪري

توهان شايد پکين، جانور ۽ ڪيڙن مڪوڙن جي تعميري صلاحيتن جي باري ۾ پڙهيو يا ٻڌو هجي. انهن ۾ ڪي اهڙا به ٿين ٿا جيڪي وادي، سنگتراش يا درزيءَ جو ڪم به ڪندا آهن. اود بلاؤ نالي هڪ جانور جا تيز ڏند وڏي وڻ کي ڪيرائي سگهن ٿا. اود بلاؤ انهن وڻن جي ٿڙن ۽ شاخن مان سڄا ٻچا بند ٻڌي ڇڏيندا آهن جنهنڪري درياءَ جو رخ بدلاجي ويندو آهي ۽ اهي سڪل تلاءَ ڀرجي ويندا آهن جن سان اود بلاؤ ڏاڍي محبت ڪندا آهن.



نڍڙا معمار بند ٻڌي رهيا آهن.

وري جهنگل جي عام ٻاڙهين ماکوڙين (ڪولين) کي ڏسو جيڪي صنوبر جي خشڪ سولن سان پنهنجا گهڙا ٺاهنديون آهن. جيڪڏهن اسين ماکوڙين جي ڪنهن اهڙي گهر کي ڪاٺيءَ سان پهچنداسين ته اهو ڏسي عجب لڳندو ته اها شاندار عمارت ڪهڙيءَ نه ڪاريگريءَ سان ٺاهي ويئي هئي!

هاڻي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته ڇا انسان وانگر ڪم ڪندڙ اهي جانور يا جيت ڪڏهن انسان جي برابر ٿي سگهن ٿا؟ ڇا اڄ کان ڏهه لک سال پوءِ ماکوڙين جون پنهنجيون اخبارون هونديون؟ اهي هوائي جهازن ۾ اڏامي سگهنديون؟ نه هر گز نه چوٽه

ماڻهن ۽ ماکوڙين ۾ هڪ تمام اهم فرق آهي. اهو فرق ڪهڙو آهي؟

ڇا فرق اهو آهي ته انسان، ماکوڙيءَ کان وڏو آهي. نه.

ڇا فرق اهو آهي ته انسان جا ٻه ٻيڙن ٿا ۽ ماکوڙيءَ جا ڇهه؟ نه.

اسين ان کان بلڪل مختلف شئي جي باري ۾ ڳالهه ڪري رهيا آهيون.


ذرا سوچيو ته انسان ڪيئن ڪم ڪري ٿو؟ هو رڳو پنهنجا هٿ ۽ ڏند نٿو استعمال ڪري پر ڪوڏر، ڪهاڙي يا مترڪو به استعمال ڪندو آهي. انجي پيٽ ۾ توهين ماکوڙين جي گهر کي ڪيترو به ڄاڻيو ان ۾ ڪابه ڪوڏر يا ڪهاڙي ڏسڻ ۾ نه ايندي.

جڏهن ماکوڙيءَ کي ڪا شي ٻن حصن ۾ ڪاٽي هوندي آهي ته هوءَ زنده ڦينچي استعمال ڪندي آهي، جيڪا انجي مٿي جو هڪ حصو هوندي آهي. جڏهن انکي ڪا ڪڏ ڪوٺي هوندي آهي ته هوءَ پنهنجيون چار زنده ڪوڏرون ڪم آڻيندي آهي. اهي ڪوڏرون هنجي ڇهن ڀيرن مان چار ڀير هوندا آهن. اڳيان ٻه ڀير ڪڏ ڪوٺيندا آهن، پويان ٻه ڀير مٿي هٿائيندا آهن ۽ وچ وارا ٻه ڀير ماکوڙيءَ کي ڪم ڪرڻ جي وقت ٻيڻ ۾ مدد ڏيندا آهن.

ماکوڙين وٽ زنده توڪريون به هونديون آهن، جنکي ڪڏهن ڪڏهن ”ماکوڙين جون ڳايون“ به چئبو آهي. زمين جي هيٺين ۽ اونداهن تهن خانن ۾ انهن توڪرين جي قطارن جون قطارون ڇت ۾ ٽنگيل هونديون آهن. انهن توڪرين ۾ ڪا به چرپر ڪانه ٿيندي آهي. اوچتو ڪا مزدور ماکوڙي تهن خاني ۾ اچي نڪرندي آهي ۽ جڏهن انجون مڇيون ڪيترائي دفعا توڪريءَ کي ڇهنديون آهن ته پوءِ اهي چرپر ڪرڻ لڳنديون آهن. تڏهن هٿو هوندو آهي ته ان

(بقايا — "خلائي لباس")

خلا باز ٻئي خلائي مسافر کي روشني ۽ آواز جي اوزارن جي مدد سان هڪدم اطلاع ڏيندو ۽ ٻيو خلائي مسافر ٽئين خلائي مسافر کي (جيڪو خلائي جهاز ۽ چنڊ جي چوگرد گردش ڪندو رهندو) اطلاع ڏيندو جنهنڪري اهو مختلف ميٽر پڙهي جلد ئي اهو معلوم ڪري وٺندو ته ڪهڙي ڳالهه ڏيان ڏيڻ جوڳي آهي ۽ هو بيمار خلائي مسافر جي مدد لاءِ ضروري ڪاروائي ڪندو. هر هڪ خلائي لباس ۾ اهڙا اوزار به لڳل هوندا آهن جن جي ذريعي خلا باز جون دماغِي لهرن، رت جو دٻاءُ ۽ نبض وغيره جي حالت معلوم ڪري سگهجي ۽ اهڙا اطلاع رپڊيائي لهرن جي ذريعي انگ اکر گڏ ڪندڙ اوزار ڪي پهچايا ويندا آهن. خلائي مسافر وٽ هڪ مڪمل ريڊيو نشري اوزار هوندو آهي، جيڪو خلائي لباس ۾ رکيو ويندو آهي اهڙي قسم جو هڪ اوزار بانڊر جي چاٽيءَ سان لڳايو ويو هو جنهن کي گهريل طبي معلومات پهچائي ويئي هئي.



ٽوڪريءَ جو مٿو ۽ پٺ به آهن ۽ دراصل ماکوڙي جو اهو ٽوڪيل پٺ تي هوندو آهي جيڪو انڪي ٽوڪريءَ جي شڪل ڏيندو آهي. پوءِ ان ماکوڙيءَ جون واچون کلي پونديون آهن ۽ انهن جي چپ تي رس جو هڪ ڦڙو اچيو وڃي جنهنکي مزدور ماکوڙي چٽي وٺندي آهي ۽ وري پنهنجي گم تي هلي ويندي آهي. ”ماکوڙيءَ جي گانءَ“ انڪانهو وري ڇت ۾ لٽڪي سمهي رهندي آهي.

اهي آهن ماکوڙين جا ”زنده اوزار“. اهي اسانجي اوزارن وانگر هٿ جا نهيل نه پر قدرتي ٿين ٿا جنکي ماکوڙي پاڻ کان ڪڍهين به جدا نٿي ڪري سگهي. جيڪڏهن انسان به زمين جي اندر رهندڙ جانورن وانگر هجن ها ته انهن کي ڪوڏر جهڙي هٿ جي ضرورت هجي ها، اهڙا هٿ هڪ اهڙي هستيءَ لاءِ غير ضروري آهن، جيڪا زمين جي مٿان رهندڙ هجي. بهر حال اها خوشيءَ جي ڳالهه آهي ته انسان پنهنجي ارتقا جي دوران ان ڳالهه جو انتظار نه ڪيو ته قدرت هنکي ڪوڏر جهڙا هٿ ڏئي. هن پاڻ ئي پنهنجن هٿن سان ڪوڏر ٺاهي. نه رڳو ڪوڏر پر چاقو، ڪهاڙي ۽ ٻيا طرح طرح جا هزارين اوزار تيار ڪري ورتا آهن تنهنڪري هو حيوانات جي باقي دنيا جي مقابلي ۾ ايترو ته اڳتي وڌي چڪو آهي جو ٻين لاءِ هنکي جهڙن ناممڪن آهي.

حبيب الرحمان - سکر

گوڙ جي ذريعي گوڙ جو تدارڪ

آرمينيا (روس) جي سائنسدانن گوڙ جي ذريعي گوڙ کي ختم ڪرڻ واسطي هڪ مشين تيار ڪئي آهي. انهيءَ مشين ذريعي ڪارخاني ۾ مشين جي شور کي مقناطيسي ٽيپ ۾ ٽيپ ڪيو ويندو آهي. ۽ ان کي مذڪوره مشين سان گڏ يا ان جي ويجهو نصب ڪيو ويندو آهي ۽ مشين سان گڏ ٽيپ کي به هلايو آهي جنهن ڪري آواز جون لهرون پاڻ ۾ ٽڪرائجي گوڙ کي ختم ڪري ڇڏينديون آهن ۽ پوءِ ڪارخاني ۾ خاموشي چالنجي ويندي آهي. ان کان اڳ گوڙ کي ختم ڪرڻ لاءِ جيڪي طريقا استعمال ڪيا ويندا هئا انهن سان صرف ڪارخاني جي ڪنهن خاص حصي جي گوڙ کي قابو ۾ ڪيو ويندو هو.

پوپٽ (Butterfly)



پوپٽ هڪ خوبصورت اڏامندڙ جيت آهي، جنهن کي اسان عام طور تي باغن ۾ کڻن تي لاسارا ڏيندي ڏسندا آهيون. پوپٽ رڳو ڏينهن جو اڏامندو آهي. جهڙ جي موسم ۾ ٻاهر ڪن نڪرندا آهن، پر جي ڏينهن صاف هوندو آهي ته پوپٽ ڏاڍو گدگد ٿيندا آهن.

پوپٽ هڪ ڪرنڪهي وارو جانور آهي، جو ”ارٿوپوڊا“ (Arthropoda) فائلم ۽ جيتن (Insects) جي درجي سان تعلق رکندو آهي. پوپٽ جيتن واري درجي جي ”ليپيڊاپٽيرا“

(Lepidoptera) قبيلي سان تعلق رکي ٿو. جيتن جي دنيا ۾ سڀ کان وڌيڪ قسم پوپٽ جا آهن، سواءِ پتنگ ۽ تنڊن جي. پتنگ ۽ پوپٽ وري پنهنجو جدا ڪٽنب ٺاهيندا آهن. توهان پوپٽن ۽ پتنگن جي گهڻائيءَ جو اندازو ان ڳالهه مان بخوبي لڳائي سگهو ٿا ته جيڪڏهن توهان هڪ منٽ ۾ هڪ نالي جي رفتار سان انهن جا نالا لکو ته توهان کي سڀني نالن لکڻ ۾ اٽڪل ٽي مهينا لڳي ويندا.

پوپٽ هر جاءِ تي ملندا آهن، اهڙن هنڌن تي به، جتي توهان کي اميد به ڪونه هوندي. پوپٽ جهنگلي جانورن جي غارن ۾ به رهندا آهن ته وري جبلن جي چوٽين تي به اڏامندا وٽندا آهن. ڪي ٿورڙا پوپٽ هاڻيءَ ۾ به رهندا آهن. ڪي پوپٽ ته اهڙا به آهن، جي پنهنجي سڄي زندگي گهائڻ جهنگلن جي اوچن وڻن جي چوٽين تي گذاريندا آهن ۽ سڄي عمر ۾ هڪ دفعو به ميدان تي ڪونه ايندا آهن. گهٽ ۾ گهٽ پنجاهه قسم آرڪٽڪ جي برف تي رهندا آهن ۽ ”مورننگ ڪلوڪ“ پوپٽ (Mourning clock) وانگر پنهنجي زندگي برف تي بسر ڪندا آهن.

پوپٽ قديم زماني کان هن ڌرتيءَ تي موجود هئا. سائنسدانن کي ڪيترائي اهڙا نشان مليا آهن، جن مان معلوم ٿئي ٿو ته پوپٽ هن ڌرتيءَ جي مٿاڇري تي گهٽ ۾ گهٽ ۵۰۰ (پنج سؤ) لک سال اڳ موجود هئا.

پوپٽ جي بناوت :- پوپٽ هڪ جيت آهي ۽ ٻين جيتن وانگر ان جو جسم به ٽن ڀاڱن ۾ ورهايل ٿيندو آهي. حقيقت ۾ ته ”جيت“ (Insect) لفظ جي معنيٰ ئي آهي ”ڀاڱن ۾“ (In Sections). پوپٽ جو جسم هيٺين ٽن حصن ۾ ورهايل ٿيندو آهي.

۱- مٿو (Head) ۲- ڇاتي (Chest)

۳- پٺ (Abdomen).

پوپٽ جا ڀر :- پوپٽ جا ٻه نازڪ ۽ نرم ٿيندا ٿيندا آهن. جيڪڏهن توهان پوپٽ کي ٻن آڱرين جي وچ ۾ جهليندا ته توهان کي انهن ڀرن تي هڪ قسم جو ٻاٻوڊر محسوس ٿيندو. جيڪڏهن توهان ان کي آتشي شيشي سان ڏسندا ته اوهان کي هزارين مختلف

ٿيندي آهي، اڳتي پوئتي ڪم ڪري سگهندي آهي. جڏهن اها ڪم ۾ ڪونه هوندي آهي ته پوٽ ان کي مٿي جي هيٺان ويڙهي ڇڏيندو آهي. پوٽ اها سونڊ کان، پوٽن ۽ سبزين ۾ داخل ڪري رس چوسيندو وڌندو آهي.

سنگيون :- هي پوٽ کي مٿي جي آڳاٽن ٿينديون آهن. هندن کي ”اڻٽيني“ (Antennae) به ڪري چيو ويندو آهي. اهي سندس ڇهن جو حواس آهن. جهڙيءَ طرح اسين ڪنهن به شيء کي آڱرين جي مدد سان ڇهي محسوس ڪندا آهيون، اهڙيءَ طرح پوٽ انهن سنگين سان شين کي ڇهي، انهن کي محسوس ڪندو آهي.

ٽنگون :- پوٽ کي ڪل ڇهه ٽنگون ٿينديون آهن، جي سنهيون، ڊگهيون ۽ هلڪيون هونديون آهن. **پوپٽ جو ڪاڌو :-** پوپٽ هاليانيون شيون پيئندو آهي. هو پنهنجي سونڊ جي مدد سان گلن وغيره مان هاليٽ ائين چوسيندو آهي، جيئن اسان بوتل ۾ نلي وجهي سوڍا پيئندا آهيون. ڪن پوپٽن کي ڇاڙڻ واريون ڇاڙيون به هونديون آهن.

پوٽ کي هڏا ڪين ٿيندا آهن. پوٽ جو رت ڳاڙهو نه پر سائو، پيلو يا بي رنگ ٿيندو آهي، جيڪو هن جي جسم ۽ ٽنگن ۾ گردش ڪندو آهي. پوٽ جي جسم جي گرميءَ جو درجو ان جي ويجهڙائيءَ واري گرميءَ جي درجي مطابق گهٽ وڌ ٿيندو رهندو آهي. پوٽ تيز ڪونه اڏامندو آهي. اهو ايترو تيز اڏامي سگهندو آهي، جيترو ڪو ماڻهو ڊڪي سگهندو آهي.

پوپٽ جون اکيون :- پوٽ کي مٿي تي ٻه وڏيون اکيون هونديون آهن. اهي مرڪب اکيون هونديون آهن، جن مان هر هڪ ننڍڙن ننڍڙن سوين ”فيسٽس“ (facets) جو مجموعو هوندي آهي. پوٽ کي

ماهن جون ننڍيون ننڍيون ٽڪريون ڏسڻ ۾ اينديون، انهن کي ”ننڍڙا ڪنڀ“ (Scale wings) ڪري چئبو آهي. ڪي ”ننڍڙا ڪنڀ“ گول، ڪي بيضوي، ڪي مستطيل ته ڪي وري چورس ٿيندا آهن. اهي ٻرن ۾ ائين لڳل هوندا آهن، جيئن ڇت ۾ پتيون لڳل هونديون آهن. اهي ننڍڙا ڪنڀ، ٻرن کي سگهه ۽ بچاءُ جو ڪم ڏيندا آهن. هنن ننڍڙن ڪنڀن جي ڪري ئي سائنسدانن هن قبيلي کي ”ليپڊوپٽيرا“ نالو ڏنو آهي، جنهن جي معنيٰ آهي ”ننڍڙا ڪنڀ“.

اهي ”ننڍڙا ڪنڀ“ حقيقت ۾ وارن جي تبديل ٿيل شڪل آهن. انهن ننڍڙن ڪنڀن جي ڪري ئي پر خوبصورت ۽ من موهندڙ نظر ايندا آهن ۽ اهي ٻرن جي رنگ بخشيندا آهن، ان ڪري جيڪڏهن ٻرن مان ننڍڙا ڪنڀ ڪڍي ڇڏجن ته پر بي رنگ نظر ايندا. هي ننڍڙا ڪنڀ، روشنيءَ کي ڇڪيندا آهن ۽ ان کي انبلاٽ وارن رنگن ۾ ٽوڙي، ٻرن کي خوبصورت بنائيندا آهن. ڪي ڪي ننڍڙا ڪنڀ بي رنگ ٿيندا آهن، پر انهن جي مٿاڇري تي خوبصورت ليڪون هونديون آهن. اتر آمريڪا جي پوپٽن جي ٻرن جي ننڍڙن ڪنڀن جي هر هڪ انچ ۾ اٽڪل ۳۰،۰۰۰ ليڪون ٿينديون آهن. ڪي اهڙا به پوپٽ ٿيندا آهن، جن جي ٻرن ۾ ”خوشبوءِ جا ڪنڀ“ (Perfume Scales) به هوندا آهن. اهي خاص ڪري مادي پوٽ ۾ هوندا آهن، جي ان کي نر پوٽ کي متوجہ ڪرڻ لاءِ ڪم آڻينديون آهن. جڏهن مادي پوٽ پنهنجا پر لوڏيندي آهي ته هوا ۾ خوشبوءِ پکڙجي ويندي آهي. ان ڪري پوٽ کي ماڻهو ”اڏامندڙ گل“ به ڪري چوندا آهن. ڪن علائقن جون ڇوڪريون هن پوٽ کي وارن ۾ به چنبڙائينديون آهن.


سونڊ :- پوٽ کي هڪ عجيب وات هوندو آهي. هن کي ڇاڙين جي جڳهه تي هڪ ڊگهي گول سونڊ

جي وقت وارو گڏ ڪيل کاڌو کائيندا آهن، اهي رڳو ٻن ٽي ڏينهن زندهه رهندا آهن.

پوپٽ ۽ پتنگ ۾ فرق :- ڪڏهن ڪڏهن پوپٽ ۽ پتنگ ۾ فرق ڪرڻ مشڪل ڳالهه محسوس ٿيندي آهي ته اهو پوپٽ آهي يا پتنگ. پر انهن ٻنهي ۾ ڪافي فرق آهي. پتنگ جسم ۾ پوٽن کان وڌيڪ ٿلهي هوندا آهن. پوپٽ جي ڇهن واريون سنگيون سنهيون وار جهڙيون ٿينديون آهن، جن جي ڇوڙي وٽ ٻوڙهيون ٿينديون آهن، پر پتنگ جون سنگيون ٿلهيون وارن واريون ۽ انهن جون چوٽيون چنهاريون ٿين ٿيون. پوپٽ جڏهن ويهندو آهي ته پنهنجا پر آڀا جهليندو آهي، پر پتنگ پنهنجا پر سڌا جهليندو آهي. ان کان سواءِ پوپٽ پيوپا واري حالت ۾ ڪوپا ڪونه جوڙيندو آهي، پر پتنگ ڪوپا جوڙي ان ۾ ننڊ ڪندو آهي.

پوپٽ جو آتم چڪر :- پوپٽ کي ان چڪر پوري ڪرڻ لاءِ هيٺين چئن حالتن مان گذرڻو پوندو آهي.

(۱) آنا (۲) سوٽ يا لاروا (۳) پيوپا (۴) پوپٽ.



اسان وانگر شيون نظر ڪونه اينديون آهن، پر ان کي هرڪا شئي ننڍڙن ننڍڙن ٽپڪن (Dots) جي صورت ۾ نظر ايندي آهي. پوپٽ رنگ به ڏسي سگهندو آهي، ان ڪري ئي هو اڪثر رنگين گلن تي ويندو آهي. هو اڪثر ڪري نرين، ساون يا ٽڪن گلن ڏي ڇڪجي ويندو آهي ۽ گهڻو ڪري ڳاڙهي رنگ جو اثر قبول ڪونه ڪندو آهي.

پوپٽ پنهنجي حفاظت ڪيئن ڪندو آهي؟

پوپٽ جا چمڪدار پر اندرئين پاسي ناسي رنگ جا هوندا آهن، جو هڪ سڪل پن جو رنگ آهي. جڏهن پوپٽ ڪنهن وٽ جي ٿاريءَ تي ويهندو آهي ته پنهنجا پر آڀا جهليندو آهي، جنهنڪري ان جي پرن جو اندريون پاسو ڏسڻ ۾ ايندو آهي. اهو اندريون پاسو چٽ هڪ پراڻو ناسي پن لڳندو آهي، ان جي اوٽ ۾ پوپٽ جو باقي جسم لڪي ويندو آهي ۽ ان ڪري اهو پنهنجي دشمن کي نظر نه ايندو آهي.

پوپٽ ساهه ڪيئن کڻندو آهي؟

جسم تي ننڍا ننڍا سوراخ هوندا آهن، جيئن ڪنهن هوائي جهاز ۾ دريون هونديون آهن. انهن سوراخن کي ”اسپايرلس“ (Spiracles) ڪري چيو ويندو آهي. اهي هزارين ننڍڙن ننڍڙن نلين ۾ ڪلندا آهن، جي وري هوائي پمپن جو ڪم ڏينديون آهن. اهي سڀئي هوا کڻنديون آهن ۽ خراب هوا نڪال ڪنديون آهن. پوپٽ جي صورت ۾ اچڻ کان اڳ لاروا تلائڻ ۾ گذاريندو آهي. ان وقت ان جو مٿو پاڻيءَ جي اندر هوندو آهي ۽ باقي ڌڙ پاڻيءَ کان ٻاهر هوندو آهي. اندر پاڻيءَ ۾ هو پوٽن مان خوراڪ حاصل ڪندو آهي ۽ باقي ڌڙ جي وسيلي ساهه کڻندو آهي.

پوپٽ گهڻو عرصو زندهه نه رهندو آهي. هو هڪ مهينو کن مس جوانيءَ جو وقت گذاريندو آهي. ڪي پوپٽ جيڪي ڪجهه به ڪين کائيندا آهن ۽ لاروا


لاهي ٿو ۽ پيري پيري سان وڏو ٿيندو، اچي ٿين حالت ۾ پهچندو آهي.

(۳) پيوپا يا ڪرسيليس:- سوپٽ جنهن وقت پيوپا جي حالت ۾ ايندو آهي ته انڌو هوندو آهي. هن کي نه ئي گهمڻ لاءِ ٺنڪون ۽ نه ئي وري اڏڻ لاءِ پر هوندا آهن. هو رڳو پٽ جي ذريعي چري سگهندو آهي. ”پيوپا“ لفظ جي معنيٰ ئي آهي ”گڏي“ يا ”پتلي“ (Puppet). اهو نالو کيس ان ڪري ڏنو ويو آهي جو هو گڏي وانگر ڏسڻ ۾ ايندو آهي. هي رڳو آرام ڪندو آهي. هن حالت ۾ نه کاڌو کائيندو آهي نه ئي وري پاڻي پيئندو آهي. هي ڪنهن جي به خلاف ڪجهه به رد عمل نه ڏيکاريندو آهي، ان جي حالت ائين هوندي آهي جيئن ڪنهن ماڻهوءَ جي پانهن ۽ تنگن کي نوڙيءَ سان ٻڌي ڇڏجي. ٿوري وقت کان پوءِ هن مان پوپٽ پرن سوڌو ٻاهر نڪري ايندو آهي.

پوپٽ جا قسم:- هن جا گهڻائي قسم ٽين ٿا جن مان ڪي هيٺ ڏجن ٿا:

- (۱) ڏاڙهونءَ جو پوپٽ:- هي پوپٽ قد جو ننڍو ۽ رنگ جو واڱڻائي ٿئي ٿو. هن جو سوپٽ ڏاڙهونءَ ۾ گهڙي، ان کي چٽ ڪري ڇڏيندو آهي.
- (۲) سارين جو پوپٽ:- هي قد جو ننڍو ۽ رنگ جو گهاٽو پورو يا خاڪي ٿيندو آهي. هن جي پرن ۾ سڀ کان پهرين ڪارا نشان ٿيندا آهن. هن جي مادي سارين جي سڻ جي هيٺين پاسي آن جا چڱا لاهيندي آهي. هنن آن مان سوپٽ نڪرندا آهن ۽ اهي سارين جي ٻوڪ کي کائي ناس ڪري ڇڏيندا آهن.
- (۳) نارنگيءَ جو پوپٽ:- هي سنگتڙي يا ليمن جي وڻ تي لڌو ويندو آهي. هن کي پرن تي ڪارا ۽ پيلا پٽا ٿيندا آهن. هن جو سوپٽ سنگتڙن ۽ ليمن کي نقصان پهچائيندو آهي.

(۱) آنا:- مادي تمام ننڍڙن آنن جا جهڳٽا وڻن جي پنن تي لاهيندي آهي، ته جيئن جنهن وقت ان مان سوپٽ ڦٽي نڪري ته ان کي خوراڪ پرمسان ميسر ٿي سگهي. اڪثر ڪري مادي به يا ئي سو آنا ڏيندي آهي، جن مان رڳو ٿورا ڦٽندا آهن. اهي آنا سياري جي مند ۾ ڪين ڦٽن، بلڪ بهار جي مند ۾ ڦٽندا آهن.



- (۱) مورنگ ڪلوڪ (Mourning cloak) پوپٽ جا آنا
- (۲) سويلو ٽيل (Swallow tail) پوپٽ جا آنا
- (۳) ڪيبيج (Cabbage) پوپٽ جا آنا

(۲) سوپٽ يا لاروا:- ٿورن ڏينهن ۾ آنن مان ڪيڻان ڦٽي نڪري ايندا آهن، جن کي ”سوپٽ“ چئبو آهي. آنن ڏيڻ کان پوءِ مادي ته مري ويندي آهي، پر ان کان اڳ نه مري ويندو آهي. ان ڪري سوپٽ کي ”پيوپا“ نالين پهچڻ لاءِ سڀ منزلون پنهنجي سر طم ڪرڻيون پونديون آهن. هي پهرين ته ننڍڙو ٿيندو آهي، پر جيئن ته هي هيجي ٿيندو آهي، ان ڪري جيڪا به شئي سندس ويجهو ايندي ان کي کائي چٽ ڪري ڇڏيندو آهي. ان ڪري ٻوڪن ۽ فصلن کي به نقصان رسندو آهي. گهڻي ڪاڻ جي ڪري وڏو جلدي ٿي پوي ٿو ۽ ان جي کل سوڙهي ٿيڻ ڪري لهي وڃي ٿي ۽ اندران کيس نئين کل ملي ٿي. اهڙيءَ طرح ٽي چار ڪلون

- ۱۴۷۱- شیر دل خان ولد محمد بخش شیخ فرست ایتر
گورنمينت ڪاليج لاڙڪاڻو
۱۴۷۲- مجيب الله عطاء الله سومرو
گورنمينت هاء اسڪول شڪارپور
۱۴۷۳- محمد عالم چوڌري
گورنمينت ڪمپريهنسو اسڪول ميرپور خاص
۱۴۷۴- غلام مصطفيٰ ولد عبداللہ سيمڻ
گورنمينت هاء اسڪول دڙو
۱۴۷۵- محمد منير ولد غلام رسول
گورنمينت پائيلٽ سيڪنڊري اسڪول لاڙڪاڻو
۱۴۷۶- نثار احمد ولد نبي بخش
گورنمينت هاء اسڪول ڀرڙوالو
۱۴۷۷- شهاب الدين اله بخش
گورنمينت هاء اسڪول ٽنڊو قيصري
۱۴۷۸- علي احمد محمد ابراهيم
پرائمري گورنمينت اسڪول ٽنڊو قيصري
۱۴۷۹- سعيد احمد غلام نبي
گورنمينت هاء اسڪول لاڙڪاڻو
۱۴۸۰- امتياز علي ارباب علي
شاھ لطيف هاء اسڪول شڪارپور



نون ميمبرن جا نالا

- ۵۵- نالو پيءُ جو نالو درجو اسڪول جونالو
۱۴۶۰- آفتاب احمد مشتق
الون
ميونسپل هاء اسڪول سکر
۱۴۶۱- عبداللہ محمد خان
الون
گورنمينت هاء اسڪول ٿڌا سعيدپور
۱۴۶۲- ڪرم علي ڌڻي بخش
نئون
گورنمينت هاء اسڪول سعيدپور
۱۴۶۳- امتياز احمد ثناء الله
پنجون
گورنمينت قاضي محلہ پرائمري اسڪول شڪارپور
۱۴۶۴- عرفان الله ظهور احمد سومرو
پنجون
گورنمينت قاضي محلہ پرائمري اسڪول شڪارپور
۱۴۶۵- محب الله ظهور احمد سومرو
چوٿون
گورنمينت قاضي محلہ پرائمري اسڪول شڪارپور
۱۴۶۶- مکيش ڪمار ڪشنچند
پنجون
شاھ ولي الله پبلڪ اسڪول ميرپور خاص
۱۴۶۷- ڪشور ڪمار تلسيداس
نئون
قاضي حبيب الله گورنمينت هاء اسڪول شڪارپور
۱۴۶۸- مطيع الله فضل الله
الون
گورنمينت هاء اسڪول شڪارپور
۱۴۶۹- مير مظفر علي ڪامريڊ مير محمد
ڏهون
گورنمينت هاء اسڪول ٽنڊو ڄام
۱۴۷۰- اشوڪ ڪمار پورڻ سل
الون
گورنمينت هاء اسڪول سکر

”سائنس ڪلب“

* ميمبر شپ ڪوپن *

نالو ۽ پيءُ جو نالو
عمر
پڙهندڙ درجو
اسڪول
ڳوٺ يا شهر پوسٽ آفيس
تصديق ڪجي ٿي ته مٿين داخلا بلڪل صحيح آهي.
هيڊ ماستر / ڪلاس ماستر جي صحيح

۱۴۸۱- نصرالله قلندر بخش خان منگي ستون

گورنمينت هاء اسڪول ٻڙهي

۱۴۸۲- مشتاق احمد حاجي الله بخش منگي ستون

گورنمينت ياسين مڊل اسڪول جهان خان

۱۴۸۳- ملڪ ممتاز علي بخش مهر ”مهر“ فرسٽ ايئر

گورنمينت مسلم ڪاليج حيدرآباد

۱۴۸۴- غلام ياسين محمد علي شيخ ڏهون

گورنمينت هاء اسڪول لاڙڪاڻو

۱۴۸۵- محمد عظيم سعيد احمد ڏهون

گورنمينت هاء اسڪول لري مبرواه

۱۴۸۶- فيض محمد عبدالرحيم ڀرٽ فرسٽ ايئر

گورنمينت ڪاليج نوشهرو فيروز

۱۴۸۷- حضور بخش الله بخش شيخ نئون

گورنمينت پرائمري اسڪول لاڙڪاڻو

۱۴۸۸- آؤتره پيارو لعل گويندائي ستون

گورنمينت هاء اسڪول ڏهرڪي

۱۴۸۹- عبدالڪريم حاجي محمد شيخ نئون

ڪانسورپهنسو اسڪول خيرپور ميرس

۱۴۹۰- عبد الرشيد علي ڏنو شيخ پنجون

بي - سي اسڪول خيرپور ميرس

ڪوپن پريندڙن لاءِ ضروري هدايتون

(۱) هن ڪوپن لاء ڪابه داخلا في نه آهي.

(۲) فقط ۱۶ سالن تائين عمر جا شاگرد ”سائنس

ڪلب“ جا ميمبر بڻجي سگهن ٿا.

(۳) سائنس رسالي ۾ ڇپيل ڪوپن کانسواءِ سادو

ڪوپن قبول نه ڪيو ويندو.

(۴) ميمبرن جا نالا ترتيبوار نمبر اچڻ تي شايع

ڪيا ويندا.

(۵) هي ڪوپن ۲۰ پئسن واري لفافي ۾ وجهي،

”ايڊيٽر ماهنامہ سائنس انسٽيٽيوٽ آف ڪيمسٽري،

سنڌ يونيورسٽي، ڄامشورو“ جي ائڊريس تي

موڪلڻ گهرجي.

۱۴۹۱- رفيق احمد يار محمد سومرو نئون

گورنمينت هاء اسڪول سيوهڻ

۱۴۹۲- طارق امين عبدالله لکير ٽيون

پرائمري اسڪول صوبو خان منگسي شاه پنجو سلطان

۱۴۹۳- نظام علي محمد عمر ڪريڙو النون

گورنمينت مڊل اسڪول بنون

۱۴۹۴- ڪيشو لعل پرشوتم ڪرماني بهريون

مين اسڪول مٺي

۱۴۹۵- فرسٽ ڪرماني النون

هاء اسڪول مٺي

۱۴۹۶- شايداس رام چند نئون

گورنمينت هاء اسڪول پريالو

۱۴۹۷- موهنداس هسانند نئون

گورنمينت هاء اسڪول پريالو

۱۴۹۸- ڪندن داس نئون

گورنمينت هاء اسڪول ميهڙ

۱۴۹۹- رنجيت ڪمار ڏهون

گورنمينت هاء اسڪول ميرپور ماٿيلو

۱۵۰۰- رحيم بخش خير محمد عمراڻي نئون

ايم - جي - هاء اسڪول غالانوان

۱۵۰۱- نصرالله حبيب الله انڙ نئون

گورنمينت ڊائلٽ ميڪنڊري اسڪول لاڙڪاڻو

۱۵۰۲- عبدالخالق عطر خان جتوئي النون

ايس - ايم گورنمينت هاء اسڪول ٽنڊوالهيار

۱۵۰۳- محمد عثمان نور احمد ميمڻ نئون

گورنمينت هاء اسڪول شڪارپور

۱۵۰۴- عبدالله عبدالرحمان سومرو نئون

گورنمينت هاء اسڪول لاڙڪاڻو

۱۵۰۵- حفيظ احمد محمد عثمان منگي ستون

گورنمينت هاء اسڪول ٻڙهي ياسين

۱۵۰۶- نصرالله قلندر بخش منگي ستون

گورنمينت هاء اسڪول ٻڙهي ياسين


۱۵۰۷- امداد علي علي مراد بلوچ

گورنمينت هاء اسڪول رتوديرو

۱۵۰۸- چونڊ رام واڌومل جهون

گورنمينت هاء اسڪول پير جوڳوٺ

آگسٽ ۱۹۷۳ع



سائنسي معلومات

تاسي جي ريل کار: آمريڪا، برطانيه، فرانس ۽ جهان ۾ ڪافي عرصي کان تيز رفتار سواريون هلي رهيون آهن. جهان ۾ تيز رفتار ريل کار جي رفتار ۱۳۰ ميل في ڪلاڪ آهي. ان لاءِ خاص قسم جي ريلوي لائين وڇايل آهي. تازو برطانيه جي سائنسدانن هڪ نئين ريل کار هلائي، جنهن جي رفتار ۱۵۰ ميل في ڪلاڪ هئي. هن جا دها بلڪل هلڪي تاسي جا ٺهيل ۽ سڀني ايئرڪنڊيشنڊ آهن. هلندڙ گاڏيءَ جو ذرو به آواز ٻڌڻ ۾ نٿو اچي. هن ريل کار جو نالو: ”الڊوانسڊ پئسنيجر ٽرين“ (Advanced Passenger Train) آهي. هن کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ هڪ نئون طريقو تيار ڪيو ويو آهي. جنهن جي ذريعي ريل کار جي ڊرائيور جو مرڪزي ڪنٽرول آفيس سان لاڳاپو رهندو آهي.

راڊر جو استعمال: ماکڙ فصلن لاءِ سخت نقصانڪار هوندي آهي ۽ دنيا جا گهڻائي ملڪ ماکڙ جي تباهيءَ جو شڪار ٿيندا رهندا آهن. آمريڪا جي ”وارياسي ماکڙ“ ته عذاب کان گهٽ نه آهي.


ماڪڙ جي خاتمي لاءِ هڪ نئون اوزار ٺاهيو ويو آهي، جنهنجي شڪل راڊر جهڙي آهي. هن جي مدد سان ماکڙ ۽ ٻين قدرتي آفتن جي خبر جلد پئجي ٿي وڃي. هن اوزار جي ذريعي پري يا ويجهو اڏامندڙ ماکڙ ۽ ٻيا جيت پردي تي صاف نظر ٿا اچن.

سائنس

طوفان ۽ برسات جو اطلاع ڏيندڙ گره: آمريڪا ۽ ڪئناڊا ملڪن جي مدد سان آسائني لوجسٽڪ لاءِ زمين جي مدار ۾ هڪ هٿرادو گره ڇڏيو آهي، جيڪو ڪره ارض مان اهم خبرون زمين وارن کي رسائيندو. هن جو وزن ۵۲۵ پونڊ آهي. هن ۾ ڏهه مختلف اوزار نصب ٿيل آهن، جنهن کي ريڊيو جي ذريعي ڪنٽرول ڪيو ٿو وڃي. هي گره خلائي راکيٽ جي صورت وانگر آهي. هن وسيلي طوفان برساتن ۽ مٽي جي واپوڙي لڳڻ جو اطلاع اڳواٽ ئي زمين وارن کي ملي سگهندو.

آواز جي وسيلي زخمن جو علاج: چين جي ماهرن ”آواز“ جي وسيلي زخمن جو علاج ڪرڻ لاءِ هڪ طريقو ڳولهي ورتو آهي. انهن جو چوڻ آهي ته ”زخم جي جاءِ تي نبض جو آواز يا آواز جو لهرون پهچائڻ سان زخم جلد چٽي ٿو وڃي.“ ان سلسلي ۾ ماهرن سيهڙ جي ڪن تي ڪامياب تجربو ڪيو آهي. ماهرن طب پڻ سيهڙن جي ڪن کي زخم رسائي هڪ ڪي ٽي هفتا آواز جون لهرون پهچايون ۽ ٻئي ڪي معمول مطابق دوا لڳائي. نتيجي ۾ پهريون زخم جلد چٽي ويو.

آگسٽ ۱۹۷۳ع



واچ ۾ موجود اسپرنگ کي ويڙهي ڇڏيندا آهيون ۽ اهو اسپرنگ آهستي ڪلندو رهندو آهي ۽ واچ جي مشين کي هلائيندو آهي. پر آٽوميٽڪ واچ ۾ هڪ ليور (Lever) هوندو آهي جيڪو جڏهن واچ هٿ ۾ ٻڌل هوندي آهي ته هٿ جي چر ۾ ڪري پاڻ به چر ۾ ڪندو آهي ۽ اسپرنگ ويڙهو رهيو آهي ۽ واچ هلندي رهندي آهي. آٽوميٽڪ واچ کي جيڪڏهن ڪجهه ڏينهن لاءِ رکي ڇڏجي ته بيهي رهندي.

انورالدين کلي - ڏيپلو

س- ٺڪر جي دلي ۾ پاڻي ٿري ٿو پر ڌاتوءَ جي ٿانو ۾ ڪونه ٿو ٿري سو ڇو؟

ج- دلي مان پاڻي، دلي ۾ موجوده سنهن سوراخن مان سمي ٻاهر نڪرندو آهي ۽ اتان بخار ٿي اڏامي ويندو آهي. پاڻيءَ کي بخار ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ گرميءَ جي ضرورت هوندي آهي جيڪا کيس دلي ۾ موجود پاڻيءَ مان ملندي آهي ۽ اهڙيءَ طرح سان دلي ۾ موجود پاڻيءَ جو درجہ حرارت گرمي ڏيڻ ڪري گهٽبو آهي ۽ پاڻي ٺرندو آهي. ڌاتوءَ جي ٿانون مان پاڻي سمي ڪونه سگهي تنهنڪري ٿري به ڪونه.

عنايت الله هيمنٽ - حيدرآباد

س- جڏهن انسان کي ٻپ ٿيندو آهي ته دل ڌڪ ڌڪ ڇو ڪرڻ لڳندي آهي؟

ج- جڏهن ڪنهن به قسم جو ٻپ محسوس ٿيندو آهي ته انسان جي بدن مان ايڊرينلين (Adrenaline) يا ايپينيپرين (Epinephrine) نالي هارمون خارج ٿيندا آهن ۽ اهو هارمون سڌو سنئون دل تي اثر انداز ٿئي ٿو ۽ دل جو ڌڪ وڌي ويندو آهي.

آگسٽ ۱۹۷۳ع

عطاءُ محمد ڀٽو، سکر

س- هڪ جوان ماڻهوءَ جي جسم ۾ ڪيترو رت هوندو آهي؟

ج- هڪ تندرست ۽ نوجوان ماڻهوءَ جي جسم ۾ اٽڪل ڇهه لٽر رت هوندو آهي.

محبوب علي هنگسي، دادو

س- پگهر ڇو ايندو آهي ۽ ڪيئن ايندو آهي؟

ج- انسان جي جسم جو درجہ حرارت 98.6°F ٿيندو آهي. جڏهن ٻاهر جو درجہ حرارت انهيءَ درجہ حرارت کان وڌندو آهي ته جسم ۾ چمڙيءَ جي هيٺان موجود پگهر جا غدود (Sweat Glands) پگهر خارج ڪندا آهن ۽ ٻاهرين چمڙيءَ تان اهو پگهر ٻاهرين گرميءَ ڪري بخار ٿي ويندو آهي.

شامداس رامچند

س- آٽوميٽڪ واچ هر وقت هلندي رهي ٿي مگر رواجي واچ آخر بيهي ڇو ٿي رهي؟

ج- رواجي واچ کي هلائڻ لاءِ اسين ڇاهي ڏيئي

سائنس

سنڌ جي لائبريرين جي سروي لاءِ سوالنامو

"انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي" جي طرفان سنڌ جي سڀني لائبريرين جي معلومات گڏ ڪئي پئي وڃي. انهيءَ سلسلي ۾ مختلف ادارن جي سربراهن يا شخصي لائبريرين جي مالڪن کي ڏي سوالنامو موڪليا ويا آهن. جنهن ماڻهوءَ وٽ پنهنجي ذاتي لائبريري آهي ۽ جن کي هي سوالنامو پهتل نٿو آهي سي مهرباني ڪري هي سوالنامو ڀري هيٺين اڀراس تي ڏياري موڪلين.

- ۱- لائبريريءَ جو نالو _____
- ۲- لائبريريءَ جو قسم؛ _____
- ۳- لائبريريءَ جي بانيءَ جو نالو؛ _____
- ۴- لائبريريءَ جو مالڪ؛ _____
- ۵- لائبريريءَ قائم ٿيڻ جي تاريخ ۽ سن؛ _____
- ۶- شهر يا ڳوٺ جو نالو جنهن ۾ لائبريري واقع آهي؛ _____
- ۷- لائبريريءَ لاءِ فنڊ ڪير مهيا ڪري ٿو؛ _____
- ۸- لائبريريءَ ۾ ڪتابن جو تعداد؛ _____
- ۹- لائبريريءَ ۾ موجود ڪتاب ڪهڙن موضوعن تي آهن؛ _____
- ۱۰- لائبريريءَ ۾ موجود ڪتاب ڪهڙين ٻولين ۾ آهن؛ _____
- ۱۱- لائبريريءَ ۾ ڪتاب ڪهڙي قسم جا آهن (قلمي، لکيو ۽ ڇپيل)؛ _____
- ۱۲- لائبريريءَ ۾ موجود ٻئي مواد جا تفصيل (رسالا، نقشا وغيره)؛ _____
- ۱۳- لائبريريءَ جو عملو؛ _____
- ۱۴- لائبريريءَ جي سالياني بجيٽ؛ _____
- ۱۵- لائبريريءَ جي بلڊنگ (پنهنجي يا مسواڙ تي)؛ _____

(ڊاڪٽر غلام علي الانا)

اسسٽنٽ ڊائريڪٽر،

انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي،

سنڌ يونيورسٽي، ڄامشورو سنڌ

MONTHLY

Science

Registered No. S-2956


MAGAZINE

Approved by the Directorate of Education, Hyderabad Region

Vol: 3

AUGUST 1973

No. 8



“خلائي پرواز دوران، خلائي جهاز مان ٻاهر نڪري خلا ۾ پنٽ ڪرڻ جو تجربو“