



وڻن ويڃن وٽ، جي سڪين ته سڳهو ٿين (شاه)



سنڌي ۾ صحت بابت پهريون رسالو

ذبابيطس زفير
(هنن پيشابن بابت خاص ڄاڻ)





ماہوار ولج کراچی

سنڌي ۾ صحت بابت پهريون رسالو

جلد ٻيو، نمبر ستون - انون

ملھ ڦي ڪاٻي 10 روپيا
ساليانو چندو سڙ روپيا (12 ڪاپين لاءِ)

فهرست

سرپرست

پروفيسر علي محمد انصاري
ايڊيٽر انچيف (اعزازي)
ڊاڪٽر قاضي عبدالشكور
ڪنسلٽنٽ ڪلينيڪل ايڊيٽر (اعزازي)
ڊاڪٽر اقبال احمد ميمڻ
ايسوسيئيٽ ڪلينيڪل ايڊيٽر
ڊاڪٽر محمد زمان شيخ
ايڊيٽر/ مئنيجنگ ايڊيٽر
ڊاڪٽر ثناء الله ڪوڪر
ايڊيٽوريل بورڊ
اعزازي سيڪريٽري
ڊاڪٽر شمس سومرو (ڪراچي)
اعزازي ميمبر
ڊاڪٽر ممتاز مهر (ڪراچي)
ڊاڪٽر مسز شمشاد ميمڻ (حيدرآباد)
ڊاڪٽر شرف علي شاه (ڪراچي)
ڊاڪٽر يار محمد شيخ (لاڙڪاڻو)
ڊاڪٽر عبدالغفور قادري (ڪراچي)
ڊاڪٽر غلام نبي ڏيپر (نوابشاه)
ڊاڪٽر رفيق سومرو (شڪارپور)
ڊاڪٽر غلام مجتبيٰ ميمڻ (ڪراچي)
ڊاڪٽر خير محمد پيرزادو (ڪراچي)
ڊاڪٽر امان الله منگي (ڪراچي)

ٻانهن ٻيلي

امان الله نول

خاص لکڻو لاءِ

محمد اسحاق قل

سوكيوليشن مينيجر

جريح الله

- 1- اوهان جي راءِ ۾
- 2- ذيابيطس ۽ اسان جو معاشر
- 3- ذيابيطس جي عالمي ڏينهن
- جو پس منظر
- 4- ذيابيطس کان ڪيئن بچجي
- 5- مٺي پيشاب جو آزار ۽ ٻار
- 6- ذيابيطس جا قسم
- 7- ذيابيطس ڄاڻ
- 8- انسولين ذيابيطس جي
- مريضن لاءِ آخري اميد
- 9- مٺي مرض بابت مٺيون ڳالهيون
- 10- ذيابيطس ۽ غذا
- 11- ذيابيطس ۽ زندگي
- جا ڪجهه اهم موڙ
- 12- صحت سنڌ سماءُ
- پڙهندڙن جا خط
- ايڊيٽوريل
- ڊاڪٽر زمان شيخ
- ڊاڪٽر صالح ميمڻ سان انٽرويو
- ڊاڪٽر اقبال ميمڻ
- ڊاڪٽر محمد زمان شيخ
- سنڌيڪار علي مرتضيٰ ڌاريجو
- سنڌيڪار علي مرتضيٰ ڌاريجو
- سنڌيڪار ڊاڪٽر ثناء الله ڪوڪر
- ڊاڪٽر محمد زمان شيخ
- ڊاڪٽر رخشي ارشد
- سنڌيڪار اسحاق قل
- صحت بابت خبرون

رسالي ۾ ڇپيل لکڻن جي لکڻين سان ماهوار ويڇ يا ايڊيٽوريل بورڊ جو متفق هئڻ ضروري نه آهي

هر قسم جي لکڻو لاءِ ايڊيٽر ماهوار ويڇ ڪمرو نمبر 53، بلاڪ A پهرين ماڙ،
معين اسٽيل مارڪيٽ باباءِ اردو روڊ، جي پي او باڪس نمبر 568 ڪراچي سان
رابطو رکڻ گهرجي، فون: 748606

ڪمپوزنگ ۽ لي آؤٽ

پيس ڪمپوزرس

ڪمرو 11، پنجين ماڙ، آفس ٽاور، رمپا پلازا، بندر روڊ، ڪراچي، سنڌ.


هي رسالو ڊاڪٽر ثناء الله ڪوڪر مشهور آفسيٽ پريس آءِ آءِ چندريگر روڊ، ڪراچي
مان ڇپرائي ۽ ڪريسينٽ سائٽيفڪ، پروفيشنل اينڊ ڪلچرل سروسز جي آڌار تي،
ڪمرو نمبر 53، بلاڪ A، پهرين ماڙ، معين اسٽيل مارڪيٽ باباءِ اردو روڊ ڪراچي
مان پڌرو ڪيو.

ليکڪن / مواد موڪليندڙن لاءِ مشورا

- ۱- ماهوار ويچ خاص صحت بابت سنڌي ٻولي جو پهريون رسالو آهي.
- ۲- رسالي ۾ صحت سان لاڳاپيل مواد، جهڙوڪ مختلف بيمارين تي مضمون، صحت جا طور طريقا، صحت بابت خبرون، صحت بابت مواد جا ترجما ۽ صحت متعلق ٻيا عمل جهڙوڪ کاڌو، خوراڪ، رهڻي ڪهڻي، ورزش، رانديون ۽ نفسيات وغيره تي لکڻيون ڇاپيون وينديون.
- ۳- ڊاڪٽر ۽ ٻيا ليکڪ/ليکڪائون جيڪي مٿي ٻڌايل عنوانن تي لکي سگهن ٿا، انهن جي لکڻين کي ڇپائي لاءِ پايڪار چئبو.
- ۴- بيمارين تي لکڻين ۾ بيماريءَ جو تعارف، نمونا، سبب ڦهلجڻ جا طريقا، روڪڻا، علاج جا طريقا ۽ ٻيون ضروري ڳالهون شامل هجڻ گهرجن. علاج جي طريقي ۾ دوائن جا نالا نه لکڻ گهرجن ڇو ته هي رسالو عام ماڻهوءَ جي پڙهڻ لاءِ هوندو جيڪي دوائن جو غلط استعمال به ڪري سگهن ٿا.
- ۵- صحت جي طور طريقن، ورزش، کاڌي پيئي راندين ۽ رهڻي ڪهڻي جي طريقن تي معياري مواد هر ڄاڻ وارو ۽ ڏاهو ماڻهو موڪلي سگهي ٿو جنهن کي سائنسي روشني ۾ ڇنڊ ڇاڻ بعد شايع ڪيو ويندو.
- ۶- هن رسالي لاءِ نفسيات بابت مضمونن جي وڌ ۾ وڌ ضرورت آهي پر مضمون جو انداز سائنسي هجڻ گهرجي.
- ۷- ترجما ڪوشش ڪري سولي ۽ آسان ٻوليءَ ۾ ڪري موڪلڻ گهرجن جنهن ۾ جيڪڏهن ڪنهن به اصطلاح (Terminology) جو بدل نه هجي ته اتي ڏنگين ۾ ان (Terminology) جي وضاحت يا وصف (Defination) آسان ٻولي ۾ سمجهاڻ گهرجي.
- ۸- ترجمو ڪري موڪليندڙ لاءِ ضروري آهي ته هو اصل مضمون (جنهن به ٻولي ۾ هجي) ان جي فوٽو اسٽيٽ ڪاپي، اصل ليکڪ جو نالو ۽ رسالي جو نالو ضرور لکي موڪلي.
- ۹- مضمونن سان شامل تصويرن يا ڊائگرام ڪاري مس يا ڪاري ڇپائي ۾ هجن ته بهتر آهي.
- ۱۰- لکڻيون ڪاغذ جي هڪ پاسي صاف سٽري لکڻيءَ ۾ هڪ لائين ڇڏي لکڻ گهرجن.
- ۱۱- سڀئي لکڻيون ايڊيٽوريل بورڊ پاران ڪيل ڇنڊ ڇاڻ يا واڌاري کانپوءِ ڇاپيون وينديون.
- ۱۲- هر ليکڪ کي ان رسالي جون جنهن ۾ سندس لکڻي شامل هوندي، ٻه اعزازي ڪاپيون موڪليون وينديون.
- ۱۳- صحت بابت خبرون سڄيءَ سنڌ مان ڪوبه سڄڻ موڪلي سگهي ٿو، جنهن ۾ بيمارين بابت اطلاع، شڪايتون، صحيح علاج ملڻ يا نه ملڻ، صفائي جو بندوبست يا ناقص انتظام وغيره شامل هجن.
- ۱۴- پڙهندڙن جا خط پڻ هر مهيني شايع ڪيا ويندا جنهن ۾ رسالي ۾ ڇپيل مواد تي تبصرا، تنقيدون، ۽ ٻيڙا پڻ شامل هوندا. صحت جي مسئلن تي پڻ خط موڪلي سگهجن ٿا.
- ۱۵- پيچيده بيمارين بابت سوالن ۽ جوابن جو هڪ الڳ ڀاڱو هوندو جنهن ۾ هر ماڻهو پنهنجي صحت بابت ڪوبه مسئلو پڇي سگهي ٿو، جنهن جو جواب واسطيدار بيماريءَ جي ماهر ڊاڪٽر کان وٺي ڇاپيو ويندو.
- ۱۶- ميڊيڪل جي شاگردن لاءِ هڪ خاص ڀاڱو هوندو، جنهن ۾ سندن تعليمي ۽ غير نصايي سرگرمين جون خبرون ۽ مضمون شايع ڪيا ويندا.
- ۱۷- سڀئي لکڻيون مئنيجنگ ايڊيٽر ماهوار ويچ، جي پي او باڪس نمبر ۵۶۸ ڪراچي جي پتي تي عام ٽپال رستي موڪلڻ گهرجن، يا سنڌيءَ طرح ڪمر نمبر ۵۲ پهرين منزل بلاڪ اي معين اسٽيل مارڪيٽ بابائي اردو روڊ ڪراچي تي هٿو هٿ يا ٻين مواصلاتي ذريعن رستي پهچائڻ گهرجن.



اب
مقیم اور غیر مقیم
پاکستانیوں،
فرموں اور کمپنیوں کو



فارن کرنسی اکاؤنٹس

کھولنے کی مکمل آزادی ہے

اہم خصوصیات :-

- اہلیت : مقیم اور غیر مقیم پاکستانی، فرمیں، کمپنیاں، غیر ملکی افراد اور غیر ملکی کمپنیاں۔
- کرنسی : امریکی ڈالر، پونڈ اسٹرلنگ، جرمن مارک اور جاپانی ین۔
- ڈیپازٹس : بیرون ملک سے موصول ہونے والی رقومات، ٹریولرز چیکس، فارن کرنسی نوٹس اور فارن ایکسچینج بیئر سرٹیفیکٹس سے حاصل کردہ زرمبادلہ۔
- منتقلی/توسیل : دنیا کے کسی بھی حصے میں رقومات کی آزادانہ اور بلا بندش منتقلی/توسیل فارن کرنسی نوٹ اور ٹریولرز چیکس بھی جاری کئے جاسکتے ہیں۔
- ہندشوں سے مستثنیٰ : فارن ایکسچینج کنٹرول سے آزاد، حصول رقم کا ذریعہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ انکم ٹیکس، ویلٹھ ٹیکس اور زکوٰۃ کی کٹوتی سے مستثنیٰ۔
- قرضے : ان کھاتوں کے عوض پاکستانی روپے میں قرضے کی سہولت۔
- منافع : بین الاقوامی مالیاتی مراکز کے مقابلے میں زیادہ شرح منافع جو بلحاظ مدت ۶.۵۰-۶.۷۵ فیصدی سے ۱۲.۵۰ فیصدی سالانہ تک ہو سکتا ہے۔

فارن کرنسی اکاؤنٹ کھولیں۔ چند قدم پر ہماری برانچ موجود ہے

حبیب بینک لمیٹڈ

پُر خلوص خدمت کی نصف صدی

پاکستان میں ہماری مجاز شاخیں


سینٹرل بلیک، کراچی
بہادر آباد، کراچی
نرسری، کراچی
اسٹیت لائف بلیک، کراچی
صدر بلیک، کراچی
سیف ٹریڈ ڈالٹ، کراچی
ایس۔ آئی۔ بی۔ ای، کراچی
کامپریٹ بلیک، کراچی
اسٹیشن روڈ، حیدر آباد
فریئر روڈ، سکھر
پنجاب
ڈی مائل، لاہور
بادلی بلیک، لاہور
سرگرم روڈ، لاہور
ایل۔ جی۔ ایس۔ بلیک، لاہور
مین مارکیٹ گلبرگ، لاہور
پٹیو مارکیٹ، لاہور
شاہ عالم مارکیٹ، لاہور
پالٹان پانی کورٹ، لاہور
برائڈر روڈ، لاہور
واپڑا روڈ، لاہور
سٹی بلیک، اسلام آباد
پی۔ ایس۔ کاملاً، طبع انک
فریڈ کینٹ، بھاول پور
مین بلیک، ڈیرہ غازی خان
مین بازار کالان، ڈیرہ اسماعیل خان
سرگرم روڈ، فیصل آباد
ڈی جی۔ جی۔ روڈ بلیک، فیصل آباد
بینک اسٹور، گورنمنٹ بازار
جی۔ بی۔ روڈ، گورنمنٹ بازار
سرگرم روڈ، گجرات
بین بازار، ہری پور
سی۔ جی۔ ایس۔ روڈ، سکسٹھ اسلام آباد
اسلامک یونیورسٹی، اسلام آباد
کامپریٹ بلیک، اسلام آباد
پی۔ بی۔ بی۔ روڈ، اسلام آباد
ایم۔ ایس۔ بی۔ روڈ، اسلام آباد
شہید روڈ، چنگ
رام دین بازار، جہلم
ریلوے روڈ، قصور
حسین آباد، ملتان
کامپریٹ بلیک، ملتان
کینٹ بلیک، ملتان
بینک روڈ، مردان
بینک اسٹور، مینجورہ
منشی روڈ، اوکاڑہ
شاہی روڈ، جم پور
سٹی بلیک، راولپنڈی
کینٹ بلیک، راولپنڈی
ایس۔ جی۔ بی۔ روڈ، راولپنڈی
سٹی بلیک، سیالکوٹ
ایف۔ ایم۔ ایف۔ بلیک، سیالکوٹ
ایس۔ آئی۔ بی۔ ای، سیالکوٹ
ٹرینک بازار، سیالکوٹ
مناج چوک، ساہیوال
بکری بازار، سرگودھا
پی۔ او۔ ایف، واہگہ
مین بازار، وزیر آباد
سرحد
سٹی بلیک، پشاور
کینٹ بلیک، پشاور
تیکال بازار، پشاور
مین بازار، پیر پور
ملوچستان
گلیا بلیک، کوئٹہ
جناح روڈ، سوات

12 کروڑ کی بجائے

اگر ہم 6 کروڑ ہوتے!



تو آج



- ۹ سو ارب روپے کے مقروض نہ ہوتے
- ہماری فی کس آمدنی ۴۰ گنا زائد ہوتی
- ہمارا تعلیمی معیار ۱۰۰ فیصد بین الاقوامی سہولیات کا حامل ہوتا
- چائے، پیٹرول اور تیل پر آدھا زر مبادلہ صرف ہوتا
- گندم وافر مقدار میں برآمد کر کے کثیر زر مبادلہ کماتے
- نئی آبادی بڑے شہروں میں منتقل نہ ہوتی
- غربت اور کچی آبادیاں نہ ہوتیں
- ہر سطح پر خود کفیل اور خوش حال ہوتے

وزارت بہبود آبادی - حکومت پاکستان



خانہ ذاتی منصوبہ بندی کے طریقے اپنائیے

اوهان جي راءِ ۾

پڙهندڙن جا خط



لاءِ واڌايون، رسالو پهتو سڪ سان
پڙهيو سين. معياري مواد شايع ڪرڻ لاءِ
جس هجي.
ادا!

ڪوشش ڪري عام بيمارين
جهڙوڪ مليريا، ٻارن ۾ دستن جي
بيمارين نمونيا، پوليو، چمڙي جي
بيمارين اوچتو حادثو ۽ هنجي فرسٽ ايڊ
تي مختصر مضمون ماهرن کان وٺي شايع
ڪريو. انهي کانسواءِ هڪ اڌ صفحو
صوبي ۽ ملڪ ۾ ٿيندڙ طبي سرگرمين
جي حوالي پڻ ڪريو.

هر وقت سهڪار لاءِ حاضر

اوهانجو پنهنجو

ڊاڪٽر عبدالجليل پرڳڙي

بگهڙي

جواب

ساڳين!

خط لکڻ لاءِ لک ٿورا، توهان جهڙن
مهربانن جو سهڪار رهيو ته هر ڀيري
هڪ وڪ اڳتي هوندي.

توهان مهرباني ڪري ويڃ رسالي
ذريعي اسانجي رهنمائي ڪريو ۽ اهو به
معلوم ڪري ويڃ ۾ ڇاپيو ته ڏنڊ
وجهن وارو قانون ڪڏهن کان نهيو. ڇا
ان ڏنڊ واري قانون ۽ ويڃ کي ڪنهن
عدالت يا شرعي عدالت ۾ چئلينج ڪري
سگهجي ٿو. في الحال ته سمال بزنس
فنانس ڪارپوريشن لاءِ ايترو لکندس ته
هاڻي جا ڏنڊ ڏيکارڻ جا هڪڙا ۽ کائڻ جا ٻيا.
هڪ ڏکيل ڊاڪٽر

جواب

ادا ڏکيل ڊاڪٽر صاحب!

توهانجو خط جيئن جو تيئن ڇپيون
پيا. اسان پنهنجي نمائندي ذريعي
سمال بزنس فنانس ڪارپوريشن وارن
کان قانوني نقطو معلوم ڪري، ڪنهن
وڪيل سان صلاح کانپوءِ توهان کي
ويڃ رستي ضرور مشورو ڏينداسين.

هر وقت سهڪار لاءِ حاضر

پيارا ساٿي

ڊگهي سامي کانپوءِ وري وڪ ڪٽڻ

هاڻي جا ڏنڊ ڏيکارڻ جا
هڪڙا، کائڻ جا ٻيا

سمال بزنس فنانس ڪارپوريشن
وارن کان ڪجهه سال اڳي قرض ورتو
هيم. قرض موٽائڻ جو مدو ختم ٿي
چڪو آهي. ڪجهه رقم باقي واپس ڪرڻي آهي.

هاڻي سمال بزنس وارن جي وٽ وٺان
لڳي پئي آهي چون ٿا ته قرض تي ويڃ
سان گڏ ڏنڊ به لڳندو. حالانڪ قرض
ڏيڻ مهل ڏنڊ جي ڪابه ڳالهه ڪاغذن
۾ شامل ڪونه هئي. اسان مسڪين
ڊاڪٽرن کي شروع ۾ قاسائي قرض
ڏنائون، پوءِ جوڻيجي واري پروگرام ۾
نوڪري به ڪونه ڏنائون ۽ هاڻي وري
ٻيا ڏنڊ وٺن. وڏا وڏا وڏيرا ته ڪروڙين
روپيا قرض وٺي وري معاف ڪرائي
ڇڏين پر مسڪين ڊاڪٽرن کي قرض
جي معافي نه ٿيو. ويڃ به ڏيو پورو ۽
ڏنڊ به ڀريو.

توهان جو خط حاضر آهي
مهرباني

رسالو سٺو آهي پر جي ڇهت
گهٽ هوندي ته وٺندس

رسالو موڪليو يا اسٽال
جي انڊريس لکو

مان حيدرآباد کان موري وڃي رهيو هئس. مون دل ۾ سوچيو، ڇو نه بوريت کان بچڻ لاءِ ڪو رسالو يا اخبار خريد ڪريان. اهو خيال ڪري بس اسٽال کان ٿورو هيٺ لٽس ته سامهون بڪ اسٽال هئو. جن تي ڪيترائي رنگ برنگي رسالا موجود هئا. مگر توهانجي ٽائيل جي خوبصورتي دل موهي ڇڏي. اهوئي سوچي خريد ڪيم ته خوبصورت ٽائيل وانگر اندر به خوبصورت هوندو. پوءِ بس جي سيت تي ويهي رهيس ٿوري دير کان پوءِ آهستي آهستي بس هلڻ لڳي ۽ آءٌ پنهنجي ڪمزور هٿن کي همت ڏيندي ويڇ رسالي جا ورق اٽلائيندو ويس. ورق اٽلائيندي، اٽلائيندي منهنجي نظر ”ڊسٽرڪٽ ڪائونسل جي سالياني رپورٽ“ تي پئي، ائين دل ۾ خيال ڪيم ته هن رپورٽ کي پڙهان، پڙهڻ کان پوءِ ذهن جا تالا کلي ويا. ان سان گڏوگڏ ”موهينڙن کان چوٽڪارو مان ڏاڍي ڄاڻ ملي. منهنجي طرفان توهانجي سڄي اداري کي جس هجي. پهريون ڀيرو ميڊيڪل جو رسالو ڏسي ڏاڍي دل کي خوشي ٿي. اميد ته پنهنجي رسالي ۾ اڃان اهڙين بيمارين جي باري ۾ لکندا جن کان شايد اسان اڻ ڄاڻ آهيون.

اوهان جو

خالد بگهيو

حسين آباد حيدرآباد

مان زرعي يونيورسٽي ٽنڊو ڄام جو اسٽوڊنٽ آهيان. مان هڪڙي آفيس ۾ توهان جو ماهوار ويڇ ڏنم، ان کي پڙهيم مون کي ڏاڍو پسند آيو. مون کي ڏاڍو شوق آهي ته مان رسالو هر مهيني پڙهان پر مون کي اهو رسالو ويڇ ملي ڪونه ٿو، ان لاءِ مان توهان کي خط لکي رهيو آهيان ته مهرباني ڪري توهان هن انڊريس تي يا حيدرآباد جي ڪنهن دڪان جي انڊريس ٻڌائيندا جتان اهو رسالو ملي ٿو. هر مهيني رسالو موڪليندا رهو ته توهان جي مهرباني ٿيندي.

راشد مصطفيٰ ميمڻ

سنڌ زرعي يونيورسٽي ٽنڊو ڄام
جواب:-

سائين رسالي جي سالياني خريداري جو فارم پري هڪ سئو روپين جي ٻرافٽ سان اڳواٽ موڪليو ته رسالو توهان کي ملندو رهندو. حيدرآباد ۾ اسانجو سول ايڇنٽ شاھ لطيف ڪتاب گهر گاڏي کاتي ۾ آهي يا انڪانسواءِ ٻين به ڪيترن ئي اسٽالن تي موجود آهي. هي رسالو توهانجو پنهنجو آهي تندي ڄام ۾ انهي لاءِ ايڇنٽ ڳولي کيس چوندا ته حيدرآباد مان هول سيل ايڇنٽ وٽان ڪاپيون وڪري لاءِ وٺي اچي.

مهرباني

توهان ڪراچيءَ مان صحت جي باري ۾ ماهوار سنڌي ”ويڇ“ رسالو شايع ڪيو ٿا. مون کي اهو ٻڌي ڏاڍي خوشي ٿي ته توهان ڪافي جدوجهد ڪري صحت تي ڄاڻ هٿ ڪري هڪ رسالي جي صورت ۾ ماڻهن جي ذهنن تائين پهچايو ٿا. ادا مون اهو رسالو ڪنهن شخص وٽ دوران سفر ڏٺو هو ۽ ان جو جائزو ورتو تمام سٺو لکيل هو. ان ڪري آئون توهان کي هيءَ خط لکي رهيو آهيان. آئون غريب شاگرد آهيان صحت تي لکيل رسالو تمام سٺو

آهي. اميد ٿو ڪريان ته ضرور به ضرور تفصيل سان لکي موڪليندا. جيڪڏهن رسالي جي في گهٽ هوندي ته پهچ مطابق ضرور به ضرور وٺندس.

مهرباني.

توهان جو

شفيع محمد چنڊ

ادا شفيع محمد چنڊ صاحب

خط لکڻ لاءِ مهرباني - رسالي جي سالياني في فقط هڪ سئو روپيا آهي جيڪا اسان پنهنجي غريب قوم جي هر فرد لاءِ هڪ ڪري رکي آهي. مناسب لڳي ته سالياني چنڊي جو فارم پري موڪليو نه ته هونئن به رسالو ڏهه روپيا في ڪاپي جي حساب سان اسٽالن تي موجود هوندو آهي.

ذبابيٽس ۽ اسان جو معاشره

ويج جي خاص ڇاپن (Special editions) ڇاپڻ جي سلسلي ۾ ڪافي مهربان اسان کي ڪجهه عرصي کان لکي رهيا هئا، سندن مشورن تي سوچڻ کان پوءِ اسان ان نتيجي تي پهتا آهيون جو ويج جو پهريون خاص ڇاپو اڄ توهان جي هٿن ۾ آهي.

اسان ويج جي خاص ڇاپي جي بسم الله اهڙي نرالي مرض جي موضوع سان ڪري رهيا آهيون جيڪو انسان ذات جو بترود شمن آهي يعني ڪٿي ڪنهن سان ظاهري ڀيو وڙهندو ۽ ڳاريندو ته ڪنهن کي وري جسم اندر ڳجهي نموني ڀيو پيچيدگيون پندا ڪندو، ڪڏهن ڪڏهن ته وقتائتي خبر نه پوڻ تي اندر ني اندر ڪيترن عضون کي ڳاري ۽ ساڙي ڇڏيندو.

ذبابيٽس جي بيماري هن دؤر جي ڪنهن به فرد کان ڳجهي نه آهي، پر انهيءَ جي هاڃن کان تمام ٿورا ماڻهو واقف آهن، ان حد تائين جو ڪڏهن ڪڏهن ذبابيٽس جا ڪيترا مريض اڻڄاڻائي سبب پيچيدگين جو شڪار ٿي ويندا آهن ۽ جڏهن پاڻي مٿي تائين چڙهي ايندو آهي ته پوءِ ڀيا هٿ پير هڻندا آهن ۽ ڊاڪٽرن تائين ڊڪندا آهن ته ”وارو ڙي وارو سر ٿو وڃي“. ڪيترا ماڻهو وري ڄاڻ هوندي به ان ڳالهه جي پرواهه نه ڪندا آهن ۽ چوندا آهن ته ”مولا مالڪ آهي“ اڳتي هلي ڏٺو ويندو. ڪي وري غير سائنسي طريقن سان ڀيا پنهنجا ٽوٽڪا استعمال ڪندا ته فلاڻي ماڻهو فلاڻي شيءِ کاڌي، ٺيڪ ٿي ويو، بس هاڻي رڳو منهنجي ڪاڻ جي دير آهي، اجهو ٿو نيڪ ٿيان.

ياد رکڻ گهرجي ته ذبابيٽس هڪ اهڙي بيماري آهي جيڪا اگر هڪ ڀيرو شروع ٿئي ٿي ته پوءِ ان کان جان ڇڏائڻ ناممڪن آهي، ها باقي ان تي قابو پائڻ يا ڪنٽرول ڪرڻ آسان آهي ۽ اهو ڪنٽرول ئي آهي جنهن سان ذبابيٽس ۾ قاتل هر انسان پنهنجي حياتي سٺي نموني سان گذاري سگهي ٿو ۽ ذبابيٽس جي هاڃن کان بچي سگهي ٿو. پوءِ اهو ڪنٽرول دوائن سان هجي يا کاڌو خوراڪ سان. ان سلسلي ۾ اسان ڪافي حد تائين ويڃ وسيلي اوهان تائين ڄاڻ پهچائڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهيون، جيڪا ذبابيٽس ۾ قاتل ماڻهن لاءِ خاص طرح ۽ هر ماڻهو لاءِ عام طرح مددگار ثابت ٿيندي عام ماڻهن لاءِ به ذبابيٽس جي ڄاڻ نهايت ضروري آهي چوڻ ته ذبابيٽس جي مريضن سان انهن جا جيڪي لڳ لاڳاپا آهن، تن وسيلي هوبه انهن مريضن جا مددگار ثابت ٿي سگهن ٿا.

اسان وٽ هڪ عجيب وهنوار آهي جيڪڏهن ڪير ڪنهن وٽ مهمان ٿي ويو، پوءِ پل اهو ذبابيٽس يا دل جي بيمارين ۾ قاتل چوڻ هجي، ميزبان پنهنجي ميزبانيءَ جا سڀئي فرض پورا ڪرڻ ۾ لڳو پيو هوندو. هر شيءِ ڀيو مهمان کي ڪارائڻ جي ڪوشش ڪندو ۽ چوندو ويندو ته ”قسمت سان ته آيو آهين ڪجهه نه ٿيندو“ اگر ڪير بيماري سبب انڪار ڪندو ته ميزبان سڳورو ٿورو ناراض به ٿي ويندو، اهو ڪونه ڏسندو ته سندس ميزباني، مهمان لاءِ چڱائي آهي يا جوکو. انهيءَ ڪري هر ماڻهو کي ذبابيٽس ۽ ٻين بيمارين جي بنيادي ڄاڻ هئڻ ضروري آهي ته جيئن وقت سر ڪير پنهنجن پيارن- يارن ۽ مٿن ماڻهن سان وير نه ويري.

ذبابيٽس ۾ قاتل ماڻهو جي اگر ڪير دعوت ڪري ته ان ميزبان جو اهو فرض آهي ته دعوت ۾ کاڌا اهڙا تيار

ڪرائي جيڪي مهمان جي کائڻ جوڳا هجن ۽ اهي کاڌا ميزبان به کائي سگهي. پر جي کاڌا صرف ميزبان جي کائڻ جوڳا هوندا ته اها مهمان سان زيادتي ٿيندي.

ذيابيطس جي بيماري کي لڪائڻ جو به اسان وٽ ڪافي رجحان آهي. متان ڪير توکي نه وجهي. ٻين سامهون سڀ ڪجهه پيا کائون، گهر ۾ پرهيڙ ڪبي. پر ياد رکڻ گهرجي ته ڪنهن به مريض کي توکڻ، مرض ڏيندڙ کي توکڻ برابر آهي چوڻ انسان بيماري اڳيان بيوس آهي. انڪري معاشري مان مرض ۽ مريض بابت توک واري عادت ختم ڪرڻ گهرجي ۽ مريض کي گهرجي ته هو معاشري ۾ هر شي چٽي طرح کولي ٻڌائي. جنهن ۾ سندس ئي فائدو آهي ڪنهن به بيماري کي لڪائڻ سخت هاجيڪار ثابت ٿي سگهي ٿو.

اسان اڃا ايترا حقيقت پسند چوڻ ٿي سگهيا آهيون جو هر لڳائي، چڱائي ۽ برائي، ڀلائي کي هر ڪنهن آڏو ظاهر ڪري سگهون. جنهن سان اسان کي ڪا روشن راه ملي سگهي، چوڻ حقيقت ۽ سچ ئي هر موڙ تي صحيح رستو ڏيکاري ٿو. روڪ، توک ۽ نٺول اسان کي هر موڙ تي اوندهه پاسي ڏڪيندا رهن ٿا، تنهنڪري صحتمند معاشري لاءِ اهو ضروري آهي ته اسان جو هر قدم، هر دم اٽل ۽ حقيقتن تي ٻڌل هجي. نه صرف بيمارين جي سلسلي ۾ پر هونءِ به اها حياتيءَ جي وهنوار جي واٽ هٿن گهرجي.

ذيابيطس جي هن خاص اشاعت ۾ اسان ڪجهه ڏيهي ۽ پرڏيهي ماهرن جا مضمون ۽ رايا ڇاپي رهيا آهيون اميد ته اسان جا پڙهندڙ نه صرف پاڻ پڙهندا پر اها ڄاڻ هن ڌرتيءَ جي ڪنڊ ڪڙڇ تائين پکيڙڻ ۾ پاڻ پتوڙيندا ۽ انهن تي عملي ڪم ڪندا. ذيابيطس جي مسئلي کي معاشري ۾ جڏهن گڏيل بنيادن تي کڻبو تڏهن ئي ان کي قابو ۾ ڪري سگهبو.

ڊاڪٽر سليمان شيخ سان تعزيت

مشهور سماج سڌارڪ، اديب ۽ سنڌ گريجوئيٽس ايسوسيئيشن جي چيئرمين محترم ڊاڪٽر سليمان شيخ جنهن پنهنجي سڄي جمار ٻين جي صحت ۽ چڱيلائي لاءِ وقف ڪري ڇڏي تنهن جي نياڻي سان سپر هاءِ وي تي جيڪو حادثو پيش آيو، اسان جو ادارو ان سلسلي ۾ ڊاڪٽر صاحب ۽ سندس خاندان جي ڏک ۾ ڀاڱي ڀانيوار آهي. اهو ٻڌي ڏاڍو افسوس ۽ تعجب ٿيو ته ڊاڪٽر صاحب جي نياڻي جيڪا پاڻ به ڊاڪٽر هئي، سا حادثي کان پوءِ جياپي لاءِ جدوجهد ڪندي ايل. ايم. سي اسپتال تائين پهتي، جتي اڻپورين طبي سهولتن سبب هوءَ موت جو مقابلو نه ڪري سگهي. افسوس! جنهن ملڪ ۾ مسيحيان لاءِ به طبي سهولتن ۽ پهچ جو معيار اهڙو ڪريل هوندو ته ڇا اهو ملڪ صحت جي عالمي اداري (W.H.O) واري پروگرام ”سال 2000ع تائين صحت سڀن لاءِ“ سان گڏوگڏ هلي سگهندو.

ڊاڪٽر زمان شيخ سان تعزيت

ماهور ويچ جي ايسوسيئيشن ڪلينيڪل ايڊيٽر ڊاڪٽر زمان شيخ جو والد محترم امام بخش شيخ تازو ڪراچي ۾ وفات ڪري ويو. اسان ڊاڪٽر صاحب جي ڏک ۾ برابر جا شريڪ ٿي مرحوم جي مغفرت لاءِ دعا ڪريون ٿا.

_____ ادارو

ڏيآبيطس جي عالمي ڏينهن جو پس منظر

ڊاڪٽر زمان شيخ
ايم. بي. ايس. ايم. آر. سي. پي. ايف. سي. پي ايس. ايم. ايس. سي (انڊوڪرائينالاجي ۽ ڊائبيٽيز)

ڇا اوهان ان مرض کان باخبر آهيو
جيڪو سموري دنيا ۾ 120 ملين ماڻهن
کي سنئون سڌو متاثر ڪري رهيو آهي.

ماريندڙ پيچيده بيماري آهي ۽ اها يقيني
طور تي موتمار آهي، جيڪڏهن ان جو
صحيح ۽ بروقت علاج نه ڪيو وڃي ته.

ضروري ۽ بنيادي ڄاڻ عام ماڻهن تائين
پهچائي وڃي ۽ ان کان اڳواٽ بچاءَ جي
طريقن تي عمل ڪيو وڃي. ان لاءِ اهڙي

قصر جي تعليمي
تقريبن (EVENTS)
ليڪ ۽ پوسٽرن جي
مدد سان ماڻهن جو
ڌيان هن شديد قسمر
جي هاجيڪار بيماريءَ
ڏانهن ڇڪايو ويو.
ان سلسلي جي سڀ
کان پهرين تقريب 9

اها سموري دنيا ۾ ڏيآبيطس جي پيچيدگين جي خلاف جهاد جي
شروعات هئي ۽ ان سلسلي ۾ جدوجهد تيز ڪرڻ جي عزم جو
اظهار هو. سڀ کان اهم ڳالهه ته اها جدوجهد صرف هڪ ڏينهن
تڪ مشتمل نه هئي، پر اها هڪ مسلسل ڪوشش جو عزم هئي.
جيڪا تيلستائين جاري رهندي جيستائين ڏيآبيطس جي موزي مرض
جو هن دنيا ۾ نالو نشان باقي آهي.

جنهن ڪري سڌي
يا ان سڌي طرح
دل جي دوري،
اڌرنگي، گردي جي
بيمارين، نظر جي
لاچاري/موتئي (انڊو
ٽي پوٽائين)،
گينگرين (پيرن جو
سڪي، ڪارو ٿي

مئي تي جنيوا (سڙر لينڊ) ۾ چوٿيتاليهين
ورلڊ هيلٿ اسيمبلي جي موقعي تي منعقد
ڪئي وئي. جنهن ۾ سموري دنيا جي
86 ملڪن جي اٽڪل هڪ سو تنظيمين
وٽان 450 کان وڌيڪ ڏيآبيطس سان
دلچسپي رکندڙ ماڻهن شرڪت ڪئي.
دنيا جي هر خطي سان تعلق رکندڙ ۽
جدا جدا ٻوليون ڳالهائيندڙ انهن ماڻهن
ڏيآبيطس جي باري ۾ عام بيداري آڻڻ ۽
علم ڦهلائڻ جو پرجوش مظاهرو ڪيو.
ميمبر ملڪن کي هن بيماري جي مسئلن
جي باري ۾ سوچڻ ۽ کين حل ڪرڻ

ان باري ۾ بين الاقوامي ڄاڻ ڏيڻ لاءِ
W.H.O (ورلڊ هيلٿ آرگنائيزيشن) ۽
I.D.F (انٽرنيشنل ڊائبيٽيز فيڊريشن)
ٻنهي گڏجي مختلف ملڪن جي قومي ۽
مقامي، سرڪاري ۽ غير سرڪاري ادارن
جي تعاون سان دنيا جو پهريون ”عالمي
ڏيآبيطس ڏينهن“ 27 جون 1991 تي
W.H.O جي قرارداد نمبر 423 مطابق
ملهايو. اهڙي قسم جي عالمي سهڪاري
ڪوشش ۽ ڏينهن ملهائڻ جو مقصد اهو
هو ته شگر جي مريضن جي زندگيءَ جي
معياري کي وڌائڻ سان گڏوگڏ شگر بابت

ناڪاره ٿي وڃڻ) ۽ حمل جون بيشمار
پيچيدگيون ٿي سگهن ٿيون. پڪ سان
توهان جو اندازو صحيح آهي. ان لاڳائي
کي ڏيآبيطس يا شگر جو مرض چئبو
آهي. پر حقيقت اها آهي ته هن بيماريءَ
جي هاجيڪار ۽ دائمي اثرن جي ڄاڻ
جي حوالي سان اوهان ان ٿورائي يا اقليت
سان واسطو رکو ٿا جا هن موزي مرض
کان باخبر هجڻ جو شرف رکي ٿي
چوٽ 95 سيڪڙي کان وڌيڪ دنيا جي
آبادي ان حقيقت کان بلڪل بيخبر آهي
ته ڏيآبيطس هڪ ماريندڙ، اجهه ڇيچلائي

جي ضرورت تي زور ڏنو ويو. هن موقعي تي صحت جي عالمي اداري (W.H.O) جو ڊائريڪٽر جنرل ڊاڪٽر ناڪا جيما بذاتِ خود شريڪ ٿيو ۽ هن ڳالهه تي زور ڏنو ته ذیابیطس جي منهن زور گهوڙي کي لغام ڏيڻ لاءِ منظم ۽ گڏيل ڪوششون جاري رکڻ گهرجن.

اها سموري دنيا ۾ ذیابیطس جي پيچيدگين جي خلاف جهاد جي شروعات هئي ۽ ان سلسلي ۾ جدوجهد تيز ڪرڻ جي عزم جو اظهار

هو. سڀ کان اهر ڳالهه ته اها جدوجهد صرف هڪ ڏينهن تي مشتمل نه هئي پر اها هڪ مسلسل ڪوشش جو عزم هئي جيڪا تيستائين جاري رهندي جيستائين

ذیابیطس جي موذي مرض جو هن دنيا ۾ نالو نشان باقي آهي.

هن سلسلي جي هڪ ڪڙي 22-20 جون 1991 تي باليٽمور ۾ هڪ سيٽلائيٽ (SATELLITE) سمپوزيم هيو. آگسٽ 1992 ۾ جرمني ۾ جرمن ذیابیطس يونين جي زیرِ اهتمام هڪ ورڪشاپ منعقد ٿيو. اها ”گڏيل جرمني“ جي پهرين ڪامياب ڪوشش هئي جنهن ۾ ذیابیطس جي مختلف پيچيدگين جو جائزو ورتو ويو ۽ جن

مسئلن تي غور و فڪر ڪيو ويو تن ۾ ذیابیطس، رانديون ۽ عملي ورزش، نفسياتي پهلو، حمل ۽ خانداني منصوبه بندي، شگر جي مريضن ۽ طبيبن جو باهمي رشتو، ذیابیطس خلاف ضابطا ۽ گلوڪوز جو رت ۽ پيشاب ۾ تيست ڪرڻ، عام سماجي سوال وغيره شامل هئا.

اهي ۽ ان سلسلي جون بيشمار ٻيون گڏجاڻيون نهايت پراثر، منظم ۽ ڪامياب رهيون. ان سلسلي ۾ پاڪستان

صحت واري عالمي اداري (W.H.O) جي لڳايل هڪ اندازي مطابق شگر جي بيماري ڪروڙين انسانن کي متاثر ڪري ٿي، پر افسوس جي ڳالهه اها آهي ته انهن جي اڪثريت کي ذیابیطس جي باري ۾ بنيادي آگاهي ۽ بنيادي سهوليتون ميسر ناهن. 1989 ۾ ذیابیطس کي صحت عامه جو وڌندڙ بين الاقوامي مسئلو قرار ڏنو ويو ۽ ورلڊ هيلٿ اسيمبلي اتفاق راءِ سان هڪ قرارداد پاس ڪري، ميمبر ملڪن تي زور ڀريو ته هو ذیابیطس جي قوهي اهميت جو ڪاڻو ڪن ۽ ان کي اجاگر ڪندي ان کي حل ڪرڻ جي پرزور ڪوشش ڪن

۾ گذريل سال جون ۾ ڪراچي ۾ ذیابیطس ايسوسيئيشن آف پاڪستان (D.A.P) جي زیرِ اهتمام هڪ سمپوزيم منعقد ٿيو جنهن ۾ مختلف مقالن ۾ هن ڳالهه تي زور ڏنو ويو ته ذیابیطس کي جڙ کان ختم ڪرڻ لاءِ گهڻو ڪجهه ڪرڻو آهي. تازو D.A.P جي ڪراچي سينٽر ۾ ان سلسلي ۾ ذیابیطس جي ماهرن ۽ مريضن جي هڪ گڏجاڻي ٿي جنهن ۾ وڏي تعداد ۾ شگر جي مريضن حصو وٺي مختلف سوال

پڇيا ۽ معلومات حاصل ڪيائون. 1992 ۾ امريڪن ذیابیطس ايسوسيئيشن (A.D.A) اهو نعرو ڏنو (TOGETHER WE CAN, JUN-TOS-PODEMOS) يعني جيڪڏهن اسان سڀ گڏجي ڪوشش ڪيون ته اهو ممڪن آهي. يعني اسان سڀني جي گڏيل ڪوشش سان ئي ذیابیطس تي فتح پائڻ ممڪن آهي.

ذیابیطس ترقي يافته ۽ ترقي ڪندڙ ملڪن ٻنهي ۾ صحت

عام (PUBLIC HEALTH) جو اهم ۽ ڌيان طلب مسئلو آهي. اها وڃي گهڻن ئي ملڪن ۾ موت جي مڙني سببن کان وڏو سبب بڻجي چڪو آهي. صحت

واري عالمي اداري (W.H.O) جي لڳايل هڪ اندازي مطابق شگر جي بيماري ڪروڙين انسانن کي متاثر ڪري ٿي، پر افسوس جي ڳالهه اها آهي ته انهن جي اڪثريت کي ذیابیطس جي باري ۾ بنيادي آگاهي ۽ بنيادي سهوليتون ميسر ناهن. 1989 ۾ ذیابیطس کي صحت عامه جو وڌندڙ بين الاقوامي مسئلو قرار ڏنو ويو ۽ ورلڊ هيلٿ اسيمبلي اتفاق راءِ سان هڪ قرارداد پاس ڪري، ميمبر ملڪن تي زور ڀريو ته هو ذیابیطس جي

مطابق مريضن جي بيروني شعبي (O.P.D) ۾ ذيابيطس جي پرگهور تي پڻ ڪافي انفرادي قوت ۽ وسيلو خرچ ٿين ٿا. ترقي پذير ملڪن مان آيل انگن اکرن مطابق بيروني شعبي ۾ آيل 53 سالن کان وڏي ڄمار وارن ماڻهن ۾ 8 فيصد تائين ذيابيطس جا مريض هوندا آهن 1992 ۾ ان کان پوءِ ايندڙ سالن ۾ ذيابيطس جو عالمي ڏينهن 14 نومبر تي ملهائڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي. ان ڏينهن جي اهميت اها آهي ته ان يادگار ڏينهن تي 1891ع ۾ فريڊرڪ گرانٽ بينٽنگ (BANTING) جنم ورتو هو. بينٽنگ کي انسولين دريافت ڪرڻ تي 1923ع ۾ نوبل پرائز سان نوازيو ويو هو. 1921ع ۾ 14 نومبر تي ئي بينٽنگ ۽ بيسٽ جي مشاهدي تي ٻڌل مڪمل رپورٽ پهريون ڀيرو شايع ڪئي وئي. هن سال ۽ ايندڙ هر سال ۾ هن ڏينهن تي اهو عهد ڪيو ويندو ته اسان جي گڏيل جدوجهد تيستائين جاري رهندي، جيستائين دنيا مان ذيابيطس جو مڪمل خاتمو نٿو ٿي وڃي.

حملي سبب جيڪي مسئلا سامهون اچن ٿا. انهن ۾ شگر جي مقدار ۾ گهٽتائي ۽ ان سبب بيهوشي، شگر جي مقدار ۾ تمام گهڻي واڌ (DIABETIC KETO ACIDOSIS) وغيره شامل آهن. ڪهنين پيچيدگين ۾ وري تن تي/ اعصابي سرشتي جي خرابي، اکين جي پردي جي خرابي (RETINO PATHY)، گگردن جي خرابي (NEPHRO PATHY)، دل ۽ ان جي شريانين جي خرابي، فالج ۽ پيرن جو ڪارو ٿي سگهي وڃي (GANGRENE) وغيره شامل آهن. سڌي يا اڻسڌي طرح ٻين بيمارين جي پيٽ ۾ هن بيماريءَ تي وڌيڪ لاڳت اچي وڃي. 1986-87 دوران برطانيه جي صحت واري سڄي بجيٽ جو چار کان پنج سيڪڙو ذيابيطس جي بيمارين لاءِ ڪٽيو ويو. هن بيماريءَ تي لاڳت ان ڪري زياده اچي ٿي جو اهڙي قسم جا مريض جڏهن اسپتال ۾ داخل ٿيندا آهن ته سندن شگر ڪنٽرول ڪرڻ يا پيچيدگين جي علاج لاءِ کين گهڻي وقت لاءِ اسپتال ۾ داخل رکڻو پوندو آهي. صحت واري عالمي اداري (W.H.O)

قومي اهميت جو ڪاٿو ڪن ۽ ان کي اجاگر ڪندي ان کي حل ڪرڻ جي پرزور ڪوشش ڪن ۽ ملڪن جي آباديءَ جي تناسب سان ان جي روڪٿام جي ڪوشش ڪن. ٻين ملڪن جي ڪيل ترقي ۽ ايجادن مان فائدو وٺڻ ۽ پنهنجي پنهنجي ملڪ ۾ صحت جي تعليم ۽ ڄاڻ جا موقعا فراهم ڪن. ترقي پذير ملڪن کي بيمارين جا اڳ ۾ ئي گهڻا بار مٿي تي آهن، جن ۾ ڪيتريون ئي وچڙندڙ يا جراثيمن سان پيدا ٿيندڙ بيماريون (INFECTIONS) ان وچڙندڙ بيماريون ۽ غذائي قلت جي ڪري ٿيندڙ مرض شامل آهن. اهي ملڪ اڃا انهن قديم بيمارين کان ئي آڃا ڪونه ٿيا آهن.

ذيابيطس سبب جيڪي پيچيدگيون ٿين ٿيون انهن ۾ هڪ ته مرض جو شدت وارو حملو ۽ ٻيو ڪهنو ٿي ويل مرض شامل آهن. اهي پيچيدگيون مختلف رفتارن ۽ شدت سان حملو ڪن ٿيون. ۽ انفرادي طرح هر ڪنهن جي حياتيءَ کي متاثر ڪري ڪيترين ئي معذوري ۽ موت جو سبب بڻجن ٿيون. شدت واري

(ايئر ڪنڊيشنڊ)

لاڙڪاڻي ۾

دان ٽيلرز

قميص، شلوار، پتلون، بش ڪوٽ ۽ واسڪيٽ وغيره.


رائل ڪمپليڪس

رائل روڊ لاڙڪاڻو فون نمبر: 22200

جينٽس اسپيشلسٽ

پروفيسر ڊاڪٽر صالح ميمڻ سان ڳالهه ٻولهه ذيابيطس کان ڪيئن بچجي

گفتگو: ڊاڪٽر ثناء الله ڪرڪر - صادق بزدلي - امان الله نول




پروفيسر ڊاڪٽر صالح ميمڻ جو نالو سنڌ جي ڪنهن به ماڻهو کان ڳجهو نه آهي. سنڌي لوڪ ادب جي مشهور ڪردارن واري ماڳ ٿر جي مشهور شهر ڏيپلي ۾ سال 1926ع ۾ جنم ورتائون ۽ پنهنجي پرائمري تعليم اتان ئي حاصل ڪيائون. ان کانپوءِ ڪڏهن پنڌ ته ڪڏهن اٺن جو سفر ڪري (تنهن زماني ۾) اچي ميرپور خاص جي سنڌ مدرسه هاءِ اسڪول مان 1943 ۾ مئٽرڪ جو امتحان پاس ڪيائون. وري ڊي جي سنڌ ڪاليج ڪراچي مان 1943 ۾ انٽر ڪرڻ کانپوءِ ايم. بي. ايس جي تعليم لاءِ بمبئي جو رخ اختيار ڪيائون جتان 2 سال علم پرائڻ بعد برصغير جي ورهاڱي ڪري واپس ڪراچي وريا ۽ باقي 3 سال ڊائوميڊيڪل ڪاليج ڪراچي ۾ تعليم حاصل ڪري ايم. بي. ايس جي سند حاصل ڪيائون. ان کانپوءِ ڪجهه وقت حيدرآباد، ڪراچي ۽ جيڪب آباد ۾ خدمتون سرانجام

ڏيڻ کانپوءِ ڊاڪٽري جي اعليٰ تعليم لاءِ ملڪ کان ٻاهر هليا ويا جتان لنڊن، ايڊنبره ۽ گلاسگو مان ايم. آر. سي. بي ۽ ايف. آر. سي. بي جون سال 1954 کان 1957 تائين ڊگريون حاصل ڪيائون. 1969 ۾ جڏهن ڪاليج آف فزیشنس ۽ سرجنس پاڪستان جو بنياد پيو ته پاڻ انجا فائونڊر ميمبر هئا ۽ اتان به ڪين ايف. سي. بي. ايس جي اعزازي سند ڏني وئي. تعليمي ماهر جي حيثيت سان پنهنجي زندگي جو آغاز لياقت ميڊيڪل ڪاليج ڄامشورو ۾ اسسٽنٽ پروفيسر جي حيثيت سان سال 1957 ۾ شروع ڪيائون ۽ اتي ئي ترقي حاصل ڪري پروفيسر آف ميڊيسن جي حيثيت سان ڪم ڪرڻ شروع ڪيائون. سال 1972ع ۾ ڊائوميڊيڪل ڪاليج ڪراچي ڏانهن بدلي ڪيا ويا. جتي ميڊيسن جي سينيئر پروفيسر جي حيثيت سان خدمتون سرانجام ڏنائون. ان وچ ۾ سال 1978 کان 1980 تائين ۽ سال 1984 کان 1986 تائين صحت کاتي جا سيڪريٽري مقرر ڪيا ويا ۽ آخر ۾ سال 1986 ۾ سرڪاري نوڪري تان رٽائر ٿيا. اڄ ڪلهه بي. آءِ. اي ميڊيڪل سينٽر ۽ آغا خان يونيورسٽي اسپتال ۾ ڪنسلٽنٽ فزیشن جي حيثيت سان ڪم ڪري رهيا آهن ۽ شام جو الحوت سينٽر شهيد رفيقي روڊ (نزد جناح اسپتال) تي ذاتي طور ماڻهن کي صحت جا مشورا ڏيندا آهن. سٺي ڊاڪٽر ۽ سٺي استاد هجڻ سان گڏوگڏ پاڻ سنڌي زبان جا سٺا اديب به پڻ آهن. سندن ڪتاب ”مونجهارن ۾ ڦاٿل هڪ انسان“ ان ڳالهه جو چٽو دليل آهي. ذيابيطس جي بيمارين تي ڊاڪٽر صاحب کي پراڻي دؤر کان ئي عبور حاصل آهي انڪري ويجه جي ذيابيطس نمبر لاءِ اسان سندن انٽرويو ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي. اميد ته پڙهندڙ ان مان سٺو لاڀ پائيندا.

ادارو _____

هند ڪيائين. بيسٽ ۽ بئننگ معلوم ڪيو ته اهي ننڍڙا سيل آهن جن کي آئلس آف لينگر هينس چون ٿا. جيڪي لبلبي (Pancreas) ۾ آهن ۽ اهي هڪڙي رتوبت پيدا ڪن ٿا، جيڪا رتوبت انسان جي جسم ۾ ڪنڊ جي ليول کي ضابطو ڪري، برقرار رکي ٿي ۽ انسان لاءِ انتهائي ضروري آهي. انهي رتوبت جو نالو آهي ”انسولين“ جيڪڏهن انهيءَ جي جسم اندر گهٽتائي رهي ٿي ته پوءِ ڪنڊ جسم ۾ استعمال ڪونه ٿي ٿي سگهي. جڏهن استعمال نه ٿي ٿئي ته پوءِ پيشاب ذريعي ويندي ٻاهر نڪرندي ۽ ان سبب پيشاب گهڻا لڳندا. اڄ گهڻي لڳندي، ڏينهن ڏينهن جسم ويندو ڪمزور ٿيندو ۽ وينديون پيچيدگيون پيدا ٿينديون. هاڻي اچون ان ڳالهه تي ته انجو علاج ڪنهن شروع ڪيو. بيسٽ دنيا جو اهو پهريون ماڻهو هيو جنهن سڀ کان پهريائين ان ڳالهه تي تحقيق ڪئي ته ان جو علاج ٿي سگهي ٿو ۽

انڪانپوءِ انسولين ايجاد ڪئي. جنهن جا شروع ۾ جانورن تي تجربا ڪيا ويا ۽ پوءِ آهستي آهستي انسانن ۾ ڏني وئي. جنهن جا سٺا نتيجا نڪتا ۽ خون ۾ ڪنڊ ضابطي هيٺ اچڻ لڳي. هاڻي اهو علاج اڃا تائين هلي پيو ڇو ته انڪانسواءِ ٻيو



ڪو رستو ڪونهي ۽ نه ئي انڪان سواءِ ٻيو ڪو بهتر علاج دريافت ٿي سگهيو آهي. انلاءِ انسولين ئي ذيابيطس جو واحد علاج آهي. ها باقي هاڻي جيئن ترقي ٿيندي پئي وڃي ته خبر پئي آهي ته ذيابيطس هڪڙي قسم جي نه آهي اها ٻن نمونن جي آهي هڪ کي (Type-I) يا پهرين نموني جي ذيابيطس چئجي ٿو ۽ ٻي (Type-II) يا ٻئي نموني جي ذيابيطس. (Type-I) اها آهي جيڪا ماڻهن جي نظر ۾ اصل کان هئي، اها اڪثر نوجواني ۾ ٿئي ٿي ۽ موروثي ٿئي ٿي. ان جا اسپيشل جينز هوندا آهن ۽ آهسته آهسته خاندان ۾ اچي ٿي ۽ انجو علاج اڃا تائين انسولين کانسواءِ ٻيو ڪوبه نه آهي. انڪانپوءِ اڳتي هلي خبر پئي ته ڪي اهڙا ٿلها ماڻهو جن جي عمر 40 سالن جي لڳ ڀڳ هجي ٿي ۽ کين نه گهڻي اڃ لڳي ٿي نه

ڊاڪٽر ثنا الله؛ سائين اڄوڪي انٽرويو جو خاص موضوع آهي ”ذيابيطس“ جيئن ته تازو سڄي دنيا ۾ ذيابيطس جو عالمي ڏينهن ملهايو ويو آهي انڪري اسان ويڄ ذريعي سنڌ واسين کي ذيابيطس لاءِ هڪ مڪمل ڄاڻ ڏيڻ چاهيون ٿا. توهان کان اڄ ذيابيطس ۽ انجي علاج معالجي جي نون طريقن ۽ کاڌو خوراڪ بابت گهڻو ڪجهه معلوم ڪرڻو آهي. ڇو ته اسانجي سباجهي سنڌ جي ماڻهن کي اڃا گهڻي ڀاڱي ذيابيطس ۽ انجي علاج جي نون طريقن جي خبر ڪانهي ۽ پراڻي حساب سان پيا پنهنجي صحت کي خراب ڪن. اسان ويڄ وسيلي کين دنيا جي جديد ڄاڻ ڏيڻ گهرون ٿا. توهان مهرباني ڪري سڀ کان پهريائين اسان کي ذيابيطس جي تاريخ بابت ڪجهه ٻڌايو؟

ڊاڪٽر صالح صاحب:- انهي جي هسٽري (تاريخ) تمام

دلچسپ آهي. ڪنهن زماني ۾ ذيابيطس يا مٺن پيشابن کي صرف هڪڙي بيماري ڪري سمجهيو ويندو هو. ماڻهو سمجهندا هئا ته انهي بيماري ۾ پيشاب گهڻا ايندا آهن، پاڻي گهڻو پيئبو آهي، بک گهڻي لڳندي آهي، ماڻهو ڳرندو ۽ سنهو ٿيندو ويندو آهي ۽

پيچيدگين سبب مريض جواني ۾ اجل جو شڪار ٿي ويندو آهي. اهو وقت هئو جو هن مرض جو ڪوبه خاص علاج ڪونه هو، ڪنهن کي ڪو پتو ڪونه هئو ته مٺا پيشاب ڪٿان ٿين ٿا، ڇو ٿين ٿا ۽ ڇا جي ڪري ٿين ٿا، ڪنهن کي ڪا خبر ڪانه هئي. اها 20 صديءَ جي شروعات هئي جڏهن ٻه ماڻهو لاهي پاڻي ان بيماري جي ڪيڊ پيا انهن مان هڪڙو هئو چارلس هربرٽ بيسٽ ۽ ٻيو هو فريڊرڪ گرانٽ بئننگ جيڪو جرمن فزیشن هئو؛ انجي هڪ دلچسپ هسٽري آهي ته انجي هڪ محبوبا هئي جنهن کي ذيابيطس ٿي پئي هئي، جنهن ڪري کيس اندر جي آند مائند ويهڻ نه ڏنو، همراه ڪم کي لڳي ويو؛ رات ڏينهن تحقيق کي لڳو پيو هو ته آخر اها ڪهڙي بيماري آهي، انجا ڪهڙا سبب آهن ۽ نيٺ وڃي ڪئنڊا ۾ هتي

گهڻي بڪ ۽ نه ايترو وزن گهٽجڻ ٿو پر اڳتي هلي پيچيدگين (Complications) جو شڪار ٿيو وڃن؛ انهن جي پيشاب ٽيسٽ ڪرڻ سان خبر پئي ته ڪنڊ پئي اچي. اهڙن ڪيسن ۾ انسولين ته جسم ۾ پيا اٿئي ٿي پر گهٽ انداز ۾، جسم انجو صحيح استعمال نٿو ڪري انهي کي چون ٿا ٻئي نموني واري ذیابيطس يا ڊائبيٽيز ٽائپ II ذیابيطس جي انهيءَ قسم ۾ انسولين جي سڀني ضرورت ڪونه ٿي پئي، پر گوريون وغيره ڪاٿيون پون ٿيون، سخت پرهيز ۽ ورزش جي ذريعي وزن گهٽ ڪرڻ ضروري آهي.

ڊاڪٽر ثناءالله:- گلوڪوز يا ڪنڊ جو جسم ۾ ڪهڙو ڪردار آهي؟

ڊاڪٽر صالح صاحب:- گلوڪوس جسم اندر ٻارڻ طور ڪم ڪري ٿو ۽ جسم کي قوت (Energy) پهچائي ٿو.

اسانجي جسم ۾ جيترا به گهرڙا (Cells) يا تشو ڪم ڪن ٿا انهن کي قوت جي، يا انرجي جي ضرورت پوي ٿي، ڪاڏي خوراڪ جي ضرورت پوي ٿي، انکي گلوڪوز ئي پورو ڪري ٿو.

ڊاڪٽر ثناءالله:- سائين اها ڪنڊ جڏهن ذیابيطس ۾ اسان

ڪنٽرول ڪريون ٿا تڏهن اگر اها ڪنٽرول دوران پنهنجي اصلي مقدار کان گهٽ ٿي وڃي يعني (Hypoglycemia) ٿي وڃي ته ان جا ڪي هاڻيڪار اثر؟


ڊاڪٽر صالح صاحب:- ڪنڊ گهٽ ٿي وڃڻ جي صورت ۾ انسان جي جسم ۾ ڪافي هيٺائي پيدا ٿي وڃي ٿي دل جو ڌڙڪو وڌي وڃي ٿو، دماغ موڳو ٿي وڃي ٿو ۽ هلڪا هلڪا پگهر شروع ٿي وڃن ٿا، اهو سڀ انگري جو سڄي جسم جي گهرڙن جو ٻارڻ گهٽ ٿي وڃي ٿو ۽ قوت گهٽ ٿي وڃي ٿي. ڪن حالتن ۾ ته جڏهن ڪنڊ تمام گهٽ ٿيو وڃي مريض بي هوش ٿي ويندا آهن.

ڊاڪٽر ثناءالله:- سائين ته پوءِ اهڙي حالت ۾ جڏهن ڪنڊ گهڻي گهٽ ٿي وڃي تڏهن ڇا ڪرڻ گهرجي؟

ڊاڪٽر صالح صاحب:- مٺاڻ، فوري طور تي ڪنهن نه صورت ۾ مريض کي مٺاڻ ڏيڻ گهرجي ۽ بي هوشي جي حالت ۾ ته سين ذريعي به گلوڪوز ڏبو آهي.

ڊاڪٽر ثناءالله:- توهان ذیابيطس جي ٻن نمونن جو ذڪر ڪيو، هڪ ٽائپ I يعني انسولين تي دارو مدار رکڻ واري ۽ ٻي ٽائپ II يعني بغير انسولين ڏيڻ واري، انهن ٻنهي نمونن کي سمجهڻ يا الڳ الڳ ڪري سمجهڻ لاءِ ڪهڙو طريقو آهي. ته ڪهڙي ٽائپ I آهي ۽ ڪهڙي ٽائپ II آهي.

ڊاڪٽر صالح صاحب:- بالڪل سولو آهي. ٽائپ I يا پهرين نموني واري ذیابيطس ننڍي عمر يا نوجواني ۾ ٿيندي آهي ۽ موروثي ٿيندي آهي يعني والدين ۾ هوندي آهي يا ماءُ، پيءُ مان ڪنهن هڪ کي هوندي آهي ۽ اتان ٻارن کي ٿيندي آهي. مريضن کي اڄ گهڻي لڳندي آهي. بڪ گهڻي لڳندي آهي. ٿورو گهڻو زخم ٿيندو ته



انفيڪشن ٿيندو ۽ جي پيشاب ٽيسٽ ڪبو ته شگر سان گڏ ڪيٽون هوندو. پيچيدگين ۾ وري شگر تمام گهڻي وڌي ويندي ته مريض بي هوش ٿي ويندو. ڪيٽو ايسيدوسس ٿي ويندس. شگر ڪنٽرول نه هوندي ته مريض ڏهرو ٿي

ويندو ۽ زندگي تمام ٿوري هوندي.

ٽائپ II ۾ يا ٻئي نموني واري ذیابيطس ۾ وري مريض اڪثر ٿلهو متارو هوندو. عمر 40 سالن جي لڳ ڀڳ هوندس. منجهس چرٻي گهڻي هوندي. ڪائيندا گهڻو پر جسم اندر چرٻي يا سٺ استعمال ڪونه ٿيندو. جسم ويندو وڌندو، پيشاب ٽيسٽ ڪبو ته شگر ايندي پر ان سان گڏ ڪيٽون ڪونه ايندو. هن نموني ۾ اڪثر ڊگهي عرصي واريون پيچيدگيون گهڻيون ٿين ٿيون. شروع ۾ ته خبر ئي ڪانه پوندي پر وقت گذرڻ سان گڏوگڏ پيچيدگيون وينديون وڌنديون جن ۾ اکين جو خرابيون (موتيو پاڻي کان وٺي انڌي ٿيڻ تائين) خون جي نلين جون بيماريون، اعصابي نظام، پيريفرل نروز، گردن، دل، دماغ ۽ پيرن جو ڪارو ٿي سگهي

ويجن يا (GANGRENE FOOT) شامل آهن. انڪري ٿاڻيپ II ذيابيطس کان بچڻ لاءِ اهو ضروري آهي ته ماڻهو پنهنجي صحت تي نظر رکي ۽ وقفي وقفي سان پيشاب ٽيسٽ ڪرائيندو رهي.

ڊاڪٽر ثنا الله:- اهو پيشاب ۽ رت ۾ ڪنڊ جي چڪاس عام ماڻهو ڪيتري ڪيتري وقفي کانپوءِ چڪاسرائي.

ڊاڪٽر صالح صاحب:- سال ۾ هڪ ڀيرو.

ڊاڪٽر ثنا الله:- ڇا ذيابيطس ٿاڻيپ II ۾ به فيملي هسٽري يا موروثي اثر ٿي سگهن ٿا.

ڊاڪٽر صالح صاحب:- ها لڳ لاڳاپن جو اثر ٿي سگهي ٿو. ڇاڪاڻ ته ماحول هڪ جهڙو آهي انوائرمينٽس ساڳيون آهن تنهنڪري فيملي ۾ ڇڻي سگهجي ٿو باقي موروثي نٿو ڇڻي سگهجي.

ڊاڪٽر ثنا الله:- اميد واري دوران ماءُ کي اگر ذيابيطس ٿي پوي ته ان جا ٻار تي ڪهڙا اثر ٿي سگهن ٿا.

ڊاڪٽر صالح صاحب:- حمل واري ماءُ کي ذيابيطس ٻن قسمن جي ٿي سگهي ٿي. جنهن ۾ هڪڙي ته گيسٽيشنل ذيابيطس هوندي آهي جيڪا

حمل جي ڇهين يا ستين مهيني شروع ٿئي ٿي ۽ ٻار ڄمڻ کانپوءِ صحيح ٿي وڃي. ٻيو جيڪڏهن ماءُ ۾ اڳ ئي ذيابيطس آهي ۽ فيملي هسٽري به آهي پوءِ پلي ٿاڻيپ I هجي يا ٿاڻيپ II هجي انجو ٻار تي ميٽابولڪ اثر ٿئي ٿو. ٻار ۾ اهڙيون علامتون ٿي سگهن ٿيون خاص ڪري ڄمڻ مهل ٻار جو وزن عام ٻارن کان گهڻو وڌيل هوندو. ٻار کي پڇيداني ۾ رهڻ واري زندگي (Intrauterine Life) ۾ به وڌيڪ جوکو ٿئي ٿو. ڄمڻ کانپوءِ ان ٻار کي ذيابيطس ٿيڻ جا انديشا ٿي سگهن ٿا.

ڊاڪٽر ثنا الله:- هڪ ماءُ جيڪا 25 يا 30 سالن جي ڄمار ۾ ٻار ڄڻي ۽ کيس 40 سالن جي ڄمار ۾ ذيابيطس ٿئي ته اهو ٻار جيڪو کيس 25 سالن جي عمر ۾ ڄائو آهي، ڇا ان کي ذيابيطس جا ڪي اثر ٿي سگهن ٿا؟

ڊاڪٽر صالح صاحب:- نه ڪوبه نه! ها جي ذيابيطس ٿاڻيپ I هوندي ۽ اها جنيٽيڪلي ٻار ۾ وڻي هوندي ته پوءِ ٿي سگهي ٿي.


ڊاڪٽر ثنا الله:- ڇا ذيابيطس ٿاڻيپ ون ۽ ٿاڻيپ ٽو ۾ عمر جو فيڪٽر ضروري آهي؟

ڊاڪٽر صالح صاحب:- جيئن مان اڳ ۾ عرض ڪري چڪو آهيان ته ٿاڻيپ ون ۽ ٿاڻيپ ٽو ۾ اڳي بيان ڪيل سڀني فرق ڏسي پوءِ ڊاڪٽر کي فيصلو ڪرڻو پوندو آهي. ڪڏهن ڪڏهن 18 سالن جي عمر ۾ به ٿاڻيپ II ظاهر ٿيندي آهي ته ڪڏهن وري چاليهن سالن جي عمر ۾ وڃي ٿاڻيپ I ظاهر ٿيندي آهي. جتي انسولين ڏيڻ جي ضرورت پوندي آهي. اصل مسئلو انسولين جي هجڻ يا نه هجڻ تي مدار رکي ٿو.

ڊاڪٽر ثنا الله:- سائين توهان سنڌ جا پراڻا فزيشن آهيو ۽

خاص ڪري ذيابيطس تي توهانجو ڪافي ڪم ٿيل آهي. توهان اهو ٻڌايو ته سنڌ ۾ آبادي جي لحاظ سان اها بيماري ڪيترو سيڪڙو آهي؟

ڊاڪٽر صالح صاحب:- ادا سنڌ جي حوالي سان پريستيج لڳائڻ ڏکي ڳالهه آهي ڇو ته ريسرچ ۽ اسٽيٽسڪس کان



سواءِ ڪي انگ اکر ڏيڻ ڏوڪو ٿيندو. توهان کي ته خبر آهي ته اسان وٽ ڪهڙي ريسرچ ٿئي پئي! باقي منهنجي ذاتي پريڪٽس ۾ جيڪي مريض اچن ٿا ته انهن ۾ اگر 6 مريض هوندا ته انهن مان 2 ذيابيطس جا هوندا، پر اسانجي سليڪٽيڊ پريڪٽس آهي. ڪنهن زماني ۾ جڏهن آءٌ لياقت ميڊيڪل ڪاليج ڄامشوري ۾ اسسٽنٽ پروفيسر هئس تڏهن اتي ڪرنل نجيب صاحب هئو، جيڪو ذيابيطس ۾ ڏاڍي دلچسپي رکندو هو، ان سان گڏجي اسان هزار کن آئوٽ ڊور مريضن تي ڪجهه ڪم ڪيو سين، انهن جي خون ۾ ڪنڊ جي تپاس ڪئپسين ته ان وقت 3 فيصد ذيابيطس ملي پراچ اها وڏي 13 ٿي وئي هوندي ڇو ته اڄ ڪلهه اهو مرض تيزي سان وڌي رهيو آهي. صادق:- سائين ذيابيطس جي اڃانڪ رفتار وڌڻ جا سبب؟


هوندي آهي پر سٽپ (فٽ) کائڻ کان پرهيز ڪرڻ ضروري آهي. ڇو ته ذیابیطس جي ڊگهي عرصي واريون پيچيدگيون خالي خون ۾ کنڊ جي مقدار وڌڻ ڪري ڪونه ٿيون ٿين پر اهي ڪوليسٽرال ميٽا بولزم ۽ فٽ ميٽا بولزم جي ڪري ٿين ٿيون خاص ڪري خون جي نلين ۾ Macro and micro veses complications ٿين ٿيون. تنهنڪري کاڌي ۾ احتياط ضروري آهي. مٺي شيءِ ته بالڪل ناهي کائڻي ڪنڊ ته ذیابیطس جي مريضن لاءِ نج زهر آهي باقي ڪنڊ مان ٺهيل شيون به ساڳئي معنيٰ رکن ٿيون. ڪوڪا ڪولا هجي يا ڪنڊ واري چانهه. مٺايون هجن يا بيڪري واريون شيون، اهي سڀ هاجيڪار ٿي سگهن ٿيون.

ڊاڪٽر ثنا الله:- سبزين جي باري ۾ ڪجهه ٻڌايو؟

ڊاڪٽر صالح صاحب:- سبزيون پلي کائجن، وڌيڪ بهتر

آهن، خاص ڪري سائي پن واريون، سبزيون پينڊي، توري، واڱڻ، ڪدو وغيره، جن سبزين ۾ تاندورا (Fibre) وڌيڪ آهن اهي وڌيڪ کائجن ته بهتر!

ڊاڪٽر ثنا الله:- سائين زير زمين سبزين مثال گجر، موري، پٽاٽا، گوگڙو وغيره



کائي سگهجن ٿا يا نه؟

ڊاڪٽر صالح صاحب:- بالڪل! پر مناسب مقدار ۾ توهان مريضن کي چوندا ته آلو پلي کائو ته هو خبر ناهي ڪيترا آلو کائي ويندا. مون توهان کي ٻڌايو ته ڪاربوهائڊريٽ (نشاستو) مناسب مقدار ۾ کائجن. ضرور آهي ته سبزي سان گڏ ڊگڙ يا چپاتي به کائبي ڪڏهن چانور به چڪبا پوءِ ائين ڪاربوهائڊريٽ جو مقدار وڌي ويندو. تنهن ڪري اهو فيصلو مريض کي ئي ڪرڻو آهي ته هو هر حال ۾ نشاستي جو مقدار مناسب رکي. مريض کي اگر سمجهائبو ته هي شي ٿوري کائو ته هو سڄي ڏينهن ٿوري ٿوري ڪري الاهي ڪيتري کائي ويندو ۽ ائين ڳالهه وڌي ويندي. جيئن گجرون آهن، گوگڙو آهن اهي گهٽ مقدار ۾ کائجن ڇو ته انهن جي کائڻ جي

ڊاڪٽر صالح صاحب:- سببن تي اڄ ڪلهه ڪافي بحث هلي پيو پر اڃا تائين جيڪي ڳالهيون سامهون آيون آهن انهن جو ڪو سائنسي بنياد ڪونهي باقي انجي تشريح هن ريت ڪري سگهجي ٿي، جيئن اڳي اسانجي آبادي جي گهڻائي ڳوٺن ۾ آباد هئي ۽ هاڻي اهي ماڻهو شهرن ۾ لڏپلاڻ ڪري آيا آهن. ڳوٺن ۾ اهي ماڻهو ڪم ڪار گهڻو ڪندا هئا، انڪري ڪئلينڊر يا طاقت استعمال ٿيندي هئي ۽ هاڻي شهرن ۾ سندن زندگي بدلجي وئي آهي. جسماني ڪم ڪار ڪونه ٿا ڪن، ها البت ڪاڌو ساڳيو ڳوٺاڻو آهي. وري شهري زندگي ۾ Stress يا ذهني دٻاءُ وڌي ويا آهن جيڪي، ڳوٺن ۾ نه هئا، مطلب ته ڳوٺاڻي زندگي ۾ جيڪا عام اٿئي ويهڻي هوندي هئي، ماڻهو ميلن جا ميل پنڌ ڪندا هئا، اها شهرن ۾ نه رهي آهي ذري ذري تي ٽرانسپورٽ جو سهارو ۽ سڄو ڏينهن ويهڪ وارو ڪم. باقي

کاڌي کائڻ جا ساڳيا شينهن،

انهن سببن جي ڪري ذیابیطس جو تعداد وڌي ويو آهي.

امان الله:- سائين انهن سڀني شين جو ڪو حل؟

ڊاڪٽر صالح صاحب:- ادا حل اهو آهي ته شهري زندگي ۾ کاڌي جو احتياط ته ڪري سگهجي ٿو. ٿورو گهڻو جسماني

ڪم ڪار ڪجي. مطلب ته جيترو ٿي سگهي اوترو ڪئلينڊر گهٽائجن.

امان الله:- سائين ذیابیطس جي مريضن جي کاڌي پيئي تي ڪجهه روشني وجهو؟

ڊاڪٽر صالح صاحب:- ذیابیطس جي مريضن لاءِ جنرل ڊائيٽ انسٽرڪشن (کاڌي جا عام مشورا) ٿين ٿيون. اڳي ڪنهن زماني ۾ مريضن کي ڪئلينڊر گهڻي ڪارائيندا هئاسين پر هاڻي اها ڳالهه ڪجهه مٽجي وئي آهي هاڻي بيلسن ڊائيٽ (متوازن غذا) کائڻ جي صلاح ڏيندا آهيون. اڳي اهو چوندا هئا ته ڪنڊ ته ٺهيو پر ڪاربوهائڊريٽ (نشاستو) جنهن مان ڪنڊ ٺهي ٿي مثال چانور، پٽاٽا وغيره سي به بنهه نه کائو پر هاڻي ٿوري مقدار ۾ ڪاربوهائڊريٽ (نشاستو) کائڻ جي اجازت

هڪ L.D.L ۽ H.D.L تن مان L.D.L ڪوليسترال جيڪو وڌيڪ خطرناڪ آهي سو گهٽ آهي. باقي H.D.L وڌيڪ آهي ۽ اهو ايترو هائڪار نه آهي.

صادق:- سائين ملڪي قلڪي ۽ متوازن غذا سان جيڪڏهن ڪنهن جو پيٽ نه پرڄي ۽ بک گهڻي لڳي ته پوءِ انجو گذارو ڪيئن ٿئي؟

ڊاڪٽر صالح صاحب:- جيسيتائين پيٽ ڀرڻ جو مسئلو آهي ته انلاءِ مون اڳ به ٻڌايو ته فائبر ڊائيت، جيئن ڪيرو ٿيو، سلاڊ ٿيو اهڙي قسم جي کاڌن جي هضم ٿيڻ ۾ دير لڳي ٿي ۽ پيٽ پرڄي وڃي ٿو. تنهنڪري ٻيا کاڌا ڇڏي اهي شيون کائڻ گهرجن ته پيٽ به ڀريل رهندو ۽ کنڊ به ڪانه وڌندي. ڊاڪٽر ثنا الله:- ذيابيطس جي مريض جي کاڌي جو انداز ڇا هئڻ گهرجي. منهنجو مطلب ته هڪدم پيٽ ڀري کائي يا گهڙي گهڙي، ٿورو ٿورو کائي؟

ڊاڪٽر صالح صاحب:- سائين هڪدم پيٽ ڀري نه کائجي، ان سان شگر هڪدم وڌي ويندي. ٿورو ٿورو کائجي ۽ ڏينهن ۾ چئن دفن کان وڌيڪ نه کائجي. وڌيڪ مناسب ناهي.

ڊاڪٽر ثنا الله:- ڪير لاءِ توهانجو ڇا خيال آهي.

ڊاڪٽر صالح صاحب:- ڪير مناسب مقدار ۾ واپرائجي پر سڻي بالڪل ڪڍي. مون اڳ به ٻڌايو ته جانورن وارو سڻي نقصان ڏئي ٿو. تنهنڪري ڪير کي به ڪاڙهي انجي مٿان ملائي بالڪل لاهي ڇڏجي.

ڊاڪٽر ثنا الله:- ٽائپ I ذيابيطس ۾ ته انسولين ڏجي ٿي. پر ٽائپ II يا ٻئي نموني واري ذيابيطس ۾ سڻي سڌي انسولين ڇو نه ڏيندا آهن؟

ڊاڪٽر صالح صاحب:- ٽائپ II ذيابيطس ۾ انسولين جي رليٽو ڊيفيشنسي (نسبتي ڪوٽ) هوندي آهي. صفا ختم نه هوندي آهي البت عام صحتمند ماڻهو جي پيٽ ۾ گهٽ هوندي آهي. يعني انسولين گهٽ مقدار ۾ پيدا ٿيندي آهي. جيڪا شگر کي ضابطي هيٺ آڻڻ لاءِ ناڪافي هوندي آهي. عام طرح سان


اجازت جو سبب اهو نه آهي ته انهن ۾ گلوڪوز ڪونهي، پر اهي سبزيون پيٽ ۾ جلد هضم ڪونه ٿيون ٿين، انڪري هڪ ئي وقت رت ۾ کنڊ جو مقدار ڪونه ٿيون وڌائين، جيئن عام مٺي شي هڪدم وڌائي ٿي. اهي آهستي آهستي جذب ٿين ٿيون ۽ پوءِ گلوڪوز ۾ متجن ٿيون ۽ ائين خون ۾ کنڊ جو مقدار هڪدم گهڻو ڪونه ٿو وڌي. انهي ڪري اهو چوندا آهيون ته بيسٽ پلي کائجي، مڪائي پلي کائجي، پوسو (بران) پلي کائجي، انهن سڀني شين جو اهو فائدو آهي.

امان الله:- سائين فائبر ڪهڙين شين مان وڌيڪ ملي ٿو ۽ انجو ذيابيطس ۾ ڪردار ڪهڙو آهي.

ڊاڪٽر صالح صاحب:- مون ٻڌايو ته سڀني پن واريون سبزيون ۽ ٻيون ڪچيون تازيون سبزيون جهڙوڪ توري، پينڊي، واڱڻ وغيره. فائبر جو ڪردار اهو آهي ته هضم گهٽ ٿئي ٿو ۽ ڦوڳ گهڻو بچي ٿو انڪري گلوڪوز جذب ڪونه ٿيندو.

امان الله:- سائين سڻي جو مقدار ڪيترو وٺي سگهجي ٿو. ڊاڪٽر صالح صاحب:- جانورن جي سڻي (Animal fat) ته قطعاً نه کائجي، اهو هر طرح سان نقصانڪار آهي. انڪي

سڄي دنيا ۾ بند ڪيو ويو آهي. ڇو ته انڪي ڪنٽرول ڪرڻ ڏکيو آهي. مان ان ڳالهه جي تشريح ڪندو هلان ته اسانجي بهراڙي جا ماڻهو چوندا آهن ته گهه طاقت واري شي آهي. مڪڻ ۾ طاقت آهي. پراڻي وقت جا ماڻهو سڄا گهه کائيندا هئا، کين طاقت به سڄي هوندي هئي پر کين ٻڌايون ته بابا اهي ماڻهو گهه، مڪڻ کائي پنڌ به ميلن جا ميل ڪندا هئا سڄو سڄو ڏينهن هر هلائيندا هئا ۽ ڪم ڪار کي لڳا پيا هوندا هئا، ائين اهي سڀ ڪئلينڊر استعمال ٿي وينديون هيون، هاڻي جڏهن ڪير مڪڻ کائي ڪار ۾ چڙهي وڃي آفيس ۾ ويهي ڪم ڪندو ته اهي ڪئلينڊر استعمال ڪتي ٿينديون. باقي سبزين وارو سڻي (Vagetable fat) ڪجهه استعمال ڪري سگهجي ٿو ڇو ته ان ۾ ڪوليسترال جا جيڪي به قسم ٿيندا آهن



ڊاڪٽر ثنا الله:- سائين ورزش تي ڪجهه ڳالهائون؟

اسان 2 هزار ڪئلينڊر ڪاڏي ۾ وٺون ٿا، جن لاءِ اها انسولين ناڪافي هجي ٿي. انلاءِ ٻي نموني واري ذيابيطس ۾ هڪ ته ڪئلينڊر گهٽائڻ ٿيون ۽ ٻيو ته واڌو انسولين ڏجي ٿي جيئن توازن برقرار رهي سگهي. ٽائپ II ذيابيطس ۾ به ڳالهائون آهن هڪ ته انسولين جي رليٽو ڊيفيشني (نسبتي ڪوٽ) ۽ ٻيو ريزسٽنس (رٿڪ) يعني انسولين جو جسم اندر برابر استعمال ڪونه ٿو ٿئي. انهي ڪري ان ٻئي نموني واري ذيابيطس ۾ گورين جو استعمال ڪبو آهي.

ڊاڪٽر ثنا الله:- سائين اورل هائپوگلايسيمڪس (ڪاٺ واريون اهي دوايون جيڪي خون ۾ ڪنڊ جو مقدار گهٽائين) جا ڪيترا نمونا آهن ۽ ڪهڙي نموني ڪنڊ کي ڪنٽرول ڪن ٿا؟

ڊاڪٽر صالح صاحب:- اهي به ٻن قسمن جون ٿين ٿيون هڪڙيون اهي آهن جيڪي انسولين کي وڌائين ٿيون، اهي ان

حالت ۾ ڏسيون آهن جڏهن لبلبو (پينڪرياس) انسولين ڪجهه نه ڪجهه پيدا ڪندو هجي پر جي پينڪرياس ۾ انسولين پيدا ٿي ڪونه ٿي ٿئي ته اها ايبسوليوت ڊائيٽيز ٿي اتي اهي گوريون ڪارائڻ بيڪار آهن اتي انسولين ٻاهرين ڏيئي پوندي.

ڊاڪٽر ثنا الله:- (وچ ۾ وضاحت پڇندي) ”اها ته پهرين نموني واري ذيابيطس ٿي وئي“.

ڊاڪٽر صالح صاحب (وري) نه ٻئي نموني واري ذيابيطس ۾ به اهڙو قسم آهي جنهن ۾ انسولين بالڪل پيدا ڪانه ٿئي ۽ انهي ۾ به هڪڙي قسم جون گوريون آهن جيڪي عارضي طرح سان خون ۾ ڪنڊ جو مقدار گهٽائين ٿيون پر انجو اثر پيريفرل يوٽيلائيزيشن تي آهي. هاڻي اهي ٻن قسمن جون ڪاٺ واريون دوائون آهن هڪڙيون اهي جيڪي پينڪرياس کي اسٽيميوليٽ (جوش ڏياري) ڪري انسولين پيدا ڪن ٿيون ۽ ٻيون اهي جن جو پينڪرياس سان ڪو واسطو ڪونهي ۽ سنئون سڌو جسم جي سڀني حصن ۾ گلوڪوس جي ليول کي گهٽائين ٿيون.

ڊاڪٽر صالح صاحب:- ورزش تمام پلي، تمام سٺي، هونءِ به ورزش نه صرف ذيابيطس لاءِ پر سڄي حياتيءَ جي وهنوار لاءِ سٺي آهي، ڇو ته ورزش ڪرڻ سان نه رڳو جسم جي طاقت بحال رهي ٿي پر جسم ۾ خون جو دورو (سرڪيوليشن) به سٺو ٿئي ٿو ۽ انڪانسواءِ جيڪي ذيابيطس جون پيچيدگيون ٿين ٿيون جنهن ۾ خاص ڪري رت واهيون ٿلهيون ٿي وڃن ٿيون ۽ انهن ۾ اندر اٿيرو اسڪلروسز ٿيو وڃي ٿو، انهي کان به بچاءُ ٿي وڃي ٿو ڇو ته جسم ۾ يوٽيلائيزيشن (استعمال) وڌي ٿي. ها باقي اهو خيال رکڻ ضروري آهي ته ذيابيطس جو مريض انسولين به هٿائي ۽ ورزش به ڪري ته ڪتي خون ۾ ڪنڊ گهٽ نه ٿي وڃي يا دوايون به کائي ۽ ورزش به ڪري ته به ساڳيو حال ٿي سگهي ٿو تنهنڪري ذيابيطس جو مريض ورزش کان سواءِ اگر ڪو انسولين/ دوا جو ڊوز وٺي ٿو ته ورزش شروع ڪرڻ کانپوءِ انکي وري پنهنجي انسولين/ دوا جي وزن تي نظر ثاني ڪرڻي پوندي.



ڊاڪٽر ثنا الله:- سائين ڪن مريضن بابت ٻڌڻ ۾ آيو آهي ته ذيابيطس جي پرهيز گهڻي وقت لاءِ ڪرڻ کانپوءِ هو ڊپرشن ۾ هليا ويندا آهن. اهو ڪيتريقدر صحيح آهي؟

ڊاڪٽر صالح صاحب:- پرهيز ڊپرشن جو سبب ڪونه ٿي ٿي سگهي باقي ڪير بهانو ڪري ته ٻي ڳالهه آهي، ڇو ته جهل ته رڳو ٻن شين جي آهي هڪ مٺاڻ، ٻي چرٻي ۽ باقي جيڪي جهان ۾ آهي انسان ٿورو ٿورو کائي سگهي ٿو رڳو ڪاڏي جي هڪ ڪرائي (Balance) ٿي ته رکڻي آهي.

صادق :- سائين ذيابيطس جي بيماري جو ماڻهن ۾ ڊپ ڏاڍو آهي شل نه ڪنهن کي ٿئي پوءِ ڄڻ ان کي مٿو سهايائون.

ڊاڪٽر صالح صاحب:- سائين ڪنهن وقت ته اها ڳالهه بالڪل صحيح هئي پر هاڻي ائين ڪونهي. هاڻي جيڪو به ذيابيطس کي سمجهي ۽ انلاءِ احتياطي تدبيرون وٺندو اچي جن

بیماریون ڪري سگهي ٿي ۽ ان جي عادت بڻجي وڃي ٿي. ڊاڪٽر صالح صاحب:- انسولين جا پنهنجا فيڪٽرس آهن اها جيڪڏهن گهربل وزن کان وڌيڪ ڏيئي ته خون ۾ کنڊ جو مقدار گهٽائي (Hypoglycemia) ڇڏيندي جنهن سبب چڪر ايندا، پگهر نڪرندا، دل جو دڙڪو وڌندو پر اهو عارضي هوندو جيڪو ڪجهه مٿان وغيره وٺڻ بعد ٺيڪ ٿي سگهي ٿو. باقي انسولين جي عادت وارو سوال صحيح ڪونهي ڇو ته انسولين ته هر انسان جي جسم ۾ هوندي آهي. ۽ پوءِ ڪنهن جي گهٽ / ختم ٿي وئي ته انکي Artificial ملڻ کپي. ڊاڪٽر ثنا الله:- سائين ذيابيطس جي پيچيدگين تي به ڪجهه اسانکي ٻڌايو؟

ڊاڪٽر صالح صاحب:- ها ذيابيطس جو وڏو مسئلو آهن ٽي انجون پيچيدگيون، ذيابيطس جي اڃانڪ ۽ گهٽ عرصي وارين پيچيدگين ۾ يا ته انسولين وڌيڪ ملڻ جي ڪري مريض Hypoglycemia (خون ۾ کنڊ گهٽ) ۾ هليو ويندو يا وڌڻ سان ڊائبيٽڪ ڪوما (ذيابيطس ڪري بيهوشي) ۽ ڪيتو ايسيدوسس جون پيچيدگيون ٿين ٿيون. باقي اگر ذيابيطس ڪنٽرول ۾ آهي ته ڪم پيو هلندو، پر جي ڪنٽرول ناهي ته زندگي ايتري رهي ٿي ڪونه ٿي جو ٻيون پيچيدگيون پيدا ٿين.


ذيابيطس ۾ ڊگهي عرصي وارين پيچيدگين جو وڏو حصو اچي وڃي ٿو ڇو ته اهي مريض جيڪي اسانوت علاج لاءِ اچن ٿا. انهن ۾ گهڻي ڀاڱي جيڪي پيچيدگيون نظر اچن ٿيون انهن کي اگر ورهائجي ته اهي جسم جي هر حصي ۾ ٿي سگهن ٿيون. پيريفرل نروز (جسم جي ٻانهن ۽ تنگن جون تنتون) قاسي سگهن ٿيون جنهن سبب پيريفرل نيورائٽس ٿيندي ۽ انڪري هٿ پير سن ٿي ويندا. گرڊا خراب ٿي سگهن ٿا. خون واڻيون خراب ٿي سگهن ٿيون جنهن ۾ سنهين ۽ ٽلهين واڻين

مان گهڻين جو ذڪر ته اسان ڪري چڪا آهيون. پوءِ اهو ٺيڪ ٺاڪ زندگي گذاري سگهي ٿو. پر جيڪڏهن ڪنهن احتياط نه ڪيو ته پوءِ واقعي تڪليف وارو مرض آهي. ڪنهن زماني ۾ جڏهن اسان 1945-46ع ۾ پڙهندا هئاسين ته اهو چوڻ عام هئو ته سفلر اگر ڪنهن سمجهي ته ڇڻ سڄي ميڊيسن سمجهي پر اڄ مان اهو چوندس ته ذيابيطس جنهن ماسٽر ڪئي تنهن مني ميڊيسن ماسٽر ڪئي ڇو ته ان ۾ جيڪي به، جنهن به سسٽم جون پيچيدگيون ٿين ٿيون، اهي گهڻو ڪجهه سيڪارين ٿيون پر انهن سڀني پيچيدگين جي روڪٿام ڪري سگهجي ٿي.

ڊاڪٽر ثنا الله:- ذيابيطس جي مريضن کي پيچيدگين کان بچڻ لاءِ پنهنجي جسم جي تپاس ڪيتري ڪيتري وقفي کانپوءِ ڪرائڻ گهرجي.

ڊاڪٽر صالح صاحب:- اگر پيچيدگيون نه آهن ته سال ۾ هڪ يا ٻه دفعا ڪافي آهي باقي اگر پيچيدگيون اڳ ۾ ئي آهن ته پوءِ حالتن تي مدار رکي ٿو. ڊاڪٽر ثنا الله:- مارڪيٽ ۾ ڪجهه ذيابيطس جي مريضن لاءِ مخصوص شيون آهن مثلاً ڊائيت جيلي، ڊائيت ڪسٽر، ڊائيت ڪيرو وغيره انهن جي استعمال تي روشني وجهو.

ڊاڪٽر صالح صاحب:- بالڪل ڪري سگهجن ٿيون ان ۾ ڪو هرج ڪونهي. ماڻهن کي بنيادي واٽ ڏيڻ گهرجي ته ڊائيت بيلنس (متوازن غذا) ڪيئن ڪجي. ڪي شيون اهڙيون هونديون آهن جيڪي ڪڏهن ڪڏهن کائجن ٿيون ۽ ڪي شيون انسان جي ضرورت آهن، روزانه ڊائيت ڪولا پيئڻ ۽ ڊائيت مٺايون کائڻ ضروري ته ڪونهن نه. ٻاهر ملڪن ۾ ته ذيابيطس جي مريضن لاءِ الڳ شيلف هوندا آهن. جنهن ۾ چاڪليٽ وغيره تائين هڙ شي هوندي آهي. جيڪي اسانوت اڃا موجود ڪونهن بهرحال غذا جو توازن ضروري آهي. امان الله:- سائين انسولين لاءِ چوڻي آهي ته اها ڪجهه ٻيون



اسانجي بهراڙي جا ماڻهو چوندا آهن ته گهر طاقت واري شيء آهي. هڪڻ ۾ طاقت آهي. پراڻي وقت جا ماڻهو سڄا گهر کائيندا هئا، کين طاقت به سڄي هوندي هئي پر کين ٻڌايون ته بابا اهي ماڻهو گهر، هڪڻ کائي پنڌ به ميلن جا ميل ڪندا هئا سڄو سڄو ڏينهن هر هلائيندا هئا ۽ ڪم ڪار ڪي لڳا پيا هوندا هئا، ائين اهي سڀ ڪئلينز استعمال ٿي وينديون هيون.

پر پيچيدگيون (Micro & Macro vascular Complications) ٿي وينديون. جيڪڏهن دل تي ويندا ته انجون خون واهيون بند ٿي ويون ته هٿ اٽڪ ٿي ويندو اگر دماغ جون خون واهيون بلاڪ ٿي ويون ته فالج جو اثر ٿي ويندو. پيرن ۾ ڊائيبيٽڪ فوٽ ڪينگريڻ ٿي ويندو جنهن ۾ پير سڪي ڪارا ٿي ويندا. جيڪڏهن مردانگي جون تنتون سن ٿي ويون ته ذيابيطسي نامردگي (Diabetic Impotency) ٿي ويندي.

خودڪار اعصابي نظام ڦاٽو ته ان ۾ دست يا ڪاڪوس جون ٻيون خرابيون ٿين ٿيون مطلب ته اهو سسٽم ڪونهي جنهن ۾ ذيابيطس پيچيدگيون پيدا نه ڪري. اکين ۾ موتيو ٿي پوي ٿو ۽ ان سبب اکين جي جهلي خراب (Retinopathy) ٿئي ٿي ۽ ماڻهو اندو ٿي سگهي ٿو. پر اهي سڀ ذيابيطس کي ڪنٽرول ڪري روڪي سگهجن ٿيون.

ذيابيطس اگر ڪنٽرول هيٺ رهي ٿي ته گهڻي قدر پيچيدگي ڪونه ٿيندي ۽ انسان بهتر زندگي گذاري سگهي ٿو.

ڊاڪٽر ثناء الله:- سائين هاڻي توهان پنهنجي پاران به ذيابيطس جي مريضن لاءِ ڪجهه مشورا ڏيو؟

ڊاڪٽر صالح صاحب:- ادا مون وٽ ذيابيطس جو جيڪو به مريض ايندو آهي ته مان ٻين پنو ڪڍي ان لاءِ دوايون لکڻ شروع ڪونه ڪندو آهيان، ڇو ته هتي جيڪو به مريض اچي ٿو انکي خبر آهي ته ذيابيطس لاءِ يا انسولين هوندي يا گوريون هونديون، جيڪي گهڻي ڀاڱي ته مريض اڳ ۾ استعمال به ڪري چڪو هوندو آهي. مان هنن سان ڳالهائيندو آهيان ۽

اهي ڳالهيون انهن لاءِ ڪمائتيون هونديون آهن. جيڪڏهن ڪير مرد مريض هوندو آهي ته انهي کي چوندو آهيان ته سمجهي وٺ ته توهي ”ٻي زال“ ڪڍي آهي، جي مائي کي سنڀالي رکين ته توکي به سڪيو رکندي ۽ جي نه سنڀاليندينس ته اڳتي هلي عذاب ڏيندي ۽ جيستائين زندگي اٿي تيستائين توسان رهندي به گڏ، ائين نه سمجهه ته ڇڏي ڇڏي ويندي. اندر ٿي اندر ۾ ڳاريندي رهندي ۽ هڪ ڏينهن ايندو جو پيچيدگين ۾ ڦاسي پوندين. پوءِ اهي دل جون هجن يا دماغ جون، گردن جون هجن يا اکين جون، انڪري مائي سان ٺهي هڻو پوندين. هر گهرج پوري ڪرڻي پوندي، تنهنڪري صبح صبح پنهنجو پيشاب ٿيسٽ ڪندو ره. خون ۾ ڪنڊ ٿيسٽ ڪرڻ جو اوزار اچي ويو آهي ان لاءِ خون گهر ۾ ٿيسٽ ڪر، دوايون جيڪي اڄ جو وزن مان لکي ڏيندو مائين سني سپاڻي ساڳيون ڪم ڪونه ايندي ڇو ته سپاڻي خبر ناهي ڪنڊ گهٽ هجي يا وڌ، تنهنڪري بار بار ڊاڪٽرن وٽ وڃي بيزار ٿي پوندين. پنهنجون پاڻ خون ٿيسٽ ڪرڻ سک ۽ دواين جو وزن وٺڻ سک، پنهنجو پاڻ کي ڊاڪٽر بنائڻو پوندي، ان لاءِ ذيابيطس جي مڪمل ڄاڻ رک، پريميز ۽ ورزش جو خيال رک، کاڌو ڪوشش ڪري گهڻو نه کاءِ هلڪي هلڪي ورزش باقائدي سان ڪندو ره.

ڪنڊ بالڪل ڇڏي ڏي. کاڌي پيتي جي جن شين جو اڳ ۾

جيڪڏهن ڪير مرد مريض هوندو آهي ته انهي کي چوندو آهيان ته سمجهي وٺ ته توهي ”ٻي زال“ ڪڍي آهي، جي مائي کي سنڀالي رکين ته توکي به سڪيو رکندي ۽ جي نه سنڀاليندينس ته اڳتي هلي عذاب ڏيندي ۽ جيستائين زندگي اٿي تيستائين توسان رهندي به گڏ، ائين نه سمجهه ته ڇڏي ڇڏي ويندي. اندر ٿي اندر ۾ ڳاريندي رهندي ۽ هڪ ڏينهن ايندو جو پيچيدگين ۾ ڦاسي پوندين. پوءِ اهي دل جون هجن يا دماغ جون، گردن جون هجن يا اکين جون، انڪري مائي سان ٺهي هڻو پوندين.

جيڪڏهن ڪير ڊاڪٽر سڄو ڏينهن
ڪمائي جي ڪڍ هوندو ته اهو پبلڪ
هيلٿ لاءِ ڇو سوچيندو. پبلڪ هيلٿ لاءِ
ڪم ڇو ڪندو. جيڪڏهن ڪير مريض
ٿيندو ته وٽس ويندو نه! روڪڻ سان ته
مريض گهٽجن ٿا.

اسان هت ذڪر ڪري چڪا آهيون، اهي ٻڌائيندو آهيان ڪاڏي
جو توازن رکڻ سمجهائيندو آهيان ته ڪنهن به صورت ۾
ڪئلينڊر نه وڌن. ڪير پڇندو آهي ته سائين چانور ڪائون ته
چونڊو آهيان. انگريزن جيان ڪاڻو ڇو ته انگريز ڪائيندا
هڪ يا اڌ پيالي اسان وٽ وري ڪاڻو جو مطلب ته ٽالهيون پري
ڪائي وڃو. تنهنڪري نشاستي واري ڪابه شي ڪاڻو ته ٿوري
مقدار ۾ پيل ڪاڻو. اسان وٽ اها ڳالهه ڏاڍي مشڪل آهي ته
ڪنهن به شيءِ جي اجازت ڏيو ته چوندا ڊاڪٽر موڪل ڏني
اهي هاڻي دل کولي ڪاڻو. سو ائين نه ڪجي.

ڊاڪٽر ثناء الله:- سائين ذيابيطس بابت توهان کان ڪافي
معلومات ملي مهرباني! هاڻي هڪ ٻه واڌارا سوال آهن پبلڪ
هيلٿ تي، توهان ڊاڪٽر ۽ استاد هئڻ سان گڏوگڏ هيلٿ
ايڊمنسٽريٽر به رهي چڪا آهيو. اڄ ڪلهه دنيا روڪ ٿام
(Prevention) ڏانهن وڌي رهي آهي. ڇا توهان اهو ٻڌائيندا ته
اسانجي ملڪ ۾ جيڪي روڪڻ جا اپاءَ ورتا پيا وڃن سي
ڪيتريقدر اطمينان بخش آهن؟ پوءِ اهي سرڪاري طرح هجن
يا غير سرڪاري طرح!

ڊاڪٽر صالح صاحب:-
منهنجي نظر ۾ اسان وٽ
روڪڻ جا اپاءَ ٻڙي (0)
آهن. توهان پوئين هسٽري
ڏسو ته ڪنهن زماني ۾ هتي
صحت لاءِ ايڊمنسٽريشن ۾

ٻه پوسٽون هونديون هيون.
(1) ڊائريڪٽر پبلڪ هيلٿ

(2) ڊائريڪٽر انسپيڪٽر جنرل آف هاسپيٽلس.

ٻه برانچون هونديون هيون، اهي ٻئي گڏ نه هونديون هيون،
جيڪڏهن ڪير ڊاڪٽر سڄو ڏينهن ڪمائي جي ڪڍ هوندو
ته اهو پبلڪ هيلٿ لاءِ ڇو سوچيندو. پبلڪ هيلٿ لاءِ ڪم
ڇو ڪندو. جيڪڏهن ڪير مريض ٿيندو ته وٽس ويندو نه!
روڪڻ سان ته مريض گهٽجن ٿا. اسان جي بنيادي سوچ
جيڪا آهي، ان اسان کي تباهه ڪري ڇڏيو آهي. روڪڻ ٻڙي
(0) پئي ٿي. علاج معالجي واري لائين تي هلندا رهياسين.

سڄي دنيا ۾ روڪڻ تي زور آهي ڇو ته بيماريون گهڻي
قدر صحت جي اپائن سان روڪڻ جوڳيون (Preventable)
آهن. ٻارن ۾ پڻ ڏاڍي ٿڪا- فئملي پلاننگ، ڪاڌو خوراڪ
صاف سٿرو پاڻي. غير ضروري جيت جئن کي ناس ڪرڻ،
صفائي، اهي سڀ شيون بيمارين کي روڪي سگهن ٿيون. اهي
ميڊيڪل پرابليمر ڪونه آهن. توهان ٿورو پوئين زماني تي نظر
ڊوڙايو جڏهن اسان وٽ ڊاڪٽر عاقبائي صاحب ڊائريڪٽر
پبلڪ هيلٿ هوندو هئو ته نه رڳو ويڪسينيٽر پر پبلڪ هيلٿ
انجنيئر به ڊائريڪٽر پبلڪ هيلٿ جي ماتحت هوندا هئا. اها
اسان جي بدقسمتي آهي ته ورهاڱي کان پوءِ اهي ٻئي پوسٽون
گڏ ڪيون ويون ۽ هڪڙو ڊائريڪٽر هڪڙو سيڪريٽري مقرر
ڪيو ويو جن جو ڪم ئي آهي ڊاڪٽرن کي نوڪريون ڏيڻ ۽
ڊاڪٽرن کان ڪم وٺڻ- روڪڻ جي پاسي تي ڌيان ٻڙي
(0) آهي.

ڊاڪٽر ثناء الله:- انهن جي
سڌاري لاءِ توهان کي پنهنجا
رايا ڏيو.
ڊاڪٽر صالح صاحب:- ان
تي رايو ڪوبه ڪونه ٿو ڏئي
سگهان ڇو ته ان ۾ جيستائين

اها اسان جي بدقسمتي آهي ته
ورهاڱي کان پوءِ اهي ٻئي پوسٽون گڏ
ڪيون ويون ۽ هڪڙو ڊائريڪٽر هڪڙو
سيڪريٽري مقرر ڪيو ويو جن جو ڪم
ئي آهي ڊاڪٽرن کي نوڪريون ڏيڻ ۽
ڊاڪٽرن کان ڪم وٺڻ.

بیمارين جي روڪڻ ۾ ٿيندي ٿيندي رهجي وڃي ٿي. مليريا جو مثال وٺو اها ختم ٿيندي ٿيندي وري آئي. پاڻي جا دٻا بند ٿيڻ لڳا، اسپري ٿيا، مچرن جو خاتمو اچڻ لڳو، وري اهو پروگرام اڌ ۾ رهجي ويو ته مليريا موٽي آئي.

انتظاميه پنهنجون ڪوششون نه وٺندي ۽ اهڙا ورڪر ڀڏا نه ڪندي جيڪي بنا ڪنهن لالچ جي ڪم ڪن ٿيستن اهو مسئلو حل ڪونه ٿيندو. ڇو ته پبلڪ هيلٿ ۾ ڪا ڪمائي ته ڪونهي نه. ڪي پئسا ته ڪونه آهن. پئسا ته آهن علاج معالجي واري صحت ۾. مان صاف صاف چوان ٿو ته پبلڪ هيلٿ واسطي موٽوبيشن (هل چل) کي جنهن وسيلي ماڻهن ۾ صحت جي سجاڳي آڻجي، پوءِ تنظيم کي جيڪا سرڪار پاران هجي. باقي پبلڪ هيلٿ جا اصول ٺهيا پيا آهن ڪي نوان ڪونهن ٺاهڻا. مثال طور پاڻي صاف ڪونه ملندو، جيوڙن وارو هوندو ته ان سان بيماريون ڪونه ڇڏينديون. هاڻي ان کي صاف ڪير ڪري. اهو ته سرڪاري مسئلو آهي نه ته ماڻهن کي پيئڻ لاءِ صاف پاڻي ملي.

بیمارين جي روڪڻ ۾ ٿيندي ٿيندي رهجي وڃي ٿي. مليريا جو مثال وٺو اها ختم ٿيندي ٿيندي وري آئي. پاڻي جا دٻا بند ٿيڻ لڳا، اسپري ٿيا، مچرن جو خاتمو اچڻ لڳو، وري اهو پروگرام اڌ ۾ رهجي ويو ته مليريا موٽي آئي.

ماتا (Small Pox) تي محنت ٿي مڪمل اميونائيزيشن ٿي ته دنيا مان ان جو نالو مڃي ويو. پاڪستان به ان کان آڄو ٿي ويو. اسان کي ياد آهي ته شمال پاڪستان جا ٽڪن هٿن وارا اٺن تي چڙهي ڳوٺن ۾ پهچندا هئا، ڳوٺن ۾ برف ڪونه هوندي هئي ته برف جا چٻا پري پوءِ ٿرماس ۾ ٽڪا وجهي اتي پهچائيندا هئا جيئن ٽڪا پهچندا هئا ته هٿن وارو ڪم کي لڳي ويندو هئو. مطلب ته محنت ۽ جدوجهد سان ڪم ٿيندو هئو اهو سڀ ڪجهه تنظيم ۽ جذبي کانسواءِ هن دؤر ۾ ڏکيو آهي.

ڊاڪٽر ثناء الله:- ڪجهه مهينا اڳ ۾ اخبار ۾ پڙهيو هئوسين ته ٿر ۾ هڪ بيماري ٿي آهي جنهن ۾ رت جون ٿيرون اچن پيون ۽ ماڻهو مري وڃن پيا. اهڙين بيمارين تي ڪجهه ڳالهائون. ڊاڪٽر صالح صاحب:- اڌا رڳو ٿر ۾ ڇو هر جاءِ تي ٿيو آهي اهو گهڻي ڀاڱي گيسٽرو انٽرائيٽس (معيدي ۽ آندڻ جي سوچ واري بيماري) آهي. يا وري پهاڙي علائقن تي هيمريچڪ فيور هوندو آهي، ان ۾ خون اچڻ شروع ٿي ويندو آهي. اهو وائرس جي ڪري هوندو آهي. پر اڪثر بيماريون کاڌي ۽ پاڻي جي خرابين ڪري ٿين ٿيون.

ڊاڪٽر ثناء الله:- سائين انهن بيمارين تي ڪا تحقيق وغيره چونه ٿي ڪئي وڃي؟

ڊاڪٽر صالح صاحب:- 1958ع ۾ جڏهن مارشلا لڳي هئي ته اسان به هتي هئاسين. برڪي صاحب وارا آيا هئا، نئون نئون جوش هئو، لياري واري پاسي ڏي ڪجهه تحقيق ٿي هئي ته اهي گيسٽرو انٽرائيٽس گندي پاڻي ۽ خراب کاڌي سبب ٿين پيا. کاڌي پيتي ۽ پاڻي کي صاف ڪبو ته بيماريون گهٽجي وينديون. هونءِ به پيٽ جي گهڻين بيمارين جو جيڪي اهڙي قسم جون آهن تن جو علاج اڄ ڪلهه دنيا ۾ ڳولهي لڌو اٿئون، اهو آهي ته جسم ۾ پاڻي جي گهٽتائي نه ٿيڻ گهرجي يعني O.R.S جو استعمال. انهي سڄي دنيا کي لوڏي ڇڏيو آهي. دوا ساز ڪمپنيون جيڪي اڳي اهڙي قسم جون دوايون هتي وڪڻنديون هيون، سي به هاڻي سوڙهيون ٿيڻ لڳيون آهن، ماڻهن کي جسم مان پاڻي جي کوٽ (Dehydration) کان بچائجي، گهڻيون بيماريون پاڻ مراديون ٿيڪ ٿيڻ جو ڳوٺ آهن. پاڻي جي کوٽ نه ٿي باقي بيمارين تي ڪنٽرول ٿي ويندو.



(Enviornmental Factor) وائرس

انفيڪشن ۽ ماءُ جي کير جو نه واپرائڻ.
جن ٻارن ماءُ جو کير نه پيتو آهي انهن
۾ ذيابيطس جو مرض وڌيڪ ڏٺو ويو
آهي.

ٻارن ۾ ذيابيطس جو مرض پنجن
سالن جي لڳ ڀڳ ظاهر ٿيندو آهي. ٻار
جو وزن گهٽجڻ، پيشاب جي گهٽائي
تمام گهڻي اڃ ۽ چڙچڙاڻ ڪجهه عام
شروع جون نشانيون آهن. پر گڏو گڏ
گهڻيون ٿيون، سهڪ ٿيڻ، خشڪي
محسوس ڪرڻ ۽ بيهوشي جي حالت ۾
وڪوڙجي وڃڻ، معائني تي ٻار کي
جسم ۾ پاڻيءَ جي گهٽتائي وڌا وڌا
ساه ڪڻ ۽ بيحالي و بيهوشي جي حالت
۾ عموماً پهرين ڏٺا ويندا آهن. ان مرض
جي تشخيص لاءِ پيشاب ۾ گلوڪوز
جو هئڻ ۽ گڏوگڏ رت ۾ گلوڪوس
جي بنا ٻي ڪنهن سبب مستقل واڌ جي
تصديق ٿيڻ ضروري آهي. عموماً
شڪايتن، جسماني نشاني ۽ پيشاب
رت ۾ گلوڪوز جي واڌ ملي ڪري
ذيابيطس جي بيماريءَ جي تقريباً پڪ
ڏيارين ٿيون. اهو مرض علاج جوڳو
آهي. پر علاج جو مدو عمر سان ٻڌل
رهي ٿو. علاج ۾ مختلف قدم هر
آهنگيءَ ۾ کڻڻا پون ٿا. هڪ پاسي
انسولين جي سئي جيڪا گهٽ ۾ گهٽ
ٻه ڀيرا روز هڻي پوندي آهي ۽ گڏو گڏ

مٺو پيشاب جو آزار ۽ ٻار

ڊاڪٽر اقبال احمد ميمڻ - ايم. بي. ايس. ايف. آر. سي. پي (ڪئناڊا) ايف. اي. اي. پي
ڪمر نمبر ۱۰ - پهرين منزل تاج ميڊيڪل ڪامپليڪس بندر روڊ حراچي

رت ۾ گلوڪوس وڌي ويندو آهي ۽
گڏو گڏ جسم جي مختلف گهرڙن ۾
گلوڪوس جي مصنوعي اثاڻ ٿي ويندي
آهي. (چاڪاڻ جو انسولين جو مددگار
عمل گلوڪوس جي استعمال لاءِ ضروري
آهي) ۽ ان ڪري گلوڪوس کان علاوه
ٻين جرن جو استعمال ضروري ٿيندو
آهي. انهيءَ متبادل رستي جي استعمال
سان جسم ۾ Lactic acid ۽ Ketones
جهڙا اڻ وڻندڙ ماده پيدا ٿيو وڃن ته ٻي
پاسي گلوڪوس جي واڌ بڪين ذريعي
خارج ٿيڻ ڪري پيشاب جي گهٽائي ۽
گهڻي اڃ لڳندي آهي.

مٺي پيشاب جي بيماري (Diabetes)
ڪن ملڪن ۾ وڌيڪ ڏٺي وڃي ٿي
(مثلاً Finland) ته ڪن ۾ ان جو هئڻ
گهڻو گهٽ آهي (Japan) ذيابيطس جي
مرض کي پيدا ڪرڻ ۾ ”دخل انداز“
سبب (Causative Factor) سمجهيا
وڃن ٿا انهن ۾ مک هي آهن: خانداني
(Genetic Familial) ماحولياتي عمل

”مٺو پيشاب“ نالو هڪ حقيقت تي
مبني آهي. چاڪاڻ ته پيشاب ۾ ڪنڊ
وانگر مٺي شئي جنهن کي گلوڪوس
چوندا آهن، اڇڻ لڳندو آهي. گلوڪوس
کان علاوه ٻه ڪنڊ وانگر مٺا، ٻيا به جزا
پيشاب ۾ ايندا آهن، پر ورلي. مٺاڻ تي
ماڪوڙين جو جمع ٿيڻ هڪ عام پسيل
فهر آهي پر مٺاڻ کانسواءِ به پيشاب تي
ماڪوڙيون مڙنديون آهن.

مٺي پيشاب جي بيماري عموماً وڏن
ٻرڻي ويندي آهي ليڪن اها بيماري
ٻارن ۾ به ٿيندي آهي. پر خوش قسمتي
سان عام نه آهي. رت ۾ گلوڪوس جو
جزو دماغ، دل ۽ ٻين ضروري جسم جي
عضون ۾ مستقل استعمال ۾ رهي ٿو. اهو
فعل، هڪ رتوبت- جنهن کي انسولين
چوندا آهن، ان جي زور تي استعمال ٿئي
ٿو. گلوڪوس جو رت ۾ هڪ خاص
مقدار ۾ هئڻ گهڻن هارمونن جي متوازن
عمل جو نتيجو آهي. انهن مان ڪجهه
جي عمل سان رت ۾ گلوڪوز وڌندو
آهي ته ڪجهه جي عمل سان گهٽجندو
آهي. انسولين جي جسم ۾ پيدوار
پينڪرياس (Pancreas) نالي غدود جي
ڪجهه خاص گهرڙن Islet Cells ۾
ٿيندي آهي ۽ سڌو رت ۾ خارج ٿيندي
آهي. جيڪڏهن ڪنهن به سبب ڪري
انهن گهرڙن جو تعداد گهٽجي وڃي يا
انهن کي نقصان پهچي ته انسولين
ضرورت مطابق ناڪافي رهندي ۽ نتيجا

انسولين کي مناسب انداز ۾ ٿڌو رکڻ به ضروري هوندو
آهي. گهڻو ڪري ته دڪاندار ان ڳالهه کي نظر انداز
ڪندي بيڪار ٿيل انسولين وڪڻندا آهن ته وري ٻي
پالسي بجليءَ جو گهڻو وقت غيرحاضر رهڻ ريفريجريٽر
جي مالڪن کي به خوار ڪريو ڇڏي.

قدر رهن ٿا. ٻارن ۾ ذيابيطس وڌڻ جي نسبت ۾ ان لحاظ کان به مختلف آهي ته ننڍن ۾ عام اثر ويهڻ هلڻ چلڻ ۽ جيئڻ کان وڌيڪ نچڻ ٿيڻ واءِ ۽ ويجهه لاءِ به انسولين جو مقدار مناسب

انسولين جي ضرورت ٻار جي عمر ۽ وزن سان بدجندي رهندي آهي. مناسب ڪنٽرول جي نشانين ۾ وزن جي واڌ، پيشابن جو گهٽجڻ، اڃ جو عام مدافتي وانگر ٿيڻ، پيشاب ۾ گلوڪوز ختم ٿي وڃڻ ۽ رت ۾ گلوڪوز جي مقدار قابل قبول ليول تي هجڻ شامل آهن. حاصل مطلب اهو آهي ته مٺي پيشاب جي بيماري ٻارن ۾ به ٿي سگهي ٿي پر وڏن جي نسبت ۾ ڪافي گهٽ تعداد ۾ ٿئي ٿي. ٻارن جي علاج ۾ سٺي جو متبادل گوري جو استعمال نٿو ٿي سگهي تنهن ڪري عملي ۽ نفسياتي مسئلا ڪافي

- پوسٹ آفس
- لیٹر بکس
- پوسٹ مین کے بیچ اور
- پوسٹ کو ڈراماٹک ریلے سے معلوم کیجئے

کراچی

پوسٹ کوڈ	ڈاک خانہ	پوسٹ کوڈ	ڈاک خانہ	پوسٹ کوڈ	ڈاک خانہ
75040	(40) گوٹھ مراد مبین	75210	(19) رقا، عام سوسائٹی	74700	(1) ایمری، ہارہ، عام آبادی کی آبادی
75580	(41) گورنر ہاؤس	75700	(20) سائٹ	75800	(2) اورنگی ہاؤس
75180	(42) لاٹھی کلاں	75350	(21) شارع فیصل	75200	(3) انجمن رات
75680	(43) لیاری	75230	(22) شاہ فیصل کلاں	75150	(4) ایکسپریس پارکس زون
75900	(44) لیاقت آباد	75730	(23) شیرشاہ	75780	(5) بلدیہ کلاں
75100	(45) مائل کلاں	75850	(24) فیصلہ کی ایما	75990	(6) ریزڈ آف انٹرپرائز
75750	(46) مالکی پور (اسے ایف)	75120	(25) قاضی آباد		ایڈ سینڈری ایجنٹ
75780	(47) مالکی پور (سی ای)	74200	(26) کراچی کی آبادی	75010	(7) پاکستان مشین ہاؤس شپ
75480	(48) محمود آباد	74000	(27) کراچی کی آبادی	75000	(8) پاکستان مشین ملز
75050	(49) فیروز شاہ	74400	(28) کراچی صدر کی آبادی	75030	(9) پاکستان مشین ٹول فیکٹری
75080	(50) فیروز کلاں	75530	(29) کراچی میٹرو	75790	(10) پاکستان نیل آسٹریٹ
75070	(51) فیروز کلاں	75270	(30) کراچی کی آبادی	75020	(11) پورٹ ٹرین قائم
75890	(52) منگھوہ	75600	(31) گلشن	75400	(12) ای ای ای ای ای ای
75640	(53) سونہ	75250	(32) کیمپن آؤٹریچ ڈیپ		بلک بزنس
74550	(54) نیشنل روڈ	75190	(33) کورنگی کیمپ	75280	(13) پی۔ سی۔ ایس۔ آئی۔ آر
74800	(55) عام آبادی کی آبادی	74900	(34) کورنگی کی آبادی	75510	(14) جناح پوسٹ آفس
75280	(56) نیشنل سینٹر	75620	(35) کیمپن		میٹریکل سنٹر
74800	(57) نیشنل ہاؤس کی آبادی	75330	(36) گورنر ہاؤس	75650	(15) حبیب بینک
75850	(58) نیشنل کراچی	75290	(37) گلشن جبر	75180	(16) دارالعلوم (کورنگی)
75520	(59) نیشنل سٹیٹ	75300	(38) گلشن اقبال	75770	(17) دارالاحسان
		75340	(39) گلشن سمار	75500	(18) ڈیفنس ہاؤس سوسائٹی

پاکستان پوسٹل سروسز کارپوریشن
وزارت مواصلات حکومت پاکستان

ذیابیطس جا قسم

ذیابیطس جا گهڻائي قسم آهن، پر مکيه ٻه آهن

ڊاڪٽر محمد زمان شيخ — اسسٽنٽ پروفيسر آف ميڊيسن سول اسپتال / ڊاٽو ميڊيڪل ڪاليج ڪراچي

(RESISTANCE) سبب ٿيندي آهي، يعني بدن ۾ انسولين جو مقدار ته نارمل هوندو آهي بلڪه ڪن حالتن ۾ ته وڌيڪ هوندو آهي، پر اها انسولين مختلف سببن ڪري بي اثر هوندي آهي ۽ جسم جي اها حالت هوندي آهي ته جيئن انسولين جسم ۾ آهي ئي ڪونه. نتيجي طور رت مان گلوڪوز مڙني جيو گهرڙن يا PERIPHERAL TIS- SUES ۾ داخل ٿي نه سگهندو آهي ۽ رت ۾ ان جو مقدار وڌندو آهي وڌندو. هي گهڻو ڪري خانداني مرض آهي، مريض 40 سالن کان وڏي ڄمار وارا ٿين ٿا ۽ عام طرح سان ٽلهه ٿين ٿا. ٽولهه گهڻو ڪري ڳجهي ذیابیطس کي ظاهر ڪري ٿي يا وري نئين سري سان ذیابیطس پيدا ڪري ٿي. جيئن ته غذا ضرورت کان وڌيڪ کائڻ سان هن جو گهرو تعلق آهي، ان لاءِ هن قسم جي ذیابیطس جي علاج جو بنيادي مقصد کاڌي جي پرهيز هوندو آهي. اڳران سان به شڪر قابو ۾ نه اچي ته پوءِ مختلف قسم جون گوريون ڏيون آهن جي لبلبي منجهان انسولين کي ائين چڪي

داخل ٿيندو آهي جتي پهريون ڀيرو ان بيماريءَ جو پتو پوندو آهي. مريض جو وزن گهٽ ٿي ويندو آهي، پر گهڻو ڪري هي مريض سنهڙا هوندا آهن. انهن جي پيشاب ۾ ڪيٽون (KETONES) جلد ظاهر ٿي پوندا آهن، جنهن جو مطلب هي هوندو آهي ته انسولين جي تمام گهڻي ڪوٽ ڪري نشاستي جي جاءِ تي سڻپ ٻرڻ شروع ڪيو آهي چوٽه جسم کي گهربل توانائي ته هر حال ۾ حاصل ڪرڻي هوندي آهي، پر ان غلط قسم جي توانائي سبب مريض بيهوشيءَ جي حالت (COMA) ۾ پهچي ويندا آهن، جنهن جو ترت علاج نه ڪرڻ سان مورڳو حياتي کي خطرو لاحق ٿي پوندو آهي.

(۲) ٽائپ ”ٻه“ يا ٻئي نموني واري ذیابیطس (TYPE-II Diabetes) — ذیابیطس جي مريضن جي گهڻائي هن قسم سان تعلق رکي ٿي ۽ هڪ اندازي موجب اٽڪل 80 سيڪڙو مريضن کي ٻئي نموني واري يا ٽائپ II ذیابیطس هوندي آهي. هن قسم جي ذیابیطس گهڻو ڪري انسولين جي عمل جي روڪ

(۱) ٽائپ هڪ يا پهريون نموني واري ذیابیطس (TYPE-I Diabetes) هن کي انسولين تي دارو مدار رکندڙ يا (I.D.D.M) به سڏيو ويندو آهي يعني اهو قسم جنهن جو علاج کاڌي جي پرهيز سان گڏ صرف انسولين آهي هن قسم جو بنيادي ڪارڻ انسولين جي لبلبي مان گهٽ پيداوار آهي. هن قسم ۾ لبلبي جا ”بيٽا“ جيو گهرڙا جيڪي انسولين پيدا ڪن ٿا، سي تباهه ٿي ويندا آهن اهي دراصل پنهنجي ئي جسم جي غلط دفاعي حڪمت عملي جو شڪار ٿين ٿا، جيڪا انساني دشمن مثلاً جراثيم، وائرس جي جاءِ تي پنهنجي جسم جي جزن تي حملو ڪرڻ شروع ڪري ڏئي ٿي. ان عمل کي آٽو اميون ريڪشن (AUTO IMMUNE REACTION) چيو وڃي ٿو.

گهڻو ڪري هي مريض 40 سالن جي ڄمار کان گهٽ ٿيندا آهن ۽ صرف چند ڏينهن يا وڌ ۾ وڌ چند هفتن ۾ ئي هن بيماري جي شدت ظاهر ٿيو پوي ۽ ان بيماريءَ جي شدت سبب مريض ڪڏهن ڪڏهن بيهوشيءَ جي عالم ۾ اسپتال ۾

ٻاهر ڪڍنديون آهن، جيئن ڪنهن
ٽڪل گهوڙي کي ڇهڪ هڻي پڄاڻ تي
مجبور ڪيو وڃي پر اهي ٽڪيون جيئن
ته پاڻ انسولين ناهن، ان ڪري اهي
کاڌي جي پرهيز کان سواءِ بيڪار آهن.
جيڪڏهن ٻئي قسم جي ذیابيطس
ننڍڙي ئي عمر ۾ ٿي پوي ته ان کي
مودي (MODY) يا (MATURITY
ONSET DIABETES IN
YOUNG) چوندا آهن. هيءَ موروثي
بيماري آهي.

تازو ذیابيطس جو ٽيون قسم به
دریافت ڪيو ويو آهي. گمان غالب آهي
ته هيءَ غذا ئي قلت جي شڪار ماڻهن
کي ٿئي ٿي.

ڳجهي ذیابيطس (LATENT DIABETES) - هنن مريضن ۾
ذیابيطس جي ڪابه نشاني موجود نه
هوندي آهي ۽ ويندي رت ۾ گلوڪوز به
نارمل هوندو آهي. ان جي باوجود هنن ۾
ذیابيطس جو مرض لاحق ٿيڻ جو خطرو
عام ماڻهو جي پيٽ ۾ تمام گهڻو
هوندو آهي. انهن ”مريضن“ ۾ يات ليلي
جي ”بيتا“ جيو گهرڙن جون ضد حيات
(ANTI BODIES) هونديون آهن يا
هي اهي جاڙا ٻار هوندا آهن، جن مان
ڪي ڪي اڳي ئي ذیابيطس هوندي آهي.

ڪن ماڻهن کي وري ذهني دٻاءُ يا
سماڻي بيماري مهل ذیابيطس ٿئي ٿي
ر وري نارمل حالت ۾ اچڻ بعد اها ختم
ي وڃي ٿي. اهڙن ماڻهن ۾ به مڪمل
يا بيطس ٿيڻ جا امڪان وڌيڪ هوندا

آهن.

ڳپ پوڻ دوران ذیابيطس

(GESTATIONAL DIABETES) -

ڪن عورتن ۾ ڳپ واري عرصي دوران
ذیابيطس شروع ٿئي ٿي پر ٻار ڄمڻ
کان پوءِ ختم ٿي وڃي ٿي پر وري ٻئي
ڳپ دوران ذیابيطس وري اچي ٿي. هن
قسم ۾ به ڏکين عورتن ۽ انهن جي
ٻارن ۾ ذیابيطس جون ساڳيون
پيچيدگيون ٿي سگهن ٿيون ۽ انهن ۾
به مڪمل ذیابيطس ٿيڻ جو خطرو
موجود رهي ٿو. هن جو علاج کاڌي جي

ڪن ماڻهن کي وري ذهني دٻاءُ
يا جسماني بيماري مهل
ذیابيطس ٿئي ٿي پر وري نارمل
حالت ۾ اچڻ بعد اها ختم ٿي
وڃي ٿي. اهڙن ماڻهن ۾ به
مڪمل ذیابيطس ٿيڻ جا امڪان
وڌيڪ هوندا آهن.

پرهيز/انسولن آهي.

سيڪنڊري ذیابيطس

(SECONDARY DIABETES) -

لبلبي جي مختلف بيمارين مثلاً سوزش،
ڪينسر يا وري مورگوئي لبلبي کي ٿي
ڪنهن سبب کان آپريشن ڪري ڪڍي
ڇڏڻ، يا وري جگر جي بيمارين يا ڪن
غدد جي مرضن مثلاً ڪشنگ سنڊروم
(CUSHING SYNDROME)،
ايڪرومگالي (ACROMEGALY)
وغیره ڪري به ذیابيطس ٿي سگهي ٿي.
ڪي دوائون به ذیابيطس ڪري سگهن
ٿيون يا ڳجهي ذیابيطس کي ظاهر

ڪري سگهن ٿيون، مثلاً اسٽيرئوڊ
(STEROIDS)، پيشاب آور دوائون
(DIURETICS)، ڄم روڪ دوائون
(CONTRACEPTIVE PILLS)
وغیره.

آخر ذیابيطس ڇو ٿئي ٿو؟ هڪ
تحقيق موجب، هندستان ۾ جيڪي
غريب ماڻهو پسمانده علائقن ۾ رهن ٿا
انهن ۾ ذیابيطس هڪ سيڪڙو آهن،
ڪلڪتي ۽ بمبئي جهڙي وڏن صنعتي
شهرن ۾ انهن جو تعداد ٻه سيڪڙو
آهي، پر اهي جڏهن برطانيه يا آمريڪا
۾ وڃي رهن ٿا ته انهن ۾ ذیابيطس 4
سيڪڙي کان به مٿي ڏٺي وئي آهي. هڪ
ٻئي تخميني موجب جيڪڏهن والدين
مان ڪوبه هڪ ذیابيطس جو مريض
آهي ته اولاد ۾ ذیابيطس ٿيڻ جو 25
سيڪڙو امڪان آهي، پر جي ٻنهي
والدين کي ذیابيطس آهي ته اولاد ۾
خطرو وڌي 75 سيڪڙو ٿي وڃي ٿو. ان
مان ظاهر ٿئي ٿو ته جيتوڻيڪ
(GENETIC) يعني پيدائشي ۽
ماحولياتي (ENVIRONMENTAL)
ٻئي سبب ذیابيطس ڪري سگهن ٿا. پر
ان کان سواءِ مختلف سببن جراثيمن
يعني وائرس (VIRUS)، ٽولهم، عمر،
غذا ۽ ذهني ڇڪ يا جسماني بيماري به
سڌي يا اڻ سڌي طرح ذیابيطس جي
مرض جو باعث بڻجن ٿا. ائين ڪشي
سمجھجي ته خانداني ۽ پيدائشي سبب
رائفل ۾ گولي پري ڇڏڻ ٿا پر ماحولياتي
اسباب (غذا، ذهني پريشاني ۽ جسماني
ڇڪ ۽ ٽولهم) وري ان جو ٽائيگر دٻائڻ
ٿا ۽ ذیابيطس جي موذي مرض جي
شروعات ٿئي ٿي.

ذیابیطس جاڻ

سنڌيڪار: علي مرتضيٰ ڌاريجو

مناسب موت ناهن ڏيندا تڏهن ذیابیطس جو مرض ٿي پوندو آهي. جڏهن کاڌي کائڻ کان پوءِ گلوڪوس رت جي گردش سرشتي ۾ داخل ٿيڻ لڳندو آهي ته انهيءَ سبب ڪري گلوڪوس، جسم جي سيلن ۾ اثرائتي طرح سان داخل ٿي ناهي سگهندو، جڏهن ته سيلن کي ان جي گهرج هوندي آهي. جنهن سبب ۾ ڳالهين پيدا ٿينديون آهن. (۱) جسم جي سيلن کي صحيح طرح سان ڪم ڪار ڪرڻ لاءِ مناسب مقدار ۾ گلوڪوس حاصل ٿي ناهي سگهندو (اهڙو فرد ڪمزور، موڳو ۽ بيمار لڳندو آهي) ۽ سندس رت ۾ گلوڪوس جو وڌيڪ مقدار رهندو آهي [رت ۾ گلوڪوس جي وڌيڪ مقدار هجڻ واريءَ حالت کي هائپر گلائيسيميا (Hyperglycaemia) سڏجي ٿو]. (۲) جڏهن بڪين جي روڪڻ واري حيثيت کان اهو مقدار (وڌي) ويندو آهي تڏهن اهڙو گلوڪوس (ڪنڊ) پيشاب ۾ اچڻ لڳندو آهي.

هڪ اندازي موجب ته ايشيا-پئسفڪ جي عام ماڻهن ۾، ذیابیطس جو مرض هڪ سيڪڙو کان 5 سيڪڙو تائين موجود آهي. جڏهن ته هر ملڪ جي ماڻهن لاءِ هينين ڳالهين اهميت واريون ٿي سگهن ٿيون. هيٺين حالتن ۾ ذیابیطس وڌيڪ عام هجي ٿي جڏهن.

- جڏهن ڪن قومن ۾ ذیابیطس جو مرض وڌيڪ عام ٿئي ٿو. (مثال طور ملايا يا چينين جي ڀيٽ ۾ انڊين ۾ وڌيڪ ٿئي ٿي).
- جڏهن ڪنهن ڪٽنب ۾ ذیابیطس عام ٿيندو هجي.

رستي به خارج ٿيڻ لڳي ٿو. اسان وٽ اڃان تائين ذیابیطس کي منن پيشابن جو مرض سڏيو ويندو آهي. جڏهن ته حقيقت ۾ ذیابیطس جي هڪ مڪمل وصف بيان ڪرڻ ان کان وڌيڪ پيچيده آهي.

اسين جيڪو به کاڌو کائيندا آهيون اهو اسان جي جسم کي شڪتي مهيا ڪري ٿو جوائين، هضم ٿي ويل ڪاربوهائيڊريٽ جا جزا گلوڪوس جي صورت ۾ رت جي گردش سرشتي ۾ جذب ٿي وڃن ٿا پوءِ اهو گلوڪوس هڪ ٻارڻ جي صورت ۾، يا ته جسم جي سيلن کي مهيا ڪيو وڃي ٿو بشرطيڪ انهن کي ضرورت هجي، نه ته جيري ۽ انڊيپوز تشوئن (جنهن کي چرٻي به سڏجي) ڏانهن اماڻيو وڃي ٿو جتي اهو ذخيرو ٿي وڃي ٿو. بهرحال بنهي حالتن ۾، گلوڪوس جي جزن/ ماليڪيولن کي سڀ کان پهريائين سيلن ۾ داخل ٿيڻو پوي ٿو جيڪي آهن جسم جون مشڪون چرٻي ۽ ٻيا سيل. جسم ۾ انجي مناسب مقدار ۾ هجڻ لاءِ هڪ هارمون جي به ضرورت هوندي آهي جنهن کي ”انسولن“ سڏجي.

انسولن لبلبي جا ٻيٽا سيل پيدا ڪن ٿا ۽ جڏهن لبلبي مناسب مقدار ۾ انسولن پيدا ڪري ناهي سگهندو يا جڏهن جسم جا سيل، انسولن جي

اسان جنهن خطي ۾ رهون ٿا اتي جي ماڻهن جون عمريون جيئن جيئن وڌنديون وينديون ۽ سندن معيار زندگي بلند ٿيندو ويندو ٿين ٿين هو ذیابیطس جي مرض جو وڌ ۾ وڌ شڪار ٿيندا ويندا جيڪو اڳتي هلي طبي دنيا جو هڪ وڏو ۽ عام مسئلو بڻجي ويندو. هن مضمون ۾ اسان، ذیابیطس بابت ڪن بنيادي ڳالهين جو تعارف ۽ ڪن عام قسمن جي سوالن جا جواب ڏنا آهن. ساڳئي وقت اهو به ٻڌايو ويو آهي ته ذیابیطس جو اهڙو مريض ۽ سندن آڪهر اهڙي بيماريءَ لاءِ ڪهڙا اپاءَ وٺي سگهن ٿا ته جيئن هو هڪ جڳهي ۽ تڪليفن کان آجي زندگي گذاري سگهي. هن مضمون ۾ ذیابیطس بابت دنيا ۾ متعارف ڪرايل علاج جي جديد طور طريقن جو به ذڪر ڪيو ويو آهي.

مترجم -

عام طور تي ذیابیطس (Diabetes) کي هڪ اهڙي بيماري سمجهيو ويندو آهي جنهن سبب جسم ۾ ڪنڊ جو مقدار تمام گهڻيءَ حد تائين وڌي وڃي ٿو. ايتري قدر جو انجو ڪجهه حصو پيشاب

● جيئن جيئن ڪو شخص پوڙهو ٿيندو وڃي ٿو.

● جڏهن ڪو شخص ٿلهو به ٿي وڃي ٿو،

ساڳئي وقت اهو به محسوس ڪيو ويو آهي ته جيئن جيئن اسان جي خاص ڪري شهري آدمشماريءَ جو وڏو انگ پوڙهو ٿيندو وڃي ٿو تيئن تيئن اهي وڌيڪ ٿلهي به ٿيندا وڃن ٿا (شايد ته خوشحاليءَ سبب) تنهن ڪري اسان اهوئي سمجهون ٿا ته اهڙن سڀني ملڪن جا ماڻهو ذیابيطس جو به وڌيڪ شڪار ٿيندا ويندا. ان لحاظ کان اها ڳالهه به خاص اهميت رکي ٿي ته، هڪ اهڙو شخص جنهن کي ذیابيطس ٿيڻ جو وڌيڪ خدشو رهي ٿو (مثال طور اهي انڊينس جيڪي ٿلهي آهن ۽ انهن جا والدين ذیابيطس جي مرض جو شڪار آهن) تنهن کي اهو ضرور محسوس ڪرڻ گهرجي ته کيس ذیابيطس ٿيڻ جا تمام گهڻا امڪان موجود آهن جنهنڪري کيس پنهنجي صحت لاءِ وڌيڪ خيال رکڻ گهرجي.

ذیابيطس جو مرض تڏهن پيدا ٿي پوي ٿو جڏهن لبلبو مناسب مقدار ۾ انسولن مهيا ڪري نٿو سگهي يا جڏهن جسم جا سيل، انسولين سان صحيح نموني نه ڪم ڪن.

يا ذیابيطس جا ٻه ڪي قسم آهن؟
طبيعن ذیابيطس جي مرض جي ٻن قسمن ۾ ورڇ پڻ ڪئي جنهن کي هو

سوليءَ طرح سان هيئن بيان ڪن ٿا ته :
ذیابيطس جو قسم نمبر ۱ ۽ قسم نمبر ۲. ائين ذیابيطس جو ڪوبه مريض، انهن ٻنهي قسمن مان ڪنهن هڪ جو شڪار ٿيل هوندو آهي.

ذیابيطس جي پهرين قسم جو شڪار ڪوبه صحتمند ماڻهو عمر جي ڪنهن به حصي ۾ ٿي سگهي ٿو، جنهن ۾ ٻار به اچي وڃن ٿا. هن قسم جي ذیابيطس جا شڪار ٿيندڙ، اهي فرد هوندا آهن جيڪي آٽو اميون (Auto im-mune) روڳ جو شڪار ٿي پوندا آهن جنهن ۾ ڪن ان جا ٿايل سببن ڪري،

لبلبي جا بيتا سيل اوچتو تباهه ٿي وڃن ٿا. اهڙن مريضن جي حالت اوچتو بنا ڪنهن نشانين ظاهر ڪرڻ جي، سخت گڻپير ٿي ويندي آهي جڏهن ته ڪي وري ڪجهه وقت ناچاڪائي محسوس ڪرڻ کان پوءِ غش ٿي ويندا آهن.

اهڙن مريضن کي جڏهن ترٽ اسپتال پهچايو وڃي ته هو ڪجهه ڏينهن انسولن جي علاج ڪرڻ کان پوءِ نوبنا ٿي واپس گهر هليا ويندا آهن. اڳتي لاءِ اهڙن سڀني مريضن کي، تا حياتي، هرروز انسولين جي سئي لڳرائڻي پوندي آهي. جيئن ته ذیابيطس جي پهرين قسم جو شڪار ٿيندڙ، سدائين لاءِ انسولن تي مدار رکندڙ ٿي پون ٿا، ان سبب ذیابيطس جي هن قسم کي انسولين ڊپينڊنٽ ڊائبيٽس ميلائٽس (Insulin Dependent Diabetes Mellitus يا IDDM) به سڏيو ويندو آهي.

خوش قسمتيءَ سان، يورپي ملڪن جي ڀيٽ ۾ اسان جي علائقن ۾، ذیابيطس جو هي قسم گهٽ ٿئي ٿو.

ذیابيطس جي ٻئي قسم کي

نان-انسولين ڊپينڊنٽ ڊائبيٽس ميلائٽس (Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus يا NIDDM) سڏيو ويندو آهي. ذیابيطس جو هي قسم پهرئين قسم کان گهڻو مختلف آهي ۽ عام طور تي وڏيءَ عمر جا ماڻهو هن قسم جو شڪار ٿي پوندا آهن. اهو به ممڪن هوندو آهي ته اهڙا مريض هيٺ ڏنل ڪنهن به هڪ قسم سان واسطو رکندڙ هجن.

● اهي مريض جن جا جسماني سيل، انسولن جي عام رواجي مقدار جي موٽ ناهن ڏيندا اهڙن مريضن کي ”انسولن ريزسٽنٽ“ سڏيو ويندو آهي ۽ اهي گهڻي ڀاڱي ٿلهي هوندا آهن. اهي جڏهن معقول طريقي سان وزن گهٽائي ڇڏيندا آهن (اهڙن ڪاڌن جي چونڊ ڪرڻ سان) ته سندن حالت گهڻي بهتر ٿي ويندي آهي.

● اهي مريض جن جا بيتا سيل ساڻا ٿي ۽ بيڪار ٿي ويل هوندا آهن جنهن سبب اهي عام رواجي حالتن دوران اهي انسولن جو رڳو ڪجهه مقدار پيدا ڪري سگهندا آهن. اهڙن ٽڪل ۽ وقت کان اڳي جهونو ٿي ويل سيلن کي زور وٺرائڻ لاءِ جيڪڏهن، اهڙن مريضن کي اهڙيون گوريون ڪارايون وڃن ته اهي وري هڪ دفعو عام رواجي مقدار ۾ انسولن پيدا ڪرڻ لڳندا آهن. اهڙين دوائن کي اورل هائپو گلويسيمڪ ايجنٽ (Oral Hypoglycaemic Agents يا OHAs) سڏبو آهي جن جو مکيه ڪم بيتا سيلن کي اثرائتو بڻائي سخت پورهيو ڪرائڻ هوندو آهي جنهن سبب اهي هڪ دفعو وري ڪجهه وقت لاءِ پنهنجيءَ ڪرت کي لڳي ويندا آهن.

او ايچ اي يا رت ۾ ڪنڊ گهٽائيندڙ دوايون

اهڙين حالتن ۾ جڏهن ڪاڌي ۽ وزن گهٽائڻ سان به ڪو خاص فرق پئجي نه سگهي ته پوءِ ڊاڪٽر اهڙيون گوريون (OHA) به تجويز ڪري سگهندو آهي. جيئن ته اهڙين گورين جا به ڪيترائي قسم آهن پر تنهن هوندي به انهن کي ٻن مکيه قسمن ۾ ورهايو ويو آهي جيڪي آهن سلفونائيليورياس (Sulphonylureas) ۽ بائيگيئونائيڊس (Biganides). شروعات ۾ گهڻي ڀاڱي ڊاڪٽر سلفونائيليورياس تجويز ڪندا آهن ڇو ته هن جي پيٽ ۾ بائيگيئونائيڊس نسبتاً گهٽ مؤثر ۽ وڌيڪ ان وڻندڙ اثر رکن ٿيون. هن قسم جي ڪيترين نين او ايچ اي گورين لاءِ اهو به چيو ويندو آهي ته اهي رت جي گلوڪوس جي ليول گهٽائڻ کان سواءِ رت جي چرٻي (Lipid) يا ننڍڙن رت نلين (Blood Vessels) تي به فائديمند اثر ڪن ٿيون. بهرحال ان مان ڪهڙي قسم جي گوري ڊاڪٽر تجويز ڪري ٿو اهو سندس تجربي تي مدار رکندڙ هوندو آهي.

ڪنهن ٻئي قسم جي او ايچ اي جي چونڊ ڪرڻ :

جڏهن ڪنهن پهرئين قسم جي گوريءَ جو وڌ ۾ وڌ وزن ڏيڻ کان پوءِ به ان جا خاطر خواه اثر پيدا نه ٿيندا آهن، تڏهن هنگروپ مان جي ڪنهن ٻئي قسم جي گوريءَ جي چونڊ ڪئي ويندي آهي. ڪيترن ماڻهن جو اهو به ويساهه آهي ته، هڪ قسم جي سلفونائيليورياس ڏيڻ کان پوءِ انجو ڪو ٻيو قسم ڏيڻ هڪ اجائي ڳالهه هوندي آهي. جڏهن ته اهو به ممڪن هوندو

ڌيابطس جي پهرين قسم جي پيٽ ۾، ٻئي قسم جا مريض جڏهن پهرين ڏٺا وڃن ته اهي ايترا بيمار نظر نه ايندا آهن. جڏهن ته اها هڪ حقيقت آهي ته، اهڙن مريضن جي ڄاڻ اتفاقاً ٿي پوندي آهي جڏهن هو پيشاب جي تپاس ڪرائيندا آهن. اهڙن مريضن جي ڌيابطس کي ضابطي هيٺ آڻڻ لاءِ ڊاڪٽر ڏاڪي به ڏاڪي علاج ڪندا آهن.

ڪاڌي جي مناسب چونڊ ۽ وزن گهٽائڻ:

اهڙا گهڻا ڌيابطس جا مريض جڏهن پنهنجو وزن گهٽائي ڇڏيندا ۽ ڪاڌو به معقول قسمن جو کائيندا آهن تڏهن نه رڳو سندن رت جي ڪنڊ ۾ سڌارو ايندو آهي پر اها عام رواجي مقدار تائين به پهچي ويندي آهي. ائين هو جيستائين پنهنجي وزن کي ضابطي ۾ رکندا ۽ متوازن ڪاڌو (ٿورڙو ڪاڌو ور ڪري کائڻ) به کائيندا رهندا آهن تيستائين کين دوائن کائڻ جي گهرج محسوس ناهي ٿيندي. انلاءِ اهو به هڪ اصول آهي ته، انسولن جي گهٽ پيداوار کي مناسب طرح استعمال لاءِ اهڙا ڪاڌا کائي ڏسجن جيڪي وڌ ۾ وڌ مؤثر ۽ فائديمند ثابت ٿيندا هجن ۽ پوءِ رڳو انهن مٿاڻي مدار رکڻ گهرجي جو ائين ڪرڻ سان، پوڙهي ٿي ويل لبلبي غدود کي به سھائتا ملي ٿي.

هڪ اهڙو فرد جنهن کي ڌيابطس جي شڪار ٿيڻ جو گهڻو امڪان رهي ٿو، تنهن کي ڪوشش ڪري پنهنجيءَ صحت جو وڌ ۾ وڌ خيال رکڻ گهرجي.

● اهڙا مريض جيڪي او ايچ اي جا وڏا وڏا وزن وٺڻ کان پوءِ به ايتري انسولن پيدا ڪري نه سگهن جو اهي صحتمند رهي سگهن ته پوءِ اهڙن مريضن کي انسولين جون سيون هنيون وينديون آهن ته جيئن هو صحتمند زندگي گذاري سگهن. (پوءِ ڀلي ته اهڙا مريض زندهه رهڻ لاءِ انهن تي مدار رکندڙ نه به هجن جيئن آءِ ڊي ڊي ايم مريضن سان ٿئي ٿو). اهڙن مريضن کي ”انسولن رڪوائرنگ“ يا انسولن جا گهرجائو به سڏيو ويندو آهي.




اسان واري علائقي ۾ ڌيابطس جي ٻئي قسم جا مريض وڌ ۾ وڌ موجود آهن. ڌيابطس جي پهرين قسم جا مريض عام طور تي سخت بيمار ڏسڻ ۾ ايندا آهن ۽ گهڻن کي ته اسپتال داخل ڪرڻ ۽ هنگامي طور تي زندگي بچائڻ لاءِ اهڙيون دوائون به ڏنيون وينديون آهن. اهڙي عرصي دوران، ڊاڪٽر تمام احتياط سان اهو ڏسندا آهن ته، اهڙي فرد کي هرروز انسولن جي ڪيتري مقدار جي گهرج آهي ۽ پوءِ اهڙي ڳالهه مريضن کي سمجهائيندا آهن ته هو هرروز اهڙي دوا ڪيئن ڪتب آڻي. اهڙو مريض اسپتال ڇڏڻ کان پوءِ، هر روز پاڻ کي انسولن جي هڪ سئي ائين سڄي عمر تائين هڻندو رهندو آهي. پر جيڪڏهن هو ائين ڪري نه سگهي ته، تمام تر، هڪ ٻن ڏينهن اندر زندگيءَ ۾ موت جي ڪشمڪش ۾ ڦاسي پوندو آهي. اهوئي سبب آهي جو ڌيابطس جي پهرين قسم جا شڪار مريض، انسولن تي پاڙيندڙ هوندا آهن. اهڙن مريضن لاءِ ڌيابطس جون گوريون (اورل هائيپوگلايسيمڪ) بنهه بي اثر هونديون آهن.

اهڙين حالتن ۾ جڏهن ذیابیطس جي مريضن جي جسم ۾ ايتري انسولن موجود نه رهي هجي جو اها سندس جسم کي ٻارڻ مهيا ڪري سگهي پوءِ چاهي اها حالت اوڀيچ اي جي بي قاعدگيءَ سان واپرائڻ سبب ٿي هجي يا هوانسولن جي سئي ڪي نظر انداز ڪندو رهيو هجي ته اهڙين حالتن ۾ سندس جسم جا سيل ٻارڻ جي عمر بدل لاءِ واجهائيندا آهن جيڪو جسم لاءِ نامناسب ۽ ناموزون هوندو آهي. جنهن لاءِ جسم جا سيل وڌ ۾ وڌ حد تائين چرٻي ۽ شڪري جي اهڙن ٻين پندارن جو ڀرپور استعمال ڪرڻ لڳندا آهن اهو آهي چرٻي جي مادن جي ڀڃ ڊاه ڪرڻ (ڪيٽونس) ۽ رت جي تيزابن جو ڊانوان ڊول ٿيڻ. انهيءَ ئي سبب ڪري هي اصطلاح ”ڊائٽڪ ڪيٽواسيڊوسس“ وجود ۾ آيو آهي، جيڪڏهن اها حالت قائم رهندي آهي ته جسم جو ميٽابوليزم ايترو ته بگڙجي ويندو آهي جو اهڙو مريض اوچتو غش ٿي وڃي ٿو. پوءِ جيتوڻيڪ اهڙن مريضن کي اسپتال ۾ پهچايو ويندو آهي پر تنهن هوندي به انهن جو ڪجهه تعداد موت جو شڪار ٿي وڃي ٿو.

ساڳئي طرح سان جيڪڏهن انسولن يا گورين جو بي قاعدگيءَ سان استعمال ڪيو رهيو ته ان سبب هائپوگلايسيميا جي حالت به پيدا ٿي سگهي ٿي جنهن سبب پڻ رت ۾ گلوڪوس جو گهٽ مقدار رهندو آهي. خاص طور تي اهڙين حالتن ۾ جڏهن واپرائجندڙ ڪاڌي يا ڪسرت/ڪرت ۾ ڪنهن سبب ڪري وڏي تبديلي آندي ويئي هجي. ذیابیطس

وقت به سٺي لاءِ چيو هوم ته هو، ان لاءِ دليون هڻي رهيا هيا. ذیابیطس جا مريض ڪهڙن مسئلن جو شڪار ٿي سگهن ٿا. ذیابیطس جا مريض جن پيچيدگين جو شڪار ٿين ٿا، اهي ٻن قسمن ۾ ورهائي سگهجن ٿيون: زندگيءَ کي خطرو ۽ گهٽ هڏي واريون پيچيدگيون

رت ۾ تمام گهڻي حد تائين ڪند وڌڻ جون نشانيون



اهو به ممڪن هوندو آهي ته ذیابیطس جو ڪو مريض اوچتو سخت بيمار ٿي پوي ۽ هو ان جون مڙيوئي ڪي نشانيون ظاهر ڪندو هجي. پر جيڪڏهن مريض کي صحيح طرح سان سنڀاليو وڃي تڏهن اهڙيون گهڻيون حالتون پيدا ٿي ناهن سگهنديون. هوند هو ڪيٽواسيڊوسس (Ketoacidosis) يا هائپوگلايسيميا (Hypoglycaemia) جو شڪار ٿي سگهي ٿو.

آهي ته اوڀيچ اي جي هئي قسم طور بائيوگنائڊ ڏني ويندي هجي. انسولن جو واڌو مقدار ڏيڻ: جڏهن ڪاڌي جي مٿاسٽا، وزن گهٽائڻ ۽ سلفانائيليوريا يا بائيوگنائڊ گورين سان به ڪو خاص فرق نه پوندو هجي، تڏهن ممڪن هوندو آهي ته ڊاڪٽر، سين رستي انسولن جو واڌو مقدار جسم ۾ هڻي. بدقسمتي سان اسان جا ڪيترا ڊاڪٽر آخري علاج طور سٺي هٿ ڪان ان ڪري به لهرائيندا آهن جو ائين ڪرڻ سان ممڪن هوندو آهي ته اهڙو مريض وڌائڻ هليو وڃي ۽ ڪنهن اهڙي ڊاڪٽر کان علاج ڪرائي جيڪو کين سٺي لاءِ زور نه ڀريندو هجي، چوڻ ته اهڙا مريض سٺي هٿ ڪان وڌن ويندا آهن.

جڏهن ته اصل حقيقت هيءَ به آهي ته، سٺين جي سائنس ۽ ٽيڪنالاجيءَ ۾ اڏو ته انقلاب اچي ويو آهي جو هاڻ، اهڙيون به سيون موجود آهن جن جي هٿ سان بنهه سور جو احساس ناهي ٿيندو. گهڻا مريض جڏهن انسولن جي سٺي هٿ ڪان شروع ڪندا آهن ته هو اڳي کان

وڌيڪ سگهه ۽ شڪتي محسوس ڪندا آهن جنهن جو سبب اهوئي هوندو آهي ته سندن جسم جي سيلن کي اهو ٻارڻ ملندو رهي ٿو جنهن کان هو اڳي وانجهيل پئي رهندا آيا آهن. مون کي اها به ڳالهه ياد آهي ته، اهڙن ٽن مريضن مون کي دٻ به پتي هئي ته مان کين گهڻو وقت اڳي انسولن جي سٺي هٿ ڪان شروع ڪئي هئي جنهن تي مون کين ياد ڏياريو هو ته، کين جڏهن ان


سگهي ٿو ڇاڪاڻ ته، ان جو مکيه سبب ڪنڊ جو اهو وڌي ويل مقدار هوندو آهي جيڪو تنتن/اعصابن، اکين، بڪين ۽ رت نلين کي تباهه ڪري وجهي ٿو. جيتوڻيڪ اسان کي اڃان تائين انهن ڳالهين جي ڄاڻ پئجي ناهي سگهي ته اهو ڪهڙيءَ طرح سان عمل ۾ اچي ٿو پر تنهن هوندي به اسان کي ايتري ڄاڻ ضرور آهي ته جيتري قدر ممڪن ٿي

سگهي اوتري قدر رت ۾ ڪنڊ جي مقدار کي عام رواجي حالتن ۾ رکڻ جي ڪوشش ڪجي. ذیابیطس جي ڪنهن به مريض جي جيڪڏهن فاسٽنگ بلڊ شگر (جڏهن نيراني رت ڪڍي چڪاسي وڃي) ۽ پوسٽ ميل بلڊ شگر (کاڌي کائڻ کان پوءِ رت ڪڍي چڪاسي وڃي) ليول جاچي ته اها عام طور تي سڌائين وڌيل ملندي ۽ جڏهن اهڙي هائپر گلوٿيسيميا واري حالت برقرار رهي ٿي ته اها سيلن ۾ آهستي آهستي ۽ ڪي اهڙيون اٽل تبديليون آڻي ٿي جو اهي وري ٺيڪ ٿي نٿيون سگهن. (خاص طور تي ايڪسٽرا سيلولر مٽرڪس/اسڪئفولڊنگ ۽ ڊي. اين. اي ۾)

تنهن ڪري اها ڳالهه ذهن ۾ رکڻ تمام ضروري آهي ته، تنتن، رت نلين ۽ بڪين وغيره کي اهڙي نقصان ٿيڻ کان بچائڻ گهرجي، چوٽه جڏهن هڪ ڀيرو به اهڙو نقصان پيدا ٿي پيو ته پوءِ ڪڏهن به ٺيڪ ٿي نٿو سگهي. پوءِ چاهي ڪٿي رت جي شگر تي ڪيڏو به سخت ڪنٽرول چونه رکيو ويندو هجي، اهڙو نقصان بلڪل ائين آهي جيئن توهان

ڊاڪٽر جي ڏسيل طور طريقن سان به واپرائيون رهجن ته اهڙا مريض اڄڪلهه ورلي ڪو، اڪيوٽ ميٽابولڪ حالتن جو شڪار ٿي سگهندا آهن. اها به هڪ بدقسمتي سمجهي ويندي آهي ته اڪيوٽ ميٽابولڪ حالتن جو شڪار مريض سولائيءَ سان نوبنو ٿي وڃي ٿو نسبتاً انهن حالتن جي جڏهن ڪو مريض ڊگهي مدي وارين پيچيدگين جو شڪار

رت ۾ ڪنڊ گهڻي گهٽ ٿي وڃڻ جون نشانينون



- گهڻا پگهر اچڻ
- دل ڌڙڪڻ
- گهڻي بک لڳڻ
- مٿي ۾ سور پوڻ
- هٿن، پيرن ۾ سين جو ڇيڪو محسوس ٿيڻ
- ڌيان هڪ هنڌ نه رهڻ
- ڳالهائڻ جو انداز متجي وڃڻ
- نظر ڌنڌلاڻ
- موڳو ٿيڻ
- ڪڏهن ڪڏهن بي هوش ٿي وڃڻ

ٿي پيو هجي.

ڪنهن وقت اهو به سمجهيو ويندو هو ته ذیابیطس جون پيدا ٿيندڙ پيچيدگيون جهڙوڪ: بي حسي، نابيناپ ۽ بڪين جو ناڪاره ٿي وڃڻ رڳو ذیابیطس جي پهرين قسم سان لاڳاپيل آهي.

جڏهن ته هاڻ اها ڳالهه غلط سمجهي وڃي ٿي چوٽه، ذیابیطس جو ڪوبه مريض اهڙين پيچيدگين جو شڪار ٿي

جي اهڙن مريضن کي اهو به سمجهايو ۽ سيکاريو ويندو آهي ته هو اهڙين حالتن جي پيدا ٿيڻ جون نشانينون سمجهي سگهن (جيڪي آهن: پوانتي، نظر چٽي نه پوڻ ۽ جسم ۾ ڇپ ڇپ ٿيڻ) ۽ انهن لاءِ ترٽ اپاءَ وٺڻ، جيڪي آهن: ڪانشاستي واري شيء کائڻ، ڪومناڻ يا مٺو شربت پيئڻ ۽ ڪجهه گهڙيون آرام ڪرڻ ۽ اڃا به آرام نه

ٿئي ته کين ترٽ طبي امداد طور اهڙيون شيون هڻڻ، هن حالت ۾ ورٽيڪلوڪاڻ (Glucagon) جي سئي هڻي ويندي آهي جيڪا ڪنهن غش ٿي ويل مريض جي رت جي ڪنڊ وڌائي ڇڏيندي آهي.

گهڻا ڊاڪٽر ذیابیطس جي مريضن کي اها به صلاح ڏيندا آهن ته هوسڌائين ڪجهه ڪٽمنڙا پاڻ سان ساڻ رکن ۽ سندن مائٽن کي به اها سڌ هجڻ گهرجي ته هو اهڙين لاچاريءَ وارين حالتن ۾ کين ڪيئن گلوڪاڻ جي سئي هڻي سگهن ٿا. اهڙيون لاچاريءَ واريون حالتون ورلي ڪو ڪنڀير ٿي سگهنديون آهن بشرطيڪ مريض يا ان جا مائٽ اهڙين حالتن ۾ صحيح اپاءَ وٺي سگهن.

عام طور تي ٿلهن مريض جڏهن پنهنجو وزن گهٽائي ڇڏيندا آهن يا معقول کاڌي کائڻ جي چوڻ ڪندا آهن تڏهن سندن رت جي ڪنڊ ۾ يا ته سڌارو اچي ويندو آهي يا اها عام رواجي ٿي ويندي آهي.

ڊگهي مدي لاءِ پيدا ٿيندڙ پيچيدگيون:

جڏهن صحيح دوائون وٺجن ۽

انسولن “ذيابيطس جي هريزن لاءِ آخري اهيڊ

سنڌيڪار - علي مرتضيٰ ڌاريجو

کان پوءِ ڪٿو مري وڃڻ کان بچي پيو. انسولن ست جيڪو بئنگنگ ۽ بيسٽ تيار ڪيو هيو، 11 جنوري 1922 تي هڪ ٻارنهن سالن جي ٻالڪ ليونارڊ ٿامپسن کي سڻي رستي هنيو ويو جيڪو ذيابيطس جو شڪار ٿيل هو ۽ ٿورنيتو جي جنرل اسپتال ۾ هن مرض ۾ پيڙجي رهيو هو. اهڙي طرح انسولن جي سڻي ذيابيطس جي اهڙن سڀني مريضن لاءِ هڪ معجزو ثابت ٿي.

انسولن جي تاريخ جا ڪجهه سنگ صيل:

- 1935ع تائين انسولن جو رڳو اهو قسم مروج هيو جنهن جو اثر صرف ڇهن ڪلاڪن تائين مس هلندو هيو جنهن سبب اهڙن مريضن کي هر روز 3-4 سين هٿن جي ضرورت پوندي هئي.
- 1936 ۾ انسولن جون اهڙيون سيون مروج ٿيڻ لڳيون جن جو اثر وڌيڪ وقت تائين رهندڙ هيو جو انسولن جي اهڙين سين ۾ پروٽامين (Protamine) مادو ملايو ويندو هو جيڪو مڇي جي تخمي جيون مان حاصل ڪيو ٿو ويو. پروٽامين متعارف ڪرائيندڙ هاگيڊارن (Hagedorn) هيو.
- 1946 ۾ وري هڪ اهڙي قسم جي انسولن متعارف ڪرائي وئي جنهن ۾ ڪجهه مقدار پروٽامين، جست ۽ فينال جو به ملايو ٿي ويو. هن قسم جي انسولن جو اثر وڌيڪ ديرپا رهندڙ هو جيڪو 18 کان 24 ڪلاڪن تائين هلي ٿي سگهيو.

- 1979 ۾ هڪ اهڙي مڪمل طور تي مصنوعي، انساني انسولن تيار ٿيڻ لڳي جيڪا انجنيئرنگ رستي حاصل ڪئي ويندي آهي ۽ اهو طريقو متعارف ڪرائيندڙ گوڊل (Goeddel) هيو.
- 7 جولاءِ 1989 تي ڪئناڊين

انسولن حاصل ڪرڻ جو مختصر قصو هيئن آهي ته:

اها سال 1921 جي هڪ اونھاري جي ڳالهه آهي جڏهن ڊاڪٽر بئنگنگ اها خواهش ظاهر ڪئي ته هو يونيورسٽي آف ٿورنيتو جي فزيالاجي ڊپارٽمينٽ ۾ ڪجهه وقت لاءِ اهڙا ڪجهه تجربا ڪرڻ چاهي ٿو. تجربن لاءِ هن ڊاڪٽر بيسٽ جون خدمتون هڪ اسسٽنٽ طور حاصل ڪيون جيڪو ساڳئي سال گريجوئيشن ڪري چڪو هو. هنن ٻنهي گڏجي اونھاري جي گرم ڏينهن ۾ هڪ ننڍڙي لئبارٽري ۾ تجربا ڪرڻ شروع ڪيا ۽ تجربن لاءِ هنن ڏم ڪتا استعمال ڪيا. جيئن ته کين لئبارٽري محدود وقت لاءِ مليل هئي، ان سبب هنن لئبارٽري ۾ ئي رهي تجربا ڪرڻ شروع ڪيا، ساڳئي وقت جيئن ته وٽن نائي جي به ڪوٺ هئي انڪري بئنگنگ پنهنجي ڪارو ڪٽي کاڌي پيتي جو سامان حاصل ڪيو. کاڌي رڌڻ لاءِ هو لئبارٽريءَ جا برتن ڪتب آڻيندا هئا. هو پنهنجن تجربن ۾ 24 ٽي ڪلاڪ مست رهندا هئا. جنهن سبب هو رات جو واري وٽيءَ سان، سمهندا هيا. نيٺ هو تجربا ڪندي ڪندي لبلبي مان ست ڪڍڻ ۾ ڪامياب ٿي ويا جنهن کي هن انسولن جو نالو ڏنو. اهو 14 نومبر 1921 جو ڏهاڙو هيو. پوءِ اهو ست هڪ ڪٽي، جنهن جو نالو مارجوري (Marjorie) هيو تنهن کي سڻي رستي جسم ۾ داخل ڪيو. ان ڪٽي جو لبلبو اڳمر ئي نيڪال ڪيو ويو هو. انسولن جي سڻي لڳڻ

انسولن جي استعمال بابت عام ماڻهن جي خيال ۾ ڪي اڃا پڻ ڏند ڪٿائون

- انسولن هڪ زهر آهي
- هڪ دفعو جيڪڏهن اها استعمال ڪرڻ شروع ڪبي ته پوءِ انسان ان جو عادي ٿي وڃي ٿو ۽ سدائين استعمال ڪرڻ تي مجبور ٿي پوي ٿو.
- انسولين جي استعمال ڪرڻ سان صحت تباهه ٿي وڃي ٿي ۽ جسم جون مشڪون ڪمزور ٿي وڃن ٿيون. جنهن سبب اڳتي هلي انسان اجل جو شڪار ٿي وڃي ٿو.
- ڏهن ته اصل حقيقت هيءَ آهي ته: ذيابيطس جي مريضن لاءِ انسولن هڪ دان آهي. انسولن 20 هڪڙي جي اوائل دوران حاصل ڪئي ويئي هئي ۽ ان کان پوءِ لاڳيتو استعمال ڪئي وڃي ٿي. انسولن مروج ڪرائيندڙ اهي به عظيم انسان آهن جن جو واسطو ڪئناڊا سان هيو، جيڪي هيا فريڊيرڪ گرانٽ بئنگنگ ۽ چارلس هربرٽ بيسٽ (Frederic Grant Banting and Charles Herbert Best 1891-1941).
- هنن ٻنهي پنهنجي سڄي زندگي ذيابيطس جي مرض جي تحقيق ڪرڻ تي وقف ڪري ڇڏي هئي. جنهن سبب اڄ سڄي دنيا جا لکين ذيابيطس جا مريض سڄي زندگي گذاري رهيا آهن. هنن ٻنهي لبلبي جو ست ڪڍي انسولن جهڙي شيءِ متعارف ڪرائي. جنهن جي استعمال ڪرڻ سان رت ۾ ڪند جي ليول گهٽجي وڃي ٿي.

ڊائٽڪ ايسوسيئيشن جي دائمي لاٽ جلائي وئي. جنهن کي ”اميد جي ڪرڻ“ سان سڏيو ويو. اها لاٽ ٻاريندڙ برطانيه جي دائمي هئي جيڪا هن، سر گرانٽ بئنٽنگ جي مجسمي ڀرسان سندس گهر ۾ جلائي ۽ ان گهر کي هاڻ، آنتيريو-ڪئناڊا ۾، هڪ ميوزم ۾ تبديل ڪيو ويو آهي. اميد جي ڪرڻ کي تڏهن وسايو ويندو جڏهن ڪائير سائنسدان ذبابيطس جو مڪمل علاج ڳولي لهڻ ۾ ڪامياب ويندا. تڏهن تائيم ڪئپسول

(اميد جي ڪرڻ) جو مواد پڻ ان تير کي نذراني طور پيش ڪيو ويندو. ● 30 جون 1991 تي هڪ يادگار تائيم ڪئپسول جنهن ۾ ڪئمپ جا فوٽو، يوٽ نيوزليٽر، ذبابيطس جو سامان ۽ هڪ پني جي گڏي به هئي جنهن ۾ يوٽ ليڊر شپ ڪانگريس جي هر هڪ وفد جو سنيهو به موجود هيو اهو 14 انٽرنيشنل ڊائٽڪ فيبريشن (IDF) ڪانگريس جي موقعي تي واشنگٽن ڊي سي، آمريڪا ۾ ڪئنيڊين ڊائٽڪ ايسوسيئيشن جي سپرد ڪيو

ويو جيڪو پوءِ ان يادگار جي ڀرسان، اميد جي ڪرڻ وٽ پوريو ويو. اچو ته اسان به سڀ گڏجي ذبابيطس جي مريضن جي چڱيلائي ۽ صحت لاءِ پنهنجا هٿ وڌايون ۽ انهن کي خراج عقيدت پيش ڪيون، جن بنا ڪنهن لالچ ۽ لوپ جي سڄي دنيا جي ذبابيطس جي سيني مريضن لاءِ پنهنجون خدمتون پيش ڪيون آهن. ائين اسان سڀ گڏجي اها دعا ڪريون ته ذبابيطس جي مريض لاءِ ڪو مؤثر ترياق ڳولهجي سگهجي.

بقايا:- ذبابيطس جا آندل صفحي 31 تان

پنهنجي باغ جو پائپ ٻاهر اس ۾ رکي ڇڏيو ۽ اهر جڏهن هڪ دفعو سڪي ٺوٺ ٿي ڪن هنڌن تان ٽرڪي پوندو آهي ته پوءِ منجهانئس پاڻي سمندو رهندو آهي. اهڙي پائپ کي پوءِ پلي ته ڪٿي توهان، گهر اندر چونه رکو پر پوءِ به ان سان ڪو فرق پئجي ناهي سگهندو.

هڪ ٻي افسوسناڪ ڳالهه هيءُ به پيدا ٿي پوندي آهي ته جڏهن پير/ٽنگ جو اهڙو وقت ڇڏي نه سگهندو آهي ته اهڙي ذبابيطس جي مريض جي ٽنگ جو اهو حصو ڪٽيو به پوندو آهي چوٽه ڊاڪٽر کي سڌ هوندي آهي ته، اهڙو نه ڇڏندڙ ٿي ان ڳالهه جي نشاني هوندي آهي ته، ان ماڻهوءَ جون رت نليون اڳي ئي متاثر ٿي چڪيون آهن ۽ ڪجهه سالن کان پوءِ اهو مريض جڏهن وٽس وري ايندو تڏهن ممڪن آهي ته کيس اهڙو پير ٿي ڪٽيو پوي ۽ اڳتي هلي

ٽنگ جو هيٺيون حصو پڻ.

ذبابيطس جي پيچيدگين کان بچڻ لاءِ ڪهڙا اپاءَ وٺي سگهجن ٿا ؟

انهن جو رهڻو هڪڙوئي اپاءُ آهي اهو هي ته، هن بيماريءَ بابت مڪمل ڄاڻ رکجي ۽ اهڙيون ڀرپور ڪوششون ڪيون رهجن ته جيئن جسم جو ميٽابولڪ نظام مڪمل طرح سان ضابطي هيٺ رهندو اچي. اهڙي ڪم ۾ هر هڪ فرد ڀاڱي پائيواري ٿي سگهي ٿو جنهن ۾ مريض، سندس يار دوست، مٽ مائٽ، صحت سان واسطو رکندڙ تير جا ميمبر ۽ ذبابيطس ايسوسيئيشن وارا به اچي وڃن ٿا.

اهي ڪهڙيون ڳالهيون آهن جن جي اختيار ڪوڻ سان مون کي ذبابيطس جي ٿيڻ جا گهٽ ۾ گهٽ امڪان ٿي سگهن ٿا ؟

ڪن ماڻهن کي پنهنجي زندگيءَ ۾ صحت بابت مڙيوئي ويچار هوندا آهن ۽ اهڙا ويچار سندن لاءِ هاجيڪار ثابت ٿي سگهن ٿا مثال طور، جڏهن چيو ويندو آهي ”قسمت ۾ جيڪي ڪجهه لکيل

هوندو اهوئي ٿيندو جنهن کي روڪڻ لاءِ مان ڪجهه به ڪري نٿو سگهان“. ٿي سگهي ٿو ته اها ڳالهه ڪيترين ڳالهين لاءِ صحيح به ثابت ٿيندي هجي جڏهن ته گهٽ ۾ گهٽ ذبابيطس لاءِ اها صحيح ناهي هوندي. جو اهڙيون ڪيتريون ڳالهيون آهن جن جي اختيار ڪرڻ اسان، پنهنجي ڪراڙ واري عرصي ۾ ذبابيطس جي ٻئي قسم جي امڪانن کي مؤثر طور تي گهٽائي سگهون ٿا. اهڙين حالتن ۾ صحتمند هجڻ سان گڏوگڏ ٻيون به ڪي مکيه ڳالهيون هونديون آهن:

- کاڌي پيئي ۾ مقول رهجي.
- ڪسرت به مقول طرح سان ڪبي رهجي.
- ڪوشش ڪري پاڻ کي ٿلهو ٿيڻ به نه ڏجي.

جڏهن ته اهي فرد جيڪي اڳي ذبابيطس جو شڪار ٿي چڪا هوندا آهن ته اهي پنهنجي ۽ سندن ڪٽنب ان لاءِ به اهڙيون ڪيتريون ئي ڳالهيون ڪري سگهن ٿا ته جيئن هو مڪمل صحتمند ڊگهيون ۽ پيچيدگين کان آجيون زندگيون گذاري سگهن.

مٺي مرض (ذيابيطس) بابت مٺيون ڳالهيون

سنڌيڪار

ڊاڪٽر ثناء الله ڪوڪر

مشڪون (Skeletal Muscles) ۾ جيترو، انسولين جي عام سطح کان وڌيل مقدار تي ئي ڪم ڪري سگهن ٿا. ججهي مشاهدي اهو ثابت ڪيو آهي ته ورزش ۽ وزن گهٽائڻ سان اهڙي حالت وڌي پيماني تي بدلجي وڃي ٿي ۽ جسم اندر شڪري ڪاربوهايڊريٽس جي برداشت ڪرڻ جي قوت وڌي ٿي.

وزن گهٽائڻ

آمريڪي نيشنل انسٽيٽيوٽ آف هيلٿ (N.I.H) ۾ هڪ گڏجاڻي ڪري ذيابيطس تي ڇاڪوڙ ڪندڙ 14 ڊاڪٽرن ان ڳالهه تي زور ڏنو ته ٻئي نموني واري ذيابيطس جا مريض هلڪي ڦلڪي کاڌي کائڻ سان وزن گهٽائڻ. هنن اهڙن مريضن کي صلاح ڏني آهي ته هو هلڪا کاڌا (Low Caloric diets) کائڻ سان شڪر ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ دواين کان به نجات حاصل ڪري سگهن ٿا ۽ اهڙي طرح سندن صحتمند حياتي جو آغاز ٿئي ٿو. هن پروگرام کي هنن لائيف اسٽائيل پروگرام جو نالو ڏنو. ڇاڪوڙي ڊاڪٽرن جي ان ٽولي ذيابيطس جي مريضن کي اها صلاح پڻ ڏني آهي ته هو چرٻي وارا کاڌا بالڪل ڇڏي ان جي ڀيٽ ۾ ڪجهه پيچيدگي (Complex Carbohydrates) وارا کاڌا ٿوري مقدار ۾ استعمال ڪن.

ڪيترن شڪر جي ماهرن وري ان ڇاڪوڙي ٽولي سان اختلاف رکندي اها ڳالهه

جسماني سکون سان ان بيماريءَ تي گهڻي ڀاڱي قابو پائي سگهجي ٿو ته گهٽ ۾ گهٽ پيچدگين ۾ گهٽتائي آڻي سگهجي ٿي.

اصل ۾ ڏسجي ته منو مرض يا ذيابيطس هڪ رتوبت (انسولين) تي دارومدار رکي ٿي. عام حالت ۾ اها رتوبت ڪنڊ جي ذرن يا آٽن (Molecules) کي انساني جسم اندر گهرڙن (Cells) لاءِ ٻارڻ (Fuel) طور ڪم ڪرڻ لاءِ رهنمائي ڪندي آهي. پهرين نموني واري ذيابيطس (Type-I Diabetes) ۾ ته جسم اندر انسولين ٺهي ئي ڪونه ٿي. جڏهن ته ٻئي نموني واري ذيابيطس (Type-II diabetes) ۾ انساني جسم انسولين جي عمل کي روڪي (Resist) ٿو ۽ ڪن حالت ۾ انسولين جي وڌيڪ ٺهڻ جي باوجود به ان جو اثر ڪونه ٿو وٺي نتيجي ۾ ڪنڊ جسماني گهرڙن (Cells) ۾ داخل ڪونه ٿي، ٿي سگهي ۽ خون ۾ وڌي وڃي ٿي جنهن سبب گهرڙا (Cells) بڪايل رهجي وڃن ٿا.

پهرين نموني واري ذيابيطس جنهن ۾ انسولين جون سيون لڳن ٿيون، اندازاً ڏهن ذيابيطس جي مريضن مان هڪ مريض کي پيڙائي ٿي. جڏهن ته ٻئي نموني واري ذيابيطس ۾ ٽولهن ۾ ڪيترن مريضن کي پيڙائي ٿي. هن گروپ ۾ جسم اندر سڃاڻپ، هڏيون

ساڳيو صحت ۽ تندرستي وارو رستو جيڪو اوهان کي دل جي بيمارين کان به بچائي سگهي ٿو سو اوهان کي ذيابيطس کان پڻ بچائي سگهي ٿو.

خاص ڪري اهڙا ماڻهو/عورتون جن کي ٻئي نموني واري ذيابيطس Type-II Diabetes آهي (جنهن ۾ Insulin واري سئي جي گهڻي ڀاڱي ضرورت نه پوندي آهي) ۽ گهڻو ڪري 40 ورهين جي ڄمار کانپوءِ ٿيندي آهي، اهڙن ماڻهن جي لکن ڪروڙن خون جي رشتي وارن متن مائٽن کي اها سڌ هجڻ گهرجي ته انهي مرض جو خطرو انهن کي پڻ ٿي سگهي ٿو. پوءِ ڇو نه اهي صحتمند نوجوان هجن، خاص ڪري اهڙا ماڻهو جيڪي ٿلهن مٿاڻا ۽ 40 سالن جي لڳ ڀڳ هجن تن ۾ 20 کان 30 سيڪڙي تائين ذيابيطس جا امڪان وڌيڪ هوندا آهن.

ڪيترن ماهرن گهڻي بحث مباحثي کان پوءِ اها راءِ قائم ڪئي آهي ته خالي پرهيز ۽ ورزش سان ٻئي نموني واري ذيابيطس (Type-II Diabetes) جا ڪيترائي مريض دواين جي جنجهٽ کان بچي سگهن ٿا.

موجوده دور جي حوالي سان ته ڪن ماهرن ان ڳالهه تي زور ڏنو آهي ته اڳواٽ اپائڻ وٺڻ سان ان موذي مرض جا خطرا ٿري سگهن ٿا. ڪيترا ذيابيطس جا ماهر ان ڳالهه ۾ يقين رکن ٿا ته وزن گهٽائڻ، ورزش، پورو پٺو کاڌو، ذهني ۽

هاجڪار آهن ۽ گڏيل نشاستي (Complex-Carbohydrates) وارا کاڌا جهڙوڪ اناج، سبزيون وغيره کائي سگهجن ٿا. باقي ڪن جو خيال آهي ته اهي شيون به زياده مقدار ۾ هڪ ئي وقت نه کائڻ گهرجن ڇو ته ائين ڪرڻ سان به هڪدم ڪنڊ جو مقدار وڌي سگهي ٿو ۽ وزن پڻ. جڏهن ته هر لحاظ سان وزن گهٽائڻ جو وڌيڪ خيال رکڻ گهرجي.

آمريڪن ڊائٽڪ ايسوسيئيشن (آڊا) تازو ذيابيطس جي مريضن لاءِ ڪاڌي پيئڻ جي طريقي تي نظر ثاني ڪئي آهي جنهن مطابق سندن ڪاڌي ۾ سٺي جو مقدار تمام گهٽ (يعني سڄي ڪاڌي جي ڪئلريز جي 30 سيڪڙي کان گهٽ ڪئلريز) ۽ گڏيل نشاستو (Complex Carbohydrates) ڪجهه وڌيڪ (يعني سڄي ڪاڌي جي ڪئلريز مان 50 کان 60 سيڪڙي تائين) هئڻ گهرجي اهڙي ڪاڌي سان خون ۾ ٿوري گهڻي ڪنڊ وڌڻ اڻٿر آهي. بهرحال ٻئي نموني وارن مريضن لاءِ اهو بهتر آهي ڇو ته انهن کي خون ۾ ڪنڊ جي مقدار سان گڏوگڏ وزن گهٽائڻ لاءِ به گهڻو ڌيان ڏيڻو آهي، جيڪو سندن لاءِ مستقل فائدو آهي. آڊا مطابق ڪاڌي ۽ توانائي لاءِ مريضن کي وري به طبي مشورن جي ضرورت پوندي رهندي.

نيشنل انسٽيٽيوٽ آف هيلٿ (N.I.H) جي جاکوڙي ٽولي وري اهو به چٽاءُ ڏنو آهي

تي ڪين همٿايو وڃي. ذيابيطس جي مريضن جي اڳاٽي پرهيز واري حساب ڪتاب ۾ هاڻي انقلابي تبديليون اچي ويون آهن ڪو زمانو هئو جڏهن چرٻي وارن سٺين کاڌن سان رت نلين جي خراب ٿيڻ جي تحقيق اڃا ڪونه ٿي هئي تڏهن جا معالج مريضن کي وڌيڪ سٺي ۽ گهٽ نشاستي کائڻ جو مشورو ڏيندا هئا. (ڇو ته پراڻي سوچ مطابق

ذيابيطس جي مريضن جي اڳاٽي پرهيز واري حساب ڪتاب ۾ هاڻي انقلابي تبديليون اچي ويون آهن ڪو زمانو هئو جڏهن چرٻي وارن سٺين کاڌن سان رت نلين جي خراب ٿيڻ جي تحقيق اڃا ڪونه ٿي هئي تڏهن جا معالج مريضن کي وڌيڪ سٺي ۽ گهٽ نشاستي کائڻ جو مشورو ڏيندا هئا. (ڇو ته پراڻي سوچ مطابق سٺي جو خون ۾ ڪنڊ جي مقدار سان ڪو واسطو نه هئو ۽ هو ڪنڊ جي سطح وڌائڻ لاءِ خالي نشاستي کي هاجڪار سمجهندا هئا).

پر هاڻي وقت بدلي چڪو آهي نين کوجنائن موجب ذيابيطس جي مريضن لاءِ سٺي ۽ چرٻي وارا کاڌا وڌيڪ هاجڪار آهن ۽ گڏيل نشاستي (Complex-Carbohydrates) وارا کاڌا جهڙوڪ اناج، سبزيون وغيره کائي سگهجن ٿا. باقي ڪن جو خيال آهي ته اهي شيون به زياده مقدار ۾ هڪ ئي وقت نه کائڻ گهرجن ڇو ته ائين ڪرڻ سان به هڪدم ڪنڊ جو مقدار وڌي سگهي ٿو ۽ وزن پڻ. جڏهن ته هر لحاظ سان وزن گهٽائڻ جو وڌيڪ خيال رکڻ گهرجي.

سٺي جو خون ۾ ڪنڊ جي مقدار سان ڪو واسطو نه هئو ۽ هو ڪنڊ جي سطح وڌائڻ لاءِ خالي نشاستي کي هاجڪار سمجهندا هئا).

پر هاڻي وقت بدلي چڪو آهي نين کوجنائن موجب ذيابيطس جي مريضن لاءِ سٺي ۽ چرٻي وارا کاڌا وڌيڪ

ڪئي آهي ته ذيابيطس جي اهڙن مريضن کي ڊاڪٽرن جي نگراني ۾ پڻ رهڻ گهرجي. ۽ ائين ورزش، هلڪي غذا ۽ ڊاڪٽري مشورن سان ذيابيطس جا مريض بهتر زندگي گذاري سگهن ٿا.

ايٽلنٽا ۾ ايمورايونيورسٽي جي ذيابيطس شعبي جي ڊائريڪٽر ڊاڪٽر جان-ڪي ڊيوڊسن 15 هزار مريضن تي هڪ تحقيق ڪئي آهي جن کي هن

دواين بدلي لائيف اسٽائيل پروگرام ۾ شفت ڪيو ۽ 16 سالن تائين سندن علاج بغير ڪنهن دوا جي صرف ورزش ۽ هلڪي خوراڪ سان ڪيو. ڊيوڊسن پنهنجن سڀني مريضن کي تمام گهٽ ڪئلريز ۽ وڌيل پيچيده نشاستي واري ڪاڌي تي رکيو. هن جو يقين آهي ته هر لحاظ کان وزن گهٽائڻ ۾ بهتر آهي.

نيشنل انسٽيٽيوٽ آف هيلٿ وارن جاکوڙي ڊاڪٽرن

جي اندازي مطابق به معيار موجب وزن گهٽائڻ بهتر مددگار ثابت ٿي سگهي ٿو.

سندن خيالن موجب مريضن کي سندن پسند مطابق اهڙا هلڪا کاڌا کائڻ گهرجن جن سان ڪين بيزاري نه ٿئي ۽ گهٽ وزن برقرار رکڻ لاءِ اجتماعي طور

جرنلس ۾ سندس ڇپيل تحقيق ۾ هن ان ڳالهه جو اظهار ڪيو.

هن وڌيڪ اهو به چيو ته ورزش سان نه صرف ذیابيطس کي ڪنٽرول ڪري سگهجي ٿو پر انسان گڏوگڏ اها دل جي بيمارين، خون ۾ ڪوليسترال ۽ ٽرائيگلائسرائيڊس جي مقدار کي گهٽ ڪرڻ ۽ بلڊ پريشر لاءِ پڻ اها فائديمند آهي. يونيورسٽي آف ورمونٽ جي انڊو ڪرائيلاجي ميٽابولزم ۽ نيوٽريشن واري شعبي جي ڊائريڪٽر ڊاڪٽر ايڊورڊ هارٽن جو پڻ اهو يقين آهي ته ورزش جسمراندر انسولين کي هٿي ڏيڻ ۾ وڏو ڪردار ادا

ڪري ٿي هن چيو ته ميڊيڪل چيڪ اپ ڪرائڻ کانپوءِ اها ورزش جيڪا مريض آساني سان ڪري سگهي ٿو، آهستي آهستي شروع ڪري، پنڌ ڪرڻ کي زندگي جو معمول پنائڻ، گهر ۾ هلڪين راندين، ٽرڻ ۽ سائيڪل هلائڻ کي هن بهتر ورزش سڏيو. ڊاڪٽر هارٽن ۽ روڊمرن جي گڏيل راءِ موجب N.I.H جي جاکوڙين ورزش جي فائدين کي بيان نه ڪري انصاف نه ڪيو آهي. وزن

گهٽ ڪرڻ سان گڏوگڏ ورزش ڪرڻ هڪ دوراندوشي ۽ ڏاهپ وارو عمل آهي ۽ اهڙي تسلي واري تحقيق کان پري هٿڻ سٺي ڳالهه نه آهي.

جڏهن ته ٺاهه (N.I.H) جي جاکوڙي ڊاڪٽرن جي پينل اهڙن ذیابيطس جي مريضن کي ورزش لاءِ مشورو ڏنو جن شروعات کان وٺي بيماري جو طبي معائنو ڪرايو. جڏهن ته اهڙا مريض جيڪي دل جي بيمارين ۾ ڦاٿل آهن تن کي هر وقت خبرداري سان هل چل ڪرڻ گهرجي يا وري اهڙا ذیابيطس جا مريض جن جي خون جو دورو صحيح چال نه ڪندو هجي يا وري

جنگهون ۽ ٻانهون سن ٿي وينديون هجن، يا منجهن سيون ڇينديون هجن تن کي ڊوڙڻ کان قطعي پاسو ڪرڻ گهرجي. ڇو ته ائين ڪرڻ سان جنگهه يا پير ۾ ڌڪ لڳڻ جو خطرو ٿي سگهي ٿو. انڪانسواءِ ذیابيطس جي عام پڇيڊگي يعني اکين جي جهلي جي خرابي (Retinopathy) (جيڪا انڌي ٿيڻ جو سبب پڻ ٿي سگهي ٿي) وارا مريض به اهڙي ورزش کان پاسو ڪن جنهن ۾ وزن ڪٽڻ يا وڌا سامه ڪٽڻ جي ضرورت پوي ڇو ته N.I.H پينل جي جاکوڙي ڊاڪٽرن ان ڳالهه جو خدشو ظاهر ڪيو

ورزش سان نه صرف ذیابيطس کي ڪنٽرول ڪري سگهجي ٿو پر انسان گڏوگڏ اها دل جي بيمارين، خون ۾ ڪوليسترال ۽ ٽرائيگلائسرائيڊس جي مقدار کي گهٽ ڪرڻ ۽ بلڊ پريشر لاءِ پڻ اها فائديمند آهي.

آهي ته ڪٿي اهڙن مريضن جي اک جون نليون نه ڦاٽي پون.

ذهني سکون:-

اگرچہ N.I.H جي جاکوڙي ڊاڪٽرن واري پينل ذهني سکون جو ذڪر نه ڪيو آهي پر ڊيوڪيونيورسٽي ميڊيڪل سينٽر جي برتاءِ واري علاج جي تحقيق واري ماهر نفسيات ڊاڪٽر رچرڊسروٽ ان ڳالهه جو جائزو پيش ڪيو آهي ته سکون ذیابيطس جي علاج ۾ ڏاڍو مددگار ثابت ٿيو آهي.

ڊاڪٽر سروٽ جي تحقيق مان اهو اشارو ملي ٿو ته ذهني دٻاءُ (Stress) جسمراندر گلوڪوز ميٽابولزم کي

گهٽائي ٿو، جيڪو ٻئي نموني واري ذیابيطس ۾ وڏي اهميت وارو مسئلو هوندو آهي. سروت جي جانورن تي ڪيل تحقيق مان خبر پوي ٿي ته ڪٿن مٿان ماحولياتي دٻاءُ سبب ڪارٽيزول، اپينيفرين ۽ نارايپينيفرين هارمون جهجهي مقدار ۾ نڪرن ٿا. جن مان ڪارٽيزول لحميات (پروٽين) کي گلوڪوز ۾ تبديل ٿيڻ واري عمل ۾ مدد ڪري ٿي پر ان جي پڇ ڊاه واري عمل (Metabolism) جي رفتار گهٽائي ٿي. اپينيفرين ۽ نارايپينيفرين وري انسولين جي پيداوار ۾ رنڊڪ وجهي ٿي ۽ خون ۾ ڪنڊ جي مقدار کي وڌائي ٿي.

سروت هائي ان کوجنا کي لڳو پيو آهي ته ڇا صرف پرسڪون رهڻ سان خون ۾ ڪنڊ جو مقدار ڪنٽرول ڪري سگهجي ٿو؟ انهي تحقيق جا کيس اميدن ڀريا نتيجا ملي رهيا آهن. ٻئي نموني واري ذیابيطس جي اهڙن ڇهن. مريضن ۾ جن جي خون ۾ ڪنڊ جو مقدار دواين ۽ پرهيز سان ضابطي هيٺ نه اچي سگهيو هيو تن ۾ سکون واري طريقه ڪار سان

ڪنڊ جي مقدار تي ضابطي سان گڏوگڏ گلوڪوس جي برداشت (Glucose Tolerance) به وڌي آهي.

ان ۾ ڪوشش نه آهي ته وزن گهٽائڻ، ورزش، کاڌي پيتي ۾ احتياط ۽ زندگي جي چڪتاڻ گهٽائڻ وارن عملن ۾ محنت ۽ ضابطي جي ضرورت پوي ٿي پر انهن سڀني شين کي اڳواٽ شروع ڪرڻ سان ٻئي نموني واري ذیابيطس جي هاجيڪار اثرن کان نجات ضرور ملي ٿي.

■ ■ ■

ذیابیطس ۽ غذا

ڊاڪٽر محمد زمان شيخ

ايم. بي. بي. ايس. ايف. سي. پي. ايس

ايم. آر. سي. پي (يو.ڪي) ايم. ايس سي (ڊائٽيز ۽ انڊو ڪرائينالاجي)

گجر (شڪرڪندي)، گوگڙو، ماني، ڊبل روٽي، پٽاٽا، مٽر، پنير (CHEESE)، ذیابیطس جا خاص کاڌا جيڪي بند دهن ۾ مارڪيٽ ۾ ملندا آهن (مثلاً ڊائيٽ ڪسٽرڊ، ڊائيٽ جيلي ۽ مٺائي وغيره)، کير (خاص ڪري ان جي ملائي)، خشڪ ميوو (بادام، پستا، اخروٽ، ڪاجو، کوپرو، بوهي مڱ وغيره)، غير مسلمانن جي لاءِ شراب.

اهي کاڌا جن کان پرهيز لازمي آهن:

کنڊ ۽ کنڊ مان ٺهيل هر شيءِ، ڳڙ، گلوڪوز، ماکي، اٽس ڪريم، عام ٽڙيون بوتلون (ڪوڪولا وغيره)، شربت، اسڪواش، چاڪليٽ، ڪٽمنڙا، مٺا بسڪٽ، ڪيڪ، پيسٽري، پڊنگ، جام ۽ جيلي، دهي ۾ بند فروٽ يا فروٽ جوس، چرٻي وارو گوشت، مکڻ، تريل (FRY) کاڌا، حلوائِي جي مٺائي، حلوا، دهي وارو (ڪنڊنس) کير، ڪمند جي رس.

ڪجهه اهم ڳالهائون:

1- گرم مصالحا ۽ مرچ ذیابیطس جي لاءِ نقصانڪار نه آهن پر اهي معدي جي تيزابيت وڌائڻ ٿا، بدھضمي ڪن ٿا، ان لاءِ انهن کان پرهيز بهتر آهي. ساڳي طرح لوڻ جيتوڻيڪ ذیابیطس تي سنئون سڌو اثر ڪونه ٿو وجهي، پر اهو بلڊپريشر (خون جي دٻاءُ) کي وڌائي ٿو، ان جي ڪري لوڻ ۽ نمڪين شيون گهٽ واپرائڻ کپن. لوڻ 24 ڪلاڪن ۾ عام ماڻهن کي وڌ ۾ وڌ 6 گرام ۽ هاءِ بلڊپريشر وارن کي 3 گرام تائين استعمال ڪرڻ گهرجي.

2- هڪ وقت ۾ گهڻو پيٽ پري کائڻ کان بهتر آهي ته ٿورو ٿورو گهڻا ڀيرا کائجي. مثلاً ٽي وقت ماني کان علاوه 11 وڳي صبح ۽ 4 يا 5 وڳي شام جو ڪجهه SNACKS مثلاً سينڊوچ يا سادا بسڪٽ کائجن.

3- کڏو ٿري نه کائجي (فرائي نه ڪجي) بلڪه اڀاري يا اوون (OVEN) ۾ وڃي BAKE ڪري يا GRILL

رت جي شريانين سڪڙجي وڃڻ ڪري پيرن ۾ گنگرين (GANGRENE) ٿي پوڻ ۽ آخر ۾ ان جو انجام پير وڌڻ (AMPUTATION) ٿي ٿئي ٿو. ڊائيٽنگ جو ٻيو مقصد رت ۾ سُڻ جي مقدار کي گهٽ ڪرڻ، جسم جو وزن مناسب رکڻ ۽ بدن کي فِٽ (FIT) ۽ جسٽ رکڻ آهي.

عمومي طور تي شگر جي مريضن لاءِ - مورن کاڌن کي هيٺين ٽن حصن ۾ ورهائي سگهجي ٿو.

اهي کاڌا جن جي ڪابه پرهيز ناهي: تازيون ڀاڄيون (پيئڊي، بند ۽ گل گوبي، ڪدو، ميه، توري، سلاڊ، کنڀون، سرنهن جو ساڳ، پالڪ، کيرو، فاروان، ليمو، ڄمو، بصر، ٽماٽا، ونگي، هريو، ڪريلا، بهه، موري، گوار، سنڌي (ڳاڙهي) گجر، واڱڻ، پٽڙو سوڀ (ڪڪڙ يا گوشت جو)، سرڪو، سرڪي ۾ ٺهيل آچار، گرم مصالحا، ڳاڙها، ساوا ۽ ڪارا مرچ، چانهن ۽ ڪافي (بغير کنڊ جي)، سيڪرين، ڪينڊل ۽ ڊائٽ بوتلون.

اهي کاڌا جي گهڻا نه کائجن:

انڊا (خاص ڪري انڊي جي زردِي)، چانور، دال، ڪارن فليڪس، لاهوري

بنيادي طور تي ذیابیطس جي مريض جو کاڌو هڪ عام صحتمند ماڻهو جي پرهيزي کاڌي کان بنهه مختلف ناهي. سڄي ڏينهن ۾ ڪيلوريز (حرارن) جي گهرج سمورن شگر جي مريضن ۾ ساڳي نه هوندي آهي. مثلاً هڪ نلهي مريض کي رڳو 1000 کان 1600 ڪيلوريز جي ضرورت آهي پر هڪ سنهڙي مريض [جيڪو گهڻو ڪري جوان هوندو آهي ۽ انسولين (Insulin) تي هوندو آهي] کي وڌيڪ ڪيلوريز جي گهرج پوندي آهي. دراصل ذیابیطس ۾ غذا مريض جي جنس، ورزش، ڌنڌي (مثلاً مزدور يا مڪينڪ آهي يا رِي ڪلرڪ يا آفيسر آهي) عمر، قد ۽ ٻين تي دارو مدار رکي ٿي.

ذیابیطس ۾ غذا جي احتياط (DIETING) جو مقصد، مريض جي ميٽابولزم (METABOLISM) کي معتدل رکڻ آهي، جنهن ۾ خاص زور رت ۾ گلوڪوز جي مقدار کي معقول رکڻ تي ڏنو ويندو آهي. کاڌي کانپوءِ جيڪڏهن رت ۾ گلوڪوز هڪدم گهڻو وڌي وڃي ته اهو مريض جي لبلبي تي زور وجهندو آهي جيڪو اڳ ۾ ئي لاچار ۽ ”بيمار“ هوندو آهي، اهو ايڏو زور برداشت نه ڪري سگهندو آهي، گهرج آهر انسولين پيدا نه ڪري سگهندو آهي ۽ نتيجي طور ڪجهه عرصي کانپوءِ ذیابیطس جون پيچيدگيون ظاهر ٿي پونديون آهن، جيڪي تمام خطرناڪ هونديون آهن، مثلاً بڪين جي فعل جي تباهي، نظر کان انڌو ٿيڻ، دل جو دورو، فالج، جسم جي رت جو دورو متاثر ٿيڻ

گرم مصالحا ۽ مرچ ذیابیطس جي لاءِ نقصانڪار نه آهن پر اهي هڪ عذب جي تيزابيت وڌائڻ ٿا

11- هيواء:- روزانه هيٺين تازن مٻون مان ڪي به ٻن قسمن جا ميوو کائي سگهجن ٿا. بهتر آهي ته اهي جدا جدا وقتن تي کائجن ۽ مانيءَ کان هڪدم پوءِ استعمال ڪجن.

هڪ صوف، هڪ نارنگي، هڪ ڪينو، هڪ مالتو، هڪ زيتون، هڪ آڙو، ٻه آلوبخارا، چار زردالون، هڪ ڪو، هڪ وچولو ڪيلو، هڪ گريپفروٽ، هڪ ناشپاتي، هڪ پيچ، هندائي، ڪدري، پيپتي، سردِي يا گرمي سان ڪنهن به هڪ جون 4 ننڍڙيون ٽاڪون، هڪ سيتا قل، ڏهه داڻا انگور، ٽي لوڪاٽ، ننڍي انب جي هڪ ڦاڪ. فروٽ جوس پيئڻ کان بهتر آهي ته سڄو فروٽ کائجي.

12- کاڌي جي متعلق ٽن ڳالهين جو هميشه خيال رکجي، خاص ڪري اهي مريضن جيڪي انسولن وٺن ٿا.

(الف) کاڌي جو وقت؛ هميشه ساڳيو هجي.

(ب) کاڌي جو مقدار (QUANTITY)

(پ) کاڌي جو معيار (QUALITY)

ٻه هميشه ساڳيو هجي. مثلاً:- ائين نه ٿئي جو هڪ ڏينهن ناشتي ۾ ٻه اڻراڻا کائجن، ٻي ڏينهن بغير سڻي جي اڌ ماني کائجي هڪ ڏينهن ڪنهن شادي تي ٻوڙ پلاؤ کائجن، ٻي ڏينهن ٻنھ ڪجهه به نه کائجي.

13- ماڪيءَ ۾ 80 في سيڪڙو نشاستو آهي، جيڪو فريڪٽوز (FRUCTOSE) جي صورت آهي. اهو رت مان ٿيندو آخر جگر اندر گلوڪوز ۾ بدلي ويندو آهي، ان ڪري ماڪيءَ کان برھيز بهتر آهي.

14- گهٽ ۾ گهٽ 8 گلاس پاڻيءَ جا روز پيئڻ گهرجن.

15- مارڪيٽ ۾ هيٺ ڏنل مٿان موجود آهن جن ۾ گلوڪوز شامل نه آهي.

1- سيڪووين: هن ۾ ٻنھ ڪاٻه ڪيلوري ناهي، يعني هيءَ وزن نه وڌائيندي آهي. مارڪيٽ ۾ سويٽيڪس

بناسپتي گهه ۽ مغز کان پرڏيز ڪرڻ گهرجي. ان جي جاءِ تي مڪئي جو يا سورج مڪي جو تيل استعمال ڪرڻ گهرجي مثلاً سن فلاور يا پڪوان آئل مڪڻ جي جاءِ تي مارجرن به ٿوري مقدار ۾ واپرائي سگهجي ٿي. بهتر ائين ٿيندو جو گهه يا تيل جي جاءِ تي پڇاڻڻ لاءِ پاڻي، ٽماٽا يا ڏهي استعمال ڪجي.

8- ذیابيطس جي تمام ٿلهن مريضن کي سختيءَ سان برھيزي کاڌي تي عمل ڪرڻ گهرجي جيئن سندن وزن سٺو ڪيل معيار تي نه صرف آندو وڃي پر ان کي برقرار پڻ رکيو وڃي. ان لاءِ وزن تي ڪڙي نظر رکي وڃي. ان لاءِ انهن ٿلهن ماڻهن لاءِ جن جو ڪم ويٺي جو آهي مثلاً آفيسر يا ڪلرڪ يا دڪاندار، جيڪي جسماني محنت مزدوري ڪونه ٿا ڪن ۽ ڪاربن موٽرن کان سواءِ ڪونه ٿا گهمن انهن لاءِ شروع ۾ ته 600 ڪيلوريز سڄي ڏينهن ۾ ڪافي آهي ۽ کين اهڙي قسم جو چارٽ پنهنجي ڊاڪٽر کان وٺڻ کپي يا ويڇ رسالي کي لکڻ کپي ته جيئن انهن جي مدد ڪري سگهجي.

9- پابنديءَ سان ”هلڪي“ ورزش ڪرڻ گهرجي مثلاً تيز هلڻ، ڊوڙڻ (JOGGING)، ٽرڻ (SWIMMING) وغيره ان مان ڪيترائي فائدا آهن. چست رهڻ سان گڏوگڏ ورزش رت ۾ گلوڪوز جو مقدار گهٽائي ٿي ۽ خون ۾ چرٻيءَ جو تناسب به درست ڪري ٿي.

10- سگريٽ نوشيءَ ذیابيطس ۾ تمام گهڻو نقصان ڏيندي آهي خاص ڪري دل جي دوري جو خطرو وڌي ويندو آهي ۽ رت جو شريانيون جيڪي ذیابيطس جي مرض جي ڪري اڳ ئي خراب هونديون آهن، سي وڌيڪ سڪڙجي وينديون آهن ۽ نتيجو گينگرين (Gangrene) ۾ نڪرندو آهي، يعني پيرن جو خراب ٿي ڊپ ڪري ڪارو ٿي پوڻ، جنهن جو علاج صرف جنجهه ڪپڻ (AMPUTATION) ئي هوندو آهي.

ڪري يا ٻاق تي پڇائجي
4- تازيون سايون پياڇيون جن ۾ ريشا (FIBRE) گهڻا هوندا آهن استعمال ڪجن. اهي ريشا انساني جسم جي مختلف لعابن (ENZYMES) سان هضم نه ٿي سگهندا آهن. انهن مان ڪي ڳرندڙ آهن مثلاً گمز ۽ پيڪٽن (GUMS & PECTION) اهي مٿر، قلبي، جو ۽ صوف جي ڪل ۾ هوندا آهن، ڪي وري اڻ ڳرندڙ آهن. مثلاً سيلولوز ۽ هيمي سيلولوز (CELLULOSE & HEMI CELLULOSE) اهي پوسي ۾ هوندا آهن. ريشا معدي ۽ آندِي جي رفتار کي معتدل رکن ٿا، بک گهٽائين ٿا، قبض دور ڪن تار ت ۾ سڻي به گهٽائين ٿا ۽ گلوڪوز جي رت ۾ پهچڻ جي رفتار کي گهٽ ڪن ٿا.

5- اٽو ٽن قسمن جو بازار ۾ ملندو آهي هڪ باريڪ ۽ سفيد ٻيو وچولو ۽ ٽيون ٿلهو (COARSE)، هميشه چڪي ۾ چي پيئل ٿلهي اتي جي ماني کائجي يا ناسي ڊيل روٽي (BRAUN BREAD) استعمال ڪجي، جنهن ۾ پوسي جو مقدار نسبتاً گهڻو ٿيندو آهي.

6- روزانه 24 ڪلاڪن ۾ ڪير جا ٻه ننڍا گلاس (500ml) پي سگهجن ٿا پر ان مان ملائي نڪتل هجي يا هو SKIMMED ڪير هجي.

7- انڊا هفتي ۾ ٽي استعمال ڪري سگهجن ٿا. ان جي زردِي خاص ڪري نقصانڪار آهي، جنهن ۾ ڪولسٽرال (اهو سڻي جيڪو رت جي نلين ۾ ڄمي دل جي دوري جو باعث بڻجي ٿو) ڀريل هوندو آهي. ذیابيطس جي مريضن جي لاءِ رت ۾ سڻي چڪاس ڪرائڻ تمام ضروري آهي ۽ ان باري ۾ پنهنجي ڊاڪٽر سان مشورو ڪرڻ گهرجي ان باري ۾ اهو ٻڌائڻ تمام ضروري آهي ته ذیابيطس جي مريضن کي نه صرف سڻي گهٽ واپرائڻ کپي پر SATURATED سڻي جي جاءِ تي UNSATURATED سڻي استعمال ڪرڻ گهرجي، يعني مڪڻ، ڪير جي ملائي، جهنگن، سڄي يا

(SWEETEX) جي نالي سان ملندي آهي. سيڪرين جي لاءِ امريڪا جي F.D.A وارنگ ڏني آهي ته اها مٿاني جو ڪينسر ڪري سگهي ٿي. اها ٻارن ۽ ڊڪي (PREGNANT) عورتن ۾ بهتر آهي ته استعمال نه ڪي.

2- اسپارٽيم (ASPARTAME) هي اڃا تائين محفوظ ترين مٺو آهي. بازار ۾ ڪينڊل ۽ ٻين نالن سان ملندي آهي. هن ۾ ٻه مکيه امائنو ايسڊ (Amino Acids) ٿيندا آهن. (1) Aspartic Adic (2) فينائيل الانائن (Phenyl Alanine). هيءَ ڪنڊ کان 180 ڀيرا وڌيڪ مٺي آهي. پر ان جو اثر ٽهڪڻ تي ختم ٿي وڃي ٿو.

3- ساربيٽال (Sorbitol) :- هي ڪيترن مقدار ۾ کائڻ سان اسهال ڪري ٿي. 4- فروڪٽوز (Fructose) :- قدرتي مٺاڻ آهي ۽ ماکيءَ ۾ جام مقدار ۾ هوندو آهي. ان جو اڳ ۾ ئي ذڪر ٿي چڪو آهي.

5- نشاستي - روڪڊوائون (Starch - blockers) :- اهي ذبابيطس جي مريضن ۾ ڪاڏي کانپوءِ رت ۾ گلوڪوز وڌڻ نٿيون ڏين. مثلاً (Glucosidase Inhibitors) هي Amylase ۽ Sucrase لعابن جو ضد (Enzymatic Antagonist) آهي.

16- هر غذا جي استعمال کان اڳ انهن جي حرارن (ڪيلوريز) جي مقدار جي معلومات انتهائي ضروري آهي. جيئن جسم جي وزن کي معتدل رکي سگهجي. نتيجي ۾ عام غذائن جون ڪيلوريز هيٺ ڏجن ٿيون.

225 ڪيلوريز: آئسڪريم (هڪ ڪپ)
160 ڪيلوريز: نان يا ماني (هڪ عدد)
140 ڪيلوريز: ڪولڊ ڊرنڪ
(ڪوڪا ڪولا وغيره: 12 آئونس)

120 ڪيلوريز: ڪيلو (وچولو)
80 ڪيلوريز: ڊبل روٽي (هڪ سلاٽس) يا ابريل چانور (هڪ ننڍڙي پليٽ)، پٽ (اڌ ڪوپ) يا ابريل دال (هڪ ننڍڙي پليٽ) يا ابريل پٽاٽو (هڪ

عدد) يا ابريل متر (هڪ ننڍڙي پليٽ)
75 ڪيلوريز: ابريل بيضو (هڪ) يا گئون يا پڪري جو گوشت (اڌ آنو)، يا کير ملائي سان (4- آئونس).

60 ڪيلوريز: صوف، موسمي، ڪينو، نارنگي، مالتو، چيڪو، گريپ فروٽ، آڙو ۽ ناشپاتي (سپن مان ڪوبه هڪ عدد)، پيٽو، گدرو، هنداثو، سردو ۽ گرمو (ڪنهن به هڪ جون چار ننڍڙيون ڦاڪون)، کير بغير ملائي جي (4 آئونس)

55 ڪيلوريز: مڇي يا ڪڪڙ (اڌ آنو)
45 ڪيلوريز: تيل يا گهم يا کير جي ملائي يا انڊي جي زردِي يا مڪڻ (هڪ چمچو، بادام (6- داڻا)، يا بوهي مڱ (10 داڻا) يا ناريل پيئل (ٻه چمچا)

25 ڪيلوريز: بصر ڪچا (هڪ ننڍي پليٽ)

20 ڪيلوريز: موري (هڪ ننڍڙي پليٽ)
15 ڪيلوريز: ڪچو ڪيرو يا گوڀي (هڪ ننڍڙي پليٽ)

17- رات جي مانيءَ ۾ لحميات (PROTEINS) نشاستي (CARBO HYDRATES) جي مقابلي ۾ وڌيڪ استعمال ڪرڻ گهرجن. جيئن اهي سڄي رات (GLUCONEOGENESIS) جي ذريعي ٿورو ٿورو گلوڪوز رت ۾ پهچائي سگهن. لحميات جا بنيادي جزا (AMINO ACIDS) انسولين جي لبلبي منجهان اخراج ڪي وڌائيندا آهن.

18- شراب هونئن به اسلام ۾ حرام آهي، پر ذبابيطس جي حوالي سان گهڻو نقصانڪار آهي. ان ۾ موجود نشاستي جي ڪري وزن وڌندو آهي ۽ هڪدم رت ۾ گلوڪوز گهٽ ٿيڻ ڪري بيهوشي پڻ ٿي سگهي ٿي. ذبابيطس جي علاج لاءِ ورتل گورين BIGUANIDES سان ملي هو LACTACIDOSIS ڪندو آهي جيڪو تيزابيت واري بي هوشي جو هڪ قسم آهي. ذبابيطس لاءِ ورتل ٻي قسم جي گورين SULPHONYLUREA

سان گڏ هي وري تمام خراب قسم جو ردعمل ڪندو آهي. ذبابيطس سان گڏ جيڪڏهن خون جو دٻاءُ (بلڊپريشر) وڌيڪ هجي يا مائهو ٿلهو هجي يا رت ۾ چرٻيءَ جو مقدار وڌيڪ هجي ته شراب وڌيڪ نقصان ڪندو آهي.

هر نشاستي واري غذا کي ذبابيطس جي مريضن لاءِ مفيد يا نقصانڪار هجڻ ان غذا جي GLYCAEMIC INDEX جي معيار تي پرکيو ويندو آهي. سولن لفظن ۾ ائين چئي سگهجي ٿو ته جيڪڏهن ڪنهن غذا جي گلائيسيمڪ انڊيڪس گهڻي آهي ته ان کان پري رهجي ڇو ته هو رت ۾ گلوڪوز جي سطح هڪدم بلند ڪري ٿي. ٽن ڪلاڪن تائين جو گراف هڪ جدول ذريعي ماپيو وڃي ٿو. اهو گراف نجِي گلوڪوز جي گراف سان پيٽيو وڃي ٿو جنهن جي انڊيڪس هڪ سئو (100) آهي.

ڪجهه غذائن جي انڊيڪس هيٺ ڏنل آهي.
ماڪي ۽ پٽاٽا (80)، چانور ۽ اڇي ڊبل روٽي (70)، ماني، چاڪليٽ (60) کنڊ، پيسٽري، سيون (50)، مٽر (40)، آئسڪريم (30)، دال (20)، بوهي مڱ (10).

تازو مختلف تجربن سان ڏٺو ويو آهي ته ڪنڊ جو ننڍو مقدار جيڪڏهن ريشن وارن ڪاڌن جون جي ماني يا پوسي واري ماني سان گڏ واپرايو وڃي ته ڪنڊ جو انڊيڪس گهڻو نٿو وڌي. يعني اها گهٽ نقصانڪار ٿي وڃي ٿي. مقصد هي آهي ته شگر واري مريض کي قسمت سان مٺو کائڻ تي دل چوي ته اها سويت ڊش (تمام ٿوري مقدار ۾) مانيءَ سان گڏ کائي، خالي پيٽ نه. ساڳي ڳالهه انب، ٻين تازن ميون ۽ آئسڪريم لاءِ به ڪري سگهجي ٿي. بهتر آهي ته، اهي به مانيءَ سان گڏ يا هڪدم پوءِ کائجن.

مختلف نشاستي وارين غذائن کي نشاستي جي 10 گرام جي حصن ۾ ورهايو ويو آهي جيئن شگر جي مريضن

چست ٿي ويندا ۽ سندن صحت تي سٺو اثر پوندو. ذيابيطس ڪنٽرول ۾ اچي ويندي ته پوءِ هو خوشي سان مستقبل ۾ پرهيز ڪندا رهندا.

ذيابيطس جي لاءِ مخصوص کاڌا جي بازار ۾ مختلف صورتن ۾ ملن ٿا، مثلاً شگر فري مٺائي، جامر جيلي، ڪسٽرڊ وغيره اهي هڪ ته گهڻا مهانگا آهن، ٻيو ته انهن ۾ ڪيلوريز تمام گهڻيون ٿين ٿيون ۽ نتيجي طور اهي وزن وڌائين ٿا، ان لاءِ انهن کان پري جو سلام ٿي بهتر آهي.

جيڪڏهن ذيابيطس جي مريض کي التيون اچن يا ڪنهن ٻي بيماريءَ جي ڪري بک ختم ٿي وڃي ته اهي انسولين يا گوريون گسائڻ نه، پر ان جو پورو مقدار وٺڻ ۽ عام کاڌي جي جاءِ تي فروٽ يا فروٽ جوس، پٽ، ڪير، ڏهي،

پليٽ سلاڊ، هڪ سڄو ٽماٽو. (2) ٻه اڻ مڪيل مانيون (يا هڪ نان) يا 4 وڏيون ڊبل روٽيءَ جو سلائس (هڪ ماني جي جاءِ تي چانورن جي ننڍڙي پليٽ کائي سگهجي ٿي). (3) اڌ ٻاءُ (125 گرام) مرغِي يا مڇي يا قيمو يا چرٻي نڪتل گوشت يا ڪچيون اڀريل سايون پاڇيون هڪ پليٽ يا هڪ ننڍڙي پليٽ ڍال، سرڪي ۾ ٺهيل آچار، ملائي نڪتل ڪير جي ٺهيل ڏهي (هڪ ننڍري پيالي).

شام 5 وڳي:- هڪ سادو بسڪٽ يا برائون بريد مان ٺهيل سينڊوچ، هڪ فروٽ، بغير ڪنڊ جي چانهه يا ڪافي هڪ ڪوپ. رات جي هاني:- ٻه مانيون، 100 گرام مرغِي يا قيمو يا گوشت يا هڪ

جي وات جو سواد بدلبورهي ۽ هڪجهڙو کاڌو روز کائي ماڻهو بور نه ٿي وڃي. هيٺ ڪجهه انهن غذائن جو مقدار ڏنو ويو آهي جن ۾ نشاستو 10 گرام آهي ۽ اهي مختلف ڏينهن تي بدلائي کائي سگهجن ٿا:-

هڪ پيريل اڀريل چانور جو وڏو ڇمڇو، ننڍي سائز (بيضي جيترو) پٽاٽو، 100 ملي ليٽر (اڌ گلاس کان ڪجهه گهٽ) نارنگي جي رس، هڪ ننڍي ڦار ڊبل روٽي جي، 115 ملي ليٽر ڪير، وڏو هڪ سادو بسڪٽ، هڪ فروٽ، هڪ ڪوپ رڌيل پٽ، منو ڪوپ ڪارن فليڪس، پٽاٽي جي چپس جو ننڍو پيڪٽ. هتي اهو ٻڌائڻ ضروري آهي ته روزانه 100 گرام گهٽ ۾ گهٽ نشاستو ضرور واپرائڻ کپي نه ته جسر

جي چرٻي ٻرڻ شروع ٿيندي. نتيجو - KETONU ۽ RIA ۽ KETOSIS ۾ نڪرندو ۽ مريض بيهوش ٿي ويندو.

هيٺ هڪ پرهيزي کاڌي جو چارٽ ڏنو وڃي ٿو جو هڪ شگر جو مريض استعمال ڪري سگهي ٿو. ان جون ڪل ڪيلوريز 1800 کان 2000 تائين آهن. ان ۾ نشاستو 50 فيصد (230 گرام)، پروٽين 15 فيصد (تقريباً 72 گرام)، سٽي 35 فيصد (66 گرام) آهي.

ناشتو:- (1) ٽي ڊبل روٽي جون ڦارون (سلائسز) جنهن تي مارجرن جو سنهڙو تهه لڳل هجي. (2) هڪ انڊو (زرد نڪتل) يا هڪ شامي ڪباب، يا هڪ ڪوپ پٽ يا ڪارن فليڪس، (3) بغير ڪنڊ جي چانهن يا ڪافي جو هڪ ڪوپ.

تقريباً 11 وڳي:- هڪ سادو بسڪٽ، هڪ فروٽ (اڳ ۾ ذڪر ڪيل) منجهند جي هاني:- (1) هڪ

رت ۾ گلوڪوز جي گراف جي ايراضي غذا ڏيڻ کانپوءِ

$$100X \frac{\text{گلائيسيمڪ انڊيڪس}}{\text{رت ۾ گلوڪوز جي گراف جي ايراضي گلوڪوز ڏيڻ کانپوءِ}} =$$

پاڻي يا پيپسي ڪولا وغيره پيئڻ ۽ هڪدم پنهنجي ڊاڪٽر سان لهه وچڙ ۾ اچڻ. آخر ۾ لنگر جي ٺهڻ لاءِ پيڪاڻ ته:-

جيڪڏهن اوهان پرهيزي کاڌو نٿا کائي سگهو يا اوهان ان جي باوجود بک محسوس ڪيو ٿا يا ٻئي ڪنهن به طريقي سان مطمئن ناهيو يا اوهان وڌيڪ معلومات چاهيو ٿا ته اوهان ويڄ رسالي جي معرفت ملي يا لکي مشورو حاصل ڪري سگهو ٿا. ياد رکو ته پرهيز ڪرڻ اوهان جي ذمہ داري آهي ۽ اها صرف اوهان جي ئي هٿ ۾ آهي، اوهان جو ڊاڪٽر صرف اوهان کي مشورو ئي ڏئي سگهي ٿو.

پليٽ سبزي يا ڍال، ڪير (الائونس منجهان)، چانهن يا ڪافي بغير ڪنڊ جي. نوٽ: ڊائٽ ٿڌي بوتل ڪڏهن به پي سگهجي ٿي.

هيٺين حالتن ۾ سخت پرهيز نه ڪجي جو انهن ۾ رت ۾ گلوڪوز جو مقدار تمام گهڻو گهٽ ٿي ويندو آهي ۽ مريض جي بيهوش ٿيڻ جو خطرو هوندو آهي؛ جگر جي خرابي، بڪين جي انتهائي خرابي، ڪجهه غدودن جي بيماري مثلاً ADRENAL, PITUTARY وغيره، شرابي ماڻهو.

ڪڏهن ڪڏهن شگر جي انهن مريضن ۾ جي تمام ٿلهي ٿيندا آهن يا جيڪي ڪنهن سبب جي ڪري پرهيزي کاڌو نٿا کائي سگهن، کين ٿوري وقت لاءِ اسپتال ۾ داخل ڪرڻو پوندو آهي، جتي هو خوشيءَ سان پرهيز ڪندا آهن، هڪ دفعو جڏهن هو پرهيزي کاڌو کائي



ذیابیطس ۽ زندگي جا ڪجهه اهم موڙ

ڊاڪٽر رخصي ارشد — سنڌيڪار — اسحاق قل

ذیابیطس ۽ شادي

شادي جي خواهش هڪ فطري عمل آهي. ذیابیطس ۾ ڦاٿل نوجوان جڏهن شاديءَ جو ارادو ڪن ٿا تڏهن اهو پڇندا آهن ته ڇا هو هڪ عام ماڻهو وانگر شادي واري زندگي گذارڻ جي قابل آهن ۽ ڇا ذیابیطس انهن جي شاديءَ واري زندگيءَ تي اثر انداز ٿيندي؟

هن سوال جي پهرئين حصي جو سڌو سنئون جواب آهي، هاڻو، ذیابیطس ۾ ڦاٿل ماڻهو به عام ماڻهن وانگر ڪامياب شادي واري زندگي گذاري سگهن ٿا. باقي جيستائين سوال جي ٻئي ڀاڱي جو تعلق آهي ته شادي واري زندگيءَ جي شروعات ڪرڻ کان پهريان بهتر رهندو ته ذیابیطس ۾ ڦاٿل مريض يا مريضائي هن بيماريءَ جي متعلق ضروري ڄاڻ ضرور حال ڪن.

ذیابیطس جا مريض گهڻو ڪري هن ڳالهه تي پريشان نظر ايندا آهن ته شايد هي مرض ڪنهن حد تائين هن جي شاديءَ واري زندگيءَ ۾ مونجهارو پيدا ڪري سگهي ٿو. پر ائين ناهي، بلڪه ذیابیطس کان وڌيڪ اوهان جي اها پريشاني اوهان جي شاديءَ واري زندگيءَ ۾ خلل وجهي سگهي ٿي. جيڪڏهن اوهان جو مرض مڪمل طور قابو (Control) ۾ آهي ته يقيناً اوهان جي شاديءَ واري زندگي ڪاميابيءَ سان گذري سگهي ٿي.

ذیابیطس جي گهڻن مريضن ۾ بالغ ٿيڻ جو مرحلو ۽ ان جي تڪميل عام ماڻهن وانگر ٿيندي آهي جڏهن ته ڪن ڪن مريضن ۾ ان جي تڪميل ڪجهه دير سان ٿيندي آهي، پر مطمئن رهڻ گهرجي اڳتي هلي سڀ ڪجهه ليڪ ٿي ويندو آهي.

شادي کان پوءِ واري حياتي ۾ ذیابیطس جو مرض ڪجهه مسئلن جو سبب بڻجي سگهي ٿو. پر جيڪڏهن ذیابیطس جو مريض يا مريضائي ۽ ان جو رفيق حيات ان مسئلي جو تحمل ۽ بهتر طريقي سان مقابلو ڪن ته ڪوبه سبب ناهي جو اهي هڪ خوش ۽ عام رواجي زندگي نه گذاري سگهن.

ذیابیطس جي مريض يا مريضائيءَ کي ۽ ان جي رفيق حيات کي اهو ڄاڻڻ گهرجي ته ان جو ساٿي جنهن مرض ۾ ڦاٿل آهي ان ۾ لڳاتار طبي سنڀال ۽ علاج جي ضرورت زندگيءَ ۾ رهي ٿي پر جيڪڏهن انهيءَ مرض کي ڪنٽرول ۾ رکيو وڃي ته هي مرض انهن جي روزمره جي ڪم ڪار ۾ رڪاوٽ جو سبب نه بڻجندو.

ذیابیطس ۽ حمل يا ڳڻپ (Diabetes and Pregnancy)

ذیابیطس جي مريض عورتن جي ذهن ۾ سڀ کان وڌيڪ اهم سوال هي هوندو آهي ته ڇا ذیابیطس کان متاثر ٿيل عورتون پيٽ ٿيڻ/ڳڻجڻ جي قابل آهن يا نه؟ بلڪل، عام عورتن وانگر ذیابیطس ۾ ڦاٿل عورتون به ڳڻجي سگهن ٿيون پر انهن کي ڪجهه احتياطي تدبيرون اختيار ڪرڻيون پونديون آهن.

انهن ۾ سڀ کان پهريائين رت ۾ ڪنڊ (Sugar) جو مقدار بلڪل صحيح رکڻو پوندو آهي. اهو تمام ضروري آهي ته ذیابیطس جون مريضائون تيستائين پيٽ سان نه ٿين جيستائين کين بيماري تي صحيح ڪنٽرول نٿو ٿئي. ڇو ته حمل جي پهرئين اٺن هفتن ۾ ٻارڙي جا عضوا ۽ مختلف حصا ٺهڻ ٿا جيڪڏهن ان تائين دوران ذیابیطس

جو ڪنٽرول نه هوندو ته ٻار ضايع ٿيڻ يا ان جي عضون ڪرڻ جو امڪان وڌي وڃي ٿو.

• ٻي اهم ڳالهه اها آهي ته پيٽ دوران شگر گهٽ ڪرڻ واريون گوريون هرگز استعمال نه ڪرڻ گهرجن جيڪڏهن شگر جو ڪنٽرول صرف پرهيز سان ممڪن نه آهي ته ان سان گڏ انسولين جو استعمال تمام ضروري ٿي وڃي ٿو ۽ ٻار ڄمڻ کان پوءِ مريض بهير گوريون کائي سگهي ٿي.

• ذیابیطس ۾ مبتلا عورتون گهڻو ڪري حمل دوران يا ويامن وقت ڪيترين ئي مشڪلاتن ۾ ڦاسي سگهن ٿيون جنهن ڪري ڪجهه وقت اهڙن مريضن تي خاص ڌيان ڏيڻ جي ضرورت هوندي آهي. طب جي موجوده ترقي ۽ نگهداشت جي بهترين سهولتن جي فراهميءَ جي ڪري انهن عورتن ۾ حمل جا نتيجا تمام بهترين مليا آهن.

• جيڪڏهن شگر جو مناسب ڪنٽرول ڪيو وڃي ته انهن عورتن ۾ 96 سيڪڙو ٻارڙا تندرست پيدا ٿي سگهي ٿا.

• اهي عورتون جيڪي ٻار پيدا ڪرڻ چاهين ٿيون تن کي گهرجي ته سڀ کان پهريائين ان ڳالهه جو جائزو وٺن ته ڇا هو ڄڻيل ٻار جي سار سنڀال ۽ پالنا ڪري سگهنديون يا نه؟

• جيڪڏهن ذیابیطس ۾ ڦاٿل مايون ڪنهن ٻي پيچيدگي ۽ خاص ڪري گردن جي بيماري جو به شڪار آهن ته پوءِ ان جوڙي کي پنهنجي ڊاڪٽر سان تفصيلي ڳالهه ٻولهه ڪرڻ گهرجي ڇو ته اهڙين عورتن ۾ حمل ٿيڻ سان ڪجهه نقصان به ٿي سگهن ٿا. ان جي ابتڙ جيڪڏهن ڪا ٻي معمولي گڙ ٻڙ موجود آهي ته اها حمل ٿيڻ ۾ ڪابه رڪاوٽ نٿي ڪري سگهي.

ذیابیطس ۽ جنسي ڪمزوري

ذیابیطس کان متاثر ٿيل مرد به هڪ عام شادي واري زندگي گذاري سگهن ٿا. پر اهو ضروري آهي ته سندن مرض پورو پورو ضابطي ۾ هجي. ذیابیطس جو

ڪنٽرول ۾ نه هجڻ به ڪڏهن ڪڏهن مرد
کي نامرد ڪري سگهي ٿو. پر اهو مرض
ذیابیطس ظاهر ٿيڻ کان ڪيترا ئي سال پوءِ
ٿيندو آهي.

ٻارڙن ۾ ذیابیطس ٿيڻ جا امڪان

ٻارڙن ۾ ڄمندي ئي ذیابیطس جا
امڪان ڪونه هوندا آهن پر جيڪڏهن ماءُ
پيءُ اهو ڄاڻن ٿا ته ڇا انهن جي
ٻچي کي ايندڙ زندگيءَ ۾ ذیابیطس ٿيڻ جو
امڪان آهي ته ان جو جواب به تسلي بخش
آهي. انهن ٻارڙن ۾ هالڪپڻ ۾ ذیابیطس
ٿيڻ جو صرف هڪ سيڪڙو خدشو هوندو
آهي. پر جوان ٿيڻ کان پوءِ ذیابیطس
ٿيندي يا نه ٿيندي انهيءَ جو يقيني اندازو
لڳائڻ في الحال ممڪن نه آهي. چوڻهه هي
هڪ عام بيماري آهي هڪ اندازي مطابق
آباديءَ جا 3 سيڪڙو ماڻهو هن بيماريءَ ۾
مبتلا آهن.

ذیابیطس ۽ روزگار

ذیابیطس جي مريضن کي روزگار جي
حوالي سان ڪجهه مسئلا سامهون اچي
سگهن ٿا. خاص طور تي اهي مريض
جيڪي Insulin تي آهن انهن لاءِ هيلئون
نوڪريون مناسب نه آهن.

مثال طور:- پبلڪ ٽرانسپورٽ هلائڻ يعني
بس، رڪشا، ٽيڪسي، ريل گاڏي، هوائي
جهاز، بحري جهاز وغيره هلائڻ. اها
ملازمت جنهن ۾ مريض کي ڪنهن به
مٿانهين واري جڳهه تي ڪم ڪرڻو پوي،
جهڙوڪ: پهڙ جي چوٽيءَ تي پٿر ڪٽڻ يا
ڇت کي رنگ وغيره لڳائڻ، ٽريفڪ
ڪنٽرول ڪرڻ وارو سپاهي، فوج ۽ فائر
برگيڊ وارا شعبا به ذیابیطس واري مريض
لاءِ موزون نه آهن چوڻهه انهن ملازمتن ۾
تمام وڏي زمينداري سان ڪم ڪرڻو پوندو
آهي ۽ ڪڏهن ڪڏهن بڪ جي حالت ۾ به
ڇڏارڻو پوندو آهي، جيڪو ذیابیطس جي
مريض لاءِ نهايت ئي مشڪل آهي.

حمل يا ڳڀ دوران ذیابیطس

حمل يا ڳڀ واري عرصي دوران

ذیابیطس تي قابو نه پائڻ ڪري ڪيترن ئي
خطرن کي منهن ڏيڻو پوي ٿو. ان حد تائين
جو ماءُ جي ٻچيداني ۾ ٻارڙي جو موت به
ٿي سگهي ٿو ۽ ان کان سواءِ ٻيا به ڪيترائي
سبب ٿي سگهن ٿا.

عورت سنڌ تي سگهي ٿي يا ڳڀڻ ۾
گهڻو تاثير لڳي سگهي ٿو جنهن جي نتيجي
۾ هو ڪيل آني کي تباهه ٿيڻ جو خدشو
هوندو آهي. يا وري ٻار ۾ پيدائشي نقص
ٿي سگهي ٿو.

حمل جي آخري ڏينهن ۾ گهڻي ڀاڱي
جهٽڪڻ جي بيماري (Pre-Eclampsia)
جو خطرو وڌي ويندو
آهي. ان کان سواءِ ٻار جو وزن وڌي ويندو
آهي جنهن ڪري ٻچيداني اندر سندس موت
به ٿي سگهي ٿو ۽ ڄمڻ کان فوراً بعد نئين
ڄاول ٻار ۾ ڪافي ٻيا مسئلا به پيدا ٿي
سگهن ٿا.

پيٽ وارين عورتن ۾ حمل جي ڪري
سندن ذیابیطس پڻ مسئلو بڻجي وڃي ٿي.
شروعاتي تن مهينن ۾ شگر تمام گهٽ
رهڻ جي شڪايت رهي ٿي ۽ آخري تن
مهينن ۾ شگر وڌيل رهي ٿي ڳڀ مان ڪنڊ
جو نيڪال وڌي وڃي ٿو ۽ اکين جي پردي
جي خراب ٿيڻ جو خطرو پڻ وڌي سگهي
ٿو.

حمل جي سار سنڀال جي رٿابندي
تاريخي ٻهلو:- شروعات ۾ انهن
پريشانين کان بچڻ جو اهو طريقو سمجهيو
ويندو هو ته حمل نه ٿئي. پر وقت گذرڻ
سان گڏ اها ڳالهه سامهون آئي ته گهڻيون
تڪليفون حمل جي پوين تن مهينن ۾ ٿين
ٿيون ان ڪري اهڙي حالت ۾ مڪمل آرام،
رت ۾ ڪنڊ جي مقدار جي ڇاڇ ۽ ذیابیطس
تي سخت ضابطي لاءِ زور ڀريو ويو. حمل
جي آخري ڏهاڪي ۾ ماءُ جي سخت سار
سنڀال تي زور ڏنو ويو ته جيئن ٻار عام
طريقن سان ڄڻائي سگهجي. اڄڪلهه ٻارڙن
۾ موت جو گهڻو سبب پيدائشي نقص آهن
۽ هاڻي زياده تر غور انهيءَ ڳالهه تي آهي ته

انهيءَ کي ڪيئن گهٽ ڪيو وڃي. اصل ۾
ضرورت انهيءَ ڳالهه جي آهي ته ذیابیطس
۾ حمل جي رٿا بنديءَ کان پهريان طبي
مشورو ضرور ورتو وڃي.

حمل کان پهريان

حمل دوران يا ان کان پهريان ذیابیطس
تي بهترين ڪنٽرول جو دارومدار مريض جو
پنهنجي پاڻ تي آهي مريض کي پنهنجي
خوراڪ جو خاص خيال رکڻ گهرجي ۽
ڪنهن سٺي ۽ ڄاڻو خوراڪ جي ماهر سان
مشورو ڪرڻ گهرجي. ذیابیطس جي ڪري
پيدائشي نقص جو اصل سبب رت ۾ ڪنڊ
جو وڌي وڃڻ ۽ زهريلي مادي ڪيٽون جو
وڌي وڃڻ آهي. ان ڪري ضروري آهي ته
حمل جي اڳواٽ رٿا بندي ڪئي وڃي ۽
پنهنجي ڊاڪٽر سان مشورو ڪيو وڃي ۽ ان
تي عمل ڪيو وڃي.

رت ۾ ڪنڊ جو مقدار معلوم ڪرڻ

حمل ٿيڻ کان پوءِ ضروري آهي ته رت
۾ ڪنڊ جو مقدار وقفي وقفي سان ضرور
معلوم ڪيو وڃي. جيئن ته ڳڀ دوران
ڪاڌي، ورزش ۽ انسولين جذب ٿيڻ جي
رفتار ۾ به ردو بدل ٿي سگهي ٿي. ان ڪري
روزانو تي يا چار ڀيرا رت ۾ ڪنڊ جو مقدار
معلوم ڪيو وڃي. هاڻي اهو مسئلو ٿو پيدا
ٿئي ته روزانو تي چار دفعا رت ۾ شگر
چيڪ ڪرڻ ڏکيو آهي. ان ڪري هفتي ۾
ٻه يا ٽي ڀيرا رت ضرور ٽيسٽ ڪرڻ
گهرجي ۽ ڏينهن ۾ تي يا چار ڀيرا پيشاب
۾ ڪنڊ چيڪ ڪرڻ گهرجي.

بهرحال اصل مقصد هي آهي ته ذیابیطس
تي مڪمل ۽ سختيءَ سان ڪنٽرول ڪيو
وڃي ته جيئن پيٽ دوران ذیابیطس جي
پريشانين ۽ موهانن کان بچي سگهجي.

خوراڪ يا کاڌو پيئڻو

اهو ته پهريان ئي ٻڌايو ويو آهي ته
حمل دوران کاڌي پيئڻي جو خاص خيال رکڻ
گهرجي ۽ جيڪڏهن ٿي سگهي ته ڪنهن
ماهر خوراڪ سان رابطو ڪري ڪائونسل
مشورو وٺڻ گهرجي ۽ ان تي عمل ڪرڻ

گهرجي.

خاص ڪري رات جو سمهڻ کان پھريان پرهيز وارو هلڪو ڦلڪو کاڌو کائڻ گهرجي ته جيئن رات جو شگر گهٽجي نه وڃي ۽ صبح جو ناشتي کان پھريان رت ۾ ڪيٽون وڌڻ جو به خطرو پيدا نه ٿئي. ائين ڪرڻ سان صبح جي وقت چڪر اچڻ، يا الٽي ٿيڻ جي شڪايت به گهٽجي وڃي ٿي جيڪا ڪيٽون وڌڻ سان ٿئي ٿي.

انسولين

انسولين جي استعمال کان پھريان ضروري آھي ته هيٺين ڳالهين جو خاص خيال رکڻ گهرجي.

(۱) انسولين کي صحيح طريقي سان ملائڻ.

(۲) انسولين لڳائڻ جي وقت جو صحيح هجڻ.

(۳) انسولين کي صحيح جڳهه تي لڳائڻ.

عام طور تي اها انسولين لڳائڻ گهرجي جنهن جو اثر گهڻو وقت ڪم ڪري ڏينهن ۾ رتي يا چار پيرا به انسولين لڳائڻ جي ضرورت پئجي سگهي ٿي.

شروعاتي ٽن مهينن ۾ انسولين جي مقدار کي گهٽائڻو پوي ٿو ڇو ته ان دوران شگر گهٽجي وڃڻ جو خطرو هوندو آهي. اهڙي طرح حمل جي آخري ٽن مهينن ۾ انسولين جو مقدار وڌايو ويندو آهي ڇو ته انهيءَ دوران شگر وڌي وڃڻ جو خطرو رهي ٿو.

حمل جي پھرين ٽماھي

حمل جي پھرين ٽماھي ۾ ضروري آھي ته ڳپيل عورتون جيترو جلدي ٿي سگهي ڪنهن ذیابيطس جي ماھر ڊاڪٽر سان مشورو ڪن، اهڙيءَ طرح تاريخن جو صحيح تعين ڪرڻ ۾ مدد ملي ٿي. مريض به مطمئن رهي ٿو ۽ انسولين جو مقدار ۽ انهيءَ جي ضرورت ۽ انهيءَ ۾ ضروري تبديلي ڪرڻ ۾ به مدد ملي ٿي. وقتي وقتي سان پنهنجو معائنو ڪرائڻ گهرجي. رت ۾ ڪنڊ جو مقدار هر دفعي لکڻ گهرجي ۽ انهيءَ مناسبت سان انسولين جي مقدار ۾

ضروري تبديلي ڪري سگهجي ته جيئن مريض کي ڪنهن به قسم جي پريشاني نه ٿئي.

ٻي ٽماھي

هي مهينا مريض ۽ ڊاڪٽر ٻنهي لاءِ پرسڪون رهن ٿا. هن ۾ ٽين ٽماھي جي باري ۾ زياده تفصيل سان ۽ سٺو طبي مشورو حاصل ڪري سگهجي ٿو. هن ٽي ٽماھيءَ دوران مريض پنهنجي طبي مسئلن بابت سوال جواب به ڪري سگهي ٿي. انسولين جي مقدار کي ضرورت مطابق وڌائي سگهجي ٿو. Glycosylated HG جو هر مهيني چيڪ ڪرڻ سان ذیابيطس جي ڪنٽرول جو بهتر اندازو ٿي سگهي ٿو.

ٽين ٽماھي

هن ٽماھيءَ دوران مريض کي ڊاڪٽر وٽ گهڻو وڃڻ گهرجي گهٽ ۾ گهٽ پندرهن ڏينهن ۾ هڪ ڀيرو، اهو ان لاءِ به ضروري آهي ته ڪڏهن ڪڏهن انسولين جو مقدار وڌائڻو پوي ٿو. مريض کي هي به سيکاريو وڃي ٿو ته ڪهڙيءَ طرح انسولين جي مقدار ۾ تبديلي ڪئي ويندي آهي اهڙيءَ طرح ذیابيطس تي سٺو ڪنٽرول حاصل ڪيو ويندو آهي ۽ مريض به روزانو ڊاڪٽر وٽ وڃڻ کان بچي ويندي آهي.

ٻار جو ڄمڻ يا ٿيڻ

ٻار کي ڄڻ جي منصوبه بندي لاءِ به اهم اصول طئي ٿيل آهن هڪڙو ته رت ۾ ڪنڊ کي وڌائڻ کان بچايو وڃي ٿو ته رت ۾ زهريلو مادو يعني ڪيٽون نه وڌن. انهيءَ کان بچڻ لاءِ بهتر آهي ته گهڻي کان گهڻو ناشتو استعمال ڪيو وڃي ۽ گڏوگڏ انسولين جيتري مقدار ۾ ضروري هجي ته وٺڻ گهرجي. ٻار ڄمڻ جو ڪهڙو به طريقو ڪار هجي، ٻار ڄمڻ کان پوءِ انسولين جي مقدار تي نظر ثاني ڪرڻ گهرجي ۽ حمل کان پھريان واري مقدار تي پهچائڻ گهرجي. هي جلدي به ممڪن آهي پر جيڪڏهن ٻار کي ماءُ جي کير تي رکڻو آهي ته انسولين جي مقدار ۾ تبديلي انهيءَ

نسبت سان ڪرڻ گهرجي.

حمل ۽ ٻار ڄمڻ کان پوءِ ضروري آهي ته آئنده خانداني منصوبه بندي جي لاءِ صلاح مشورو ڪيو وڃي ۽ ٻارن ۾ ذیابيطس جي خطري ۽ پريشاني جي باري ۾ ڊاڪٽر سان ڳالهه ٻولهه ڪرڻ گهرجي.

ذیابيطس جي مريض ماڻھن جا ٻارڙا

ذیابيطس جي مريض ماڻھن جا نوان ڄاول ٻارڙا عام طرح ڪيترين ئي پيچيدگين جو شڪار هوندا آهن. انهن سڀني پيچيدگين جو سڌو سنئون واسطو ذیابيطس جي مدت ۽ پيٽ دوران انهيءَ جي شدت سان آهي. پيٽ دوران ذیابيطس تي سٺو ڪنٽرول نون ڄاول ٻارڙن ۾ انهن خطرن کي ڪافي حد تائين گهٽ ڪري ٿو.

پيچيدگين جو بنيادي سبب

نون ڄاول ٻارڙن ۾ جيڪي پيچيدگيون پيدا ٿين ٿيون ان جو بنيادي سبب رت ۾ انسولين جو گهڻو وڌي وڃڻ آهي. پيٽ دوران ماءُ ۽ ٻار جي رت ۾ ڪنڊ جو مقدار هڪ ٻئي سان مطابقت رکي ٿو. ماءُ جي خون ۾ ڪنڊ جي واڌ به ٻارڙي جي خون ۾ ڪنڊ جي واڌ جو سبب بڻجي ٿي. جنهن جي ڪري پيچيدگي جي اندر ئي ٻارڙي جو ليلو (Pancreas) انسولين وڌيڪ پيدا ڪرڻ لڳي ٿو ۽ ٻارڙي جي رت ۾ انسولين جو مقدار وڌي وڃي ٿو. جيڪو مختلف بيمارين جو سبب بڻجي ٿو.

وزن وڌيل ٻارڙو يا ٻارڙي جي جسامت

ٻارڙي جي رت ۾ انسولين جي وڌڻ سان ماءُ جي پيچيدگيءَ ۾ موجود ٻارڙي جي جسم ۾ چرٻي ۽ گوشت وڌيڪ جمع ٿيندو رهي ٿو، جيڪا ذیابيطس جي مريض پيٽ وارين عورتن جي نون ڄاول ٻارڙن جي هڪ اهم خاصيت آهي. ماءُ جي رت ۾ شگر وڌي وڃڻ ڪري ٻارڙي جي جسم تي چرٻي وڌي وڃي ٿي جيڪا نه صرف ٻارڙي جو وزن وڌڻ جو سبب بڻجي ٿي پر ٻار جي جسم جي بيهڪ پڻ وڌائي ٿي ۽ ٻارڙو پنهنجي هر عمر ٻارڙن کان وزن ۾ وڌيڪ

۽ وڏو لڳندو آهي. اهڙن ٻارڙن ۾ عام طور غتي دل، جيسرو ۽ گردا به وڌيل ٿين ٿا. مطلب ته هنن ٻارڙن جو وزن وڌيڪ وڌيل هوندو آهي. پر هنن جي مٿي جي سائيز عام ٻارن جيتري ئي هوندي آهي. اهڙا ٻارڙا ڄمڻ مهل گهڻيون ئي مشڪلاتون پيدا ڪن ٿا. مثلاً ڄمڻ مهل ڪلهن جو ڦاسي پوڻ، سامهه گهٽجڻ يا ڪوئي ٻيو ڌڪ يا زخرو وغيره رسڻ.

پيدائشي خاصيون

پيدائشي نقص نون ڄاول ٻارڙن جي موت جو هڪ وڏو سبب آهن ۽ ذیابيطس جي مريض ماڻهن جي ڄمڻ ٻارن ۾ گهڻي قدر تڏهن ٿيندا آهن جڏهن حمل جي پهرين ستن يا اٺن هفتن تائين شگر تي ڪنٽرول نه ڪيو ويو هجي.

ذیابيطس جو مناسب ڪنٽرول نه هجڻ ڪري ماءُ جي رت ۾ شگر ۽ ڪيٽون جهڙن زهريلن مادن جو مقدار وڌي وڃي ٿو جيڪو ناڙي (Umbilical Cord) مان گذري ڪري ٻچيدائيءَ ۾ موجود ٻارڙي تائين پهچي ان کي نقصان پهچائي ٿو ۽ ان ٻارڙي ۾ پيدائشي نقص وڌي وڃڻ جا امڪان زياده هوندا آهن ۽ اهي نقص گهڻي ڀاڱي ٻار جي دل، دماغ يا مٿي ۾ پائي وغيره جي صورت ۾ ظاهر ٿيندا آهن.

ڪجهه ماهرن جو خيال آهي ته نون ڄمڻ ٻارڙن ۾ پيدائشي نقص جو سبب ماڻهن جي رت ۾ شگر جو گهٽجي وڃڻ پڻ آهي.

سامهه کڻڻ جون تڪليفون

پيٽ وارين ذیابيطس جي مريض عورتن ۾ شگر جو صحيح ڪنٽرول نه هجڻ ڪري ٻچيدائيءَ ۾ موجود ٻارڙي جي جسم ۾ انسولين جو وڌندڙ مقدار ٻارڙي جي ڦڦڙن جي مناسب واڌ ويجهه تي اثر انداز ٿئي ٿو ۽ اهڙن ٻارڙن کي ڄمڻ کان پوءِ سامهه جي تڪليف ٿئي ٿي. ٻارڙي جي رت ۾ انسولين جي واڌ نه صرف اهڙي رطوبت جي پيداوار ۾ مداخلت ڪري ٿي جيڪا ڦڦڙن جي واڌ ويجهه لاءِ ضروري آهي پر ان جي علاج وارين دوائن جي اثر کي به گهٽ ڪري ڇڏين ٿيون. ۽ اهڙن ٻارڙن ۾ سامهه کڻڻ

وارو نظام وڌيڪ ڪمزور هجڻ جا انديشا ٿين ٿا ۽ گهڻ ٻارن کي ته ڄمڻ کان پوءِ هٿرادو سامهه يا آڪيسجن تي رکڻو پوندو آهي.

دل جون تڪليفون

ذیابيطس جي مريض پيٽ وارين عورتن ۾ شگر جي صحيح ڪنٽرول نه هجڻ ڪري نتيجي ۾ سندن ڄاول ٻار ۾ دل جا پڌائشي نقص ٿي سگهن ٿا. جنهن جون نشانيون هي آهن.

- ٻارڙي جو هر ٻلو يا نيرو ٿي وڃڻ
- کير نه پيڻ.
- سست پيو رهڻ.
- جسم ٿڌو ٿي وڃڻ.

رت ۾ ڪنڊ جي گهٽتائي

اهڙي طرح جيڪڏهن ماءُ جي ذیابيطس صحيح ڪنٽرول ۾ ناهي ۽ رت ۾ شگر جو مقدار وڌيل آهي ته اها ناڙي ذريعي ٻچيدائيءَ ۾ موجود ٻارڙي تائين پهچندي رهي ٿي. جڏهن ته ماءُ جي رت ۾ موجود انسولين ناڙي مان گذري نه ٿي سگهي. اهڙي طرح ٻارڙي جي رت ۾ شگر جي واڌ ان جي لبلبي مان گهڻي مقدار ۾ انسولين خارج ڪري ٿي. هي سلسلو ٻارڙي جي ڄمڻ سان ختم ٿئي ٿو. جيئن ته پيدائش کان پوءِ ماءُ جي رت جي ڪنڊ ٻارڙي تائين پهچي نه ٿي سگهي پر ٻار جو لبلبو انسولين بنايڻدو رهي ٿو جنهن ڪري ڄمڻ کان فوراً پوءِ ٻار جي رت ۾ شگر جي گهٽتائي ٿئي ٿي ۽ ان ڪري ٻار تيزي سان سامهه کڻندو آهي. کيس پگهر ايندا آهن ۽ ان کان سواءِ ٻي چيني ۽ جهٽڪا ٿي پوندا آهن.

خاص طور تي اهڙيون ماڻهن جن جو پيٽ دوران ذیابيطس تي ڪنٽرول نه رهيو هجي کي گهرجي ته پنهنجي ٻارڙن جو هر چئن ڪلاڪن کان پوءِ رت تيست ڪرائين ۽ جيڪڏهن مٿين ڪا نشاني ظاهر ٿئي ته ان جو جلد تدارڪ ڪن.

رت ۾ ڪيلشم ۽ ميگنيشم جي گهٽتائي

اهڙيون ڳڀيل عورتون جيڪي ذیابيطس جي ڪنٽرول لاءِ انسولين لڳرائينديون آهن. انهن جي ٻارڙن ۾ ڄمڻ کان پوءِ پهريائين

ٻن يا ٽن هفتن تائين رت ۾ ڪيلشم ۽ ميگنيشم جي گهٽتائي رهي ٿي. ان جو بنيادي سبب اهو آهي ته نئين ڄاول ٻار جا غدود Parathyroid Glands ديسر سان ڪم ڪرڻ شروع ڪندا آهن. اهڙن ٻارن ۾ جهٽڪا اچڻ لڳندا آهن.

سائي يا يوقان

اهڙيون ماڻهن جن ۾ ذیابيطس جو صحيح ڪنٽرول نه هجڻ ڪري ٻار وقت کان اڳ ڄمي پوندو آهي انهن ٻارڙن جي رت ۾ (Bilirubin) وڌي وڃي ٿي جيڪا سائيءَ جي صورت ۾ ظاهر ٿئي ٿي. ان کان سواءِ سندن رت ۾ ڳاڙها جزا به وڌي ويندا آهن جن سان سائي جو خـطـرو وڌي ويندو آهي.

گردن جي وچن ۾ وڪاوت:-

(Renal Vein thrombosis)

هيءَ تمام گهٽ ٻارڙن ۾ ٿيندي آهي هن جو بنيادي سبب رت ۾ ڳاڙهن جنن جو وڌي وڃڻ ۽ دل جو صحيح ڪم نه ڪرڻ آهي. هي ٻئي ڳالههين رت جي واهپي کي سست ڪن ٿيون.

آنڊن جي تڪليف

هي گهٽ ٻارڙن ۾ ٿئي ٿي، جنهن سبب وڏي آنڊي جي سسٽن ڪري ٻار کي التيون ٿي پونديون آهن ۽ پيٽ آڦرجي پوندو آهي. خوش قسمتي سان هي بيماري بغير علاج جي خود بخود صحيح ٿي ويندي آهي.

ذیابيطس وارين ماڻهن جا ٻار عام طرح سان سگها ٿيندا آهن. سندن ذهني ڪيفيت به ليڪ هوندي آهي پر جڏهن حمل دوران ماءُ جي خون ۾ ڪنڊ گهڻي وڌيل هجي يا وري پيشاب ۾ ڪيٽون ايندي هجي ته اهڙين ماڻهن جا ٻار وڌيڪ ذهين نه ٿيندا آهن. ان کان سواءِ ڪجهه دماغي بيماريون جهڙوڪ مرگهي وغيره ٿيڻ جا انديشا به ٿي پوندا آهن. زياده تر انهن بيمارين جو سبب وقت کان اڳ ٻار جو ڄمڻ، گهٽ وزن وغيره هوندو آهي.

(هي مضمون پاڪستان ڊائيٽيز ايسوسيئيشن جي ماهوار ذیابيطس ڊائجسٽ تان ورتل آهي.)

صحت سڌ سماءَ

سمنڙيندڙ: اسحاق گل

ڄمون - ذيا بيطس جي مريضن لاءِ هڪ ترياق يا زهر

ڪراچي جي هڪ ڊاڪٽر ”ڊان“ اخبار ڪراچيءَ کي خط لکي عام ماڻهن کي ”ڄمون“ جي ڪن طلسمي اثرن کان باخبر ڪيو آهي جنهن ۾ هن چيو آهي ته، ڄمون اونھاري جي مند جو ميوو آهي جيڪو تمام ٿورڙو وقت، اٽڪل ٻه مهينا، جون کان جولاءِ تائين مس ٿو هلي. اسان جي ملڪ ۾ اهو جهجهو ٿئي ٿو ۽ جيتوڻيڪ خاص طور سنڌ ۽ پنجاب ۾ جام لهي ٿو پر تنهن هوندي به 40 کان 60 روپيا في ڪلو کان گهٽ نٿو وڪامي.

ذيا بيطس جي مريضن لاءِ اهو هڪ موھيندڙ ميوو آهي جيڪو هو ترياق طور استعمال ڪن ٿا، نه رڳو ايترو پر ڄمون جي موسم ۾ ذيا بيطس جا ڪيترا مريض ته، پنهنجيون سڀ انگريزي دوائون کائڻ بند ڪري ڇڏين ٿا ۽ پوءِ رڳو ۽ رڳو ڄمون واپرائيندا رهن ٿا ايتري قدر جو ڪيترن اهڙن مريضن ته پنهنجي لاءِ ڄمونءَ جي ڪاٺيءَ جا پيالا به ٺهرائي ڇڏيا آهن جيڪي هو پاڻيءَ پيئڻ لاءِ ڪتب آڻن ٿا ۽ دوائن ڇڏڻ سبب هو ڪيترن پيچيده بيمارين جهڙوڪ: بلڊ پريشر، موٽي پاڻي، دل جي مرضن، بڪين جي ناڪاره ٿيڻ ۽ ڪاربنڪيولس (Carbunculus) وغيره جو شڪار ٿي پون ٿا.

مان جڏهن اهڙن ٻن مريضن کي

تپاسيو ته مون کي فاسٽنگ ۽ رنڊم بلڊ ٽيسٽ مان خبر پئي ته هو هائپر گلائيسيميا يعني ته هاءِ بلڊ شگر جو شڪار هيا ۽ انهن مان هڪڙي جي بڪين ته ڪم ڪرڻ به ڇڏي ڏنو آهي جنهن ڪري هو هاڻ هي موڊائليسس ڪرائي رهيو آهي.

جيستائين ڪنهن ميوي يا ميوي جي ٻجن جي سائنسي بنيادن تي مڪمل ڇنڊ ڇاڻ نه ٿي ڪئي وڃي تيستائين ان ميوي يا ميون جي ڪن ٻجن جي فائدين بابت عام ماڻهن کي واپرائڻ لاءِ صلاح مشورا ڏيڻ هڪ ڏوهه جي برابر آهي. ان سلسلي ۾ اسان جي اليڪٽرونڪ ميڊيا به ايتري ئي ذميواري آهي ڇو ته اها به ان ڄاڻ ماڻهن تائين اهڙيون ڪويجي ڳالهيون پهچائيندي رهي ٿي. اسان جا معتبر حڪيم، طبيب ۽ اهڙا ٻيا جڙين ٻوٽن جا ماهر جڏهن ٿي وڃن ٿا اچي اهڙن ميون جي فائدين بابت عام ماڻهن کي ڳالهيون ٻڌائين ٿا ته کين ساڳئي وقت اهو به ٻڌائڻ گهرجي ته دوا طور جسم ۾ انهن جا ڪهڙا اثر پيدا ٿين ٿا ۽ انهن جي ڪيميائي جوڙجڪ ڪهڙي آهي، ان لاءِ کين اهڙن بين الاقوامي طبي رسالن/جرنلن جا حوالا ضرور ڏيڻ گهرجن.

جيستائين ڄمون جو تعلق آهي ته، ان جي ڳر کائي ڪو ڪڙو اڇلايو ويندو آهي. جيئن ته ڳر مٺي آهي، ان سبب رت ۾

ڪنڊ جو مقدار غير رواجي طور تي وڌي وڃي ٿو ۽ منجهس ذيا بيطس کي ختم ڪرڻ جو به ڪو اثر موجود ڪونهي. جڏهن ته ڄمونءَ جي ڪوڪڙي جي وري اها خاصيت آهي ته منجهس الڪلوائڊ (جمبو سائڻ) هجڻ سبب اهو جڏهن استعمال ڪجي ٿو ته ڊگهي عرصي تائين سخت قسم جي هائپو گلائيسيميا/لو بلڊ شگر پيدا ڪري وجهي ٿو، اهڙا تجربا سئين رستي ڪتن تي ڪيا ويا آهن. پر جڏهن اهي وات رستي واپرايا وڃن ٿا تڏهن انسانن جي ذيا بيطس گهٽائڻ جو اثر بنهه نٿا رکن. (مترجم - علي مرتضيٰ ڌاريجو)

پروفيسر علي محمد انصاري
پاڪستان ميڊيڪل انسوسائيٽيشن جو
پريزيڊنٽ اليڪٽ چونڊجي ويو.

ڪراچي (ويج رپورٽ) هڏي جي بيمارين جو مشهور سرجن ۽ اڳوڻو ڊائريڪٽر جنرل هيلٿ پروفيسر علي محمد انصاري جيڪو ماهور ويڇ جو سرپرست به آهي پاڪستان ميڊيڪل ايسوسيئيشن جو بنا مقابلي مرڪزي پريزيڊنٽ اليڪٽ چونڊجي ويو آهي ۽ سال 96-1995 دوران پي-ايم اي جي مرڪزي صدر جي حيثيت سان ڪم ڪندو جڏهن ته ڊاڪٽر ڪليم بٽ موجوده مرڪزي سيڪريٽري جنرل ايندڙ ٻن سالن لاءِ ٻيهر ساڳي عهدي تي چونڊجي آيو آهي

ڪراچي واٽر اينڊ سيوريج بورڊ گيلپ ٽينڊر نوٽيس



ايگزيڪيوٽو انجنيئر اسٽور ۽ پرجيز ڊويزن ڪي ڊبليو ۽ ايس بي طرفان هيٺيان اسٽور ايڪس اسٽاڪ بنياد تي مهيا ڪرڻ لاءِ مال ٺاهيندڙن، واپارين، ۽ ريزڪي وڪرو ڪندڙن کان مهربند ٽينڊر گهرائجڻ ٿا.

جريان نمبر	اسٽورن جو تفصيل	فائيل نمبر	سوٽي رقم	ٽينڊر جي قيمت	ڪلڻ جي تاريخ
۱-	پري پرنٽيڊ واٽر/ رٿيل ڪمپيوٽر بلز.	بي يو-۱۵/I / ٽيڪس / ۹۲-۹۳	۲%	۳۰۰ روپيا	۹۳-۱-۲
۲-	پري پرنٽيڊ ايف ٽي ۽ سي ٽي ڪمپيوٽر بلز.	بي يو-۱۶/I / ٽيڪس / ۹۲-۹۳	۲%	۳۰۰ روپيا	-"

نالي لکيل مهربند ٽينڊر ايگزيڪيوٽو انجنيئر اسٽور اينڊ پرجيز ڊويزن جي آفيس واقع نائون ميل سامهون ڪارساز ڪراسنگ، شارع فيصل ڪراچي ۾ مٿي ڏيکاريل تاريخ تي ۱۱-۰۰ وڳي تائين ڏينهن جو وصول ڪيا ويندا ۽ ساڳي ڏينهن تي ساڍي يارهين وڳي ڏينهن جو اهڙن ٺيڪيدارن جي روبرو، جيڪڏهن ڪي هوندا، ڪوليا ويندا.


ٽينڊر فارم جن ۾ شرط ۽ ضابطا ۽ تفصيلي صراحتون شامل آهن سي مٿي بيان ڪيل آفيسر جي آفيس مان هر هڪ جي سامهون ڏيکاريل ٽينڊر جي قيمت (ناقابل واپسي) پڻ تي ٽينڊر ڪلڻ کان هڪ ڏينهن اڳ ۱۱-۰۰ وڳي تائين حاصل ڪري سگهجن ٿا. ٽينڊر جي قيمت حبیب بینک لميٽيڊ، سنڌ سيڪريٽريٽ برانچ يا حسن اسڪوائر برانچ ۾ جمع ڪرائڻ گهرجي، جن لاءِ هن آفيس مان چالان حاصل ڪري سگهجن ٿا.

بورڊ سواءِ ڪنهن سبب ٻڌائڻ جي ڪوبه يا سڀ ٽينڊر قبول يا رد ڪرڻ جو حق محفوظ رکي ٿو.

بقايائون بروقت ادا ڪريو

ڪي ڊبليو ايس بي 92/360/
انفرميشن/ڪراچي 6395

ڪراچي ميٽروپوليٽن ڪارپوريشن ٽينڊر نوٽيس



ڪي ايم سي جي مڪينڪل ۽ اليڪٽريڪل جي ڪمن لاء منظور ليڪيڊارن، جن سال 93-1992ع لاء تجديد ڪرائي هجي، تن کان هيٺ ڏنل ڪمن لاء مهربند ٽينڊر گهرائجن ٿا.

- 1- ڪي ايم سي قلندريا چورنگي لاء اسٽريٽ لائيت پول مهيا ڪرڻ/لڳائڻ.
ڪٽيل رقم -/16593
پلس آئٽم ريت
في ٽينڊر جو ملهه 200/-
ٽينڊر جي ڪل رقم
جو 2 سيڪڙو سوٽي
- 2- گلشن مصطفيٰ فائر اسٽيشن سهراب ڳوٺ ڪي ايم سي جي نون ٺهيل فليٽن ۾ بجلي هڻڻ
ڪٽيل رقم -/180195
پلس آئٽم ريت
في ٽينڊر جو ملهه 200/-
ٽينڊر جي ڪل رقم
جو 2 سيڪڙو سوٽي
- 3- ڪريم آباد پل ڪي ايم سي جي سڌاري ۽ سنڀال جو ڪم
ڪٽيل رقم -/2763
پلس آئٽم ريت
في ٽينڊر جو ملهه 200/-
ٽينڊر جي ڪل رقم
جو 2 سيڪڙو سوٽي
- 4- نواب صديق علي خان روڊ ڪي ايم سي وٽ اسٽريٽ لائيت مهيا ڪرڻ/لڳائڻ
ڪٽيل رقم -/40238
پلس آئٽم ريت
في ٽينڊر جو ملهه 500/-
ٽينڊر جي ڪل رقم
جو 2 سيڪڙو سوٽي

ٽينڊر جا ڪاغذ پٽ شرطن ۽ ضابطن سميت ايگزيڪيوٽو انجنيئر (ايم ائنڊ اي II) ۽ سپرنٽينڊنگ انجنيئر (ايم ائنڊ اي) ڪي ايم سي، ٻئي واقع ڪي ايم سي ورڪشاپ نشتر روڊ ڪراچي جي آفيسن مان مٿي ڏيکاريل ٽينڊر ملهه (موت جو ڳوٺ نه) ڪنهن به مڃيل بئنڪ مان ورتل پي آرڊر جي صورت ۾، جي ادائگي تي حاصل ڪري سگهجن ٿا. ٽينڊر جا ڪاغذ پٽ چيف انجنيئر (ايم ائنڊ اي) واقع ڪي ايم سي ورڪشاپ نشتر روڊ ڪراچي ۽ سينٽرل انڪوائري آفيس واقع ڪي ايم سي مين بلڊنگ ايم اي جناح روڊ ڪراچي جي آفيسن مان مٿي ڄاڻايل ادائگي تي پڻ حاصل ڪري سگهجن ٿا.

ٽينڊر سان 2 سيڪڙي سوٽي جو پي آرڊر شامل هجڻ گهرجي ۽ ٽينڊر، چيف انجنيئر (ايم ائنڊ اي) ڪي ايم سي واقع ڪي ايم سي ورڪشاپ نشتر روڊ ڪراچي جي ٻاهران رگيل ٻيٽي ۾ 93-1-7ع تي 11:30 وڳي تائين وجهڻ گهرجن. جيڪي ساڳئي تاريخ ۽ وقت تي موجود مڙني واسطيدارن، جيڪي موجودگي جي خواهش رکندڙ هوندا، تن آڏو ڪوليا ويندا. ڪي ايم سي بنا سبب ٻڌائڻ جي ڪنهن هڪ يا سمورين آڇن کي رد يا قبول ڪرڻ جو حق پاڻ وٽ رکي ٿي.

صحيح

ڪراچي ميٽروپوليٽن ڪارپوريشن

ڪي ايم سي 733/92
انفارميشن/ڪراچي: 6421

راکسينول ڇا آهي؟

راکسينول هڪ طاقتور ۽ بي ضرر دوا آهي جيڪا بغير ڪنهن جوکي جي، ڇمڙي کي ڪيترن ئي جيوڙن کان نجات ڏياري ٿي.

استعمال

هڪ وڏو ڇمڇو پاڻي جي بالٽي ۾ ملائي وھجڻ سان توهان جو جسم ڪيترن ئي جيوڙن کان پاڪ ۽ صاف ٿي ويندو.

شيوڪرڻ لاءِ

چند قطرو راکسينول شيو واري پاڻي ۾ ملائي استعمال ڪرڻ سان ڇمڙي کي چير وغيره اچڻ جي حالت ۾ اها جڳهه جيوڙن کان پاڪ رهندي ۽ زخمو خراب ٿيڻ جو خطرو گهٽجي ويندو.

وات جي صفائي

چند قطرو راکسينول هڪ ڪي گهر پاڻي جي گلاس ۾ ملائي وات جي صفائي لاءِ استعمال ڪري سگهجي ٿو.

اسپتال ۾

اسپتال ۾ استعمال ٿيندڙ مسلمان ۽ شرما ميٽر وغيره کي پڻ راکسينول سان جيوڙن کان صاف ڪري سگهجي ٿو.

هر گهر جي ضرورت
پوري گهرائي جي حفاظت
راکسينول
THE PROTECTION YOU NEED



احتياط

هي دوا صرف ڇمڙي جي مٿان استعمال ڪرڻ گهرجي.
ٻارن جي پھچ / رس کان پري رکڻ گهرجي.

زخمو هجي يا ڦٽ، يا لڳي جيت جڻي جو چڪ

راکسينول

جو هڪ چانه وارو ڇمڇو پاڻي جي گلاس ۾ ملائي ڦٽ صاف ڪرڻ يا ڏوڻ سان ڇمڙي جي بهتر حفاظت ڪري سگهجي ٿي.



تیار کنندہ،

ڪراچي فارماسيوٽيڪل ليبارٽريز ڪراچي