



سائنس

جون ۱۹۷۲ء





ڊئريڪٽوريٽ آف ايڊيوڪيشن حيدرآباد ريجن طرفان تعليمي ادارن لاء منظور ڪيل

سال [۲]

پرچو [۶]



جون ۱۹۷۲ع



قيمت

في ڪاپي ————— ۱۰۰ ۷۵
ساليانه —————

۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

مضمونن لاء:- ”
سالانه خريداري لاء:- ”مضمون

مئنيجنگ ايڊيٽر

ڊاڪٽر ممتاز علي قاضي



اسسٽنٽ ايڊيٽر

مرتضيٰ پٽي - ظفر حسن



الڊور ٽائز مينٽ انچارج

گل محمد مستوئي



آفيس

”انسٽيٽيوٽ آف ڪيمسٽري“

يونيورسٽي آف سنڌ، ڄامشورو

فون:- 25981/9




سر ورق

دنيا جا قديم حيوان

(۱) ساڄي پاسي: ”انڪيلاوسارس“ (Ankylosaurus)

(۲) ڪاٻي پاسي: ”ٽائرنوسارس“ (Tyrannosaurus)





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالشَّمْسُ وَضُجَاهَا ۝ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۝ وَالنَّهَارُ
إِذَا جَلَّهَا ۝ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ۝ وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا ۝
وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَّهَا ۝ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ فَأَلْهَمَهَا
فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ
مَنْ دَسَّاهَا ۝



شاهد آهن سج ۽ سندس روشني، ڪائناتس پٺيان ايندڙ چنڊ،
روشن ٿيل ڏينهن، کيس ڍڪي ڇڏيندڙ رات، آسمان ۽ کيس ٻڌائيندڙ،
زمين ۽ کيس پکيڙيندڙ انسان ۽ جنهن کيس برابر ٺاهيو، پوءِ کيس
سندس چڱن ۽ برن ڪمن جي سمجهه ڏني. بيشڪ جنهن روح کي پاڪ
ڪيو تنهن مراد ماڻهي، ۽ جنهن ان کي خراب ڪيو سو نقصان ۾ پيو.
(سوره الشمس)




ٿيندو ته سنڌيءَ ۾ سائنسي ڪتابن جو سلسلو نه رڳو نئين دؤر جي تقاضا مطابق اسانجي نؤخير طالب علمن لاءِ پر علمي ذوق رکندڙ عوام جي مختلف طبقن جي ذهني پرورش لاءِ به مددگار ثابت ٿيندو.

سائنسي نظرين جي پرچار لاءِ مذڪور اشاعتي پروگرامن تي عمل ڪرڻ کانپوءِ ان ڏس ۾ هاڻي هڪ ٻيو نمايان قدم کنيو پيو وڃي. اهو آهي سنڌ يونيورسٽيءَ طرفان ”سنڌ سائنس سوسائٽي“ کي ”سائنس ڪانفرنس جي انعقاد“ لاءِ مدعو ڪرڻ - سنڌ ۽ سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ ۾ پنهنجي نوعيت جي اها پهرين ئي ڪانفرنس هوندي، جنهن ۾ سنڌ ۽ پاڪستان جي ٻين حصن جا ممتاز سائنسدان، دانشور ۽ پيشور ماهرين سائنسي موضوعن تي پنهنجي خيالات ۽ جذبات جو اظهار ڪندا. هيءَ ڪانفرنس منعقد ڪرڻ جو هڪ مقصد اهو به آهي ته علائقي جي ماڻهن ۽ تعليم سان تعلق رکندڙ حلقن کي پنهنجي مادري ٻوليءَ جي وسيلي جديد سائنسي علمن ڏانهن لاڙو رکڻ جي ترغيب ڏني وڃي. اميد ته سنڌ يونيورسٽي ۽ سائنس ڪانفرنس جا منتظمين انهيءَ نيڪ مقصد ۾ توقع مطابق ڪامياب ٿيندا.

سائنسي سرگرمين جي حوصله افزائيءَ لاءِ سنڌ يونيورسٽيءَ جي اختياريءَ وارن، خصوصاً موجوده هردلعزيز وائيس چانسلر جناب حسن علي عبدالرحمان، وقت بوقت جنهن نيڪ جذبي ۽ دلچسپيءَ سان تعاون ۽ همت افزائي ڏئي ڪئي آهي، انهيءَ لاءِ اسين سندن شڪرگذار آهيون ۽ اميد رکون ٿا ته سندن ڪوششن سان سنڌ يونيورسٽيءَ جهڙو عظيم تعليمي ادارو ڏينهن ڏينهن ترقيءَ جي راه تي گامزن ٿي پنهنجي علائقي جي گهڻي کان گهڻي خدمت ڪندو رهندو.

سائنس ڪانفرنس جي موقعي جي لحاظ کان اسين ”ماهنام سائنس“ جو ايندڙ پرچو هڪ خاص نمبر جي صورت ۾ پيش ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهيون. خدا گهريو ته اهو خصوصي ايڊيشن به ٻين پرچن وانگر پنهنجو مقرر معيار برقرار رکندو.


مارچ ۱۹۷۲ع



انساني زندگيءَ جي فلاح ۽ بهبود لاءِ سائنس جي جديد نظرين کي قبول ڪري، انهن تي عمل ڪرڻ ۽ سائنسي ادب ذريعي عام ماڻهن کي انهن جي فائدين کان آگاه ڪرڻ جي شديده ضرورت جيتري هن وقت محسوس ڪئي وڃي ٿي، اوتري هن کان اڳ ڪڏهن به محسوس نه ڪئي ويئي هئي. سائنس جي جديد ترين ايجادن ذريعي اڄوڪي دنيا ۾ ظاهر ٿيندڙ انقلابي تبديليون قومن جي قسمت تي اثر انداز ٿي رهيون آهن ۽ انهن حقيقتن جي پيش نظر شايد ئي ڪو ڏي فهم، سائنسي ترقيءَ جي اهميت کان اڻ ڄاڻ هجي.

سنڌ يونيورسٽيءَ جي اختياريءَ وارن کي وقت جي اهڙي تقاضا جو احساس ته اڳيئي هو جنهنڪري درس و تدريس جي ميدان ۾ اهي پنهنجي وس آهر ڪافي ڪم ڪري رهيا آهن، پر سائنسي علمن کي علائقي جي اڪثريت ۽ مادري يعني سنڌي ٻوليءَ جي جهوليءَ ۾ آڻڻ لاءِ هنن ويجهڙائيءَ ۾ ڪي عملي ۽ بامقصد قدم کڻڻ شروع ڪيا آهن، جن مان ”ماهنام سائنس“ جو اجراءُ پهريون قدم آهي. ساڳئي مقصد هيٺ ”سائنس پبليڪيشنس“ جي نالي سان قائم ڪيل نئين اداره طرفان سائنسي موضوعن تي مستند ڪتابن جي اشاعت جو سلسلو پڻ عنقريب جاري ٿي رهيو آهي. ”ماهنام سائنس“ ذريعي هيستائين سائنسي ادب جي خاص ميدان ۾ بجا آندل خدمتن جو جيڪو خوشگوار رد عمل ظاهر ٿيو آهي، ان مان ائين سمجهڻ بيجا نه

سائنس



قديم زمانی جا حيوان




رهندا هئا. ان زماني جي هڪ جاندار ”ٿريلوبائيٽ“ جا تمام گهڻا ڍانچا مليا آهن. ائين معلوم ٿئي ٿو ته سمنڊن جا سمنڊ انهن جاندارن سان ڀريل هئا، پر ڪجهه وقت کان پوءِ هڪ ٻيو جانور ترقي ڪري ٿريلوبائيٽ جو دشمن بڻيو جنهن هٿن کي پنهنجي خوراڪ بڻائڻ شروع ڪيو. ان جو نالو ”نوٽيلس“ آهي. هي جانور ڪڏهن ڪڏهن موجوده زماني جي سمنڊن مان پڻ لپندو آهي. خيال ڪيو وڃي ٿو ته ان زماني ۾ ٻوٽن ۽ مڇين پڻ جنم ورتو. اهو زمانو اڄ کان اٽڪل ڪروڙ سال اڳ جو آهي. ان زماني ۾ هڪ ”آرٿر“ نالي هڪ مڇيءَ جون خوفناڪ ڏانئون ۽ چاقوءَ ڏند هوندا هئا جيڪا پاڻيءَ ۾ رهندڙ ٻين جانورن کي گهٽي ويندي هئي ۽ انجو مٿ ڪو ٻيو جانور سمنڊ قدرت انهيءَ بي رحم مڇيءَ کي جلد ختم ڪري ڇڏڻ کانپوءِ ڪيتريون ئي ٻيون مڇيون پيدا ٿيون جن ۾ سيناڦاسي (هيءَ مڇي رنگين قسم جي هوندي هئي) ۽ ششدار مڇي اچي وڃن ٿيون. آسٽريليا، آفريڪا ۽ ڏکڻ آمريڪا ششدار مڇين جي مطالعي سان معلوم ٿيو آهي ته شروعات انهن مڇين کي ڪا زبردست مصيبت سامهون آئي هئي جنهن ڪري هنن پاڻي کان ٻاهر نڪرڻ جي ڪوشش هوندي. موجوده ششدار مڇين جو طريقو هوندو آهي ته ڪنهن خشڪ سال ۾ پاڻي سڪي ويندو آهي ته اهي رهڻ جي جڳهه نه ملڻ ڪري گپ ۾ اندر هڪ ٻئي ٺاهي ان ۾ جون ۱۹۷۲ع

انسان جي پيدائش کان اڳ هن زمين تي ڇا هو؟ انسان کي پيدا ٿيندي ته فقط ٻه اڍائي لک سال مس ٿيا هوندا، جڏهن ته زمين کي وجود ۾ ايندي ٻه ارب سال ٿي چڪا آهن! ڇا ايترو عرصو هيءَ زمين غير آباد هئي؟ ڪافي تحقيق کانپوءِ انهيءَ سوال جو جواب ملي چڪو آهي ته ڪروڙها سالن کانوڻي هن زمين تي زندگيءَ جو وجود رهندو آيو آهي. زندگيءَ جو اهو ثبوت عجيبو غريب جانورن جي موجودگيءَ مان ملي ٿو. هي زمانو انسان خود نه ڏٺو پر اهو سڀڪجهه انهن قديم آثارن مان ظاهر ٿيو آهي، جيڪي هن زمين تي ڪئي ڪئي ملي رهيا آهن.

ساهرن کوجنا ڪئي آهي ته اڄ کان ڪروڙين سال اڳ هن زمين تي عجيب قسم جا جانور ۽ پکي رهندا هئا. انهي زماني جا جانور موجوده جانورن کان قد ۽ طاقت ۾ تمام وڌيڪ هوندا هئا، موجوده زماني ۾ هاڻي خشڪيءَ جو وڏي ۾ وڏو جانور آهي جنهن کي ماڻهو ڏسي عجب ۾ پئجي وڃن. جيڪڏهن هاڻيءَ کي ان زماني جي ڪنهن جانور سان گڏ بيهاريو وڃي ته هاڻي جيڪر هڪ تمام ننڍڙو ٻچڙو نظر اچي!

ڪروڙها سال اڳ موجوده ترقيءَ جي اڪثر جڳهين تي رڳو پاڻي ئي پاڻي هوندو هو، جنهنجي گهرائي اٽڪل ڇهه سو فوٽ هوندي هئي ۽ انهيءَ ۾ طرحين طرحين قسم جا جاندار سائنس

جو منهن ويڪرو هو جنهن ۾ اکين جا ٻه سوراخ هوندا هئس ۽ هنجي گچي اٺ جي گچيءَ کان به ڊگهي هوندي هئي. هن جي وات ۾ تڪا ڏند هوندا هئا. هي دريائن جي ڪنارن وٽ واريءَ تي رهندو هو ۽ جڏهن بک لڳندي هيس ته پاڻيءَ ۾ لهي



برونٽو ساريس (Bronto Saurus)

هي جانور اٽڪل ۳۰ فٽن ڊگهو هوندو هو ۽ سندس گذران اڪثر گاهه تي ٿيندو هو. هڪ اندازي موجب هي روزانه اٽڪل ڏهن من گاهه يا پايون کائيندو هو. هن جانور جو نسل امريڪا ۾ لڌو ويو آهي.

شڪار ڪري ايندو هو. هي جانور اڳتي هلي اڳي کان وڌيڪ مضبوط، چست ۽ گهمڻ جي صلاحيت ۾ وڌي ويو. هن سان مقابلو ڪرڻ لاءِ وري هڪ قسم جا ٻيا جانور پيدا ٿيا جنجي قوت رفت رفت وڌندي ويئي ۽ اهي ڌرتيءَ تي هڪ وڏي طاقت بنجي ويا. انهن کي ”اسٽيگوساريس“ چوندا آهن. هن جانور جو جسم ۲ فوٽ هوندو هو، پيرن ۾ ڊگها ننهن هوندا هئا ۽ وات ۾ ڊگها ٽڪا ڏند هوندا هئس. هن کي ان زماني جو شينهن به چوندا آهن. هن سان ڪو ٻيو جانور مقابلو نه ڪري سگهندو هو ڇو جو هن جي پٺيءَ تي وڏا ۽ نوڪدار ٿوها هوندا هئا جن سان دشمن جو مقابلو ڪندو هو.

(تصوير لاءِ ڏسو صفحو ۷)

انهيءَ کان پوءِ برفاني دؤر آيو. سرديون انتهائي وڌي ويون ۽ دنيا جا گهڻا علائقا برف سان ڍڪجي ويا. انجو نتيجو هي نڪتو جو هن دنيا مان گهڻا جاندار هميشه لاءِ ختم ٿي ويا. ان کانپوءِ وري هڪ نئون دور آيو جيڪو اڄ کان ساڍا سترهن ڪروڙ سال اڳ جو دور هو. اهو دور اٽڪل ساڍا ۱۹۷۲ جون

ويهي رهنديون آهن ۽ پنهنجن ٿڌن ۾ ساهه کڻڻ لاءِ هوا جمع ڪري رکنديون آهن. اهڙي طرح خوراڪ کانسواءِ به اهي مڇيون زندهه رهي سگهنديون آهن ۽ وري جڏهن پاڻي ايندو آهي ته هو پنهنجن پرن کان ٻاهر نڪري اينديون آهن ۽ معمولي مڇيءَ وانگر زندگي گذارينديون آهن. ائين معلوم ٿئي ٿو ته ان زماني ۾ خشڪ ساليءَ سبب تلاءُ نديون سڪي وينديون هيون يا انهن ۾ ٿورو پاڻي لهندو هوندو هو جنهن ۾ مڇين کي زندهه رهڻ مشڪل ٿي پوندو هو ۽ جڏهن مٽيءَ ۾ گهڙي وڃڻ سان به ڪم نه ٺهيو ته شايد مڇين مجبور ٿي هوا ۾ ساهه کڻڻ جي ڪوشش ڪئي. اهڙيءَ طرح هنن جي جسم ۾ آهستي آهستي هوا برداشت ڪرڻ کانپوءِ ٿڌ پيدا ٿيا هوندا. ممڪن آهي ته پاڻيءَ کان ٻاهر نڪرڻ جي ڪوشش ڪندي هنن پنهنجيون ڪنڀرائيون استعمال ڪيون هجن ۽ اهڙيءَ طرح زور پوندي بوندي انهن جو جسم ۽ ڪنڀرائيون مضبوط ٿي ويا هجن ۽ اڳتي هلي ان ڪنڀرائين مان سندن هٿ پير ٺهي ويا هجن. هيءَ سموري تبديلي گهٽ ۾ گهٽ هڪ پن هزارن سالن ۾ ٿي هوندي ۽ اهو زمانو اڄ کان اٽڪل ۳۰ ڪروڙ سال اڳ جو هوندو. هتي اها ڳالهه به قابل ذڪر آهي ته جتي جتي پاڻي سڪندو ويو اتي گپ ۾ طرحين طرحين جانورن ۽ وڻ پيدا ٿيندا ويا جيڪي پڻ سوين فوٽ اوچا هوندا وڻ ٿڻ وقت سان گڏ پڪڙجندا ويا ۽ انهن جا پن، وڏا وڏا ڌار جهونا ٿيندا ڪرندا ويا جنهن ڪري ڍير ٺهندا ويا. ڪجهه وقت کان پوءِ انهن جي مٿان جا تهر چڙهي ويا ۽ ڪروڙين سالن جي دٻ ڪري اهو حاڪم ڪوئلي جي صورت ۾ بدليجي ويو موجود زماني ۾ دنيا جي مختلف هنڌن تي جيڪو ڪوئلو ٺهي ٿو اهو انهيءَ ڳالهه جو ثبوت آهي.

اهڙيءَ طرح ڪروڙين سالن جي تبديليءَ کانپوءِ مڇين هڪ قسم جي جانورن جي صورت اختيار ڪئي جن کي ريپٽائلس (Reptiles) سڏيو وڃي ٿو. هي پهريان جانور آهن جيڪي بلڪل آزاد ۽ خشڪي تي ٿي رهندا هئا. هنن جانورن ۾ هڪ قسم جو جانور جيڪو سڀني کان وڏو ۽ حيرتناڪ هو ان کي ”برونٽو ساريس“ سڏيو ويندو آهي. هن جو جسم ۳۰ فوٽ ڊگهو، پير ننڍڙا ۽ بدن ايترو ته ڳڙو هو جو هن کي سندس پير نه ٿي کڻي سگهيا تنهنڪري هن جو پيٽ زمين سان لڳل هوندو هو ۽ ريڙهيون پاڻي هڻندو هو. هن سائنس

فوت ڪن هئي. جيڪڏهن انجي آڏو ماڻهو بهاريو وڃي ته
انجي گوڏي جيترو مس ٿيندو.




ٽائرنو ساروس (Tyranno Saurus)

هي جانور پنهنجي وقت ۾ خشڪيءَ تي رهندڙ گوشت خور
جانورن ۾ سڀ کان وڏو هو. هي پنهنجي طاقتور چنبن
۽ چاڙين سان شڪار ڪندو هو. سندس ڊيگهه اٽڪل
۲۰ فوت هئي. اڪيون خوفناڪ ۽ وات ۾ ڀالن جهڙا
ڏند هوندا هئس.

ان کان به وڏو هڪ ٻيو جانور جنهن کي ”ٻيلو ڊرڪس“
چوندا آهن، اڄ کان ۹ ڪروڙ سال اڳ آمريڪا ۾ پيدا ٿيو.
هي تقريباً ۳۰ فوت اوچو ۽ ۹۰ فوت ڊگهو هوندو ۽ هن جي
ڪنڌ ۽ ٻيچ جي ڊيگهه اٽڪل ۵۲ فوت هئي. هن جو وزن ۵۵
ٽنن جي لڳ ڀڳ يعني ڏهن يا يارهن هالن جي وزن جي برابر
هوندو هو. تازو هڪ انگريز سائنسدان پاڪستان جي بلوچستان
علاقن مان پراڻي زماني جي کير ڏيندڙ جانورن مان هڪ قسم
جي جانور جا هڏا لڌا آهن پر انهيءَ مان جانور جي قدبت جو
صحيح اندازو نه لڳي سگهيو. ٻارهن سالن تان پوءِ وري
منگوليا (چين) مان به هن ئي قسم جا هڏا لڌا جن مان صحيح
اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته هي جانور ۱۷ فوت اوچو هوندو
۽ جيڪڏهن ڪنڌ مٿي ڪري ته ۲۵ فوت اوچي وڻ جا پن
بلڪل آسانيءَ سان کائي سگهندو. هن جو نالو ”بلوچي ٽيرير“
رکيو ويو آهي ڇاڪاڻ ته هن جا هڏا پهرين بلوچستان مان
لڌا هئا. انهن جانورن کان سواءِ ٻيا به ڪيترن ئي قسمن جي
جانورن ۽ پکين جا ڍانچا پڻ مليا آهن.

جون ۱۹۷۲ع



اسٽيگو ساروس (Stego Saurus)

۲۰ فوت ڊگهي هن جانور جي پٺيءَ تي هڏائون ٿوهن
۽ نوڪدار ڪنڊن جون ٻه قطارون آهن. سندس مٿو تمام
ننڍڙو هو. هي ٻه گهڻو ڪري گاهه ۽ ٻوٽن تي گذران
ڪندو هو.

ٻارهن ڪروڙ سال هليو. انهيءَ زماني ۾ ڪيترا ٻيا جانور ۽ کير
ڏيندڙ جانور پيدا ٿيا. هن دور ۾ هڪ قسم جا جانور ”ڊينوساروس“
(جيڪي ڪرڙيءَ جهڙا هئا) پيدا ٿيا. انهن جا به
وري به قسم هئا جن مان ڪي گاهه کائيندا هئا ۽ ٻيا گوشت
خور هئا. گوشت خور ڊينوساروس ڪي وڏي قد جا ته ڪي وري
ننڍي قد جا هوندا هئا. ننڍي قد جا ڊينوساروس سڀي جيترا به
ٿيندا هئا ۽ وڏن به پنجن کان ڏهن فوٽن تائين هوندا هئا.
ڊينوساروس وقت سان گڏ هلي اٽڪل ۴۷ فوٽن تائين
پهچي ويا ۽ سندن قد به اوچو هوندو هو. انهن
کي وري ”ٽريڪو ڊون“ چوندا هئا. هن جو ٻيچ به تمام
وڏو هوندو هو هي جانور پنهنجن پوين پيرن تي هلندو هو
۽ سندن وات ۾ ڪارائيءَ وانگر ڏند هوندا هئا. جيئن جيئن
زمانو گذرندو ويو ته انکان به وڏا جانور پيدا ٿيڻ لڳا، جن ۾
هڪ جانور ”ٽائيم ڊوساروس“ پيدا ٿيو. هن جو ٻيچ ۽ جسم سندس
سندس پويان پير سنڀاليندا هئا، سندس ٻيچ ۽ سندس جسم
جو توازن قائم رکندو هو. هن جا هٿ وري تمام ننڍا هوندا
هئا. هن جو منهن چئن فوٽن کان به وڌيڪ ڊگهو ۽ ٽي
فوت کن ويڪرو هو. هنجي وات ۾ اڌ اڌ فوت جا ڊگها
ڏند هئا. هن خطرناڪ جانور جي ڊيگهه ۷۴ فوت ۽ اوچائي ۲۰

سائنس

"بيريليم" — هڪ قيمتي ڌاتو

ڪچي ڌاتوءَ جي ذخيرن جو پتو پئجي سگهندو. ڪيترين ڪمپنين انجي ڳولا جو ڪم به شروع ڪري ڏنو آهي.

بيريليم جون خاصيتون

هيءَ ڌاتو اليومينيم جي مقابلي ۾ تمام هڪڙو ٿيندو آهي، پر ٻين سڀني ڌاتن کان وڌيڪ سخت ٿيندو آهي. طاقت ۾ ڪنهن به فرق اچڻ کان سواءِ حرارت جو تمام وڏو مقدار جذب ڪري وڃي ٿو ۽ سختيءَ ۾ فولاد کان وڌيڪ سخت ٿيندو آهي.

خلائي پرواز جي سلسلي ۾ موجوده منصوبو اهو آهي، ته خلا ۾ موڪلج واري ڪنٽيوليئر تي بيريليم چرٽر هيل هجي، جيڪو انهن کي تپش کان بچائي. ڪنٽيوليئر جي نقشه سازي ۽ منصوبه بندي ڪئي ويندي آهي؛ جيئن اهو خلا ۾ انسان کي وٺي وڃي ۽ موٽائي سگهي. بيريليم جي استعمال سان ان ڳالهه جو پورو امڪان آهي، ته اهو انسان کي وڌ ۾ وڌ تپش ۽ انتهائين تبديلين کان محفوظ رکي سگهندو. پرواز جي سلسلي ۾ وزن جو گهٽ هجڻ انتهائي ضروري آهي ۽ بيريليم ان مقصد جي به پوراڻي ڪري ٿو؛ ڇاڪاڻ ته انجو وزن ٽيٽيم ۽ اليومينيم کان به گهٽ هوندو آهي. اليومينيم جي وزن کان هن جو وزن چوٿون حصو گهٽ آهي.

بيريليم جا استعمال

ٻين ڌاتن کي انتهائي سخت بنائڻ لاءِ بيريليم کي ملاوٽ طور به استعمال ڪيو وڃي ٿو. مثال طور جيڪڏهن نڪل سان هن جو ۱۶۸ في سيڪڙو ملايو وڃي ۽ باهه ۾ تپايو وڃي، ته اهو نئون ٺهيل ڌاتو ٻه لک سن هزار في چورس انچ جي طاقت جو بچاءُ ڪري سگهي ٿو. خودڪار پستن، اعلى دٻاءُ جا سلينڊر، پلگ اسپارڪ وغيره ۽ برقي پورسلين وغيره اڄ ڪالھ ڪامياب ۽ نفعي واري طريقي سان ان نئين ڌاتوءَ مان ٺاهيا وڃن ٿا. ان کان سواءِ هي ائٽمي طاقت ۾ نيوتران کسي منعڪس ڪرڻ لاءِ به استعمال ڪيو وڃي ٿو.

"بيريليم" (Berelium) هڪ ڌاتو آهي، جيڪو ويجهڙائيءَ واري زماني ۾ لڌو ويو آهي. جيئن ته پهريائين هن جي استعمال جي ڪنهن کي خبر ڪانه هئي، تنهن ڪري ان کي بيڪار سمجهيو پئي ويو. ڪجهه وقت وقت کانپوءِ انجي ڪارج جي سڌ پيئي، جنهنڪري انجي گهرج وڌڻ لڳي ۽ جڏهن ضرورت وڌڻ لڳي، تڏهن وري انجو ملڻ مشڪل ٿي پيو، جيڪڏهن مليو ٿي ته به ڏاڍو مهانگو. تنهنڪري ان جي ڳولها شروع ڪئي ويئي ۽ آخر وڏين ڪوششن کانپوءِ هينئر نه فقط انجا ذخيرا مليا آهن، پر انجي ڳولها جو طريقو به معلوم ٿي ويو آهي.

اڄوڪي دور ۾ "بيريليم" هڪ اهڙو قيمتي ۽ ضروري ڌاتو آهي، جنهنجو وسيع استعمال خلا ۾ موڪلج واري جسم، ميزائيل، ڪمپيوٽر ۽ لاشعاعي نلين وغيره ۾ عام آهي. اڄ کان اٽڪل ڏيڍ سو سال کن اڳ هي ڌاتو ڳولي لڌو ويو هو. ان کانپوءِ اٽڪل هڪ صديءَ تائين اهو تجربو ڪرڻ ۾ مختلف مرحلن مان لنگهندو رهيو. ان کانپوءِ هڪ اهڙو دور آيو، جڏهن سائنس آخرڪار انجو ڪارآمد استعمال ڳولي ڪڍيو ۽ ڌاتو سان گڏيل مرڪب جي صورت ۾ بجليءَ جي سچن وغيره ۾ استعمال ٿيڻ لڳو.

وري جڏهن خلائي دور آيو ته انجي استعمال ۽ ڪارآمد ٿيڻ جو وڌيڪ احساس ٿيو؛ پر معلوم ٿيو ته هي ايتري وڏي انداز ۾ آهي ئي ڪونه، جو اسانجون ضرورتون پوريون ڪري سگهي. ان کان سواءِ انجي سڃاڻپ به هڪ مشڪل مسئلو هو، ڇاڪاڻ ته هي خالص حالت ۾ موجود نه هوندو آهي ۽ گندڪچري سان اهڙيءَ طرح ته مليل ملندو آهي، جو انکي سڃاڻڻ ڏاڍو مشڪل ٿي پوندو آهي. هينئر ڪشادا ۾ بيريليم جي ذخيري جي امڪانن جو جائزو وٺڻ لاءِ هڪ اوزار ٺاهيو ويو آهي، جيڪو انجي نشاندهي ڪري ٿو. ان اوزار کي "بيريلو ميٽر" (Berelometer) چيو وڃي ٿو. انجي استعمال سان پهريون ڀيرو اهو امڪان پيدا ٿي ويو آهي، ته انجي


سائنس

ڪندو آهي ۽ ريڊيو ۾ لڳل لائوڊاسپيڪر انهن برقي لهرن کي وري ساڳئي ئي آواز جي لهرن ۾ بدلائيندو آهي. يعني آواز مائڪروفون کان هلي لائوڊاسپيڪر مان نڪرندو آهي. ماهنام سائنس جي سالنام ۾ چئين ته لائوڊاسپيڪر بابت معلومات ڏنل آهي تنهنڪري هن مضمون ۾ مائڪروفون جي تشريح ڪجي ٿي.

مائڪروفون مختلف قسمن جا ٿيندا آهن. مثلاً: ڪاربان مائڪروفون، ڪرسٽل مائڪروفون، ڊائنامڪ مائڪروفون ۽ ولاسٽي مائڪروفون وغيره. هتي هر هڪ جو جدا جدا مختصر بيان پيش ڪجي ٿو.

۱- ڪاربان مائڪروفون (Carbon Microphone)


هن قسم جي مائڪروفون جو بنياد هن اصول تي آهي ته ڪاربن جي ذرڙن مٿان داپ تبديل ڪرڻ سان انهن جي رڪاوٽ يا مزاحمت (Resistance) به تبديل ٿيندي. هن ۾ لچڪيدار پردو (ڊاياگرام - Diaphragm) هڪ ننڍڙي ڪاربن جي ٿلهڙي (ڪاربان ڊسڪ - Carbon Disc) سان سختيءَ سان ڳنڍيل ٿئي ٿو. ڪاربن جي اها ٿلهڙي هڪ ذاتي ٿانو مٿان ابرق جي هڪ ٽڪري جي سهاري سان ٻينل هوندي آهي ان ذاتي ٿانو ۾ ڪاربان جا ذرا ڍريءَ طرح ڀريل هوندا آهن.



- ۱- لچڪيدار پردو ۲- ڪاربان جي ٿلهڙي ۳- ابرق جو سهارو
- ۴- ذاتي ٿانو ۵- ڪاربان جا ذرڙا ۶- تارون.

آواز جون لهرون جڏهن لچڪيدار پردي يعني ڊاياگرام سان ٽڪرائجن ٿيون ته انڪي لرزش ۽ آئين ٿيون. ڊاياگرام جي لرزش ۾ اچڻ ڪري سائس ڳنڍيل ڪاربن جي ٿلهڙي بلرزش ۾ اچي ٿي جيڪا وري ذاتي ٿانو ۾ پيل ڪاربن جي ذرڙن تي گهٽ وڌ ٿيندڙ يا تبديل ٿيندڙ داپ وجهي ٿي. جڏهن تارون ٻيڙيءَ سان ڳنڍجن ٿيون تڏهن ڪاربن جي ذرڙن منجهان ڪرنٽ لنگهي ٿو ۽ ڪاربن جي ذرڙن مٿان داپ تبديل ٿيڻ جون ۱۹۷۲ع

مائڪروفون [مشيني ڪن]




جڏهن اسين ڳالهائيندا آهيون تڏهن اسان جي نڙيءَ ۾ رکيل آواز جو دٻو ”وڪل ڪارڊ“ (Vocal Cord) لرزش ۾ اچي ٿو ۽ ان مان آواز جون لهرون نڪري پنهنجي آسپاس جي هوا کي به لرزش ۾ آئين ٿيون. اهي لهرون جڏهن وات منجهان لنگهن ٿيون تڏهن زبان ۽ چپ کين روڪي ۽ ڦيرائي گهيرائي مختلف قسمن جا آواز پيدا ڪن ٿا. وات مان نڪتل آواز جون لهرون وري هوا ۾ پکڙجي وڃن ٿيون ۽ جڏهن اسان جي ڪنن تائين پهچن ٿيون ته اسين اهو آواز ٻڌون ٿا. آواز جون لهرون جيترو پري ٿينديون وينديون آهن اوترو سندن طاقت گهٽبي ويندي آهي. اهوئي سبب آهي جو اسين پري پري جا آواز نٿا ٻڌي سگهون ۽ اسانجي ڪن جو پردو صرف مخصوص طاقت وارن آوازن کان ئي متاثر ٿئي ٿو. جي آئين نه هجي ها ته اسان جيڪر دنيا ۾ ٿيندڙ هر آواز ٻڌي سگهون ها ۽ اهڙي گوڙ گهمسان ۽ اسانڪي زندگي گذارڻ ئي مشڪل ٿي پوي ها.

”مائڪروفون“ هڪ ”مشيني ڪن“ آهي. هن ۽ اسان

جي ڪن ۾ فرق رکڻو هيءُ آهي ته اسان جي ڪن ۾ جيڪو به آواز ڪن جي پردي سان ٽڪرائبو آهي اهو ساڳيءَ صورت ۾ ئي نسن جي ذريعي اسان جي دماغ تائين پهچي ٿو، پر مائڪروفون ۾ وري آواز جون لهرون پردي سان ٽڪرائڻ کانپوءِ برقي لهرن ۾ تبديل ٿي پوءِ تارن جي ذريعي ايمپليفائڻ ڏانهن وينديون آهن. ايمپليفائڻ انهن لهرن کي طاقتور بڻائي لائوڊاسپيڪر ڏانهن موڪلي ٿو ۽ لائوڊاسپيڪر انهن برقي لهرن کي ساڳئي ئي آواز جي لهرن ۾ تبديل ڪري ٿو. ريڊيو اسٽيشن ۾ وري ايمپليفائڻ مان نڪتل برقي لهرن کي ڪجهه ٻين منزلن مان به گذرڻو پوندو آهي ۽ کين برق مقناطيسي لهرن تي سوار ڪري انٽيماوسيلي هوا ۾ ڇڏيو ويندو آهي. اسانجو ريڊيو يا ٽرانسسٽر وري برق مقناطيسي لهرن مان کين جدا سائنس

اهي مقناطيس جي پيدا ٿيل مقناطيسي ميدان ۾ سولائيءَ سان اڳتي پٺتي ٿي سگهندا آهن.



- ۱- پردو (ڊاياگرام) ۲- صوتي ويڙهو ۳- لچڪيدار جوڙ
- ۴- ڍڪ ۵- مستقل مقناطيس ۶- صوتي برقي وهڪ.

جڏهن آواز جون لهرون ڊاياگرام سان ٽڪرائبيون آهن تڏهن صوتي ويڙها (Voice Coils) مقناطيسي ميدان ۾ اڳتي پٺتي ٿيندا آهن، جنهن ڪري ويڙهن ۾ وولٽيج پيدا ٿيندو آهي. (ڇاڪاڻ ته مقناطيس جي اها خاصيت آهي ته جڏهن به سندس ٻن قطبن جي وچ ۾ ڪنهن پسرئيندڙ جسم کي چوريو وڃي ته منجهس وولٽيج پيدا ٿيندو آهي) اهو پيدا ٿيل وولٽيج آواز جي لهرن جي برقي پيدائش آهي.

ٻين قسمن جي مائڪروفونن کان هن قسم جو مائڪروفون وڌيڪ حساس ٿئي ٿو ۽ تمام ٿوري فريڪوئنسيءَ جا آواز به جهٽي وٺندو آهي. ڇاڪاڻ ته هن ۾ ڊاياگرام گهڻو ڍلو ۽ لچڪيدار ٿئي ٿو جنهنڪري ٿوري آواز سان ئي گهڻي چرپر ڪري ٿو. هن قسم جي مائڪروفون تي گهم ۽ گرميءَ جي درجي وغيره جو ڪوبه اثر ڪونه ٿيندو آهي جنهن ڪري کيس ٻاهرين ۽ کليل علائقن ۾ تيز هوا ۾ به استعمال ڪري سگهيو آهي.

ڊائنامڪ مائڪروفون کي چرندڙ ويڙهي وارو مائڪروفون (Moving-coil microphone) به چئبو آهي ڇو ته هن ۾ ڊاياگرام سان گڏوگڏ ويڙها به حرڪت ڪن ٿا.

۴- **ولاسٽي مائڪروفون** (Velocity Microphone)
هي مائڪروفون چرندڙ ويڙهي واري مائڪروفون جي اصول (بقايا ڏسو صفحو ۱۶)

ڪري انهن جي رکاوٽ به تبديل ٿيندي رهي ٿي. جڏهن دٻو ٿي ٿو ته رکاوٽ گهٽجي ٿي جنهنڪري ڪرنٽ وڌي وڃي ٿو جڏهن دٻو گهٽجي ٿو ته رکاوٽ وڌي وڃي ٿي ۽ ڪرنٽ گهٽجي وڃي ٿو. تنهنڪري جڏهن مائڪروفون کي بيٽريءَ سان ڳنڍيو وڃي ٿو تڏهن آواز جون لهرون تبديل ٿيندڙ ڪرنٽ (Alternating Current - ڪرنٽ) ۾ تبديل ٿي وڃن ٿيون ۽ ان ڪرنٽ جي فريڪوئنسي ان آواز جي لهرن جي فريڪوئنسيءَ جي برابر ٿئي ٿي. هن قسم جا مائڪروفون پوليس ۽ ملٽريءَ جي ڪمن ۾ عام طور استعمال ٿيندا آهن.

۳- **ڪرسٽل مائڪروفون**:- (Crystal Microphone)
ڪرسٽل مائڪروفون ڪن خاص بلوري يا شفاف شين (ڪرسٽيلن سٽيريل - Crystalline Material) جي هڪ خاصيت تي ٺاهيا ويندا آهن. ان خصوصيت موجب جڏهن به ڪن خاص شفاف يا بلوري شين جي مٿان دٻاءُ يا ڇڪ وڌي وڃي ٿي ته ان بلور جي آسھون سامھون وارن پاسن جي وچ ۾ پوٽينشل (Potential) فرق پيدا ٿي پوي ٿو. شفاف شين جي هن خصوصيت کي پيزو اليڪٽرڪ (Piezo Electric) سڏبو آهي. هڪ سٺي ڪرسٽل مائڪروفون ۾ ڪرسٽل سنئون سڌو ڊاياگرام سان لڳل هوندو آهي. جڏهن آواز جون لهرون ڊاياگرام کي لرزش ۾ آڻينديون آهن تڏهن ڪرسٽل پڻ لرزش ۾ اچي ويندو آهي ۽ پيزو اليڪٽرڪ جي عمل جي ڪري ڪرسٽل جي چيڙن وٽ بدلجندڙ وولٽيج (Alternating Voltage) پيدا ٿيندو آهي. ان وولٽيج جي فريڪوئنسي آواز جي لهرن مطابق هوندي آهي. صرف هڪڙي ڪرسٽل سيل مان نڪرندڙ وولٽيج تمام ٿورو هوندو آهي، انڪري گهڻائي سيل پاڻ ۾ سلسليوار ڳنڍيا ويندا آهن ته جيئن گهڻو وولٽيج حاصل ٿئي. هن قسم جي مائڪروفون لاءِ ڪنهن به قسم جي ٻاهرين وولٽيج يا ڪرنٽ جي ضرورت ڪونه ٿي پوي. هن قسم جو مائڪروفون براڊ ڪاسٽنگ اسٽيشن ۾ رڪارڊنگ جي ڪمن ۾ استعمال ٿئي ٿو.

۳- **ڊائنامڪ مائڪروفون** (Dynamic microphone)
هن ۾ هڪ لچڪيدار ۽ ڍلي پردي يعني ڊاياگرام جي پٺيان تارن جا ٻه ويڙها (ڪوائلس - Coils) لڳل هوندا آهن، جن کي صوتي ويڙها سڏبو آهي. هن ۾ هڪ مستقل مقناطيس لڳل هوندو آهي. صوتي ويڙها اهڙي طرح لڳل هوندا آهن جو

سائنس



۱۶۱۰ع ۾ گليلو جو ٺاهيل پهريون ٽيلي اسڪوپ

گليلو گليلي

جنهن پنهنجي سائنسي نظرين ۽
کوجنائن جي عيوض قيد جي سزا کائي

اڄ کان اٽڪل چار سؤ سال اڳ اٽليءَ جي شهر پيزا (Pisa) ۾ دنيا جو هڪ عظيم فيلسوف، انقلابي موجد ۽ علم نجوم جو محقق ”گليلو گليلي“ پيدا ٿيو. گليلو جي خاندان جو شمار اٽليءَ جي باعزت گهراڻن ۾ ٿيندو هو. ملڪي سياست ۾ به هن خاندان کي نمايان مقام حاصل هو. گليلو جو والد جيتوڻيڪ مالي لحاظ کان آسوده حال نه هو پر علمي لحاظ کان هو هڪ مسلم رياضي دان ۽ علم موسيقيءَ تي بخشي راءِ رکندڙ هو.

ذهبن گليلو کي ننڍپڻ ۾ ئي مشينون ٺاهڻ جو شوق هوندو هو. اهي مشينون جيتوڻيڪ ٻارن جي رانديڪن جهڙيون هونديون هيون پر انهن کي ڏسڻ سان انهن جي ٺاهيندڙ جي بي پناه ذهانت ۽ مستقبل جي عظمت جو پتو پئجي ويندو هو. هنجي علمي زندگي به شروع کان ئي تمام نمايان رهي آهي. فلورنس جي ويجهو جنهن مذهبي اداري ۾ تعليم حاصل ڪندو هو، اتي سڀئي سندس لياقت کي ساراهيندا هئا. هن نه رڳو لاطيني زبان پر يوناني ۾ به جلدئي مهارت حاصل ڪري ورتي هئي. گليلو جي پيءُ سندس تعليم مذهب تائين محدود رکڻ نٿي چاهي تنهنڪري هن کيس علم طب ڏانهن رغبت ڏياري ڇو ته هنجي خيال مطابق اهو علم، موسيقي يا رياضي کان وڌيڪ مفيد هو ۽ اهڙي طرح مستقبل ۾ گليلو جي مالي حالت بهتر ٿيڻ جي پڻ توقع هئي. اڃا گليلو جي عمر ۱۸ سال ٿي مس ٿي ته کيس پيزا يونيورسٽيءَ ۾ داخل ڪرايو ويو جتي هنجي علمي لياقت ۾ وڌيڪ اضافو ٿيو. اتفاق سان هڪ دفعي هنکي ”اوسٽيوريسي“ نالي جاسٽريءَ جي هڪ ماھر جو ليڪچر ٻڌڻ جو موقعو مليو جنهن کانپوءِ هو سائنس ۽ رياضيءَ جي علمن ڏانهن راغب ٿي ويو.

پنهنجي مشغلي ۾ ڪجهه عرصي جي لاهين چاڙهين کانپوءِ هن هائڊروسٽيٽڪل بئلس (Hydrostatical Balance) بابت هڪ جامع ۽ معلوماتي مضمون لکيو جنهن سندس شهرت سڄي ملڪ ۾ پکيڙي ڇڏي ۽ هڪ نئين علمي نظريه جي تحقيق جي سائنس

جي آڌار تي کيس فلورنس يونيورسٽيءَ ۾ ليڪچرار مقرر ڪيو ويو. اڳتي هلي هن ڊائناميڪل (Dynamical) سائنس جي اوائلي اصولن جو بنياد رکيو ۽ اتان ئي سندس ۽ مذهبي پيشوائن جي وچ ۾ ڇڪتاڻ شروع ٿي. ان نظريه جي ترديد ۾ ته بلنديءَ کان زمين ڏانهن زياده وزني شي گهٽ وزني شي کان پهرين ڪري ٿي، هن يونيورسٽيءَ جي استادن ۽ شاگردن اڳيان هڪ عملي مظاهرو ڪيو. پيزا ٽاور تان هن به مختلف وزن رکندڙ شيون زمين تي اچايون ته اهي ٻئي هڪ ئي وقت اچي هيٺ ڪريون. اها تحقيق مذهبي پيشوائن جي خود ساختہ عقيدن جي خلاف ثابت ٿي تنهنڪري انهن هنجي مخالفت شروع ڪري ڇڏي، ايتري قدر جو گليلو کي يونيورسٽي جي ملازمت تان خارج ڪيو ويو. انهيءَ سال (۱۹۵۱ع ۾) هنجي والد جو به انتقال ٿي ويو جنهنڪري گھريلو ذميدارين جو بار به مٿس اچي پيو پر خوشقسمتيءَ سان کيس وري به پاڊوا (Padua) يونيورسٽيءَ ۾ علم رياضيءَ جي شعبي ۾ جڳهه ملي ويئي.

گليلو اتي اٽڪل ۱۸ سال رهيو ۽ يونيورسٽيءَ ۾ سندس ترقي ٿيندي رهي. انهيءَ دوران هن پهريون ٽرميٽر ايجاد ڪيو. گليلو جي دور رس علمي نگاهن سندس ايجاد ڪيل اوزارن جي مدد سان آسمانن جي دنيا جي کوجنا جو ڪم شروع ڪيو ۽ انهيءَ ”آسماني جنت“ ۾ مداخلت ڪئي جنهنجو تصور به جون ۱۹۷۲ع

هڪ به نه ٻڌي. اعليٰ مذهبي رهنمائن جي هڪ خاص اجلاس ۾ گليليو جي کوجنائن تي غور ڪيو ويو. مذهبي رهنمائن انهيءَ نظريي کي مذهب ۽ قديم فلسفہ جي خلاف قرار ڏنو ته سچ ڪائنات جي وچ ۾ جامد ۽ بي حرڪت بيٺل آهي ۽ زمين انجي چوڌاري ڦري رهي آهي. انجي برعڪس پادرين جو عقيدو اهو هو ته زمين بي حرڪت آهي ۽ سچ انجي چوڌاري ڦري رهيو آهي. نيٺ اها فتوا ڏني ويئي ته گليليو پنهنجي نظرين جي تبليغ ۽ اشاعت بند ڪري ڇڏي. گليليو اهو حڪم ٻڌي خاموشي اختيار ڪئي ۽ ٽن مهينن کانپوءِ فلورنس واپس موٽي آيو. ستن سالن تائين هو خاموشيءَ جي زندگي بسر ڪندو رهيو ۽ انهيءَ وچ ۾ ڪابه اهڙي ڳالهه نه ڪيائين جيڪا پاڻءِ روم جي حڪم جي خلاف هجي. ستن سالن کانپوءِ جڏهن هو گوشه نشينيءَ کان ٻاهر نڪتو ته هن هڪ ڪتاب شايع ڪرايو جنهن ۾ نظام شمسي يا سورج منڊل جي باري ۾ سندس نظرين جي وضاحت ڪيل هئي. ڪافي بحث مباحث کانپوءِ ان ڪتاب تي به بندش وڌي ويئي ۽ گليليو کي روم سڏايو ويو. ۱۳- فيبروري ۱۶۳۳ع هي پوڙهو فاضل روم پهتو جتي مذهبي رهنمائن جي عدالت ۾ کيس ٽي سال قيد جي سزا ڏني ويئي. سزا جي مدت ختم ٿيڻ کانپوءِ گليليو پنهنجي زندگيءَ جا باقي اٺ سال نهايت خاموشيءَ ۾ گذاريا ڇو ته سندس آزاديءَ لاءِ اهو هڪ اهم شرط هو. ۸ جنوري ۱۶۴۲ع تي ڪائنات جي اسرارن جو پتو لڳائيندڙ هن عالم جون صداقت پريل اکيون هميشه لاءِ بند ٿي ويون.

گليليو جو علمي ۽ تحقيقي ڪارنامو هن جون اهي دريافتون آهن جيڪي دوربين جي ذريعي معرض وجود ۾ آيون. جيتري قدر سائنس جي نظرياتي تڪميل ۽ تحقيق جو تعلق آهي، ان ۾ هن ڪوبه امتيازي ڪم ڪونه ڪيو پر ان ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته نگاهه جي حد ۾ ايندڙ ڪائنات جي حدن ۾ هن گهڻي توسيع ڪئي ۽ انسان جون نگاهون هنجي ايجاد ڪيل ٽيلي اسڪوپ جي مدد سان ايترو ته پري تائين پهچي ويون جو تارن جي علم ۾ هڪ انقلاب اچي ويو. اڄ جتي گليليو جي حق کوٽي، قوت مشاهده جو ڪمال، راست بسازي ۽ شخصي عظمت جو اعتراف ڪيو وڃي ٿو، اتي علم نجوم ۽ هنجون انقلابي دريافتون به اڄوڪي دور جي سائنسدانن جي رهنمائي ڪري رهيون آهن.

مذهبي پيشوائن جي خيال ۾ سخت قسم جي گستاخي هئي. ان صورتحال جي شروعات هڪ نئين تاري جي دريافت سان ٿي. گليليو جي مشهور ايجاد ”دوربين“ انهيءَ زماني جو يادگار آهي. حقيقت اها آهي ته دوربين جو اصل موجد گليليو نه پر هڪ ٻيو سائنسدان ”هينزليبرشي“ آهي پر ان اوزار جي ترقي ۽ ان کان صحيح ڪم وٺڻ جو سهرو گليليو جي سر تي آهي. هن دوربين جي طاقت ۽ مسلسل اضافو ڪيا ۽ انجي ترقي يافته شڪل ۾ سوين دوربينون پنهنجي هٿ سان ٺاهيون. هي اوزار ايترو ته مقبول ۽ مفيد ثابت ٿيو جو يورپ ۾ انجي ڪافي ڪيت ٿيڻ لڳي. گليليو جي دوربين سان چنڊ جي دنيا جو جائزو ورتو ويو ۽ چنڊ جي روشني، تاريخي، غروب ۽ طلوع جا اسباب پهريون دفعو دنيا جي علم ۾ آيا. اهڙيءَ طرح ڪهڪشان جي حقيقت جو پڻ انڪشاف ٿيو ۽ معلوم ٿيو ته اهو به تارن جو هڪ مجموعو آهي. مشتري گرهه کي به سڀ کان پهرين گليليو ۷ جنوري ۱۶۱۰ع تي ڏٺو.

سيپٽمبر ۱۶۱۰ع ۾ گليليو وري فلورنس ويو. اتي هن دوربين ذريعي جيڪي دريافتون ڪيون تن سندس شهرت ۽ مقبوليت ۾ حيرت انگيز اضافو ڪيو ۽ کيس اعزازن ۽ وطنين سان نوازيو ويو. ۱۶۱۱ع ۾ هو روم ويو جتي ٽيليسڪوپ جي عجائبات جي نمائش کانپوءِ مذهبي حلقن ۾ هنگامو برپا ٿي ويو ۽ ڪيترن ئي مذهبي رهنمائن گليليو جي تحقيقات ۽ دريافتن جي ڪليل مخالفت شروع ڪئي. پنهنجي مخالفن کي ڦاٿل ڪرڻ لاءِ هن گهڻي دليل پيش ڪيا پر هنن سندس



گليليو روم جي پادرين کي پنهنجي ٽيلي اسڪوپ ذريعي آسمان جا نظارا ڏيکاري رهيو آهي.

انسانی رت جي درجه بندي

رت جا "رحم" (Rh) درجا

پڙهندڙن کي معلوم هوندو ته رت جي عطيه جي ڏي وٺ جي سلسلي ۾ رت کي چئن درجن ۾ ورهايو ويو آهي جيڪي ٽن مختلف جين (Multiple Allels) I^A , I^B ۽ i جي ڪارڪنداريءَ سبب عمل ۾ آيا آهن، پر انهيءَ کانسواءِ ڪن حالتن ۾ ڏنو ويو آهي ته رت جي عطيه جي سلسلي ۾ وڌيڪ حادثا پيش آيا آهن. مثال طور مريض کي رت جو صحيح گروپ ڏيڻ جي باوجود ڪن حالتن ۾ رت وٺندڙ جو رت ڳوڙها ڳوڙها (Clumps) ٿي پوي ٿو يا اگليوٽينيشن (Agglutination) جو طريقو عمل ۾ اچي ٿو. اهڙن سڃاڻڻ سان ائين سمجهه ۾ اچي ٿو ته مٿي ذڪر ڪيل انٽي جين (Antigens) کانسواءِ ٻيون انٽي جين به رت سان شامل آهن ۽ هي پنهنجو اثر ظاهر ڪن ٿا. اهڙي عمل کي ڄاڻڻ سان هي حالتون ٻيهر ڪي رت جي رڪي معلوم ڪيو ته

ته "ريجنس" جنس جي باندر جو رت جيڪڏهن سهي جي جسم ۾ سين وسيلي داخل ڪبو ته سهي جي رت ۾ باندر جي رت جي خلاف متضاد جسامت (Anti bodies) تيار ٿيندا. ساڳئي وقت هنن ڪن ماڻهن ۾ پڻ ساڳئي قسم جي متضاد جسامت کي ڳولي نڌو. جيئن ته اهڙن متضاد جسامت جو انڪشاف پهريائين

ريجنس (Rhesus) باندر جي رت داخل ڪرڻ سان ٿيو هو، تنهن ڪري اهڙن متضاد جسامت کي جنس جي پهرين ٻن اکرن Rh سان سڏين ٿا.

ماڻهن جو چوڻ آهي ته گورن ماڻهن مان ۸۵ سيڪڙو ماڻهو اهڙا آهن جن جي رت جي گڙهن جن ۾ انٽي جين "د" (D) موجود آهي ۽ ۱۵ سيڪڙو ماڻهن جي رت ۾ اهڙي انٽي جين ڪانهي. پڙهندڙن کي بخوبي معلوم هوندو ته جهڙي طرح رت ۾ ٻين انٽي جين (الف ۽ ب) جي مطابقت واريون انٽي باڊيز يا متضاد جسامت اگليوٽين (Agglutinin) رت جي رصوبت (Blood Plasma) ۾ موجود آهن،

DONOR				
O				
AB				
B				
A				
RECEIVER →				
	A	B	AB	O

"ڪارل لينڊ اسٽينر" نالي نوبل انعام کٽندڙ سائنسدان اها دريافت ڪئي ته انسان جي رت جا چار مکيه درجا ٿين ٿا، جنکي اي، بي، اي-بي ۽ او سڏيو وڃي ٿو. انسان جي جسم ۾ رت جي ڏي وٺ لاءِ اهي درجا تمام گهڻي اهميت رکن ٿا ڇو ته جيڪڏهن ڪنهن ماڻهوءَ کي گهربل درجي جي رت جي بدران جيڪڏهن ڪنهن ٻئي درجي جو رت ڏنو ويو ته اهو هڪ وڌيڪ نقصان پهچائيندو. مٿين چارٽ ۾ ڏيکاريو ويو آهي ته رت جا ڪهڙا قسم چئني درجن وارن ماڻهن کي ڏيئي سگهجن ٿا يا انهن کان وٺي سگهجن ٿا. هڪ سلائي واري نشانيءَ مان مراد آهي ته رت جو اهو قسم ائين درجن سان لهڪي اچي ٿو. تقارن جي نشان سان مراد آهي ته رت جو اهو قسم جانايل درجن سان ٿو لهڪي سگهي.

ٿوري طرح "د" انٽي جين لاءِ ان جي برعڪس ڪو به اهڙو متضاد جسامت موجود ڪونهي ۽ اهڙا جسامت اهڙن ماڻهن جي رت ۾ نه ٿي سگهن ٿا جن جي گڙهن جن ۾ "د" انٽي جين نه هجي ۽ انهن جي رت ۾ اهڙو رت داخل ڪجي جنهن ۾ "د" انٽي جين موجود هجي.

اهڙن ماڻهن کي واڌو رحم Rh چون ٿا جن جي رت سان جون ۱۹۴۲ع

انٽي جين الف (A) ۽ ب (B) کانسواءِ ٻيون انٽي جين ٿ (C)، (D) ۽ اي (E) به رت جي گڙهن جن ۾ موجود آهن جن سان سڀ کان وڌيڪ سڳي "د" (D) انٽي جين آهي ۽ انهيءَ جي موجودگي ۽ غير موجودگي اگليوٽينيشن جي طريقي کي عمل ۾ آڻي ٿي. سنه ۱۹۴۵ ۾ لينڊ اسٽينر (Land Steiner) ۽ ويٽنر (Weiner) اها ڳالهه پهريون دفعو تجربو ڪري معلوم ڪئي

سائنس

ريجنس جهڙا متضاد جسامت ۾ اچن ٿا ۽ ٻيءَ صورت ۾ جن ماڻهن جي رت سان اهڙن متضاد جسامت جو ٺهڻ ممڪن نه آهي انهن کي ڪاٺو رت Rh^- سڏين ٿا.

ٻهٽين دفعي ڪاٺو رت (Rh^-) واري ماڻهوءَ کي واڌو رت (Rh^+) وارو رت ڏيڻ سان ظاهري طورڪا به ناموزونيت يا تڪليف در پيش ڪانه ايندي پر جڏهن متضاد جسامت اهڙي ماڻهوءَ جي رت ۾ ٺهي تيار ٿي وڃن ته پوءِ اهو لازمي آهي ته انهيءَ ساڳئي ماڻهوءَ کي واڌو رت جو رت ڪنهن به صورت ۾ نه ڏجي پوءِ ڇو نه ڪٿي ا، ب، ۽ (A, B, O) درجو صحيح هجي. ان جو سبب هي آهي ته واڌو رت ڪاٺو رت سان ملي ڳوڙها ڳوڙها ٿي پوندو ۽ مريض جي جان کي جو کوٽي پوندو. تنهن ڪري ٻئي دفعي جڏهن به ڪاٺو رت واري مريض کي رت ڏجي ته ان کي هميشه صحيح ا، ب، ۽ (A, B, O) وارو ڪاٺو رت رت ڏجي باقي واڌو رت وارن ماڻهن جي رت ۾ رت اگليوڻين يا متضادجسن ٺاهڻ جي صلاحيت ڪانه هوندي آهي تنهن ڪري انهن لاءِ اهو ضروري ڪونهي ته انهيءَ کي ڪاٺو رت يا واڌو رت ڏجي. رت وٺڻ مهل هميشه صحيح گروپ ۽ ڪاٺو رت جو رت وٺجي يعني ($Rh^- \rightarrow Rh^+$).


حاصل مطلب ته واڌو رت رت رکندڙ مريض کي ڪهڙي به رت قسم جو (رت يا رت) رت ڏيئي سگهجي ٿو ۽ باقي ڪاٺو رت رکندڙ مريض کي ڪڏهن به واڌو رت جو رت نه ڏجي پوءِ ڇو نه ڪٿي اهو ساڳئي الف، ب، ۽ (A, B, O) درجي سان تعلق رکي. ڇاڪاڻ جو اهڙي مريض جي رطوبت ۾ جيڪڏهن هڪ دفعو متضاد "د" جسامت ($Anti D Bodies$) ٺهي ويا ته پوءِ آئنده اهڙن مريضن کي هر طرح کان موزون درجي جو رت ڏيڻو پوندو.

انهن مشڪلاتن کان وڌيڪ ذڪر مسئلو ڪاٺو رت رکندڙ عورت کي واڌو رت ڏيڻ سان پيدا ٿئي ٿو. ڇاڪاڻ جو عورت جي رت جي رطوبت ۾ متضاد "د" جسامت ٺهڻ جي حالت ۾ کيس سالم ٻار ڄمڻ جا گهٽ امڪان ٿيندا آهن ۽ ساڳئي قسم جا واقعا اهڙين عورتن سان پڻ ٿيا آهن جيڪي ٻار ڪاٺو رت جي رت سان تعلق رکن ٿيون ۽ سندن مرد واڌو رت سان تعلق رکن ٿا، جيتوڻيڪ اهڙين زالن کي اڳي ڪڏهن به رت نه ڏنو ويو آهي.

سائنس

اهڙن مسئلن کي ليون ۽ اسٽيئسن ($Levin \& Stetson$) ننڍڙن ٻارن جي الن مهينن جي عمر ۾ ٽسي پيٽ انڊر مري وڃڻ جي واقعن کانپوءِ محسوس ڪري واضح ڪيو ته اهڙا سوت رت جي ڳاڙهن جزن جي ناس ٿيڻ ($Erythro blastosis$) کان ٿي عمل ۾ اچن ٿا. ليون ۽ ان جي ساٿين اهو ثابت ڪيو ته واڌو رت واري رت جا ڳاڙها جزا متضاد "د" جسامت سان ملي ناس ٿين ٿا. علمي ماهرن اهڙن مشاهدن جي تشريح هيئن ڪئي آهي ته ڪاٺو رت واري عورت جي شادي واڌو رت رکندڙ مرد سان ٿيندي ته اهڙيءَ عورت جي پيٽان ٻار پڻ واڌو رت جي رت سان مطابقت رکي جنم وٺندا. انهيءَ حالت ۾ ٻار ماءُ جي رت واري رطوبت ۾ متضاد جسامت "د" ٺهي پون ٿا. اهڙيءَ ماءُ کي جڏهن ٻار پيدا ٿئي ٿو ته ٻار جي رت جي گردش ۾ ماءُ جي رت طرفان متضاد "د" جسامت داخل ٿي ٻارن جي رت جي ڳاڙهن جزن کي ناس ڪري ٻار جو انت آڻين ٿا، يا ٻار سخت سائي يا يرقان جي مرض ۾ مبتلا ٿي پوندو آهي. اهڙو ٻار جيڪڏهن جيئرو ڄمي ته کيس هڪدم ڪاٺو رت ۽ "او" درجي وارو نئون رت ڏجي ڇاڪاڻ جو انهيءَ وقت ٻار جي رت جو صحيح درجو معلوم ڪرڻ مشڪل آهي، ۽ ڪاٺو رت ٻار ۾ رهيل متضاد "د" جسامت سان ڪوبه رد عمل نه ڪندا. البت ڪن ڏينهن کانپوءِ ٻار خود بخود واڌو رت جزا جوڙي وٺندو ۽ تيستائين متضاد "د" جسامت جي گردش مان نڪري چڪا هوندا. هيٺ ڏنل شڪل مان اها ڳالهه وڌيڪ ظاهر ٿئي ٿي.

(ماءُ ۽ ڄميل ٻار) (ماءُ ٻار سميت) (ماءُ)




ڪاٺو رت رکندڙ ماءُ کي واڌو رت رکندڙ ٻار ٺهي سگهي ٿو. انهيءَ حالت ۾ ته ڪوبه ردعمل ٿيڻ جو امڪان ڪونه آهي ڇاڪاڻ جو ٻنهي جي رت جي گردش ڌار ڌار آهي. ڏسو شڪل "الف". پر جيڪڏهن اتفاق


مٿين ٻنهي نظرين ۾ تفاوت رڳو جين جي تعداد ۽ رنگين جسم ۾ جڳهه تي آهي پر عملي طور ٻنهي نظرين جا نتيجا ساڳيا آهن. ننڍي آر (r) يا ننڍي ڊي (d) واريون جين ڪمزور فطرت جون آهن، جن تي وڏي (R) يا وڏي ڊي (D) واريون جين هميشه غالب هونديون آهن. تنهنڪري اهڙيون جين ڪنهن به انٽي جين کي جنم نه ڏين ۽ نه وري ر ۾ جزوئي ٺهي ٿو. تنهن ڪري اهڙي ماڻهوءَ کي ڪاٿو ر ۾ واري جزي سان سڏين ٿا.

رحيسس جزو فطرتاً وراثت ۾ غالب رهي ٿو. يعني جيڪڏهن ڪنهن به هڪ ماءُ يا پيءُ ۾ رحيسس جزو هوندو ته اهو سندن اولاد ۾ سڌائين ظاهر ٿيندو پر ماڻهو ڇند تخمي واڌو رحيسس (Homozygous - Rhesus Positive) يا ڪر تخمي واڌو رحيسس (Hetrozygous - Rhesus Positive) سان تعلق رکي سگهيو ۽ ڪاٿو رحيسس رڳو انهيءَ حالت ۾ ممڪن آهي جڏهن مڪمل طور تي (D) يا (R) جين غير موجود هجي (يعني ڇند d d جين هجن).

مثال طور، جيڪڏهن پيءُ جي لاءِ ۱، ۲ جين ۽ ماءُ لاءِ ۳، ۴ جين مقرر ڪريون ته سندن ٻار جون ممڪن جين هيٺيون ٿي سگهن ٿيون:-



مٿين قانون مطابق اهڙن ٻارن جي جين هيٺينءَ ريت معلوم ڪري سگهجي جن جي ماءُ ڇند تخمي ڪاٿو رحيسس (d,d) ۽ پيءُ ڇند تخمي واڌو رحيسس (D,D) سان تعلق رکي ٿا.



سان ماءُ جي رت جي رطوبت ۾ متضاد 'د' جسا ٺهي بيا ته اهي جهليءَ (Placental) جي وسيلي ٻار جي رت جي گردش ۾ داخل ٿي ان جا ڳاڙها جزا ناس ڪندا. ڏسوشڪل 'ب'. جيئن ئي ٻار ٻاهر اچي ويو ته وڌيڪ متضاد 'د' جسا ان جي رت جي گردش ۾ داخل ڪونه ٿيندا. ڏسوشڪل 'ث'.

جيڪڏهن ٻار به ڪاٿو ر ۾ سان تعلق رکندڙ آهي ته سندس ماءُ جي رت واريءَ رطوبت جا متضاد 'د' جسا ان لاءِ بي ضرر آهن. انهن مشڪلاتن کان نجات پائڻ جو سولو طريقو اهو آهي ته ڪاٿو ر ۾ رکندڙ چوڪريءَ کي ڪاٿو ر ۾ وارو مڙس ملڻ گهرجي پر اتفاق سان اهو به ايترو آسان نه آهي، ڇاڪاڻ جو رڳو ستن مردن مان هڪ مرد ڪاٿو ر رت رکي ٿو.

رحيسس جزو ۽ جين (Rhesus Factor & Gene)
جهڙيءَ طرح الف، ب ۽ او (A,B,O) انٽي جين انسان کي پنهنجي والدين کان ورثي ۾ ملنديون اچن ٿيون، تهڙيءَ طرح رحيسس جزو (رح) يا ان جي انٽي جين ڊ (D) ٿ، ڇ (C) ۽ اي (E) به رنگين جسم (Chromosomes) ذريعي هڪ نسل کان ٻئي نسل ڏانهن منتقل ٿينديون رهن ٿيون. ان کان اڳ ماڻهن جو اهو عام خيال هوندو هو ته رحيسس جزي لاءِ فقط هڪ ئي جين جوابدار آهي، پر وڌيڪ تحقيقات ڪرڻ کانپوءِ محققن ٻه نظريا مرتب ڪيا آهن.


پهرئين نظريي مطابق ر ۾ جزي لاءِ ڪابه جوابدار جين ٽن مختلف جينن جي ميلاپ سان ئي وجود ۾ اچي، ر ۾ جزي جي خصوصيت کي ظاهر ڪري ٿي ۽ اهڙيءَ طرح ڇهن متضاد جينن، جن کي (E,e) (D,d) (C,c) جهڙن اشارن سان واضح ڪيو ويو آهي، انهن جي مخصوص ميلاپ سان اٺ ممڪن جوڙ يعني اٺ مختلف جين عمل ۾ اچن ٿيون جيڪي فشر (Fischer) نالي شماريات جي ماهر هن ريت بيان ڪيا آهن :-

(E CD, ecD, DEc, CDe,) (ecd, dec, ECd, cdE)
ان جي برعڪس امريڪي سائنسدان وينر (Weiner) جي نظريي مطابق رت جي ر ۾ جزي جي پيدائش اٺن مختلف جينن جي وسيلي عمل ۾ اچي ٿي، جيڪي رنگين جسم تي هڪ ئي جاءِ تي واقع ٿي سگهن ٿيون جن کي وينر وڏي آر (R) ۽ ننڍي آر (r) جهڙن مختلف اشارن سان سڏيو آهي جيئن ته :-

(R¹, R², R^u R_L) ۽ (r, r', r'', ry)
سائنس

[بقايا — "مائڪروفون"]

تي ٺهيل آهي. هن ۾ چرندڙ ويڙهي جي بدران هڪ ڌاتوءَ جي سنهي پٿريءَ کي مقناطيسي ميدان ۾ لرزش ۾ آندو ويندو آهي. هي ڊائنامڪ مائڪروفون جيترو حساس ڪونه ٿيندو آهي. (سندس بناوت شڪل ۾ ڏيکاريل آهي). هن ۾ هڪ سنهي،



هلڪي ۽ لچڪيدار ڌاتوءَ جي پٿري مستقل مقناطيس جي ٻن قطبن جي وچ ۾ لٽڪيل هوندي آهي. جڏهن آواز جون لهرون هن پٿريءَ سان ڌڪرائبيون آهن تڏهن پٿري لرزش ۾ ايندي آهي ۽ مقناطيسي قطبن جي وچ ۾ لرزش ۾ اچڻ سبب منجهس وولٽيج

آواز جي لهرن جي دٻاءَ ۽ فريڪوئنسيءَ مطابق ۱- مستقل مقناطيس ۲- ربن ڊاياگرام ۳- مقناطيسي زور جي ليڪن جو رستو

پيدا ٿيندو آهي. (يعني پٿريءَ جي تيز ۽ آهستي لرزش موجب وولٽيج به وڌيو ۽ گهٽيو رهندو.)

ڇاڪاڻ ته هن قسم جي مائڪروفون ۾ ڌاتوءَ جي پٿري هڪ ربن (Ribbon) وانگر هوندي آهي انڪري کيس ربن مائڪروفون (Ribbon Microphone) به سڏيو ويندو آهي. هن قسم جو مائڪروفون صرف اهي آواز جون لهرون جهڙي سگهندو آهي جيڪي مائڪروفون جي بالڪل سامهون ٽڪرائبيون آهن. جئين ته سندس ربن تمام نازڪ ٿيندي آهي تنهنڪري کيس تيز هوا يا آواز کان بچائڻ گهرجي.


"سائينس"

ماهندهام جا گذريل پوڄا

ماهندهام "سائينس" جا گذريل پوڄا (مارچ ۱۹۷۱ کان ڊسمبر ۱۹۷۱ تائين ۽ جنوري ۱۹۷۲ کان مئي ۱۹۷۲ تائين) موجود آهن. ضرورتمند هيٺين ائڊريس تان گهرائي سگهجن ٿا.


ڊئمپيڇر ماهندهام "سائينس"
انسٽيٽيوٽ آف ڪيمسٽري
سنڌ يونيورسٽي - ڄامشورو

جون ۱۹۷۲ع




سڀني مثال ۾ ماءُ ۽ چنڊ تخمي ڪاٺو رحم ۽ پيءُ ڪر تخمي واڌور رحم سان تعلق رکڻ ٿا ۽ انهن جا آڌ ٻار چنڊ ڪاٺو رحم ۽ آڌ ٻار ڪر تخمي واڌور رحم وارا چمندا.

هيٺين مثال ۾ سڀئي چنڊ تخمي (Homozygous) ڪاٺو رحم سان تعلق رکڻ ٿا ڇاڪاڻ ته اهڙن ٻارن جي والدين (ماءُ ۽ پيءُ) جو پڻ چنڊ تخمي ڪاٺو رحم واريئن جينن سان تعلق آهي تنهنڪري اهو ناممڪن آهي ته اهڙن والدين وٽ واڌو رحم جا ٻار پيدا ٿين.




(باقي آئندو)



قيمت ٽي روپيا
مشهور بوڪ اسٽالن تان ملي سگهندو

سائينس



پت ڪيئون (Silk Worm)

قدرت صرف سندن بچاء لاءِ جيتن ۾ ٺاهڻ جي صلاحيت پيدا ڪئي آهي ليڪن انسان وري ان کي پنهنجي مقصد لاءِ استعمال ڪيو آهي.

عام طرح اهڙن جيتن جاسرڻ ٿي قسم آهن :-

(۱) بامبيڪس موري. *Bembyx Mori*

(۲) انٿيروئيا پيپيا. *Antheroea Pabhia*

(۳) آٽاڪس آٽاس. *Attacus attas*

پت ڪيئون جي حياتيءَ جو چڪر :-

پوپٽ Math - نوجوان پوپٽ مضبوط ڪريمي اڇي رنگ جو ٿيندو آهي. اڳين ڀرن تي ڪيتريون ئي ليڪون هونديون اٿس ۽ چلڻ سان ڍڪيل هئڻ سبب آڏاسڻ لاءِ استعمال ڪونه ڪيا ويندا آهن. کيس ڏنگ (Peobosis) ڪونه ٿيندو آهي. سڄون (Antenae) پنهي طرف ڦٽي جي ڏندن وانگر پنهي ڏر ۽ مادي ۾ ساڳئي قسم جون ٿينديون آهن. پوپٽ جو سڄو جسم وارن سان ڍڪيل هوندو آهي. سندس زندگي صرف ٻن يا ٽن ڏينهن جي ٿيندي آهي ۽ انهي عرصي ۾ پوپٽ کي کاڌو ڪونه کپي، هو صرف وڌندو رهندو آهي. سادي پوپٽ ۳۰۰ کان ۴۰۰ ڀڄن جهڙا اڇا آنا لاهيندي آهي.

(۲) آنا Eggs - سادي پوپٽ هر انهي مٿاڇري جي مٿان آنا لاهيندي آهي جنهن مٿان آها ويهندي آهي. تازا لٺل آنا اڇا، ملائي رنگ جا ٿيندا آهن ليڪن ڪجهه وقت کان پوءِ انهن جو رنگ پورو ٿي پوندو آهي. نوجوان جيت ۸، ۱۰ ڏينهن کان پوءِ آئن مان نڪري ٻاهر ايندا آهن.

(۳) لاروا Larva - نئون ڄاول جيت، سادو، گول، اڇي رنگ جو ۱۹۷۲ع

دنيا ۾ قدرت جيڪا شيء پيدا ڪئي آهي تنهن جو ڪونه ڪو مقصد ضرور هوندو آهي. مثال طور پت ڪيئون، جيڪو ۱۸۰۰ع کان اڳ ڪنهن به ڪم جو نه هو، هن وقت ان مان هڪ قيمتي تند ورتي وڃي ٿي جنهن مان اسان ريشمي ڪپڙو ٺاهيون ٿا. پت هٿ ڪرڻ لاءِ اسان کي اهي جيت پالڻا پون ٿا ۽ سندن رکوالي ڪرڻي پوي ٿي ۽ مقرر وقت تي پت (ريشم) حاصل ڪيو وڃي ٿو.

اهو هڪ اتفاق هو جڏهن چين جي هڪ عورت ”سي لنڪ چي“ باغ ۾ ڪيئين جي کوپي (Cocoon) کي ڇڏي رهي هئي ته اهو سندس هٿ مان ڪري پيو ۽ ڇانهه جي کوپ ۾ وڃي پيو. جڏهن هن ان کوپي کي آگر سان ڪڍيو ته اهو تندن ۾ تبديل ٿي ويو. جنهن کان پوءِ سندس ذهن ۾ انهن تندن کي گڏ ڪري ڪپڙي ٺاهڻ جو خيال آيو. ان لاءِ سندس مڙس ”هونگ“ سندس همت افزائي ڪئي ۽ کيس ڪيئن پالڻ ۾ مدد ڪئي. اهو راز چين وارن لکائي ڇڏيو ليڪن انهي جي باوجود ڪجهه جيت ٻين ملڪن ۾ به پهچي ويا. هنن جيتن کي توت (Mulberry) جي پنن تي پالڻو آهي. انهي ڪري جڏهن به توت جا وڻ ساوا پن ڪڍندا آهن ته چين جا رهاڪو مسر سي لنڪ چي جي ياد ملهائيندا آهن.

اڳئين وقت ۾ آمريڪا ڏانهن ڪجهه جيت آندا ويا ليڪن ڪو خاص مقصد حاصل ڪونه ٿيو. اڄڪلهه ريشم تمام مستي نموني هٿ ڪيو وڃي ٿو. ڪيترائي قسم پوپٽن جا آهن جيڪي پاڻ کي لڪائڻ ۽ زندگي کي وڌائڻ لاءِ پنهنجي مٿان ڏاڳن جو هڪ گهر (Cocoon) ٺاهين ٿا. ان گهر کي سائس

(۱) ٿالهي-(Tray) هي ٻانس جي پگڙ ٽڪرن مان ٺاهي ويندي آهي. اهي چورس يا مستطيل هونديون آهن پاسا اٽڪل ۲-۳ انچ ڊگها ٿيندا آهن.

(۲) طاقيءَ الماري (Shelf): هن ۾ ٿالهيون رکيون آهن. هي يا ته چٽ ۾ ٽنگي آهي يا وري ڌرتي تي رکي آهي. هر هڪ الماري جي مٿان ٻي الماري رکي آهي.

(۳) چاريون (Nets): ڏاڳي جون چاريون ٿالهيون کڻي صاف ڪرڻ لاءِ هونديون آهن.

پهرين آڻا ڪاغذ تي لڻا ويندا آهن ۽ ان کان پوءِ انهن کي ٿالهي ۾ پڪيڙيو آهي. ٻئي ڏينهن صبح جو ڪيترن ئي آڻن مان ننڍڙا جيت نڪري نروار ٿيندا آهن ۽ پوءِ انن جا خالي ڪوپا اڇلائي ڇڏبا آهن. ٻچن ڦٽڻ جو سلسلو صبح کان وٺي شام تائين جاري رهندو آهي. توت جا نرم پن اهڙي ته نموني سان هڪ ٻئي جي مٿان رکجن جيئن جيتڙا انهن جي مٿان سولائي سان چري پري سگهن. ٻئي ڏينهن شام جو ٽڪرا ٽڪرا ڪيل پن انهن ٿالهي ۾ رکبا آهن ۽ ۴۲ ڪلاڪن گذرڻ کانپوءِ سڀ پن اڇلائي جيتن کي نئين ٿالهي ۾ رکبو آهي. اتي سڄي رات رهڻ کان پوءِ صبح جو کاڌو ڏبو آهي. جيئن ته اهي سڀ پن کاڌا کين ويندا آهن ان ڪري خراب ٿيندا رهندا آهن، تنهن ڪري انهن پنن کي اتان وقت به وقت هٽايو رهيو آهي ۽ هميشه تازا پن استعمال ڪيا آهن. پنن مٿان جو ڪم چارين جي وسيلي ڪيو آهي.

ٻنجن ڏينهن جي کاڌي کانپوءِ جيتن کي وڌيڪ کاڌي جي ضرورت ڪونه هوندي آهي ۽ اهي ڪنپ ڇاڻڻ شروع ڪندا آهن. جڏهن سندن وڏڻ جي پي حد ايندي آهي ته هو سڄي ٿالهي ۾ پکڙجي ويندا آهن ۽ ان وقت کين هر روز ۴ ڀيرا کاڌو ڏنو ويندو آهي پن هر ٻئي ڏينهن تي صاف ڪيا آهن ٽين ۽ چوٿين حد تي ساڳي نموني تي مٽاسٽاءِ کاڌو ڏنو ويندو آهي.

ڪنڀن ڇاڻڻ جي پنجين حد تي جيت هڃ ڪري کائيندا آهن ۽ ۳ دفعا کائيندا آهن. صفائي هر هڪ ڏينهن تي ڪئي ويندي آهي. نيٺ جيت وڏا ٿي ڪوپو ٺاهڻ شروع ڪن ٿا. انهي وقت سندن وات مان ريشمي تند نڪرندي آهي جيڪا ڪوپي کي مضبوط ڪندي آهي. پورا ٺهيل ڪوپا هڪ هنڌ گڏ ڪيا آهن. (بقايا ڏسو صفحو ۲۴)

جو هوندو آهي. اهي لاروا ٽولين ۾ هوندا آهن ۽ مشڪل سان ڪو هيڏي هوڏي ڦرندا آهن. ليڪن هو هڃ ڪري کاڌو (ڪاري توت جا پن) کائيندا آهن. انهن کي گهٽ ۽ گهٽ هڪ ڏينهن ۾ ۵ کان ۹ ڀيرا ٽڪرا ٽڪرا ڪيل پن ملڻ گهرجن. سندن کل ۴ يا ۵ دفعا ڪنپ ڇاڻڻ وقت لهي ويندي آهي. چوٿين ڀيري ڪنپ ڇاڻڻ کان پوءِ هو هڃ ڪري ڪري انوقت تائين کائيندا رهندا جيسين پوري ريت وڌي وڃن ۽ بچاءُ جو ڪوپو ٺاهين.


(۴) پيوپا Pupa:- لارول عرصو ۳ يا ۵ هفتن کان پوءِ ختم ٿي ويندو آهي ۽ پوءِ پيوپا (Pupa) جو عرصو شروع ٿئي ٿو. هن عرصي ۾ جيت جو ڪوپو (Cocoon) ريشمي قسم جي ڏاڳن سان ٺاهيو وڃي ٿو، جيڪو جيت پنهنجي غدودن مان ڪڍيندا آهن. غدود ڊگها ۽ جسر جو ڳچ جيترو حصو والاريندا آهن. اهي غدود ڳوٺڙين جي شڪل ۾ هوندا آهن.

ڪڪون ٺاهڻ لاءِ سڀ کان پهرين ريشمي ڇڙ ڏاڳا استعمال ڪندا آهن جيڪي انهي کي ڪاٺي يا پن سان چٽڙائين ٿا. آخر ۾ سڌا ڊگها ڏاڳا ٻاهر کان اندر تائين ڪڪون کي ويجهندا آهن. مطلب ته پيوپا انهي ڪوپي جي اندر حفاظت سان رهي ٿو. تندون جيت جي وات مان نڪرڻ وقت ڳوٺڙهيون ۽ صاف ٿين ٿيون ليڪن هوا لڳڻ کان پوءِ سخت ٿيو وڃن. لاروا کي ڪڪون ٺاهڻ ۾ اٽڪل ۳ ڏينهن لڳندا آهن.

جڏهن ڪڪون کي ڇڏي ڏبو ته ان مان جيت کيس ٽوڙي ٻاهر نڪري ايندو، تنهن ڪري اسان کي پن تسمن جي تند ملندي. هڪڙي تند ڊگهي، ۽ ٻي تند ٿل- جيئن ته ڊگهي تند تمام ٿوري انداز ۾ نڪرندي آهي تنهن ڪري ڊگهي تند حاصل ڪرڻ لاءِ پيوپا کي ڪڪون جي اندر ئي ماربو آهي. اهڙي ڪڪون کي بچ وارو ڪوپو (Seed Cocoon) سڏبو آهي. ليڪن جنهن مان جيت پوپٽ ٿي ٻاهر نڪري اچي ته اهڙي قسم جي ڪڪون کي ”پيئرسنگ ڪڪون“ (Piercing Cocoon) سڏبو آهي. جيئن ئي پوپٽ ڪڪون کان ٻاهر نڪري ٿو ته هڪدم نر ۽ مادي پوپٽ پاڻ ۾ ملاپ ڪن ٿا ۽ ساڳي شام جو مادي آڻا لاهيندي آهي. آڻن لاهڻ کان پوءِ پوپٽ اڇلائي ڇڏجن.

پالڻ:- جيتن کي پالڻ لاءِ هيٺيون سامان گهرجي:-

سائنس



دنيا ۾ سڀ کان بلند عمارت

نيويارڪ ۾ هڊسن درياھ جي ڪناري بوئرڊن هٿن جي مٿان ”ورلڊ ٽريڊنگ سينٽر“ (World Trading Centre) يعني ”عالمي تجارتي مرڪز“ تعمير ٿي رهيو آهي جيڪو ۱۴ ايڪڙ زمين جي مٿان ٺهندو. هن ۾ ۶۰ جايون اهڙيون ٺهنديون جن ۾ ۱۱۰ طبقا هوندا ۽ انهن جي بلندي ۱۳۵ فوٽ هوندي. مرڪز جي تعمير تي اٽڪل ۶۰ ڪروڙ ڊالر خرچ ٿيندا. تعميري فن جو هي پهريون مثال آهي جنهن لاءِ ۱۴ ايڪڙ ايراضي ۽ ٽي ايترو خرچ ڪيو پيو وڃي. وري دلچسپ ڳالهه اها آهي جو جيڪا عمارت انهيءَ ايراضي ۽ تي ٺهندي، ان جي ايراضي ۲۳۰ ايڪڙ هوندي ۽ ان جي اندر هڪ ڪروڙ چورس فوٽ جاءِ رڳو مسواڙ تي ويهڻ وارن لاءِ هوندي. هن مرڪز جا ۸۰ طبقا ٺهي چڪا آهن ۽ باقي سڄي جاءِ ۱۹۷۳ع تائين گهڻو ڪري مڪمل ٿي ويندي. هي مرڪز دراصل هڪ عالمي سپر مارڪيٽ آهي جتي آمدني روانگي ڪرڻ وارا ماڻهو دنيا جي ڪنهن به ملڪ سان ڏيئي لپتي ڪري سگهندا ۽ انهن کي هرڪا معلومات ملي سگهندي. مرڪز ۾ ڇهه شوروم هوندا جن ۾ دنيا جي سڀني ملڪن جي شين جي مستقل نمائش لڳل هوندي.

ائين چئجي ته هي هڪ هڪ تمام وڏو شهر هوندو جنهن ۾ هر قسم جي سهوليت ميسر هوندي. هن مرڪز ۾ ۵ ايڪڙن جو هڪ خوبصورت باغ پڻ آهي جنهن ۾ گل، ڦوهارا ۽ حسين جھيل پتلا رکيل آهن. جيڪي جايون ٺهي رهيون آهن انهن ۾ به ۱۱۰ طبقن واريون هونديون ۽ چار ننڍيون جايون وري اٺن طبقن سان هونديون. هن ۾ ۵۰ هزار ماڻهو ڪم ڪندا ۽ روزانو ڪاروبار ڪرڻ لاءِ ايندڙ ويندڙ ماڻهن جو تعداد ۸۰ هزار هوندو. هن ۾ ۴۰۰ ڪمرن واري هڪ هوٽل پڻ هوندي. هن جي مختلف ننڍين هوٽلن ۾ هڪ ئي وقت ۲۰ هزار ماڻهو ماني کائي سگهندا. خريداري ڪرڻ لاءِ باغ جي هيٺان اٺن ايڪڙن تي ٺهيل دڪانن تان هرڪا سائنس

شيءَ ملي سگهندي. ان کانسواءِ ٻن هزار ڪارن جي بيٺڻ، مختلف شين جي گدامن ۽ مشينري لاءِ پڻ زمين هيٺ گنجائش رکي وئي آهي.

ايڏي وڏي جاءِ ٺاهڻ ڪا سولي ڳالهه نه آهي. سڀ کان پهريائين ته ڊزائين جو مسئلو هو جنهن لاءِ تعميرات جي هڪ ماهر ”ياماساڪي“ سڄي جاءِ لاءِ ڪاٺ جا ماڊل تيار ڪرايا ۽ انهن کي ملائي اٽڪل هڪ سو ڊزائينون ٺاهيائين. انهن مان صرف اهائي ڊزائين پسند ڪئي وئي جيڪا هن وقت ٺهي رهي آهي.

هن عمارت ۾ آندورفت جي مسئلي کي حل ڪرڻ لاءِ بجليءَ تي هلندڙ گاڏيون استعمال ڪيون وينديون جيڪي وڏ ۾ وڏ ٻن سٽن ۾ ڪنهن به طبقي تي پهچائي ڇڏينديون. مرڪز ۾ ٽي ايڪسپريس گاڏيون هلنديون. پهرين گاڏي پهرئين طبقي کان ۳۳ طبقي تائين هلندي، ٻي ۴۴ طبقي کان ۷۷ طبقي تائين هلندي ۽ ٽين گاڏي ۷۸ طبقي کان ۱۱۰ طبقي تائين هلندي. هر گاڏيءَ ۾ ۵۵ ماڻهو ويهي سگهندا ۽ ان ۾ روزانو اٽڪل اڍائي لک ماڻهو سفر ڪري سگهندا.

هن مرڪز جي صفائي به هڪ مسئلو آهي. مثال طور هن جي ۳۳ هزار چاهه سو درين کي ڪيئن ڌوئو وڃي؟ ان مقصد لاءِ بجليءَ جو آٽوميٽڪ (پائيهي هلندڙ) واشر استعمال ڪيو ويندو جيڪو هڪ منٽ ۾ پنجن طمعن جي درين کي ڌوئي ڇڏيندو. ان سان گڏ هڪ برش هوندو جيڪو شيشا صاف ڪندو ۽ اسپنج جهڙو ڪپڙو وري انهن کي خشڪ ڪندو ويندو. هن صفائيءَ لاءِ جيڪو پاڻي استعمال ڪيو ويندو ان کي صاف ڪري وري ڪم آندو ويندو.

جون ۱۹۷۲ع

چند ڪلاڪن لاءِ گرمي مهياڪڻي ويندي آهي. ان کانسواءِ ٽرانسپورٽر بيلٽ ذريعي ڪڪڙين کي داڻو پڻ ڏنو ويندو آهي خوراڪ جي اهم جزن جي انتخاب ڪرڻ وقت سخت احتياط ڪيو ويندو آهي ۽ اهاڻي هڪ خاص ڳالهه آهي جنهن ۾ سائنس جو وڏو ڪمال رکيل آهي. هن فارم تي ڪم ڪندڙ ماڻهن جو بنيادي ڪم صرف مشينن کي ٺيڪ ڪرڻ ۽ اهو ڏسڻ هوندو آهي ته آيا مشينون صحيح ڪم ڪري رهيون آهن يا نه. هن فارم ۾ حاصل ٿيندڙ آڻن جو تعداد عام رواجي طريقن سان حاصل ٿيندڙ آڻن کان ڏيڍو ٿو هوندو آهي.

ڳالهائيندڙ ڪتاب

يوگوسلاوي ۾ سائنسدانن جي هڪ گروپ هڪ اهڙو طريقو ايجاد ڪيو آهي جنهن جي وسيلي ڪتاب ڳالهائي سگهندا. ونڪا (Vinca) ۽ بورس ڪيڊرڪ نيوڪليئر انسٽيٽيوٽ جي سائنسدانن جو چوڻ آهي ته پهريائين ڪتاب تي لکيل اکرن جي پوروچوڻيءَ تي آواز جو رستو (Sound Track) ٺاهيو ويندو ۽ پوءِ ان آواز کي جهڻ لاءِ انڊين جهڙو هڪ اوزار ٺاهيو ويندو جنهن کي جڏهن انهن اکرن مٿان هلايو ته آواز پيدا ٿيندو. هن ايجاد مان پرائمري اسڪولن جي ٻارن ۽ نابين ماڻهن کي ڪتاب پڙهڻ ۾ سهوليت ٿيندي.

ٻارن کي وهنجارڻ جي مشين

آمريڪا ۾ ٻارن کي وهنجارڻ جي هڪ مشين ايجاد ڪئي ويئي آهي جنهن ۾ هڪ سيلنڊر ٿئي ٿو. ٻار کي سيلنڊر اندر وڌو ويندو آهي ۽ مشين چند سيڪنڊن ۾ ٻار کي صاف هڻي گرم پاڻيءَ سان وهنجاري ڇڏيندي آهي. ٻار کي سيلنڊر ۾ وجهڻ وقت سندس نڪ ۽ منهن ٻاهر هوندو آهي جنهن ڪري ان جي ماءُ پيءُ کي به ڪو الڪو نه ٿيندو آهي ته سندن ٻار ٻڏي ويندو.

تيز رفتار ريل گاڏيون

اڄ ڪلهه اهو خيال عام ٿي ويو آهي ته ريل گاڏين جي سفر ۾ گهڻو وقت لڳي ٿو. ڪيترا ماڻهو اهوئي چاهيندا آهن ته جيترو ٿورو وقت لڳي اوترو سٺو تنهنڪري دنيا جا ڪيترائي ملڪ ريل گاڏين جي رفتار وڌائڻ ۽ انهن کي وڌيڪ آرام ده ٺاهڻ لاءِ ڪوشاڻ آهن. اڄ ڪلهه گاڏين جي رفتار ۸۰ ميل في ڪلاڪ آهي پر ۱۰-۱۲ سالن کانپوءِ سندن رفتار ۱۵۵ ميل في ڪلاڪ ڪئي ويندي ۽ گاڏيون پٽڙين کان ٿورو سٺي ٿي هلنديون سندن سٽون پڻ خلاصيون ٺاهيون وينديون. بجليءَ ذريعي ريل گاڏين کي هلائڻ وارو طريقو ترقي ڪيل ملڪن ۾ ته پراڻو ئي چڪو آهي پر اڄڪلهه پاڪستان ۾ به لاهور ۽ خانيوال جي وچ ۾ ريل گاڏيون بجليءَ ذريعي هلنديون آهن.

تيز هوائن ۽ طوفانن کان محفوظ رکڻ لاءِ به خاص انتظام ڪيو ويو آهي. جيڪڏهن ڪو طوفان ڏيڍ سؤ في ميل ڪلاڪ جي رفتار سان لڳندو تڏهن به هن جاءِ کي ڪو نقصان ڪونه پهچندو. هن جي درين ۾ جيڪو شيشو استعمال ڪيو ويو آهي اهو عام رواجي شيشي کان اڻ دفعا وڌيڪ مضبوط آهي ۽ ان کي هڪ خاص گرميءَ جي درجي تي تيار ڪيو ويو آهي جنهن تي تمام گهڻي طوفان جو به اثر ڪونه ٿيندو.

اهڙيءَ تمام منجهيل جاءِ لاءِ مواصلات جو نظام ڪيئن قائم ڪيو ويو هوندو؟ ان لاءِ ڪمپيوٽر سسٽم (Computer-System) رکيو ويو آهي. دنيا جي ڪنهن به ملڪ يا ڪنهن به شيءِ جي باري ۾ پڇڻو هجي ته مرڪز جي ڪمپيوٽر کي فون ڪرڻو پوندو. جواب ۾ ٽيليويزن وانگر ”نوٽو اسڪرين“ (پردي) تي تصويرون اچڻ شروع ٿي وينديون. شين جي ڏي وٺ لاءِ قيمتن جي خبر ڪيئن پوندي؟ ان لاءِ مرڪز ۾ دنيا جي هر بئنڪ جي شاخ گهڻو ڪري موجود آهي جتي هر ملڪ جي نائي جي ماسٽائي سگهندي.

اڄڪلهه دنيا ۾ وڏين ۽ ويڪرين جاين جي بجاءِ بلند ترين جاين ٺاهڻ جو رواج وڌي رهيو آهي. ان جو سبب ڪان وڏو سبب زمين جي قلت آهي. بلند جاين ٺاهڻ ۾ سائنسي علمن ۽ فنن جو استعمال بيحد ضروري آهي. صفائي، اڇ وڇ، مواصلات ۽ اهڙن ٻين مسئلن تي ڪنٽرول ڪرڻ آسان ڪم نه آهي، تنهنڪري عالمي تجارتي مرڪز هڪ ٺهڻ ۽ دلچسپ تجربو آهي.

ميشينن سان هلندڙ مرغي خانو

جمهوريه تاتاريه جي هڪ ڳوٺ بول شيمئي ڪايوچي جي هڪ پولٽري فارم ۾ ۲۰ هزار ڪڪڙيون رکيل آهن. هن فارم ۾ مختلف جڳهين تي پٽيون ۽ ڊائل وغيره رکيل آهن جن تي هي اکر لکيل هوندا آهن: ”صبح شام ۽ رات“. هن فارم ۾ ڪڪڙيون هيڏي هوڏي ڊوڙي ڪونه سگهنديون آهن ۽ نه وري ڪو سچ ٿي ڏسن. هو هڪ ئي جاءِ تي داڻو کائينديون آهن ۽ پيا لاهينديون آهن. هن مقصد لاءِ پاڻيهي هلندڙ مشينن جي ضرورت ٿئي ٿي جيڪي ڪڪڙين جي حياتياتي ۽ جسماني خصوصيات جو رڪارڊ رکنديون آهن.



مختلف تجربن مان معلوم ٿيو آهي ته ڪڪڙين جي آڻن لاهڻ جو دارومدار سنئون سڌو روشنيءَ سان تعلق رکي ٿو. جيتوڻيڪ فارم کي سچ جي روشنيءَ کان محروم رکيو ويندو آهي ان هوندي به ان ۾ روشنيءَ جو ايترو مقدار فراهم ڪيو ويندو آهي جيڪو سچ جي روشنيءَ واري گهٽتائي کي پورو ڪيو ڇڏي. هن لاءِ خود ڪار مشينن ۾ روشني فراهم ڪرڻ لاءِ خاص قسم جا اوزار لڳل هوندا آهن. پاڻيهي هلندڙ مشينن وسيلي چند ڪلاڪن لاءِ روشني چند ڪلاڪن لاءِ هواءِ ۽

وڏو مسئلو پيدا ڪري ڇڏيو آهي. هي ٻئي آفتون جو قدرتي
ٽهر آهن. هڪ دفعو ڪٿي ڪو اهڃاڻ ظاهر ٿين. بس پوءِ
اوسي پاسي کي وڇڙندڙ بيماريءَ وانگر ويرم ڪيو وٺن.

خوراڪ انسان ذات جو بنيادي مسئلو آهي. جيستائين
انسان زندهه آهي، غذا جي ضرورت کيس آهي ئي آهي، مگر
جيئن جيئن ڏينهن ڏينهن آدمشاري وڌندي رهي ٿي تيئن تيئن خوراڪ
جو مسئلو به زياده پيچيده ۽ تڪليف ده ٿيندو ٿو نظر اچي.
جيڪڏهن دنيا جي آدمشاري جا انگ اکر وٺبا ته ڏسڻ ۾ ايندو
تہ جتي ۱۸۳۰ع ۾ آدمشاري ۱ - ارب هئي، اتي ۱۹۳۰ع ۾
آدمشاري ۲ - ارب ٿي وڃي ٿي. اها وري ۱۹۶۰ع ۾ وڌي
۳ - ارب ٿي ٿي جا شايد سن ۲۰۰۰ع جي پڇاڙي ۾ ۴ - ارب
وڃي ٿيندي. ٻين لفظن ۾ هر پنجن ملڪن ۾ آدمشاري ۾ ڏهن
ماڻهن جو اضافو ٿئي ٿو.

اسان جي آدمشاري تہ ائين وڌندي رهي ٿي، مگر خوراڪ
حاصل ڪرڻ جا ذريعا ۽ آباد ٿيندڙ زمين محدود آهن. وڏي
مشڪل ڳالهه جنهن اسان جي وطن ۾ خوراڪ جي مسئلي
کي بيمحد نازڪ بنايو آهي، سا آهي سم ۽ ڪلر جهڙي موذي
مرض جو اسان جي آباديءَ لائق زمين تي حملو. هاڻي هڪ
طرف اسان جي آدمشاري ۾ بيمحد اضافو، ٻئي طرف محدود
آبادي لائق زمين، ٽئين طرف ان زمين کي سم ۽ ڪلر جو
مرض، انهن ڳالهين اسان کي انتهائي سنگين حالت تي پهچائي
ڇڏيو آهي. جهڙيءَ طرح انسان جي بدن لاءِ ناسور ٻڄڙي
کان ٻڄڙي بيماري آهي، تهڙيءَ طرح زمين جون بيماريون سم
۽ ڪلر آهن. سم ۽ ڪلر ٻه ڌار ڌار مصيبتون آهن. جتي
ڪلر آهي، اتي سم جو هجڻ ضروري ڪونه آهي، مگر جتي
سم آهي، اتي ڪلر هئڻ لازمي آهي.

وري سوال ٿو اٿي ته ”سم“ يعني واٽرلاجنگ (Water
Logging) ٻه ڌار ڌار فصلن لاءِ ڌار ڌار معنيٰ رکي ٿي.
جيڪڏهن پاڻي سطح زمين کان اٽڪل چار فوٽ هيٺ آهي ته
اها زمين ساربال ٻوڪ لاءِ سم ۾ مبتلا نه آهي، پر وونل يا
اهڙا ٻيا فصل جن جي پاڙ اونهي وڃي ٿي، انهن فصلن لاءِ اها
زمين سم زده چئبي. سم واري زمين ۾ زير زمين پاڻيءَ جي
سطح مٿي چڙهي اچي ٿي، جنهن ڪري عام طرح فصلن جي
پاڙن وارا سوراخ پاڻي سان ڀرجي پوئتا ۽ هوا جو گذر بند
جون ۱۹۷۲ع



جا دشمن ”سم ۽ ڪلر“

ڪنهن به ملڪ جي معاشي ترقيءَ جو دارومدار ان
ملڪ جي زرعي پيداوار تي هوندو آهي. پاڪستان معدني
پيداوار جي گهٽتائيءَ سبب هڪ زرعي ملڪ ليکيو وڃي ٿو،
انهيءَ ڪري زرعي مسئلن کي اولين قومي اهميت ڏني
وڃي ٿي. جيڪڏهن اسين پاڪستان جي گذريل ڏهن ٻارهن
سالن جي زرعي ترقيءَ جو جائزو وٺنداسون ته خبر پوندي ته
پاڪستان جي بئراج وارن علائقن ۾ جنهن رفتار سان زمين
ڪٽي ۽ جي لائق ٺاهي ٻئي وڃي انهيءَ کان وڌيڪ تيزي
سان زراعت هيٺ آيل وڏا علائقا سم ۽ ڪلر جي ڪري تباهه
ٿيندا ٿا وڃن. سم ۽ ڪلر جو مسئلو دراصل ۱۵ سالن جي
عرصي کان به گهڻو پراڻو آهي. ائين چوڻ وڌيڪ صحيح
ٿيندو ته موجوده مستقل واڌن ۽ بئراجن جي استعمال کانپوءِ
ٽي زمين ۾ سم ۽ ڪلر وڌيڪ نمايان ٿي، اسان جي لاءِ هڪ

مائس

طرح حالتن جو جائزو وٺندا سون ۽ هنن نازڪ مسئلن کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪندا سون ته نظر ايندو ته درحقيقت اهي مسئلا ٻئي ڪنهن جا نه مگر اسان جا پنهنجا ئي پيدا ڪيل آهن، جن جا هيٺيان سبب آهن :-

- ۱- واهن جو وسيع چار
 - ۲- زميندارن طرفان پوک جي غلط طريقن جو استعمال .
 - ۳- آباديءَ جي ضرورت کان زياده پاڻي جو استعمال.
 - ۴- زائد پاڻي جي نيڪال جو بندوبست نه هئڻ .
 - ۵- زياده ساربال جو بندوبست نه هئڻ .
 - ۶- لڳاتار آبادي هيٺ آڻي خشڪ ٿيڻ جو موقعو نه ڏيڻ .
- پاڪستان ۾ دنيا جا وڏي ۾ وڏا آبپاشي منصوبا آهن مگر انهن جي فاضل پاڻي جي اخراج جو ڪوبه خاطر خواه انتظام نه آهي. اهڙي سبب آهي جو سال بسال هميشه وهندڙ واهن جي اثر هيٺ هزارين ايڪڙ زرخيز زمين سم جي آزار کان بيڪار ٿي ويندي آهي .

متاثر ٿيل زمين جي سڌاري لاءِ اپاءَ

سم زده ايراضين کي، سطحي ۽ نيم سطحي ايراضين مان پاڻي جي نيڪال لاءِ هٿرادو ناليون ڪوٽي گهٽ ڪري سگهجي ٿو جنهن جي ڪري تري واري حلقو کان هيٺ پاڻي جي شرح گهٽجي ٿي. سٺي فصل حاصل ڪرڻ لاءِ ضروري آهي ته پاڻي جي شرح زمين جي سطح کان چار پنج فوٽ هيٺ هجي. اهڙي نيڪال جي بندوبست لاءِ هيٺين ڳالهين جو خيال رکيو وڃي:-

- ۱- فصل هيٺ آيل زمينن جي پاڻي جي نيڪال جو چڱو بندوبست .
- ۲- زمين مان نڪتل گندي پاڻي کي ڪنهن مناسب جڳهه تي پهچائڻ جو بندوبست .
- ۳- پاڻي کڻي ويندڙ ڪئنال وغيره جي نيڪال جو طريقو .

سم جي واڌ کي روڪڻ لاءِ اپاءَ

- ۱- ضايع ٿيندڙ پاڻيءَ کي ڪفايت سان استعمال ڪرڻ، پاڻيءَ جي گهڻي استعمال کان پرهيز ڪرڻ، واري ڦيري سان پاڻي ڏيڻ. نالين ۽ واهن کي سميت سان ٺهرائڻ ڪري مٿيون مقصد حاصل ٿي سگهي ٿو .
- ۲- سم وارو پاڻي ڪنو ڪرڻ لاءِ واهن جي ڀرسان ڪاهيون کوٽيون وڃن.

ٿي وڃي ٿو. جڏهن زمين کي سم وٺندي آهي، تڏهن فصلن جي پيداوار گهٽ ٿي ويندي آهي. سم واري زمين ۾ لوڻائيون شيون مٿي چڙهي اچن ٿيون ۽ فصلن جي پاڙن ۾ رهي فصلن کي برباد ڪري ٿيون ڇڏين. مطلب ته فصلن جو گهٽ ٿيڻ پڻ سم جي نشانين مان هڪ آهي. سم زده علائقي ۾ ڪوهن ۾ پاڻي به مٿي چڙهي ايندو آهي ۽ اڪثر ڪارو ٿي پوندو آهي. سم مان مراد آهي زير زمين پاڻي جي سطح جو ايترو مٿي چڙهي اچڻ جو اهو پاڻي فصلن جي پاڙن ۾ مستقل طور بيٺو رهي يا ڪن حالتن ۾ زمين جي سطح تي نمودار ٿئي. سم جي ظاهر ٿيڻ سان زمين جي قوت افزائش ختم ٿي وڃي ٿي ۽ رفت رفت ان ۾ ڪا به آبادي ڪري نه ٿي سگهجي. سنڌ ۾ آباد ٿيندڙ بهترين زمين جا ۱۱۳ لک ايڪڙ سم ۽ ۱۶۰ لک ايڪڙ ڪلر جي نذر ٿي چڪا آهن. انهيءَ کانسواءِ ۱۱۲ لک ايڪڙ زمين ۾ ڪلر جا اثرات نمودار ٿي چڪا آهن .

ڪار يعني سٺينشي (Salinity) دراصل دنيا جي سڀني ملڪن ۾ عام ٿي ويو آهي. دنيا جي مختلف علائقن ۾، جتي ڪلر هڪ وڏو مسئلو بڻجي ويو آهي، اولهه پاڪستان کانسواءِ درياءُ نيل جي وادي آمريڪا جي گڏيل رياستن مان نيو ميڪسيڪو، اري روما ۽ ڪيليفورنيا جاري پٽ آهن. اهڙي طرح اولهه آسٽريليا جي رڻ پٽ ۾ به هيءَ شيءِ مستقل مٿي جو سور بڻجي وئي آهي، پر اسان جي ملڪ کانسواءِ هر هنڌ نهايت استقلال ۽ ديانداري سان انهي جي خلاف جنگ شروع ڪئي ويئي آهي. آمريڪا ۽ آسٽريليا جهڙن ترقي يافتہ ملڪن کي ته ڇڏيو پر مصر جهڙي غير ترقي يافتہ ملڪ ۾ رڳو ٽن سالن جي قليل عرصي ۾ ڪلر جي خراب ٿيل زمين مان ڏهه هزار ايڪڙ زمين کيتي جي لائق بڻجي چڪا آهن. ڪلر واري زمين ۾ اڪثر سوڊيم جا لوڻ ملن ٿا. اهڙن هنڌن تي سوڊيم ڪلورائيڊ ۽ سوڊيم ڪاربونيٽ سڀني کان اهم آهن. هونءِ سوڊيم بائڪاربونيٽ ۽ مگنيشم به ملندا آهن .

مطلب ته اسان جي وطن جي هر سال هڪ لک ايڪڙ آبادي هيٺ زمين سم ۽ ڪلر سبب برباد ٿي رهي آهي يا ائين ڪئي ڇڏجي ته هر پنجن منٽن ۾ هڪ ايڪڙ زمين هنن موذي مرضن جي نذر ٿي رهي آهي. جيڪڏهن اسين پوري

خرابي اها آهي جو انهن لاڳو واهن يا ڪاهين جي سطح هيٺين علائقن ۾ وڌي واه کان ڪجهه مٿي رکڻي پوندي ۽ اهي وڏا واه اڳ ۾ ئي آسپاس جي زمينن کان اوچا آهن، تنهنڪري نتيجو اهو نڪرندو جو لاڳو واهن يا نالين مان پاڻي سمي سمي نڪري پوندو ۽ زمين ۾ سم ۽ ڪلر انهن علائقن ۾ به پکڙجي ويندا جتي اڳ ۾ ايترا ڪونه هئا يا اصل ڪونه هئا.

ان ڪري انهن سڀني مسئلن جو حل رڳو هي ٿي سگهيو ته واهن جي پاسن ۽ ترن تي سيمنٽ يا ڪنهن اهڙي پٽي ان گرنڊز مادي جا تهه ڇاڙهيا وڃن، ته جيئن پاڻي بلڪل نڪري نه سگهي. انهي ۾ شڪ ناهي ته انهي تي خرچ تمام گهڻو ٿيندو، پر اهو خرچ زمين جي ههڙي مسلسل نقصان کان ڪنهن به صورت ۾ وڌيڪ ڪونهي. باقي رهيو تباه ٿيل زمين کي کيتي جي لائق ڪرڻ جو مسئلو، سو اڳئين مسئلي کان به ڏکيو آهي. پر انهي سلسلي ۾ چانورن جي پوک فائديمند ٿي سگهي ٿي. انهي ڏس ۾ ڏٺو ويو آهي ته اتر اولهه واه ۽ دادو واه ۽ چانورن واري واه وارن علائقن تي جتي اڪثر چانور پوکيا ويندا آهن، سم ۽ ڪلر جو اثر تمام ٿورو آهي. چانورن جي لاءِ پوک ۾ ايترو پاڻي جو مقدار مهيا ڪيو ويندو آهي ۽ اهو زمين جي سطح کان هميشه اوچو رهندو آهي. اهو پاڻي مٽيءَ جي مٿين تهن ۾ موجود لوئن کي ڳاري ان جو وڏو حصو پاڻ سان گڏ زمين ۾ اندر کڻي ويندو آهي. جيڪڏهن واهن مان سم جو سلسلو بند ٿي وڃي ته ٻن چئن چانورن جي فصلن سان مٽيءَ جي مٿين سطح تي موجود ڪلر ايتري قدر گهٽجي سگهجي ٿو، جو ان زمين ۾ باجهري ۽ ربيع ۾ ڄاڻو پوکڻ سان چئن پنجن سالن ۾ ڪلر کان نجات پاڻي سگهجي ٿي. آمريڪا جي گڏيل رياستن سم جو علاج ۽ اپاءُ هيئن ڪيو آهي جو واهن جي پاسن ۽ تري کي سيمنٽ جو لپو ڏنو ويو ۽ پوءِ متاثر علائقي کي پنجن سالن تائين پوکڻ کان روڪيو ويو. انڪري قدرتي طرح انهيءَ جو ائين علاج ٿي ويو جو خشڪ علائقن ۾ سراسري پنج انچ برسات مٽيءَ جي مٿاڇري تي موجود انهن لوئن کي ڳاري پاڻ سان وهائي کڻي وئي ۽ رڳو پنجن سالن کانپوءِ اهي ساڳيون زمينون ٻيهر فصل پوکڻ جي لائق ٿي ويون ۽ فصل اڳئين کان به وڌيڪ ڪاميابيءَ سان ٿيڻ لڳا.

۳ - جوڳي سطحي نيڪال يعني ڊرينج (Drainage) جو بندوبست - جنهن سان زمين جي سطح تان ضرورت کان زياده پاڻي ٻاهر ڪڍي سگهجي.

۴ - پاتار جي پاڻيءَ جي نيڪال جو جوڳو بندوبست. انهي مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ ٻه طريقا اختيار ڪري سگهجن ٿا (الف) پاڻي جي نالين جو بندوبست يا (ب) ڪليل اونهن نالين جو بندوبست.

اسان جي آڏو هاڻي ٻه مسئلا ٿا رهن: پهريون هي ته واهن مان سمندڙ پاڻي کي روڪيو وڃي ته جيئن سم ۽ ڪلر جي مسئلي کي روڪيو وڃي ۽ ٻيو ته جيڪا زمين متاثر ٿي چڪي آهي تنهن کي قابل ڪاشت بنايو وڃي. واهن مان سمندڙ پاڻيءَ کي روڪڻ لاءِ صرف هڪڙي ترڪيب آهي جا خرچ تمام گهڻو گهرندي باقي صحيح نشاني تي وڃي ڪپندي. اهو اهو ته واهن جي پاسن ۽ ترن کي، يا گهٽ ۾ گهٽ رڳو پاسن کي سيمنٽ وغيره جهڙي ڪنهن شيء سان ضرور لپو ڏنو وڃي ته جيئن ڪنارا مضبوط ٿي پاڻيءَ کي سمن نه ڏين. ان جي بجاءِ رڳو بچت جي لحاظ کان انهي مسئلي کي ٻن طريقن سان منهن ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي. انهي مان هڪڙي ڪوشش اها آهي ته پٺين جي ذريعي پاتار جي پاڻي کي ڪڍي واهن ۾ وڌو وڃي ته جيئن هيٺين پاڻيءَ جي سطح زمين جي مٿاڇري کان گهڻو هيٺ ٿي وڃي. پر روهڙي ڪئنال جي ڪناري تي جيڪي ٻمپ لڳايا ويا آهن اهي رڳو ۲۰۰ مڪعب فوٽ پاڻي في ثانيه جي حساب سان اچڻ جي وسعت رکن ٿا جتي واه مان ۱۶۰۰ مڪعب فوٽ في ثانيه سمندو رهيو. ان ۾ ٻي هڪ وڏي خاسي اها آهي ته طاقتور کان طاقتور ٻمپ به وڌ ۾ وڌ مشڪل سان هڪ چورس ميل زمين جي پاڻيءَ تي قابو پاڻي سگهي ٿو ۽ هن هيڏي وسيع علائقي لاءِ جيڪو لکن ميلن جي مسافت تي پکڙيو پيو آهي، تنهن لاءِ هي طريقو مهانگو ته ٿيندو ٿيڻدو پر هر قيمت تي ناڪافي به رهندو.

ٻي تدبير جيڪا ان ڏس ۾ زيرغور آهي سا اها ته واهن جي ٻنهي ڪنارن سان واهن جي ڀرسان ڪجهه ذيلي واه يا ڪاهيون کوٽايون وڃن، جي اهڙيءَ طرح واهن مان سمندڙ پاڻي کي گڏ ڪنديون وينديون ۽ نيٺ هيٺ هلي، انهن ڪاهين کي وري به واهن ۾ وجهي ڇڏبو. پر ان منصوبي ۾

”غرڙاٽ ڪندڙ مڇي“

گروڻين نالي هڪ مڇيءَ جو قسم آهي جيڪا گهڻي انداز ۾ ڪئليفورنيا جي رياست ۾، ڪيپريلو جي ڪناري وٽ نظر ايندي آهي. گروڻين (Grunion) اسپيني زبان جو لفظ آهي، جنهنجي لغوي معنيٰ آهي ”غرڙاٽ ڪرڻ“. هي نالومڻس انهيءَ ڪري پيو آهي، جو اُٿن لاهڻ وقت، هيءَ مڇي اهڙي قسم جو آواز ڪندي آهي، جن ڪو ڪو ڪاٺيءَ ڪيٽري رهيو آهي.

جڏهن سمند جي وڏي وير اٿندي آهي ته هن قسم جون هزارين مڇيون اچي وارياسن ڪنارن تي پونديون آهن ۽ وير جي لهي وڃڻ سان به وري واپس نه وينديون آهن، بلڪ واديءَ جي ميدانن تي گهمنديون ڦرنديون نظر اينديون آهن. ائين ڪرڻ ڪري هنن مڇين لاءِ چيو ويندو آهي ته هي مڇيون جاسوسي ڪرڻ آيون آهن، جاسوسي وري ڪهڙي ڪنديون آهن! هي صرف اهو ڏسنديون آهن ته اُٿن لاهڻ ۽ ڦوڙڻ لاءِ ڪهڙي جڳهه سوزون آهي. اهڙي قسم جي جاسوسي ڪري وري واپس هليون وينديون آهن. هيءَ ئي هڪ مڇي آهي جا واريءَ تي به هلي سگهي ٿي. اهي مڇيون هڪ لهر سان اچن ته وري ٿوري وقتي کانپوءِ، ٻيءَ لهر سان واپس هليون وڃن.

اهڙيءَ طرح جاسوسي ڪرڻ کانپوءِ وري ٽولن جي صورت ۾ واپس واريءَ تي اينديون آهن ۽ واريءَ جي ڌڙن اندر هڪ قسم جون چرون يا کڏون کوٽينديون آهن. اهو منظر ڏسڻ وڌان هوندو آهي. ڪي ترڦنديون، ته ڪي هيڏانهن هوڏانهن پيون ڦٽڪنديون. ڪي وري، پنهنجي مخصوص هنر ۽ قابليت سان کڏون پيون کوٽينديون. کڏون يا چرون کوٽڻ مادي مڇين جو ڪم هوندو آهي. جڏهن نر مڇيون ڏسنديون آهن ته ماديون چرن کوٽڻ ۾ مشغول آهن ته نر وري انهن جي چوگرد ڦري ايندا آهن، ڇوڪ انهن جي حفاظت هنن جي ڏسي آهي. انهن چرن ۾ ئي ماديون آنا لاهينديون آهن ۽ انهن کي ڦوڙينديون آهن.

ماهرن جو خيال آهي ته هيءَ مڇي هڪ سال جي عمر کان پوءِ آنا ڏيندي آهي ۽ هڪ ئي وقت اٽڪل ٽي هزار آنا ڏئي

سائينس

سگهندي آهي. هي آنا پيلي رنگ يا گلابي رنگ جا ٿيندا آهن چون ٿا ته ڪناري جي گرم ۽ واريءَ تي پرورش حاصل ڪرڻ وارا هي آنا جلدئي ننڍين مڇين جي شڪل اختيار ڪري وٺندا آهن. انهن نون پيدا ٿيل مڇين جا مٿا وڏا، اکيون ٻاهر نڪتل ۽ ٻچ ڊگها ٿيندا آهن. اندازو آهي ته اهو عمل ڏهن ڏينهن جي عرصي جي لڳ ڀڳ ظاهر ٿئي ٿو. ٻچن ڦٽڻ جو مدار گهڻي قدر آب وهاءِ ۽ زياده تر لهرن جي طاقت تي به آهي. جئين لهرن تڪڙيون ۽ زور واريون لڳنديون، تيئن ٻچن ڦٽڻ ۾ تيزي ايندي.

آٺن مان ڦٽڻ کانپوءِ اهي ٻچا پاڻيءَ جي لهرن سان گڏجي واريءَ واري ميدانن کي ڇڏي پاڻيءَ طرف هليا ويندا آهن، پر شروعاتي ڏينهن ۾ البت تانگهي پاڻيءَ ۾ رهائش ڪندا آهن پوءِ جيئن ويندا وڏا ٿيندا تيئن گهري پاڻي ڏانهن هلندا ويندا. ماهرن جو چوڻ آهي ته مڇي انهن واريءَ جي گهرن ۾ آٺن لاهڻ کانپوءِ ان جاءِ کان گهڻو پري ڪانه ويندي آهي، پر انهن جي سار سنڀال لهندي رهندي آهي. اٽڪل هر ڪلاڪ کانپوءِ لهرن جي وسيلي انهن جي سدسما لاءِ ايندي آهي ۽ وري هلي ويندي آهي. اهڙيءَ طرح مڇي پاڻيءَ کان ٻاهر واريءَ تي اٽڪل ٽيهه سيڪنڊ ترسي سگهندي آهي.

آٺن مان نڪرڻ کانپوءِ ٻچا پاڻيءَ جي وڏين لهرن جو شدت سان انتظار ڪندا آهن ته جئين اندر پاڻي ۾ هليا وڃن. اهو وقت انهن لاءِ بنديخاني وانگر هوندو آهي ڪي ويچارا ته لهرن نه اچڻ سبب آٺن جي کلن ۾ ئي رهجي ويندا آهن ۽ اتي جو اتي مري ويندا آهن. اهي لهرن کين آٺن جي کلن مان نڪرڻ ۾ به مدد ڪنديون آهن.

هي مڇيون سمند ۾، ڪناري کان گهڻو پري ڪونه وينديون آهن. اندر به چاليهن فوٽن کان سٺ فوٽن جي اونهائي تائين وڃي سگهنديون آهن. سندن عمر جي پهرئين سال ۾، انهن جي ڊيگهه پنجن انچن تائين هوندي آهي. نر جي ڊيگهه ڇهن انچن تائين هوندي آهي. ايتري حد کي پهچڻ کانپوءِ ئي هو آٺن لاهڻ جي قابل ٿينديون آهن.

ڪيپريلو جي ڪناري تي مڇين ڦاسائڻ لاءِ لپسن هوندا آهن. البت سورهن سالن کان گهٽ عمر وارن ٻارن کي هٿن سان مڇي ڦاسائڻ جي عام اجازت هوندي آهي. هيءَ مڇي کڏن ۾ نهايت لذت ڏيندي آهي جيڪڏهن تري ڪاٺي ته منجهانئس ٿوڌني جي خوشبوءِ به ايندي.

جون ۱۹۷۲ع



● هن کان اڳ ”سائنس ڪلب“ جي ميمبرن کي پنهنجا ڪروپ ٺاهڻ جو مشورو ڏنو ويو هو. هيستائين فقط چند هندن تي اهڙيون شاخون قائم ٿيڻ جا اطلاع مليا آهن پر انهن به ڏسيل هدايتن مطابق باقاعدي سان عمل نه ڪيو آهي. اسانجي خيال ۾ انجو هڪ سبب شايد اهو به هجي ته گهڻن ٻارن کي اڃا شاخون يا جماعتون قائم ڪرڻ جو عملي تجربو نه آهي تنهنڪري هيستائين ڪو استاد يا مائٽ سندن رهنمائي نه ڪندو. تيسين هن تنظيم جو صحيح بنياد رکي نه سگهيو.

انلاءِ جيڪڏهن مختلف تعليمي ادارن ۾ سائنس پڙهائيندڙ استاد علمي خدمت جي جذبي هيٺ ٻارن سان تعاون ڪن ته جيڪر اهو مسئلو آسانيءَ سان حل ٿي وڃي. بهرحال هاڻي ته اسڪولن وغيره ۾ به گرسيءَ جون موڪلون ٿي رهيون آهن، انهيءَ وچ ۾ اسين ڪواٽرو طريقو يا پروگرام سوچي وٺنداسين جيڪو ٻارن جي سمجهڻ ۽ عمل ڪرڻ جوڳو هوندو. سائنس ڪلب جا ميمبر به انهيءَ سلسلي ۾ ڪو اثرائتو قدم کڻڻ لاءِ پنهنجا رايو ۽ تجويزون موڪليندا ته انهن کي ويچار هيٺ آڻڻ ۾ اسين خوشي محسوس ڪنداسين.

”انچارج - ٻارن جا صفحا“

جون ۱۹۷۲ع

● گذريل پرچي (سائنس ڪانفرنس نمبر ۱) جي پسنديدگيءَ بابت ٻارڙن جا ڪيترائي خط پهچي چڪا آهن جن ۾ هنن سائنس ڪانفرنس ۽ ٻارن جي سائنسي ميلي جي ڪاميابيءَ تي اسانکي مبارڪباد پيش ڪئي آهي. اسانجي خيال ۾ اها ڪاميابي منظمين جي ڪوششن سان گڏوگڏ ٻارن جي دلچسپيءَ جو پڻ نتيجو آهي. جن ٻارن هن تقريبن ۾ شرڪت ڪئي تن ايترو ضرور محسوس ڪيو هوندو ته سائنسي علمن ۽ سائنس جي نين ايجادن انسان کي ڪافي فائدو پهچايو آهي تنهنڪري انهن علمن ڏانهن لاڙو رکڻ هنن لاءِ نهايت ضروري آهي. ٻارن جي ميلي جي مختلف پروگرامن جهڙوڪ بحث مباحث، معلوماتي چٽا پيٽي ۽ نمائش وغيره ۾ به ٻارن پنهنجو پاڻ ملهائڻ جهڻاڻه اسين پڻ کين جس ڏيون ٿا. اميد ته ”سنڌ سائنس سوسائٽي“ هر سال اهڙا ميلا منعقد ڪري ٻارن ۾ سائنس لاءِ چاهه ۽ جذبو جاڳائيندي رهندي. ساڳئي وقت اسين ٻارن ۽ خاص طور تي سائنس ڪلب جي ميمبرن کي صلاح ڏيون ٿا ته اهي به پاڻ ۾ گڏجي پنهنجن استادن ۽ مائٽن جي ساٿ سان ان قسم جا پروگرام ٺاهين ۽ پڇنديءَ آهر پنهنجن ڳوٺن يا شهرن ۾ اهڙا ميلا لڳائي سائنسي علمن جو گهڻي کان گهڻو پرچار ڪن.

سائنس


هاضمو ڇا ڪي چئبو آهي؟

اسين روزانه ٽي وقت ماني کائون ٿا، جنهن ۾ اناج، گوشت ڀاڄيون ۽ ميوو وغيره استعمال ڪندا آهيون. اهي سڀئي شيون اسانجي جسم ۾ هضم ٿي اسانجي لاءِ گهربل قوت يعني ڪم ڪرڻ جي طاقت پيدا ڪن ٿيون ۽ باقي بچيل مادو ٽوڪڻ جي صورت ۾ اسانجي بدن مان نڪال ٿي وڃي ٿو. کاڌو ۽ پيون شيون اندر وڃي اهڙو عمل اختيار ڪن ٿيون جو اسانجي بدن لاءِ گهربل رت ۽ گهربل طاقت پيدا ٿئي ٿي. ان تبديليءَ کي ئي "هاضمو" چئبو آهي.

هاضمي جا خاص عضوا هيٺيان آهن:-

(۱) وات (۲) معدو (۳) ننڍو آندو (۴) وڏو آندو

هاضمو ۽ هاضمي جا عضوا



هاضمي جو عمل

- ۱- سيلوري (Salivary) غدود ۲- نڙگهٽ (Esophagus)
- ۳- جگر يا جيو (Liver) ۴- پتو (Gall Bladder)
- ۵- معدو (Stomach) ۶- شيردان (Pancreas)
- ۷- ننڍي آندو جو اڳيون حصو (Duodenum) ۸- وڏو آندو
- ۹- ننڍو آندو ۱۰- نيڪال جو هنڌ (Rectum).

۲- هڪا ڏند. ڪچا ڏند ننڍن ٻارن کي پهريائين ايندا آهن. ڪچن ڏندن کي ٻاڙون نه هونديون آهن. جڏهن ٻار ڪجهه وڏو ٿيندو آهي تڏهن اهي ڪچا ڏند پڇڻ شروع ٿيندا آهن. وات ۾ ٻنهي ڇاڙن تي ڪل ۳۲ ڏند هوندا آهن يعني ۱۶ ڏند هيٺين ڇاڙي ۽ ۱۶ مٿين ڇاڙيءَ تي هوندا آهن. ڏندن جو ڪم آهي کاڌي کي پڇي ٽڪرائڪرا ڪرڻ ۽ پوءِ ان کي ٻيهي سنهو ڪرڻ. انهيءَ ڪري کاڌو آسانيءَ سان هضم ٿي وڃي ٿو.

زبان وات ۾ هڪ ضروري ۽ خاص عضو آهي جيڪو هڪ

ڊگهي ٽڪنڊي مشڪ جي صورت ۾ وات جي تري سان جهٽيل هوندو آهي. زبان جو اڳيون حصو ننڍو ۽ نوڪدار هوندو آهي، جنهن کي زبان جي چوٽي چئبو آهي ۽ اها آزاد هوندي آهي. زبان جي مٿاڇري تي سنهي داڻ داڻ هوندي آهي جنهن سان ذائقي جي خبر پوندي آهي. زبان جي پٺئين پاسي تي هڪ قسم جي ٿلهي جون ۱۹۷۲ع

۱- وات:- وات هاضمي جي سرشتي جي پهرين منزل آهي. هي هڪ پور مثل آهي جيڪو پٺيان ٽڙيءَ سان ڳنڍيل هوندو آهي. وات ۾ کاڌو هيٺين ڇاڙيءَ کي هلائين سان ڇپاڙبو آهي. وات ۾ وري هيٺيون شيون آهن:- ۱- ڏند ۲- چپ يا زبان ۳- غدود. ڏند ٻه ٻن قسمن جا ٿيندا آهن. ۱- ڪچا يا کيرا ڏند

ولوڙيندو رهندو آهي. معدي جي اندرئين تهه تي هڪ قسم جو تمام نفيس پردو آهي جنهن کي ”ميڪوس ميمبرين“ (Mucous Membrane) چئبو آهي. معدي ۾ اندر ننڍڙا ننڍڙا غدود هوندا جن مان وقت بوقت گسٽرڪ (Gastric) نالي هڪ رس نڪرندي آهي جا کاڌي جي نائٽروجن جي جزن کي هضم ڪندي آهي جڏهن کاڌو معدي ۾ داخل ٿيندو آهي ته اتي اٽلي بٽلي پٽڙي صورت اختيار ڪندو آهي جنهن کي نيم هضم کاڌو ڪري چئبو آهي.


۳۔ آندو - آندو ٻن حصن ۾ ورهايل آهي: (۱) ننڍو آندو (۲) وڏو آندو. هي ٻئي ٻان ۾ ڳنڍيل هوندا آهن ۽ سندن ڳنڍجڻ جي هنڌ تي هڪ قسم جو ڍڪڻ رکيل آهي جيڪو ٽوڳ ۽ پاڻيءَ کي ننڍي آندبي مان وڏي آندبي ڏي وڃڻ ڏئي ٿو ۽ انجي ابتڙ وڃڻ کان روڪيندو آهي. کاڌو معدي مان ننڍي آندبي ۾ داخل ٿيندو آهي جتي ان هضم ٿيل سٺي نيم هضم ٿيل نشاستيدار ۽ نائٽروجن جي جزا باقي رهجي ويندا آهن. انهن جزن تي ٻن رطوبتن جو اثر ٿيندو آهي جنهنڪري هاضمي جو ڪم اڳتي وڌندو آهي. انهن رطوبتن مان هڪ کي ”جيري جي رطوبت“ چئبو آهي جيڪا هڪ نليءَ جي ذريعي جيري مان آندبي ۾ داخل ٿيندي آهي. ان جو خاص ڪم سٺي کي هضم ڪرڻ ۽ جيورڙن کي مارڻ هوندو آهي. ٻي وري ”بلبل يا شيردان جي رطوبت“ هوندي آهي جيڪا هڪ نليءَ جي ذريعي ننڍي آندبي ۾ داخل ٿيندي آهي. هن جو ڪم آهي اڳيئي هضم ٿيل نائٽروجن جي جزن ۽ سٺي کي وڌيڪ هضم ڪرڻ. ان کان پوءِ کاڌو وڏي آندبي ۾ داخل ٿيندو آهي، جنهن ۾ هاضمي جو ڪيميائي عمل جاري رهندو آهي. هضم ٿيل کاڌو رت ۾ شامل ٿيندو رهندو آهي. جڏهن هضم ٿيڻ جو ڳيون شيون هضم ٿي وينديون (بقايا ڏسو صفحو ۴۱)

داڻ داڻ هوندي آهي جيڪا ابتي وي (V) اکر جي صورت ۾ ٿيندي آهي. انهيءَ داڻ داڻ ۾ ذائقي معلوم ڪرڻ جي وڌيڪ قوت هوندي آهي. زبان جا هيٺيان ڪم ٿيندا آهن :-

(۱) کاڌي کي وات ۾ اڳتي پوئتي ڪرڻ ته جيئن کاڌو چڱيءَ طرح سان ڇاڙ جي (۲) ذائقو محسوس ڪرڻ (۳) ڳالهائڻ ۾ مدد ڪرڻ (۴) کاڌي کي ڳهڻ ۾ مدد ڪرڻ.

وات ۾ هڪ جون ڳوٺريون يا غدود (Salivary Glands) به ٿيندا آهن. اهي هڪ وارا غدود وات جي اندرئين ۽ ٻاهرئين پاسي ٽن هنڌن تي رکيل هوندا آهن. هڪڙا ڳل جي اندرئين پاسي ڇاڙيءَ جي هيٺان، جن کي ”ڇاڙيءَ وارا غدود“ چئبو آهي. ٻيا زبان جي هيٺان جن کي ”زير زبان“ ڳلڙا سڏبو آهي ۽ ٽيان ڳل جي ٻاهرئين پاسي، ڪن جي اڳيان، ڳل وارين مشڪن ۽ چمڙيءَ جي وچ ۾ هوندا آهن. هڪ وارا غدود هڪ شفاف لڳ لڳدار، گهاٽيرڙي ۽ پٽڙي رس ٺاهيندا آهن. جيڪڏهن ان کي ڪجهه وقت لاءِ هڪ هنڌ رکي ڇڏبو ته ڄمي پوندي ڇاڪاڻ ته منجهس جيڪي لوڻ پيل آهن سي نهري صورت وٺي وڃي تر ۾ پوندا آهن. هڪ ۾ هڪ قسم جي ٻي برس ٿيندي آهي جنهن کي ٽائيلن (Ptyline) چئبو آهي. ان جي مدد سان هڪ ڪاربو هئڊريٽس ۽ نشاستي کي ڦيرائي ڪنڊ جي صورت ۾ آڻيندي آهي. هڪ تمام جلد تيار ٿيندڙ رس آهي، ڇو جو اها کاڌي جي وات ۾ پوڻ شرط ان جي ڪن جزن کي هضم ڪرڻ لاءِ هڪدم نڪري نروار ٿيندي آهي.

۲۔ معدو:- معدو به کاڌي هضم ڪرڻ جو مکيه عضو آهي. معدو هڪ ٿيلهي وانگر هوندو آهي جنهن ۾ هڪ طرف کان کاڌي جي نلي داخل ٿيندي آهي ۽ ٻئي طرف کان ننڍو آندو ٻاهر نڪرندو آهي. معدو پنهنجي مشڪن جي مدد سان کاڌي کي پنهنجي اندر



خلائي مسافر گاڏي


”خلائي مسافر گاڏي“ تيار ڪرڻ لاءِ آمريڪي حڪومت ۵۰ ارب ۵۰ ڪروڙ ڊالرن جي منظوري ڏيڻ جو چيڪو فيصلو ڪيو آهي ان سان آئنده لاءِ خلائي تحقيقات جي مهم ۾ اهڙائي پروگرام عمل ۾ ايندا، جهڙو ۱۱ سال اڳ انسان کي چند تي پهچائڻ لاءِ بڻايو ويو هو. مسافرن کي خلائي سفر تي ڪٿي ويندڙ گاڏي ٺاهڻ جو پروگرام ڇهن سالن ۾ مڪمل ٿيڻ جو اندازو لڳايو ويو آهي. اها گاڏي مسافرن کي اهڙيءَ طرح خلائي سفر تي ڪٿي ويندي جهڙي طرح هوائي جهاز فضا ۾ ۽ موٽر گاڏيون زمين تي مسافرن کي هڪ جڳهه کان ٻيءَ جڳهه تائين پهچائين ٿيون.

هن وقت خلائي سفر تي تمام گهڻو خرچ اچي ٿو ڇو ته خلائي جهاز هڪ دفعو سفر ڪرڻ کانپوءِ بيڪار ٿي وڃن ٿا. انهن جا راکيٽ زمين تان پرواز ڪرڻ وقت ۽ وري واپسي ۾ فضا ۾ داخل ٿيڻ وقت سڙي وڃن ٿا. ان کانسواءِ موجوده خلائي جهاز رڳو هڪ ئي پرواز لاءِ ٺاهيا وڃن ٿا پر نئين خلائي گاڏي مستقل طور تي استعمال ٿي سگهندي تنهنڪري خلائي


سفر جو خرچ به گهڻي قدر گهٽجي ويندو. هيستائين خلائي مسافر گاڏيءَ جون ڪيتريون ئي ڊزائنون پيش ڪيون ويون آهن. انهن ڊزائنن مطابق خلائي مسافر گاڏيءَ ۾ هڪ ايشرڪنڊيشنڊ خانو (ڪاڪ پٽ) هوندو جنهن ۾ هڪ خلاپيما ۽ هڪ انجو ساٿي پائلٽ وهندو. ان کانسواءِ هڪ ڪمرو به هوندو جنهن ۾ به مسافر هوندا. انهن مسافرن کي خلائي لباس پائڻ جي ضرورت نه ٿيندي ۽ نه ئي کين ڪا تربيت ڏنل هوندي. سامان رکڻ جي خاني ۾ هڪ وڏي بس وانگر ”قمري جهاز“ هوندو جنهن ۾ وڌيڪ ۱۲ مسافر سوار ٿيندا.

خلائي مسافر گاڏيءَ جا ٻه وڏا حصا هوندا جن مان هڪ حصو راکيٽ تي مشتمل هوندو، جيڪو گاڏيءَ کي اٽڪل ۳۰ ميلن جي بلندي تي پهچائڻ کانپوءِ جدا ٿي ويندو. ان کانپوءِ گاڏيءَ جو ٻيو حصو ڪم ڪرڻ لڳندو ۽ انجون انجنيون انکي مدار تائين کڻي وينديون.

اميد آهي ته خلائي مسافر گاڏيءَ جو سفر ’ڪيپ ڪينيڊي‘ (آمريڪي رياست فلوريڊا جي خلائي اڏي) کان شروع ٿيندو ڇو ته اتان ئي سڀني انسان بردار آمريڪي جهاز پنهنجو خلائي سفر شروع ڪندا آهن.



راڪيٽ يا هٿرادو گرہ ڪيئن ٿا اڏامن بنيادي اصولن بابت ڪي سولا تجربا



وزن ٻڌو (چيڪي مٽيءَ مان ٺاهيل بال ان مقصد لاءِ بهتر ٿيندو) بال ٺاهڻ وقت آلي مٽيءَ جي وچ ۾ ڏاڳو رکي ڇڏيو ته سڪڻ کانپوءِ اهو ان سان گڏ چمي ويندو. هڪ بال جو قطر ۲ يا ۳ - انچ هجي ۽ ٻئي بال جو اٽڪل هڪ انچ هجي. هاڻي ريل کي پنهنجي آڱرين جي وچ ۾ ائين جهليو جو ڏاڳو توهانجي آڱرين کي نه چهي سگهي. پوءِ هڪ هٿ سان هيٺئين وڏي بال کي هڪ هنڌ جهليو ۽ ٻئي هٿ سان (جنهن ۾ ريل جهليل هجي) ننڍي بال کي گولائيءَ ۾ ڦيرايو. هاڻي هيٺئين بال کي ڇڏي ڏيو ۽ بال هڪ ئي جاءِ تي بيٺل هوندو. ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته هڪ طاقت نه رڳو ٻيءَ طاقت جو توازن قائم رکي ٿي پر ان تي حاوي پڻ ٿئي ٿي. هٿرادو گرہ يا راڪيٽ به اهڙيءَ ريت زمين جي چوڌاري چڪر لڳائيندا رهن ٿا.



(۳) پلاسٽڪ جو پاڻي پيڻ جو گلاس کڻي انکي زمين تي پاسيرو ڪري رکيو ۽ ان ۾ سنگمرمر يا مٽيءَ جو ٺهيل هڪ بال وجهيو. هاڻي گلاس کي پنئين پاسي کان هٿ سان ٿورو هلڪو ڌڪو ڏيو. توهين ڏسندا ته گلاس اڳتي نه وڌندو پر بال ان مان نڪري اڳتي هليو ويندو. هٿرادو گرہ به ڪنهن موٽر يا انجن کان سواءِ انهيءَ اصول تي خلا ۾ اڳتي وڌندا آهن.

[بنافيا ڏسو صفحو ۳۱]


(۱) ٽين جو هڪ گول خالي دٻو کڻو. انجي ٻن پاسن کان ڪوڪي ۽ مٽرڪي سان سوراخ ڪري انهن سوراخن جي وچ ۾ ٽي فوت ڊگهو ڏاڳو ٻڌو. دٻي ۾ هڪ يا سوا انچ جيترو پاڻي وجهو. هاڻي ڏاڳي کي بلڪل وچ مان جهلي دٻي کي مٿي کڻو ۽ انکي عمودي دائرو ۾ گهاريو. توهين ڏسندا ته دٻو جڏهن توهانجي مٿي تان لڳهندو ته ان مان پاڻي هيٺ نه ڪرندو. ان مان ثابت ٿئي ته سينٽريفيوگل فورس (Centrifugal Force) پاڻيءَ کي هيٺ ڪرڻ نٿو ڏئي.

انجو مطلب پين اڪرن ۾ ائين ٿيندو ته شيون جڏهن تيزيءَ سان گردش ڪن ٿيون ته اهي مرڪز ڏانهن ڇڪجڻ جي بدران ان کان پري پري رهنديون. ساڳيءَ ريت هٿرادو گرہ جڏهن تيزيءَ سان گردش ڪري ٿو ته ان تي زمين جي ڪشش جو اثر نٿو پوي.

(۲) سبڻ جي مشين ۾ استعمال ٿيندڙ ڏاڳي جو هڪ خالي ريل کڻو ۽ انجي وچئين سوراخ مان ٽي فوت ڊگهو ڏاڳو وجهي، انجي هر چيڙي تي ڪو

موسمون ۽ هوائون

ڪريون ٿا. اسين ان مان آر پار به ڏسي سگهون ٿا پر هوا کي خود ڏسي يا چهي نٿا سگهون. اهڙي شي جو ذهن ۾ تصور ڪرڻ ضرور مشڪل ٿيندو جيڪا ڏسڻ ۾ نٿي نه اچي يا جنهن کي چهي نه سگهجي. تنهنڪري اهو ڪيئن ثابت ڪجي ته هوا جي موجودگي هڪ حقيقت آهي! اها ڳالهه هيٺين تجربن مان ثابت ڪري سگهجي ٿي.



۱. هڪ گلاس کي اونڌو ڪري پائڻ جي پيالي ۾ وجهو. هاڻي توهين ڏسندا ته ڪا شي آهي جيڪا پائڻ کي گلاس ۾ وڃڻ کان روڪي ٿي. توهانجي خيال ۾

ته گلاس خالي آهي ۽ ان ۾ ٻيڻ جي ڪابه شي نه آهي پر ائين نه آهي. گلاس ڪنهن شي سان ضرور ڀريل آهي ۽ اها شي آهي ”هوا“. سائنسي لحاظ کان انهن شين جو ئي وجود مڃيو ويندو آهي جيڪي جڳهه والارينديون آهن. هوا ۽ پاڻي هڪ ئي وقت گلاس ۾ ماڻي نٿا سگهن. جهڙيءَ طرح ڪي به ٻه ماڻهو ڪپڙن جي هڪ ئي وڳي ۾ ماڻي نٿا سگهن. تنهنڪري پاڻي گلاس ۾ انوقت تائين داخل نه ٿي سگهندو جيسين انکي پاسيرو ڪري هوا کي ٻاهر نڪرڻ نه ڏنو ويندو.

۲. هڪ ٽوڪڙي کي وات سان ڦوڪيو. ٽوڪڙو کانپوءِ انکي آڱرين سان ڊٻائي ڏسندا ته ڪا شي

موسمون :- اسانجي زمين تي آب هوا ۽ موسمون بدلجندڙ رهن ٿيون. ڪڪر، تيز هوا، برسات ۽ برف، اهي سڀئي موسم جون نشانيون آهن. اهي نشانيون موسم بابت اهڙوئي اثر ڏيکارين ٿيون، جيئن ڪاٺ يا مشڪ سان اسانجي خوش طبعي ظاهر ٿئي ٿي. جڏهن اسين ڇڙ يا ناراضگيءَ جو اظهار ڪريون ٿا ته اهو به اسانجي طبيعت جو هڪ قدرتي اثر ليکيو وڃي ٿو. اهڙيءَ طرح موسم جو مدار به ٽن ڳالهين تي هوندو آهي ۽ اهي ٽيئي ڪيفيتون جڏهن پاڻ ۾ گڏيون آهن ته انکي موسم چيو ويندو آهي.

گرمي + هوا + پاڻي = موسم

مطلب ته گرمي، هوا ۽ پاڻي کانسواءِ ڪابه موسم نٿي ٿي سگهي. ”گرمي“ اسانکي سج مان حاصل ٿئي ٿي. ٻي آهي ”هوا“. اسانجي زمين هوا جي تپ سان ائين ويڙهيل آهي جيئن ڪنهن پارسل کي ڪاغذ ۾ ويڙهيو آهي. ٽين شي آهي ”پاڻي“ جيڪو سمنڊن ۽ ڍنڍن، تلاءُن ۽ چشمن ۽ خود اسانجي جسم ۾ موجود رهي ٿو.

موسم جون اهي ڪيفيتون چند تي موجود نه آهن ڇو ته چند، سج کان ئي روشني ۽ گرمي حاصل ڪري ٿو. اتي ڪابه هوا ۽ پاڻي نه آهي تنهنڪري اتي ڪا به موسم ڪانه ٿئي.

موسمون ٻن قسمن جون ٿينديون آهن هڪڙي روزانه موسم، جنهن مان سرديءَ گرميءَ جو اندازو ٿيندو آهي ۽ ٻيون وري سال ۾ چار موسمون ٿينديون آهن، جنکي اونهارو، سيارو، سرءُ ۽ بهار چوندا آهن.

هواڏون :- اسين هوا جي هڪ وسيع سمنڊ ۾ رهون ٿا جيئن مٿي ٻڌايو ويو آهي، هوا اسانجي چوڌاري موجود رهي ٿي. ساهه کڻڻ لاءِ به اسين هوا استعمال


اسانجي جسم جو اندريون دٻاءُ ۽ جسم تي پوندڙ هوا جو ٻاهريون دٻاءُ ٻئي هڪجيترا هوندا آهن تنهنڪري اسين انجو وزن محسوس نه ڪري سگهندا آهيون.

(بقايا—”هاضمو ۽ هاضمي جا عضوا“)

آهن تڏهن باقي بچيل حصو ڦوڳ جي صورت ۾ جسم منجهان ٻاهر نڪرندو آهي.

ڪاڌو ننڍي آندي مان ٿي وڏي آندي ۾ پهچندو آهي جيڪو اٽڪل ۶ فوٽ ڊگهو ۽ ڏيڍ انچ ويڪرو ٿيندو آهي. سندس بناوت ننڍي آندي وانگر ئي هوندي آهي پر رڳو ان کان وڌيڪ ويڪرو ٿيندو آهي ۽ اندرئين پاسي تي داڻ داڻ ڪانه هوندي اٿس. هي ٻه ڀيت واري خال ۾ پيل هوندو آهي ۽ ٽن ڀاڱن ۾ ورهايل آهي جن کي جدا جدا نالا ڏنل آهن. وڏو آندو ڪاڌي هضم ڪرڻ ۾ ڪو مکيه حصو ڪونه ٿو وٺي. جڏهن ڦوڳ ۽ پاڻي ننڍي آندي مان لنگهي وڏي آندي ۾ ايندا آهن. تڏهن وڏو آندو پاڻيءَ جو ڪجهه حصو پاڻ جهلي وٺندو آهي ۽ ڦوڳ کي بدن مان ٻاهر نڪال ٿيڻ لاءِ موڪليندو آهي.


(بقايا — ”سائڊسي وندر“)



(۴) رٻڙ جو هڪ ڊگهو ڦوڪڻو کٽو ۽ ان ۾ هوا ڦوڪي، ڦوڪڻي جي منهن کي پنهنجين آڱرين سان قابو دٻائي جهليو جيئن هوا ٻاهر نه نڪري. هائي انکي يڪدم ڇڏي ڏيو. توهين ڏسندا ته هوا ڦوڪڻي جي ننڍڙي سوراخ مان تيزيءَ سان نڪرندي ۽ ڦوڪڻو هوا جي مخالف رخ ۾ هيٺ مٿي ٿيندو تيزيءَ سان اڏامي ويندو. راکيت جي اڏامن جو به اهڙي بنيادي اصول آهي. راکيت جي هيٺان سوراخ مان دونهون نڪرندو آهي ۽ راکيت انجي مخالف رخ ۾ مٿي اڏامن شروع ڪندو.



محسوس ٿيندي -
اهائي هوائي ۽
ان سان هوا جي
موجودگي ثابت
ٿئي ٿي.
ڇا هوا جو وزن
ٿئي ٿو؟ ان سوال
جو جواب حاصل
ڪرڻ لاءِ هيٺيون
تجربو ڪري ڏسو.



ڪنهن دوست کي چئو ته هڪ سنهي پني جو ٽڪرو پنهنجي پنهلي هٿن ۾ جهلي بيهي. هائي توهين پنهنجي آڱر سان پني جي هڪ پاسي کي دٻايو. توهانجي آڱر پني ۾ سوراخ ڪري ٻئي پاسي کان نڪري ويندي. هائي ٻيو پنو کٽو ۽ انجي پنهلي پاسن کان ساڳيءَ جڳهه تي آڱرين سان دٻايو. ائين ڪرڻ سان آڱريون هڪ هنڌ بيٺل هونديون ۽ پني تي به ڪو اثر نه پوندو ڇو ته پني تي پنهلي پاسن کان هڪ جيترو ئي دٻاءُ هو. ان مان اها ڳالهه به ثابت ٿئي ٿي ته هوا کي وزن آهي ۽ اها اسانتي دٻاءُ وجهيڻي پر جيئن ته

سائنس

وري بحال ڪئي ويئي آهي. اها ماڻڪي وڌيڪ آساني سان لڳائي سگهجي ٿي ۽ مضبوطيءَ سان بيهاري سگهجي ٿي. روس ۾ هن وقت تائين ڇهن سون کان وڌيڪ اهڙا آپريشن ڪيا ويا آهن.

هڪ بلين ڇا ٿيندو آهي؟

آمريڪا ڪنڊ کي ڳولي نهن کي ساڍا چار سئو سالن کان وڌيڪ عرصو گذري چڪو آهي. اهو عرصو هونءَ تہ تمام گهڻو آهي پر اهو عرصو هڪ بلين منٽ کان تمام گهٽ آهي (هڪ بلين برابر آهي هڪ هزار جي ۽ هڪ ملين برابر آهي ڏهن لکن جي). هڪ بلين سيڪنڊ ۾ ۳۱ سال ٿيندا آهن. هڪ انسان سراسري طور ٻن بلين سيڪنڊن تائين جيئرو رهندو آهي. جيڪڏهن هڪ بلين سگريٽن کي هڪ قطار ۾ رکيو وڃي تہ ان قطار جي ڊيگهه ۷۵۰۰ ڪلوميٽر ٿيندي. هڪ بلين صفحن جي ڪتاب جو وزن ۱۵۰۰ ٽن ٿيندو ۽ انجي ٽولهه ۵۰ ڪلوميٽر هوندي. ان ڪتاب کي پڙهڻ لاءِ ٽيهه هزار سال لڳي ويندا.

سج جي شعاعن سان هيري جي ڪٽائي

هيري ۾ خمس خمس جي دائي جيترو سوراخ ڪرڻ لاءِ عام طور ان ڪلاڪ لڳي ويندا آهن، پر سائنسدانن هاڻي هڪ اهڙي مشين ايجاد ڪئي آهي جيڪا اهو ڪم هڪ سيڪنڊ جي هزارين حصي ۾ پورو ڪندي آهي. ان مشين ذريعي سج جو هڪ ڪرڻو هيري جي نشان ڪيل هنڌ تي مرڪوز ڪيو ويندو آهي جنهن سان هڪ ڌماڪو ٿيندو آهي ۽ هڪدم هڪ ننڍڙو سوراخ ٿي پوندو آهي. تيزيءَ سان ڪم ڪندڙ هي خود ڪار مشينون، واچون ۽ سنڀا پرزا ٺاهڻ ۽ اليڪٽرونڪ صنعتن ۾ (جن ۾ سخت ڌاتو استعمال ڪيا ويندا آهن) ڪم اينديون آهن.

جون ۱۹۷۲ع

سائنسي خبرون

هڪ پٽڙي تي هلندڙ ريل

انسان جي وڏي ايجاد جو عملي مظاهرو يعني گاڏيءَ جو ڦٽو جيڪو ريل گاڏين ۾ استعمال ٿيندو آهي سو هاڻي بربڪ جو ڪم ڏيندو.

روسي سائنسدان هڪ اهڙي ريل تيار ڪري رهيا آهن جيڪا ٻن پٽڙين جي بدران رڳو هڪ پٽڙيءَ تي هلندي. انهيءَ نئين ريل جي رفتار ڪلاڪ ۾ ۳۷۵ ميل هوندي، جنهن ۾ هڪ سو اسي مسافر ويهي سگهندا انجو وزن چاليهه ٽن هوندو. هڪ پٽڙي تي هلندڙ ترين ماسڪو ۽ ليننگراڊ جي وچ ۾ هلائي ويندي. اهڙين ريلن ذريعي ڏورانهن علائقن ۽ مشڪل رستن کي آساني سان طم ڪري سگهبو.

دنيا جو هڪ وڏي ۾ وڏو بجلي گهر

”ازبڪستان“ نالي روس جي هڪ صوبي جي گادي ”تاشقند“ جي ويجهو ۴۴ لک ڪلووات پاڻ وارو ٿرمل بجلي گهر تعمير ڪيو پيو وڃي. انهي جي پيٽ ۾ مغربي جرمني ۾ جيڪو بجلي گهر آهي سو صرف ۲۷ لک ڪلووات آهي.

پلاسٽڪ جي ماڻڪي

روسي ماهرن هڪ نقلي ماڻڪي تيار ڪئي آهي جنهن جو قطر ۵ ايم. ايم آهي ۽ ٽولهه هڪ ايم. ايم کان وڌيڪ نه آهي.

اهڙن ماڻهن جي نظر جيڪا باهم، تاء يا صنعتي حادثي جي وگهي ختم ٿي وئي هجي انهيءَ جي لڳائڻ سان ٻيهر ڪم ڏيئي سگهندي. تازن تجربن ذريعي اهڙن هڪ سو ماڻهن مان ۹۲ ماڻهن جي نظر

سائنس

- ۵۱۹- ارشاد احمد محمد يعقوب دائود پوٽو درجو ٺاڻون
 ڊي - سي - هاءِ اسڪول نصرپور
 ۵۲۰- اشوڪ ڪمار رامجي مل چوسواڻي درجو ستون
 ڊي - سي - هاءِ اسڪول سٺي
 ۵۲۱- محمد اڪرام الحق منظور علي بلوچ درجو چوٿون
 ڀي - سي - هاءِ اسڪول لاڙڪاڻو
 ۵۲۲- حبيب الرحمان ولد غلام نبي ڪونڌر درجو اٺون
 ڊي - سي - هاءِ اسڪول خانواهن
 ۵۲۳- احسان الله ولد عبدالغفور قاضي درجو ڏهون
 ڊي - سي - هاءِ اسڪول نصرپور
 ۵۲۴- شهيلي خان شاهه محمد خان نظاماڻي درجو ستون
 ڊي - سي - هاءِ اسڪول ٽنڊو قيصر
 ۵۲۵- گرمک ولد ڌيرو مل درجو ڏهون
 ڊي - اي - وي هاءِ اسڪول گهوٽڪي
 ۵۲۶- نجب الله ولد نور محمد شيخ (فرست ايئر)
 گورنمينٽ هاءِ ڪاليج شڪارپور
 ۵۲۷- محمد خان ڌڻي بخش نظاماڻي (فرست ايئر)
 مسلم ڪاليج حيدرآباد
 ۵۲۸- شير محمد ولد قادر ڏنو درجو ٺاڻون
 ڪيڊٽ ڪاليج ڀٽارو
 ۵۲۹- رام ديال هاسن داس (انٽر سائنس)
 گورنمينٽ ڊگري ڪاليج سکر



ڏون ميمبرن جا نالا

- ۵۰۶- منظور احمد ولد واحد بخش درجو اٺون
 گورنمينٽ مڊل اسڪول ڌڙي
 ۵۰۷- حفيظ الله ولد امان الله درجو پنجون
 اسڪول مهيسر وڏا
 ۵۰۸- عبدالستار ولد عبدالله خان رک درجو پنجون
 اسڪول تاجو رک
 ۵۰۹- ارشد علي ولد محمد صديق جتوئي درجو اٺون
 مڊل اسڪول لڪو ديرو
 ۵۱۰- ارباب علي ولد رسول بخش بلوچ درجو ڏهون
 گورنمينٽ هاءِ اسڪول غوثپور
 ۵۱۱- نعمت الله ولد غلام مصطفيٰ درجو ٺاڻون
 گورنمينٽ هاءِ اسڪول احمدپور
 ۵۱۲- هادي بخش ولد غلام الله لاشاري درجو ڏهون
 گورنمينٽ هاءِ اسڪول حيدرآباد
 ۵۱۳- نسيم احمد ولد ڪريم بخش درجو ٺاڻون
 گورنمينٽ هاءِ اسڪول حيدرآباد
 ۵۱۴- منصور احمد ولد محمد يعقوب ٿپو درجو ڇهون
 گورنمينٽ هاءِ اسڪول ماتلي
 ۵۱۵- سليم رضا ولد نور محمد پنهور درجو ڏهون
 طالب الموليٰ هاءِ اسڪول دادو
 ۵۱۶- اميش - ايڇ - بالاڻي درجو ڇهون
 گورنمينٽ هاءِ اسڪول غوثپور
 ۵۱۷- ديوان چند ولد چانڊومل درجو ٺاڻون
 گورنمينٽ هاءِ اسڪول غوثپور
 ۵۱۸- ڪرتار - ايم - منڌان درجو ٺاڻون
 گورنمينٽ هاءِ اسڪول غوثپور

”سائنس ڪلب“

* ميمبر شپ ڪوپن *


نالو ۽ پيءُ جو نالو.....
 عمر.....
 پڙهندڙ درجو.....
 اسڪو.....
 ڳوٺ يا شهر.....
 تصديق ڪجي ٿي ته مٿين داخلا بلڪل صحيح آهي.
 هيٺ ماستر / ڪلاس ماستر جي صحيح.....

- ۵۳۰- اعجاز احمد ولد باغ علي دائود پوٽ (فرست ايئر)
شاھ عبداللطيف ڪاليج ميرپور خاص
- ۵۳۱- ڄام صلاح الدين حاجي سيف الله انڙ (انٽر سائنس)
گورنمينٽ ڪاليج نواب شاھ
- ۵۳۲- محفوظ علي ولد علي محمد شاھ
درجو نائون
نور محمد هاءِ اسڪول حيدرآباد
- ۵۳۳- ممتاز ”گل“ بنت محمد يوسف
درجو ڇهون
گورنمينٽ گرلس هاءِ اسڪول حيدرآباد
- ۵۳۴- درگا ديوي ڌيءَ چتر وٺل
درجو ڏهون
گرلس اسڪول مٺي
- ۵۳۵- بي بي رفيع بنت محمد يعقوب ٿيڀو
ٽيون انگريزي
مدرسه البنات حيدرآباد
- ۵۳۶- بي بي فوزيه بنت محمد يعقوب ٿيڀو
درجو پهريون
مدرسه البنات حيدرآباد
- ۵۳۷- آفتاب احمد ايس - چانڊيو
درجو ڏهون
ميونسپل هاءِ اسڪول قمبر
- ۵۳۸- سيد لياقت ولد بهلوان شاھ بخاري
درجو نائون
دي - سي - هاءِ اسڪول سيتاروڊ
- ۵۳۹- عابد ولد عبدالرحيم يوسفائي
درجو ڏهون
ڪامپريهنسو هاءِ اسڪول ميرپورخاص
- ۵۴۰- محمد عثمان ولد لعل بخش
درجو ستون
اسلامي هاءِ اسڪول مسن وڏي
- ۵۴۱- مسعود احمد ولد محمد عثمان ٿيڀو
درجو پهريون
ماڊل هاءِ اسڪول سنڌ يونيورسٽي حيدرآباد
- ۵۴۲- نظير احمد ولد مولانا غلام مصطفيٰ قاسمي
درجو ستون
ماڊل ٽريننگ اسڪول فارمين حيدرآباد
- ۵۴۳- اشفاق احمد ولد محمد يوسف ميمڻ
درجو نائون
نور محمد هاءِ اسڪول حيدرآباد
- ۵۴۴- مقمود احمد ولد محمد يعقوب
درجو پنجون
ماڊل هاءِ اسڪول سنڌ يونيورسٽي
- ۵۴۵- آفتاب احمد ولد نور احمد
درجو نائون
ماڊل هاءِ اسڪول سنڌ يونيورسٽي
- ۵۴۶- ابرار علي ولد عباس علي
درجو ستون
گورنمينٽ هاءِ اسڪول جيڪب آباد
- ۵۴۷- مرلي ڌر ولد ڪيتارام
درجو اٺون
گورنمينٽ هاءِ اسڪول ٽنڊو ڄام
- ۵۴۸- ارشاد احمد فضل الدين راجپوت
درجو ڏهون
گورنمينٽ هاءِ اسڪول ٽنڊو ڄام
- ۵۴۹- سليم مقصود
درجو نائون
گورنمينٽ هاءِ اسڪول سيتاروڊ
- ۵۵۰- مقبول احمد ولد الهڏنو
درجو ڏهون
گورنمينٽ هاءِ اسڪول ماتلي
- ۵۵۱- محمد علي ولد عرض محمد ٽالپر
درجو نائون
گورنمينٽ هاءِ اسڪول ٽنڊو محمد خان
- ۵۵۲- محمد اقبال ولد محمد ابراهيم ميمڻ
درجو نائون
گورنمينٽ هاءِ اسڪول دڙو
- ۵۵۳- عبداللطيف ولد محمد اسماعيل
درجو ڏهون
گورنمينٽ هاءِ اسڪول ميرپورخاص
- ۵۵۴- نند لعل تاراچند پگوانئي
درجو ڏهون
گورنمينٽ هاءِ اسڪول جوهي
- ۵۵۵- ريش لعل امر لعل هبلائي
درجو ستون
گورنمينٽ هاءِ اسڪول ڪنڌڪوٽ
- ۵۵۶- عبدالغني ولد غلام حسين مڱريو
درجو اٺون
گورنمينٽ هاءِ اسڪول سکر
- ۵۵۷- رضاشاه ولد خلدن شاه
درجو پنجون
اسڪول حاجي عبدالله شاه
- ۵۵۸- غلام حسين ولد عبدالحي سمون
درجو پنجون
پرائمري اسڪول سوڀو پنهن


ڪوپن پريندڙن لاءِ ضروري هدايتون

- (۱) هن ڪوپن لاءِ ڪا به داخلا في نه آهي.
- (۲) فقط ۱ سالن تائين عمر جا شاگرد ”سائنس ڪلب“ جا ميمبر بڻجي سگهن ٿا.
- (۳) سائنس رسالي ۾ ڇپيل ڪوپن کان سواءِ سادو ڪوپن قبول نه ڪيو ويندو.
- (۴) ميمبرن جا نالا ترتيبوار نمبر ۾ ڇپيل ٿي شايع ڪيا ويندا.
- (۵) هي ڪوپن ۲۰ پئسن واري لفافي ۾ وجهي، ”ايڊيٽر ماهنام سائنس انسٽيٽيوٽ آف ڪيمسٽري، سنڌ يونيورسٽي، ڄامشورو“ جي اڊريس تي موڪلڻ گهرجي.

حيوانن جي دنيا



Ant Eater "ڪول خور"



* دنيا جو عجيب ترين جانور *

شڪار آسانيءَ سان ڪري سگهي ٿو پر ان جي ڪري هن کي هاضمي ۾ به مدد ملي ٿي. پنهنجي ڊگهي ۽ گول زبان جيڪا بظاهر ڪيڏين وانگر نظر اچي ٿي اها ڪيولين جي ڀر ۾ وجهي انتظار ڪرڻ لڳندو آهي. ليسدار مادي جي ڪرين سوين هزارين ڪوليون ۽ جيت سندس زبان سان چٽيو وڃن پوءِ انهن کي کائي ڇڏيندو آهي.

عام طور تي ڪول خور جا ٽي قسم لڌا وڃن ٿا:

۱. عظيم ڪيول خور ۲. ريشمي ڪول خور ۳. ٿر آگريو ڪيول خور.

ان کان سواءِ دنيا ۾ ڊگهي ڀڄ وارا، ڀڳمي ۽ جابلو ڪيول خور پڻ ملن ٿا. عام طور تي انهن جو جسم وارن سان ڀريل هوندو آهي، پر ڪن قسمن ۾ انهن جي ڇيلهه ايتري مضبوط ۽ سٺي هوندي آهي، جو سڙوالن جي مفاصلي تان 303 جي بنڊوق جي گولي به انجي جسم تان ترڪي هلي ويندي آهي. هي قسم گهڻو ڪري هندوپاڪ ۽ سيلون ۾ لڌو وڃي ٿو. گهڻا ڪيول خور پنهنجن دشمنن کان بچڻ لاءِ وڻن جي گهاٽين ٽارين ۾ رهندا آهن، پر جابلو ڪول خور ٽڪرين جي تري ۾ ڪڏا کوٽي رهندا آهن. ڏينهن جو ڪول خور تمام گهٽ پنهنجي لڪائن مان نڪرندا

جون ۱۹۷۲ع

دنيا ۾ بيشمار دلچسپ ۽ عجيب جاندار لڌا وڃن ٿا، جن مان ڪي پنهنجي عقل ۽ خوبصورتيءَ جي ڪري ۽ ڪي پنهنجي وري عجيب شڪل و صورت ۽ عادت جي ڪري انسان لاءِ حيرت جو سبب بڻجن ٿا. "ڪول خور" جو شمار به انهن عجيب جانورن ۾ ٿئي ٿو. هن جي شڪل صورت عجيب ۽ بي ڊولي آهي. ننڍو مٿو، ڊگهي مخروطي ٿوٺي (منهن)، وارن سان ڀريل ڀڄ ۽ ننڍيون اکيون، مطلب ته هن جي عضون جي بناوت هن کي ٻين جانورن ۾ نمايان ڪري ٿي.

"ڪول خور" ماليه يعني کير پياريندڙ جانورن جي گروهه جو ڀاتي آهي. هن کي ڏند بالڪل ڪونه ٿين. جئين سندس نالي مان ظاهر آهي، هن جي خوراڪ ڪوليون، ننڍا جيت ۽ انهن جا لاروا ۽ پوپا آهي. اڳين پنجن ۾ ٽڪا ۽ مضبوط وريل نهن هوندا اٿس جن جي مدد سان ڪولين يا ماکوڙين جي ڀرن کي کوٽي پنهنجي غذا حاصل ڪندو آهي. قدرت هن کي هڪ خاص قوت بخشي آهي جنهنجي مدد سان لڪل يا گهراڻي وارن ڀرن جي خبر به پئجي وڃي. هن جي زبان گول ۽ ڊگهي هروقت هڪ خاص قسم جي ليسدار مادي سان ترموڏي آهي. ان مادي جي ڪري نه صرف پنهنجو

سائنس

آهن ۽ عام طور تي رات جو شڪار جي ڳولا ۾ نڪرندا آهن. سندن ننڍيون ننڍيون اکيون ڏينهن جي روشنيءَ ۾ تمام مشڪل سان ڪلنديون آهن پر اونڌاڪيءَ ۾ چڱي طرح ڏسي سگهن ٿا. ڪول خور جي هٿ جو انداز ٻه نرالو آهي. ڪڏهن پنهنجي اڳين پنجن تي ويهي گهلجي هلي ٿو ته ڪڏهن پٺين پيرن تي ٿيڻا ڏيندو هلندو آهي. ڪنهن کڙڪي تي يا پير جي چاپ ٻڌي پنهنجو مٿو ٻچ ۾ لڪائي بال جي شڪل اختيار ڪندو آهي. جيڪڏهن ڪير زياده تنگ ڪريس يا دشمن اوچتو حملو ڪري ته ڊگهي ٻچ کي هنتر وانگر گهمائڻ لڳندو آهي - مشهور ماهر حيوانات جي - ڊي - ايڊم (J. D. Adum) هڪ ڪول خور جو ذڪر ڪندي لکي ٿو ته: ”هن پنهنجي ٻچ جي هڪ وار سان ڪتي جا اڳيان ٻئي پير زخمي ڪري ڇڏيا“.

عظيم ڪول خور جو قد اٽڪل ۲ فوٽ ۽ ڊيگهه اٽڪل ۸ فوٽ هوندي آهي. وزن هڪ مڻ کان سوا مڻ تائين هوندو اٿس. پنهنجي بي ڊولي جسم ۽ وزني هٿن ڪري ان کي ڪول خور خاندان جو رچ بڻ چوندا آهن. سندس سڄو جسم خاڪي رنگ جي وارن سان يڪيل هوندو اٿس، ڇاتيءَ تي ڪارن ۽ ڪنڌ تي اڇن وارن جي پٽي نظر ايندي آهي. ٻچ تي گهاٽا ۽ اٽڪل ۱۵ انچ ڊگها وار هوندا اٿس. هي پنهنجي زبان سان ۹ انچن تائين ڪوليون پڪڙي سگهندو آهي. قدرت هن جي پنجن ۾ مضبوطي ۽ تلسوار جهڙي ڌار ڏني آهي هو انهن جي مدد سان ڪولين جي مضبوط کان مضبوط ٻرن کي گهڙيءَ ۾ ڊاهي ڇڏيندو آهي. ٿوڻي (منهن) مخروطي هڪ فوٽ ڊگهو ۽ ٻچ جي ڊيگهه سڄي جسم جي اڌ کان وڌيڪ هوندي اٿس. عام طور تي هي جانور صلح پسند ثابت ٿيو آهي، پر کيس وڌيڪ تنگ ڪيو وڃي ته دليريءَ سان مقابلو ڪندو آهي ۽ اڳين پنجن سان حملو آور ڪري رتو رت ڪري سائس

ڇڏيندو آهي. وڙهن وقت پنهنجي منهن مان جيڪو هڪ ننڍي ٻائيءَ جيترو هوندو آهي، تيز ۽ ڊيچاريندڙ آواز ڪڍندو آهي. خشڪيءَ جو جانور هئڻ جي باوجود ضرورت پوڻ تي ندي يا واه ۾ تري پار ڪندو آهي. مادي سال ۾ صرف هڪ ٻچو ڏيندي آهي، جنهن جي وڌڻ جي رفتار تمام سست هوندي آهي. هڪ سال تائين ٻچو ماءُ سان گڏ رهندو آهي. جيڪا هن کي پنهنجي ڪلهن تي کڻي هلندي آهي. ڪول خور جو هي قسم اتر ۽ وچ آمريڪا، پيراگوي جي اتر، ارجنٽائين ۽ ڪوستاريڪا جي ڏکڻ ۾ وڏين ۽ ڪليل چراگاهن ۾ لڌو ويندو آهي. ڪنهن زماني ۾ پاناما جي اولهه حصي ۾ انهن جي گهٽائي هئي، پر آهسته آهسته هن علائقي مان هي نسل ختم ٿيندو وڃي. هن قسم جي ڪول خور کي آسانيءَ سان پالي سگهجي ٿو. ترازو لڌن جي چڙيا گهر ۾ هڪ نر ڪول خور ۱۴ سالن تائين تماشائين جي دل وندرائڻ رهڻ کانپوءِ مري ويو. چڙيا گهر ۾ هن کي کائڻ لاءِ ڪچا بيضا، قيمو ۽ ڪير ملندو هو. هو انهن شين کي مزي ۽ شوق سان کائيندو هو.

ريشي ڪول خور کي

”په آگرېو ڪول خور“ به چوندا

آهن. عظيم ڪول خور کان هي




ڏاڍو خوبصورت جانور هوندو آهي. هن جي پشم نهايت چمڪيلي، ملائم ۽ هلڪي زرد رنگ جي هوندي آهي. هي نسل ميڪسيڪو کان بوليويا جي علائقي ۾ (جتي جي آب هوا قابل برداشت حد تائين گرم هوندي آهي) عام جام ملسي ٿو. جسامت ۾ هڪ وڏي ڪُئي کان وڌيڪ نه هوندو آهي. وڏ ۾ وڏ لمبائي ۱۵-۱۶ انچ هوندي اٿس جنهن ۾ اڌ کان گهٽ ٻچ به شامل آهي. سڄو ڏينهن وڻن جي گهاٽين تارين ۾ لڪل رهندو آهي. هي خطري جي وقت ڇاهي وانگر پنهنجو مٿو لڪائي ڇوڻ ۱۹۷۲ع

رنگ جي ڪولين جو هڪ قسم آهي جيڪي وڻن جي تاربن ۽ شاخن تي پنهنجا پر ٺاهينديون آهن. هي ڪوليون تمام وڌيڪ زهريليون هونديون آهن. انهن جي جسم ۾ نهايت تيز قسم جو تيزاب (فالڪ ائسڊ) هوندو آهي. انسان کي سندن چڪ لڳڻ سان زخم ۾ نهايت تيز قسم جو ساڙو ٿيندو آهي، پر ڪول خور هن جو اهڙو ته عادي هوندو آهي جو جيستائين فالڪ ائسڊ جو هڪ خاص مقدار هن جي رت ۾ شامل نه ٿئي، هو جيئرو نٿو رهي سگهي. اها شيء جيڪا انسان لاء زهر آهي سا ڪول خور لاء تريق ثابت ٿئي ٿي.

”جايلو ڪول خور“ اتر

افريقا ۾ لڌو وڃي ٿو. عام طور تي ٽڪرين ۾ رهندو آهي. شڪل صورت




۽ جسماني بناوت ۾ عام ڪول خور کان بلڪل مختلف واقع ٿيو آهي. قد ۾ سوئر جي برابر هوندو آهي. ڏسڻ ۾ به گهڻي حد تائين ان سان مشابهت رکي ٿو. رنگ ميتاڙو ۽ ڪن گڏهه جي ڪن وانگر ڊگها ۽ چهنبدار هوندا اٿس. مٿو سنهو ۽ ٿوڻي (منهن) سوئر وانگر بي ڍنگي ۽ ويڪري، پير تمام ننڍا پر ننهن وڏا ۽ تيز ۽ زبان جي ڊيگهه ارڙهن انچن تائين هوندي اٿس. ڏاڍو حساس، ڦڙيلو ۽ هوشيار جانور آهي. ٿوري ڪڙڪي تي نظرن کان غائب ٿي ويندو آهي.

پيدائش وقت هن جي جسم تي وار ڪونه هوندا آهن پر جيئن جيئن عمر وڌندي اٿس، وار ظاهر ٿيڻ لڳندا آهن. بالغ ٿيڻ تي وارن جي رنگت سرخي مائل پوري هوندي اٿس. ڪن قسمن ۾ سخت ڪردار پيلي رنگ جا وار به نظر ايندا آهن. عمر سان گڏ وارن ۽ ڪل جي رنگت بدلي رهندي اٿس. پياپي ۾ نه صرف وار چڱو لڳندا اٿس پر ڪل به ڪردري ۽ ڪارائت مائل ٿي ويندي اٿس. افريقا جا رهاڪو هن جو گوشت کائڻ کي متبرڪ ۽ طاقت واري غذا سمجهندا آهن ۽ ڏاڍي شوق ۽ رغبت سان کائيندا آهن.

بال جي شڪل اختيار ڪندو آهي. نظر ۽ قوت سماعت ٻئي گهڻي حد تائين ڪمزور واقع ٿيا اٿس. هي نهايت سست جانور آهي. وڻ جي ڪنهن ٿاريءَ جي چوڌاري ڀڄ ويڙهي خاموشيءَ سان جسم کي سسائي سمهي رهندو آهي. ننڊ ۾ به ان جا اڳيان پنجا ٻاهرئين طرف نڪتل هوندا آهن. پري کان ڏسجي ته ائين معلوم ٿيندو ڄڻ وڻ جو ڪوئل آهي. انسان، نانگ ۽ ٻلي هن جا جاني دشمن آهن. انهن جي ڊب ڪان وڻن تان گهٽ لهندو آهي، هي پنهنجو پيٽ وڻن تي ماريءَ جي چٽن ۽ ڪولين جي ٻرن مان پريندو آهي. هن کي ٻالن تمام مشڪل آهي. قيد جي حالت ۾ بڪ هڙتال ڪندو آهي ۽ کائڻ پيڻ ڇڏي ڏيندو آهي. گهڻن ڇيڻ ڪرڻ سان به دوستي نه ڪندو آهي ۽ ٻري ٻري جان ڏيندو آهي.

”تم آگريو ڪول خور“ کي ”ٿامانڊا“ (Tamandua) به چوندا آهن. جسم ۾ عظيم ڪول خور کان اڌ جيترو هوندو آهي. سندس رنگ سرمائي ۽ زرد مائل هوندو آهي. ميڪسيڪو (اتر آمريڪا) جي جهنگلن، برازيل ۽ پيراگوي ۾ ملندو آهي. زندگيءَ جو گهڻو حصو وڻن تي گذاريندو آهي. پر ڪولين ۽ ٻين جيتن جي ٻولها لاءِ ڪڏهن ڪڏهن زمين تي به نظر ايندو آهي. ڪولين ۽ جيتن کان علاوه ڪيئن جي لاروڪن ۽ پيوپن جي کائڻ جو به شوقين آهي. اندازو لڳايو ويو آهي ته هڪ خوراڪ ۾ هي ڪول خور اڌ سیر ڪوليون ۽ ڪيئن کائي ويندو آهي.

”تم آگريو ڪول خور“
جهڙوئي هڪ ٻيو ڪول خور
ڊگهي ڀڄ وار ٿيندو
آهي جنهن کي ”پينگولن“



(Pangolin) سڏيو ويندو آهي. ڪل تمام سخت ٿيندي اٿس، جنهنڪري تيز ڏندن يا چهنب واري شيء جو ذرو به اثر نه ٿو ٿيس. هن جي وڻندڙ خوراڪ ڪاري

۱۱۱ ذهني آزمائش

هيٺين سوالن جا جواب پهرين پاڻ سوچي
پنهنجي ذهني لياقت جو اندازو لڳايو

غلام سرور - ايڇ - چنو - نصير آباد

۱- آڪسيجن گئس ڪهڙي سائنسدان ڳولي لڌي؟

۲- روشني ڪيترن رنگن جو مجموعو آهي؟

۳- ڪنڊ جو فارمولا ڇا آهي؟

۴- جيڪڏهن پاڻي ۾ لون ملايو ته انجو جو جوش
درجو وڌندو يا گهٽندو؟

۵- دنيا جو مشهور معروف گهٽ گهر ڪٿي آهي ۽
ڪهڙي نالي سان مشهور آهي؟

۶- C.C مان مراد ڇا آهي؟

۷- ايتائيل الڪحل جي ٺهڪڻ جو درجو ڪهڙو آهي؟

۸- ٻڙ ۾ ڪهڙي گئس مدد ڪندي آهي؟

۹- مريخ گرھ سج کان ڪيترو پري آهي؟

۱۰- پاڪستان جو مشهور سائنسدان ڪهڙو آهي؟

۱۱- هڪ انچ ۾ ڪيترا سينٽي ميٽر (C.M.) آهن؟

۱۲- پيٽرول تي هلندڙ انجن ڪهڙي سائنسدان ڪهڙي
سن ۾ دريافت ڪئي؟

۱۳- انسان جو وار هڪ سال ۾ ڪيترو وڌندو آهي؟

۱۴- سج ۾ ڪهڙيون ٻه گئسون شامل آهن؟

۱۵- سج کي ويجهي ۾ ويجهو گرھ ڪهڙو آهي؟
(جوابن لاءِ ڏسو صفحو ۴۰)

(بقايا - "سائنس ڪلب" جي ميمبرن جا نالا)

۵۵- سيف الله ولد محمد نواز ملڪاڻي درجو ڏهون
گورنمينٽ پائلٽ سيڪنڊري اسڪول دادو

۵۶- نثار احمد ولد دين محمد عباسي درجو ڏهون
گورنمينٽ پائلٽ سيڪنڊري اسڪول لاڙڪاڻو

سائنس

۵۶۱- شمع پي - اي

(انٽر سائنس)

گورنمينٽ گراس ڪاليج لاڙڪاڻو

۵۶۲- عبدالرسول ولد حجي محمد عارف درجو اٺون

اسڪول لنگر خان شربلوچ

۵۶۳- گيانچند ولد سچڻ مل درجو ستون

گورنمينٽ هاءِ اسڪول ميرپور ماٿيلو

۵۶۴- جبرائيل ولد پيررام درجو ڇهون

گورنمينٽ هاءِ اسڪول ميرپور ماٿيلو

۵۶۵- رياضت علي رمزعلي شربلوچ درجو اٺون

گورنمينٽ مڊل اسڪول مينگهو فقير شر

۵۶۶- رشيد احمد ولد ولي محمد درجو نائون

گورنمينٽ هاءِ اسڪول ڌڙو

۵۶۷- قلسيداس ولد موٽومل درجو ڏهون

گورنمينٽ هاءِ اسڪول دادو

۵۶۸- سهيل انصاري ولد قائم انصاري درجو نائون

گلستان شاھ لطيف بوائز هاءِ اسڪول ڪراچي

۵۶۹- نثار احمد ولد مينهون خان درجو ڏهون

گورنمينٽ هاءِ اسڪول مهڙ

۵۷۰- فضل الرحمن "فيض" ڏيپلائي درجو ڏهون

نور محمد هاءِ اسڪول حيدرآباد

۵۷۱- غلام مصطفيٰ حافظ درجو نائون

دي سي هاءِ اسڪول مورو

۵۷۲- گوڪر داس آدودومل درجو ڏهون

گورنمينٽ هاءِ اسڪول راڌڻ

۵۷۳- سيد عبدالرشيد شاد جيلاني (انٽر سائنس)

اسلامي هاءِ ڪاليج سکر

۵۷۴- وسيم احمد ولد محمد يوسف تونيه درجو اٺون

گورنمينٽ پائلٽ سيڪنڊري اسڪول لاڙڪاڻو

۵۷۵- شريش ڪمار ولد شيوڪ رام درجو پنجون

ديني مدرسو لاڙڪاڻو

۵۷۶- راجڪمار ولد رتن لعل اوچائي درجو نائون

گورنمينٽ پائلٽ سيڪنڊري اسڪول لاڙڪاڻو

۵۷۷- موهن لعل - اي - چمائي درجو نائون

گورنمينٽ هاءِ اسڪول غوثپور

جون ۱۹۷۲ع

عبدالحق اعوان - ڏهر ڪي

س - مقناطيس ڏانهن ڪهڙيون شيون ڇڪجن ٿيون
ع چو؟

ج - مقناطيس کان ڪوئالت، نڪل، لوه ۽ ڪي
ٻيا ڪيميائي مرڪب اثر انداز ٿيندا آهن، چو ته انهن
۾ هڪ طرف ڇڪر کائيندڙ (Unpaired) اليڪٽرون
موجود هوندا آهن.

مشتاق احمد نظاماڻي - ماڻي

س - آرسِيءَ ۾ ماڻهوءَ جي شڪل سبتي ڏسڻ ۾
اچي ٿي پر اکر ابتڙ ڏسبا آهن، انجو ڪهڙو سبب آهي؟
ج - جيڪڏهن اوهين غور سان ڏسندا ته اوهان
جي کاٻي هٿ ۾ موجود ڪتاب سامهون آرسِيءَ ۾
پر اوهانجي کاٻي هٿ ۾ هوندو يعني آرسِيءَ ۾ اوهان
جو کاٻو پاسو دراصل اوهانجي کاٻي پاسي ۽ ساڄو
پاسو ساڄي پاسي هوندو، پر اوهانجي سامهون بيٺل
ڪنهن دوست جو ساڄو پاسو اوهانجي کاٻي هٿ ڏانهن
هوندو ۽ کاٻو پاسو ساڄي هٿ ڏانهن هوندو، انهيءَ
ڪري ئي جڏهن اوهين ڪنهن سان هٿ ملائيندا آهيو
ته آهون سامهون وارو نه پر ابتي پاسي وارو هٿ
استعمال ڪندا آهيو، ٻين لفظن ۾ ائين چئجي ته آرسِيءَ
وارو ماڻهو به سبتو نه پر ابتي نظر ايندو آهي.

غلام رسول زرداري - نواب شاه

س - چنڊ گرھڻ چو ٿي ٿئي؟

ج - چنڊ بذات خود روشن جسم نه آهي پر سج جي
روشن ڪري روشن نظر اچي ٿو ۽ جيڪڏهن ڪنهن طريقي
سان سج مان پوندڙ روشنيءَ ۾ ڪا رنڊ پئجي وڃي
ته جيڪر چنڊ به روشن نه رهي، مثال طور بتيءَ اڳيان
لنگهندي اوهان جو جسم انجي اڳيان اچي وڃي ته
سامهون وارو حصو اونداهو ٿي ويندو، ساڳيءَ ريت خلا
جي وسعتن ۾ گردش ڪندي ڪندي جڏهن ڌرتي سج
۽ چنڊ جي وچ ۾ اچي ويندي آهي ته انجو پاڇو چنڊ
تي پوندو آهي جنهنڪري چنڊ اونداهو ٿي ويندو آهي،
چنڊ جي انهيءَ ڪيفيت کي ”چنڊ گرھڻ“ چئجي ٿو.

جون ۱۹۷۲ع



امير علي ”اسد“ سندرائي - ڪنڌڪوٽ

س - قدرتي ڪاربان ڪهڙيءَ صورت ۾ ملي ٿو؟
ج - قدرتي ڪاربان قلمن جي صورت ۾ هيرن،
گريفايٽ (Graphite) انٿراسائيٽ ڪول (Anthracite)
(Coal) ۽ شهاب ثاقبن يا ٻرندڙ تارن ۾ ملي ٿو،
ڪيميائي مرڪبن جي صورت ۾ پيٽرول، چن جي پٿر،
مئگنيشم ڪاربونيٽ ($MgCO_3$) يا ميگنيسائيٽ ۽
ڊولومائيٽ ($CaCO_3, MgCO_3$) ۽ هر آرگنيڪي ڪمپائونڊ
۾ ملي ٿو.

گوبند رام بولچند خوبچنداڻي - ميهڙ

س - ڪاربان جي ٻهرو پن جا نالا ڪهڙا آهن؟
ج - ڪاربان جا صرف ٻه ٻهروپ آهن (۱) ڊائمنڊ
(Diamond) يا هيرو ۽ (۲) گريفايٽ.

ڪنڊت شير محمد ڪنگو - لاڙڪاڻو

س - گل مختلف رنگن جا ڇو ٿيندا آهن؟
ج - گلن کي رنگ عطا ڪرڻ وارا هڪڙا خاص
قسم جا آرگنيڪ ڪمپائونڊ ٿين ٿا جن جو هر هڪ جو
پنهنجو رنگ هوندو آهي (جيئن وڻن جي پنن ۾ موجود
ڪلوروفل سائو ٿيندو آهي) پوءِ جنهن ٻوٽي کي جنهن
آرگنيڪ مرڪب ٺاهڻ جي صلاحيت هوندي آهي، انجي
گل جو رنگ به اهڙو ئي ٿيندو آهي ۽ ڪيترا ٻوٽا هڪ
کان وڌيڪ به اهڙا مرڪب ٺاهي سگهندا آهن، تنهن
ڪري گلن جي پنن جو رنگ به مختلف ٿيندو آهي.

سائنس

صدر الدين صديقي - خير پور هيرس

س- تور (Weight) ۽ مادي (Mass) ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

ج- تور ڪنهن به جسم ۾ ڌرتيءَ جي ڪشش سبب ڇڪجڻ واري خصوصيت کي چئبو آهي ۽ مادو يا ماس ڪنهن به جسم ۾ موجود ايٽمن يا ماليڪيولن جي وجود کي چئبو آهي -

محمد ايوب - راول

س- پنکي هيٺان ڪا شي رکجي ٿي ته اها ٿڌي ٿيڻ وڃي پر گلاس ۾ پيل پاڻي گرم ٿي وڃي ٿو، سو ڇو؟

ج- ڪنهن به شيءِ جي ٿڌي ٿيڻ جو مدار پنکي جي هوا تي نه پر انجي بخارن جي اڏاڻڻ جي رفتار تي هوندو آهي. اوهان ڏٺو هوندو ته هٿ تي جيڪڏهن اسپرٽ يا پيٽرول هاريو ته هٿ هڪدم ٿڌو ٿي ويندو يا ڪنهن واه ۾ وهنجي ٻاهر نڪرو ته جيڪڏهن هوا وڌيڪ هوندي ته سيءُ پوڻ لڳندو. اهو انڪري ٿئي ٿو جو بدن جي آلي هٿن ڪري انجي مٿان موجود پاڻيءَ جو سنهڙو تهر بخار ٿي اڏامندو ٿو وڃي ۽ جيئن ته پاڻيءَ کي بخار ٿيڻ لاءِ گرميءَ جي ضرورت هوندي آهي تنهنڪري اها گرمي پاڻي پنهنجي ئي تهر مان چوسيندو ٿو وڃي ۽ تهر ٿڌو ٿيندو وڃي ٿو. هوا صرف بخار ٿيل پاڻيءَ کي بدن تان جلدي پري ڪري ڇڏي ٿي ته جيئن وڌيڪ بخار اڏاڻڻ لاءِ جڳهه خالي ٿئي. اهڙيءَ حالت ۾ پاڻيءَ جو مٿاڇرو جيترو گهڻو هوندو اوترو ئي گهڻا بخار اڏامندا ۽ شيءِ تڪڙي ٿڌي ٿي. اهو ئي سبب آهي جو ڇانهر ڪوڙ کان جلدي سار ۾ ٿيندي آهي. ساڳئي اصول تي دلي مان سمندر پاڻي اڏامندو دلي کي ٺاريندو ويندو ۽ گلاس مان جيئن ته پاڻي ٿڌو سڀي تنهنڪري انجو پاڻي ٿڌو ٿري. باقي رهيو سوال ته اهو پاڻي گرم ڇو ٿو ٿئي، انجو سبب هي آهي ته اوهان

ماس

گلاس ۾ دلي مان ٺريل پاڻي پري رکندا ته اهو پاڻي ڪلاڪ ٻن ۾ صرف ڪمري جي گرميءَ سبب ئي گرم ٿي ويندو.

محمد اشرف هگل - نوابشاهه

س- پاور ري ايڪٽر جو مطلب ڇا آهي؟

ج- ايٽمي ري ايڪٽر ٻن قسمن جا ٿيندا آهن. هڪڙا اهي جيڪي رڳو ايٽمي شعاع پيدا ڪن ٿا ۽ اهي زرعي ۽ طبي سائنس ۾ ڪم اچن ٿا. جهڙوڪ ٽنڊي ڄام وارو ايٽمي ري ايڪٽر. ٻيا ري ايڪٽر بجلي وغيره پيدا ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيا وڃن ٿا. جهڙوڪ ڪراچيءَ وارو ايٽمي بجلي گهر جنهن کي پاور ري ايڪٽر به سڏبو آهي.

ذهني آزمائش جا جواب

- ۱- جوزف پريستلي.
- ۲- ستن رنگن جو.
- ۳- $C_{12}H_{22}O_{11}$.
- ۴- وڌندو.
- ۵- دنيا جو مشهور معروف گهٽه گهر لنڊن ۾ واقع آهي ۽ ”بگ بين“ جي نالي سان مشهور آهي؟
- ۶- ڪيوبڪ سينٽي ميٽر.
- ۷- $78^{\circ}C$.
- ۸- آڪسيجن گئس.
- ۹- سراسري ۱۳ ڪروڙ ۱۰ لک ميل.
- ۱۰- پروفيسر عبدالسلام.
- ۱۱- ۲۶۵۴ سينٽي ميٽر.
- ۱۲- جرمن سائنسدان اوٽو (Otto) نالي سنه ۱۸۷۶ع ۾ دريافت ڪئي.
- ۱۳- اٽڪل ۵ انچ.
- ۱۴- هيڊروجن ۽ هيليم.
- ۱۵- عطارد يا مرڪيوري (Mercury).

جون ۱۹۷۲ع

MONTHLY

Science

MAGAZINE

Approved by the Directorate of Education, Hyderabad Region

Vol: 2

JUNE 1972

No. 6

چونڊ ڪهاڻيون



ٻارن لاءِ دلچسپ ۽ نصيحت آميز آکاڻين جو
ٻاڻ تصوير فيچر

الف ليلي جي مشهور آکاڻي ”علاؤالدين ۽ جادوءَ جو ڏيڻو“
ٻاڻ تصوير (قسط وار) ۽ ان سان گڏ ٻين بهترين آکاڻين جو
مجموعو، هر مهيني ۾ دفعا شايع ٿي رهيو آهي
”سنڌي ڪتاب مرڪز حيدرآباد سنڌ“