

MONTHLY WALI KARACHI

مہینہ وار ۹۵
وطن و بچن وٽ، جي سڪين ۾ سگهو ٿين (شاهه)




ABC
CERTIFIED

ماہوار
وٽ
۱۵ آڱڻ ۾ سنڌي ڪيسر
ڪراچي

سنڌي ۾ صحت بابت پهريون رسالو

THE MAGAZINE ABOUT HEALTH, BEAUTY AND ENVIRONMENT

انيداني جو ڪينسر OVARIAN CANCER



بيوتي ڪلينڪ
BEAUTY CLINIC

ڏيا پيٽس پاڻو ٿيون

CAUSES PREVENTION & FIRST AID OF

سڙڻ
BURNS

جا سبب، بچاءَ ۽ تر ت هدد


اوهان جي دنيا کي تباھ ڪرڻ لاءِ
هاڻي ڪنهن آفت جي ضرورت ڪونهي



پنهن جي دنيا کي پاڻ آلودگيءَ کان بچايو

E P A SINDH

Environmental Protection Agency, Government of Sindh.



ABC
CERTIFIED

ماہوار
ويج
ڪراچي

سنڌي ۾ صحت بابت پهريون رسالو

THE MAGAZINE ABOUT HEALTH, BEAUTY AND ENVIRONMENT

ملھ في ڪاپي 12 روپيا
ساليانو چندو هڪ سؤ پنجاھ روپيا (150 روپي)

جلد چوٿون، نمبر 10، فيبروري - 1995

فهرست

- 5 1- طبي پيشي ۾ ڪميشن جو رجحان ، ايڊيٽوريل
- 6 2- ويڇ هيلٿ پروموترز فورم
- 9 3- ذیابيطس هڪ جائزو
ياڳو ٿيون؛
- 13 4- سڙڻ
ڪارڻ، بچاء ۽ ترٽ مدد
- 24 سونهن سينگار
5- بيوتي ڪلنيڪ
- 26 6- آئيڊائي جو ڪينسر
علي مرتضيٰ قاريجو
- 33 7- سائيڪوسز
ڊاڪٽر عبدالحميد ميمڻ
- 35 8- وچڙندڙ جنسي بيماريون
ڊاڪٽر شرف علي شاه
- 37 9- خانداني منصوبہ بندي جا ڳڻ روڪ طريقا
نور محمد ميمڻ
- 10- سنڌ زرعي يونيورسٽي ٽنڊو ڄام ۾ السڪين رپورٽ؛
- 43 ميموريل بلم بئڪ جي افتتاحي تقريب جو احوال
نظير سومرو

سرپرست

پروفيسر علي محمد انصاري
ايڊيٽر انچيف (اعزازي)
ڊاڪٽر قاضي عبدالشڪور
ڪنسلٽنٽ ڪلينيڪل ايڊيٽر (اعزازي)
ڊاڪٽر اقبال احمد ميمڻ
ايسوسيئيٽ ڪلينيڪل ايڊيٽر
ڊاڪٽر محمد زمان شيخ
ايڊيٽر / مينيڇنگ ايڊيٽر
ڊاڪٽر ثناء الله ڪوڪر
ايڊيٽوريل بورڊ
اعزازي سيڪريٽري
ڊاڪٽر شمس سومرو (ڪراچي)
اعزازي ميمبر
ڊاڪٽر ممتاز مهر (ڪراچي)
ڊاڪٽر مسز شهشاد ميمڻ (حيدرآباد)
ڊاڪٽر شرف علي شاه (ڪراچي)
ڊاڪٽر يار محمد شيخ (لاڙڪاڻو)
ڊاڪٽر عبدالغفور قادري (ڪراچي)
ڊاڪٽر غلام نبي ڏيڙ (نوابشاه)
ڊاڪٽر رفيق سومرو (شڪارپور)
ڊاڪٽر غلام مجتبيٰ ميمڻ (ڪراچي)
ڊاڪٽر خير محمد پيرزادو (ڪراچي)
ڊاڪٽر امان الله منگي (ڪراچي)
ٻانھن هيلي

جي. ايم. لغاري
خاص لکڻو لاءِ
سليم حيدري
سڪيوليشن مئنيجر
اختر علي عباسي

رسالي ۾ ڇپيل لکندڙن جي لکڻن سان ماهوار ويڇ يا ايڊيٽوريل بورڊ جو متفق ٿيڻ ضروري نه آهي.

All correspondence should be addressed to The Editor Monthly "WAIJ"
Karachi, Room No. 53, Block-A, First Floor, Moon Steel Market, Baba-e-
Urdu Road, G.P.O. Box No: 568, Karachi

ڪمپيوٽر ڪمپوزنگ؛


غلام مصطفيٰ انصاري

اسپيريل ڪمپيوٽر ڪمپوزرس

ڪمر 53 بلاڪ اي، مڃين اسٽيل مارڪيٽ، باباءِ اردو روڊ ڪراچي، فون 748606

هي رسالو ڊاڪٽر ثناء الله ڪوڪر فيئر فيئر پرنٽرس، ڪراچي مان ڇپرائي ۽ ڪريسيٽ سائينٽفڪ پروفيسنل اينڊ ڪنچرل سروسز جي آڌار تي، ڪمر نمبر 53، بلاڪ A، پهرين مار، مڃين اسٽيل مارڪيٽ، باباءِ اردو روڊ، ڪراچي مان پڌرو ڪيو.

A comprehensive banking solution



We at UBL, with an integrated network of over 1694 branches globally, offer a comprehensive range of innovative banking services. And invaluable schemes like Unizar, Unimahana and Unisona.

Our billion rupee assets, invested in industrial growth, ensure maximum security of our clients' capital.

Plus, by financing import and export. Lending agricultural loans. Serving the Haj pilgrims. Promoting school banking, sports and talented sportsmen. We move with the nation even closer to prosperity and self-reliance.

UBL **United Bank Limited**
-the progressive bank

*There is only
one reason for research*

*Better Health:
A commitment for all ages*

MSD Research:

*for every answer, a new question
for every discovery, a new challenge
for every medicine, a new hope*




MERCK SHARP & DOHME (MSD) is a
division of MERCK & CO., Inc., a
worldwide research-intensive health
products company that discovers,
develops, produces, and markets
human and animal health products
and specialty chemicals.



Copyright © MERCK & CO., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. 1990
All rights reserved.

10-95-GEN-90-R-4101-J (10-95-GEN-94-PAK-34-J)

Habib Bank Credit Card wears a new look



**We have pleasure in announcing the introduction
of a new, improved Credit Card.**

Habib Bank is the first bank which introduced Credit Card Scheme in Pakistan in 1966. The scheme has made much headway over the years. Today the number of Habib Bank Credit Card holders runs into thousands. It is accepted at over 1000 establishments all over the country comprising Airlines, Petrol Pumps, Hotels, Restaurants, Hospitals, Departmental Stores, General Merchants, etc.

The possession of our Credit Card entitles you to use it freely. Travel or shop and just sign the bills. We shall do the rest.

Carrying lot of cash is not safe. Always carry your Credit Card. Contact your nearest branch and get one. The existing cards will remain valid till their expiry.

A Tradition of Better Service

Habib Bank Limited

طبي پيشي ۾ ڪميشن جو رجحان

طب جو پيشو جتي معزز ۽ مسيحاڻي پيشو ڄاتو سڃاتو وڃي ٿو اتي هن پيشي ۾ ڪي لالچ جا عنصر ۽ اوڻايون پڻ شامل ٿي ويون آهن ڪن ننڍي کان ننڍي طبي ڪارڪنن کان وٺي ڪجهه وڏن ڊاڪٽرن تائين هن پيشي ۾ ڪي اهڙيون ريتون ۽ رسمون ڪاهي پيون آهن جن طب کي پيشو نه پر ڌنڌو بڻائي ڇڏيو آهي، ڇو ته ڌنڌي ۾ ڪم ۽ ڪمائي سان گڏ اڪثر ڪري لالچ ۽ واپاري عنصر شامل هوندا آهن. جڏهن ته پيشي ۾ ڪم سان گڏ سچائي ۽ خلوص جي ضرورت هوندي آهي.

جيتريقدر ڏٺو ويو آهي ته هن دؤر ۾ ڪيترن ڊاڪٽرن، ليبارٽري وارن ۽ ٻين طبي تشخيصي مرڪزن ۾ اڪثر ڪميشن جو رجحان گهڙي آيو آهي ڪيترا وڏا ڊاڪٽر يا ڪنسلٽنٽ پنهنجن جونيئر ڊاڪٽرن يا فئملي فزیشنس سان ڪميشن طئي ڪيون ويٺا آهن، جنهن ۾ ڪنسلٽيشن تي الڳ ڪميشن ته آپريشن وارن ڪيسن تي وري ڊاڪٽرن ۽ اسپتالن طرفان ڳريون ڪميشنون پڻ آچيون وڃن ٿيون. انڪانسواءِ اسان وٽ جيڪي طبي تشخيص جا مرڪز آهن جن ۾ اڪثر ڪري ايڪسري، الٽراسائونڊ ۽ لئبارٽريون شامل آهن انهن مان ڪيترائي هر ڊاڪٽر کي سندس حيثيت مطابق ڪميشن جي آڇ ڏين پيا. نتيجي ۾ انهن سڀني سلسلن جو بوجھ اڻ سڌي طرح غريب عوام تي پوي ٿو، ڇو ته جڏهن ڪوبه ڊاڪٽر ڪنهن به مريض کي ڪميشن مقرر ڪندڙ مرڪز ڏانهن موڪلي ٿو ته مريض ويچارو ڊاڪٽر تي اعتبار ڪري جڏهن سڌو اوڏانهن جو رخ اختيار ڪري ٿو ته اهي مرڪز وري سندس ڪيسي تي پيو بار وجهي ڇڏين ٿا.

اسان وٽ ڪجهه اهڙن ڊاڪٽرن ۽ تشخيصي مرڪزن جا مثال موجود آهن جيڪي ڪميشن ۽ پئيسي جي خاطر ڪيترن مريضن جون غير ضروري تشخيصي ٽيسٽون ڪرائيندا رهن ٿا. جيڪي مريض جسماني تپاس سان به تشخيص جوڳا هوندا انهن لاءِ به هزارين روپين جون ٽيسٽون لکيون وينديون ۽ نتيجي ۾ ڪڏهن ڪڏهن مريض اهو خرچ برداشت نه ڪرڻ سبب وڃي جاهل ميڊيڪل پريڪٽيشنرز جي ور چڙهندو. جيڪي وري سندس صحت کي انتها هاڃو رسائيندا.

اسان اهڙن ڊاڪٽرن ۽ تشخيصي مرڪزن (ايڪسري الٽراسائونڊ ۽ لئبارٽري) وارن کي عرض ڪنداسين ته هو طب کي ڌنڌي طور نه پر پيشي طور اپنائين ۽ هن مقدس پيشي مان ڪميشن وارو رجحان جيڪو روز بروز وڌندو پيو وڃي سو فوري طور تي ختم ڪن.

ادارو

ويج هيلٽ پروموترز فورم

ماهوار ويج جتي پڙهيل لکيل ماڻهن کي صحت جي ڄاڻ لاءِ ڪوشاڻ آهي اتي هن ديس جي اڻ پڙه ۽ ابوجهه ماڻهن کي به صحت جي بنيادي سکيا ڏيڻ ۽ بيمارين کان بچاءَ جي واٽ ڏيکارڻ جو عزم ڪري ٿو.

ان سلسلي ۾ اسان هيٺ ڄاڻايل متن ۽ مقصدن سان ”ويج هيلٽ پروموترز فورم“ جي شروعات ڪري رهيا آهيون.

- 1- ڪوبه اهڙو فرد (عورت يا مرد) جيڪو ماهوار ويج جون لکڻيون پڙهي ۽ سمجهي سگهي ٿو سو هن فورم جو ميمبر ٿي سگهي ٿو.
 - 2- اهڙو فرد جيڪو ويج هيلٽ پروموترز فورم جو ميمبر ٿيندو اهو عام ماڻهو جيڪي ويج کان مانوس نه آهن يا وري لکي پڙهي ڪونه ٿا ڄاڻن، تن کي ويج مان حاصل ڪيل صحت جي ڄاڻ جو پيغام پهچائڻ لاءِ پاڻ پتوڙيندو.
 - 3- ويج هيلٽ پروموترز فورم ۾ ڪوبه ڊاڪٽر / نرس / ڊسپينسر / شاگرد يا عام ماڻهو ڇاهي اهو مرد هجي يا عورت، بنا ڪنهن امتياز ۽ فيس جي ميمبر ٿي سگهي ٿو. اهڙن ميمبرن کي هيٺ ڏنل حلف نامو ۽ ميمبري جو فارم پري اداري کي موڪلڻو پوندو. سندس ميمبر شپ کي يقيني بڻائڻ لاءِ ماهوار ويج جي ايندڙ شماري ۾ سندس نالي جو اعلان ڪيو ويندو.
 - 4- ويج هيلٽ پروموترز فورم جي ميمبرن کي ماهوار ويج ذريعي متحد رکيو ويندو ۽ سندن صحت بابت ڄاڻ کي وڌايو / تازو ڪيو ويندو.
 - 5- فورم جي باقائده منظم ٿيڻ کانپوءِ ميمبرن جي سالياني گڏجاڻي پڻ سڏائي ويندي.
- هن مقصد سان متفق ساڻين کي گذارش آهي ته هيٺيون فارم پري اداري کي هيٺين ائڊريس تي موڪلين.

ويج هيلٽ پروموترز فورم

معرفت ماهوار ويج : ڪمر ۽ نمبر 53، پهرين ماڙ، بلاڪ-اي، مدين اسٽيل مارڪيٽ، باباءِ اردو روڊ، جي. پي. او باڪس نمبر 568، ڪراچي.

ويج هيلٽ پروموترز فورم

حلف نامي تي عزم

آءٌ _____ پٽ / ڌيءُ / زال _____ پنهنجي رضا خوشي ۽ هوش حواس سان ويج هيلٽ پروموترز فورم جو / جي ميمبر ٿيان ٿو / ٿي. آءٌ ان ڳالهه جو اقرار ٿو / ٿي ڪريان ته بنان ڪنهن غرض، لالچ ۽ وڌائي / ننڍائي جي پنهنجي ڄاڻ ۽ وس آهر عام ماڻهو تائين صحت جي پيغام کي عام ڪرڻ لاءِ پاڻ پتوڙيندس / پتوڙينديس.

ميمبر جي صحيح

ذاتي تفصيل

نالو _____ پيءُ / مڙس جو نالو _____
ذات _____ ڏندو _____
تعليم _____
ٻيون مصروفيتون _____
ائڊريس: _____

ميمبر جي صحيح

نوٽ: هن فارم جي فوٽو اسٽيٽ ڪاٻي به استعمال ڪري سگهجي ٿي.

ويج هيلٿ پرو موٽرز فورم

جنوري 1995 دوران ٿيل ميمبرن جي لسٽ

- ۲۳- عبدالغني نوناري معرفت لطيف ميڊيڪل ڪمپليڪس سول اسپتال روڊ لاڙڪاڻو
- ۲۴- محمد يونس پتو پوسٽ آفيس بنگل ديرو تعلقو رتوديرو ضلعو لاڙڪاڻو
- ۲۵- عبدالوهاب ڪنير گاهي مھيسر معرفت سارنگ ميڊيڪل اسٽور مھڙ ضلعو دادو
- ۲۶- غلام مصطفيٰ لغاري، گهر نمبر-25، پنجين ماڙ ڪامران منزل گهٽي نمبر-1، بهار ڪالوني لياري، ڪراچي-2
- ۲۸- اختر علي عباسي گهر نمبر-9 بلاڪ 19 ڪي. اي. ايس. سي ڪالوني گلشن اقبال ڪراچي
- ۲۸- محمد اسحاق قل فليٽ نمبر-18 توڪل مينشن اسٽريٽ 1 F/- تاج مسجد روڊ آگره تاج ڪالوني ڪراچي
- ۲۹- ڊاڪٽر ثناء الله ڪوڪر ثناء ڪليڪ نزد جهونا مسجد شاه عبداللطيف ڀٽائي روڊ نيڪلري لياري ڪراچي-53
- ۳۰- سڪندر علي ميمڻ ڳوٺ رسول آباد ضلعو نوشهرو فيروز

ويج هيلٿ پرو موٽرز فورم جي ميمبرن لاءِ مشورا

- ۱- فورم جي سڀني ميمبرن جا نالا ۽ ايڊريسون رسالي ۾ موجود آهن. ميمبر ساٿين کي گهرجي ته هو خط و ڪتابت ۽ ميل ميلاب ذريعي هڪ ٻئي سان رابطو قائم ڪن جيئن اڳتي هلي تنظيمي معاملن ۽ صحت جي پرچار ۾ هڪ ٻئي جي مدد ڪري سگهن.
- ۲- هن پرچي ۾ فورم جي ميمبرن لاءِ خاص ڪم اهو آهي. ته هو فورم جي ميمبر شپ وڌائڻ لاءِ پنهنجن دوستن ۽ مٿن مائٽن کي ميمبر ٿيڻ لاءِ آماده ڪن.
- ۳- عملي ڪم جي سلسلي ۾ پنهنجي گهر محلي ۽ شهر ۾ هينون پيغام عام ڪن.
- ماڻھون پنهنجن کير پياڪ ٻارڙن کي ماءُ جو کير پيارين جيئن ته ان سان ٻار جي صحت وڌيڪ بهتر رهي ٿي ۽ اجاين بيمارين کان نجات ملي ٿي.
- ٻارڙن جي هر قسم جي صفائي سٿرائي لاءِ مائرن کي آماده ڪجي ۽ کين صفائي جي فائدين کان آگاه ڪجي.
- ٻارن کي چوسڻي / نپل ۽ بوتل کان سختي سان پرھيز ڪرائين چوڻ ته ان سان پيٽ جون بيماريون وڌن ٿيون.
- ويج جي ايندڙ پرچي ۾ ماءُ جي ٿيڻ تي هڪ تفصيلي مضمون ورجائي شايع ڪيو ويندو آھي ته ميمبر دوست ان مان سٺو لاپ حاصل ڪندا، ۽ ان کان سواءِ اڳ پر ويج اندر شايع ٿيل صحت بابت سڀني مضمونن جي پرچار ساٿين لاءِ ضروري آهي.
- ميمبر دوست هن سلسلي ۾ پنهنجا وڌيڪ رايو ۽ رٿون موڪلي سگهن ٿا جيڪي پڻ ايندڙ پرچن ۾ شايع ڪيون وينديون.

- ۱- ڊاڪٽر حاڪم علي جوگي، واجد ڪليڪ پوسٽ آفيس عرضي پتو تعلقو ميرو خان ضلعو لاڙڪاڻو
- ۲- ڊاڪٽر امان الله جهتيال محلو ڀٽائي نگر ماٿيلو روڊ گهوٽڪي
- ۳- نواز الله قل فليٽ نمبر-18 توڪل مينشن اسٽريٽ نمبر F/1 تاج مسجد روڊ آگره تاج ڪالوني لياري ڪراچي
- ۴- ڊاڪٽر نذير احمد هيسبائي A-13 انور ولاز فيز-1 نيو وحدت ڪالوني حيدرآباد
- ۵- لياقت علي جوڻيجو پوسٽ آفيس اميد علي جوڻيجو تعلقو شهداد ڪوٽ ضلعو لاڙڪاڻو
- ۶- مظهر علي ميمڻ دودائي روڊ صديقي ڪالوني محلو گجڻ پور لاڙڪاڻو
- ۷- ڪي. ڪي. (K.K) پرگزي ماروي ڪليڪ ڊاڪٽر ارباب علي شاه تعلقو خير پور ناٿن شاه ضلعو دادو
- ۸- عبدالغني درس هائوس نمبر-72 جاني شاه محلو تلاء نمبر 3- حيدرآباد
- ۹- مظهر علي ڀٽي معرفت حبيب الله ڀٽي H.S.T گورنمنٽ ٻواڙ هاءِ اسڪول ميرو خان ضلعو لاڙڪاڻو
- ۱۰- راجيش ڪمار پنجواڻي معرفت ڏامون مل پنجواڻي راجا جنرل اسٽور شاپ نمبر-3 پلس شاپنگ سينٽر ميونسپل ڪاميٽي رتوديرو
- ۱۱- رميش ڪمار شارا هائوس نمبر 1456/A کڏو پلاٽ غريب آباد ميرپور خاص سنڌ
- ۱۲- ڊاڪٽر واحد بخش سولنگي ڪمره نمبر-10، هاسٽل نمبر-2 چانڊڪا ميڊيڪل ڪاليج لاڙڪاڻو
- ۱۳- اڪرام الله ڳوٺ ۽ پوسٽ آفيس ڇڙا تعلقو قمبر علي خان ضلعو لاڙڪاڻو سنڌ
- ۱۴- وزير علي ابڙو معرفت مقصود ڪليڪ نزد نوراني مسجد ڊرپ محل شهداد ڪوٽ ضلعو لاڙڪاڻو
- ۱۵- اسد علي گاڏهي معرفت مسٽر شاه محمد گاڏهي هيڊ ماسٽر گورنمنٽ هاءِ اسڪول گوزو تعلقو خيرپور ناٿن شاه ضلعو دادو
- ۱۶- ڊاڪٽر ڪلياڻ داس ساگر ماروي ڪليڪ لياقت اسٽريٽ پوسٽ آفيس ڏوڪري ضلعو لاڙڪاڻو فون: 292
- ۱۷- ڊاڪٽر شرن ڪمار بچارام ڪٽيارا هائوس نمبر 1590 پراڻو لاهوري محلو لاڙڪاڻو
- ۱۸- ڊاڪٽر نندال روم نمبر 46 الطبري هاسٽل لياقت ميڊيڪل ڪاليج ڄامشورو
- ۱۹- عبدالرؤف ابڙو ڪوارٽر نمبر 105/28 شيخ زيد ڪالوني لاڙڪاڻو
- ۲۰- نظير احمد سومرو معرفت بشير احمد سومرو سائيڪل ورڪس جوهي ضلعو دادو قاسم هاسٽل زرعي يونيورسٽي روم نمبر 24 تندو ڄام
- ۲۱- شمس الدين نوناري ڳوٺ خدا بخش نوناري تعلقو ٺل ضلعو جيڪب آباد
- ۲۲- محمد يوسف جوکيو ڳوٺ جوکيو ساڌر ديھ ڏانڊو نيئر پاڪ لينڊ سيمنٽ فيڪٽري ضلعو ملير ڪراچي




During illness and convalescence

GLAXOSE-D

builds up your energy level

Illness depletes your energy reserves and makes you feel weak and listless. Glaxose-D helps you regain the depleted energy during illness and convalescence.

Glaxose-D contains Glucose, Calcium and Vitamin D. Take one large dessertspoonful of Glaxose-D with your fruit juice, milk, tea, coffee or with plain water. It will build up your energy level. Diabetics should not use Glucose.



GLAXOSE-D

-the all-time energy builder.

ذیابیطس - هڪ جائزو

ياڳو ٽيون

باڪٽريئم. زمان شيخ

ايم. بي. ايس. ايف. سي. بي. ايس. (پاڪستان)، ايم. آر. سي. بي. (برطانيه)، ايم. ايس. سي. (ذیابیطس ۽ اندوڪرائلاجي) (ڪلاسڪو)

روم نمبر 10، ٽين ماڙ، تاج ميڊيڪل ڪامپليڪس، بندر روڊ ڪراچي

ذیابیطس جي ڪنٽرول جي پاڻ سنڀال:

ذیابیطس جي علاج جي سلسلي ۾ هڪ ٻن يا ٽن مهينن جي وقفي سان رت ۽ پيشاب ۾ گلوڪوز ٽيسٽ ڪرڻ يا ڊاڪٽر سان مشورو ڪرڻ ڪافي نه آهي. ان لاءِ مريض کي پاڻ ڏينهن ۾ مختلف وقتن تي رت ۽ پيشاب ۾ گلوڪوز جي مقدار کي ٽيسٽ ڪري پنهنجي مرض جي ڪنٽرول جي جاچ رکڻ گهرجي.

رت ۾ گلوڪوز جي جاچ لاءِ (Blood Sugar Test Strip) ملنديون آهن، جن جي هڪ چيٽري تي رت جو هڪ ڦڙو وڌو ويندو آهي. رت ۾ گلوڪوز جي مقدار جو اندازو (Strip) جي بدليل رنگ کي مقرر ڪيل وقت تي سڌو سنئون بوتل تي ڇپيل رنگن سان پيئڻ سان يا اليڪٽرونڪ اوزار جي مدد سان لڳايو ويندو آهي.

مريض جي لاءِ پاڻ پيشاب ۾ گلوڪوز جي جاچ جو طريقو نسبتاً سولو آهي پر ايڏو حساس نه آهي. (Urine Sugar Test Strip) کي پيشاب ۾ هڪ ٻه سيڪنڊن تائين ٻوڙڻ، مخصوص وقت کانپوءِ

کي ساڳي نموني بوتل تي ڏنل رنگن سان پيئڻو ويندو آهي ۽ ان جي وسيلي پيشاب ۾ گلوڪوز جو اندازو لڳايو ويندو آهي. سڄي ڏينهن ۾ تنهنجي وقتن جي ڪاڏي يعني نرين، منجهند ۽ رات جي مانيءَ کان اڳ ۽ پوءِ ۽ رات جو سمهڻ مهل رت ۽ پيشاب ۾ گلوڪوز ٽيسٽ ڪيو ويندو آهي.

رت ۽ پيشاب ۾ گلوڪوز جي ٽيسٽ جا نتيجا ڏينهن، تاريخ ۽ وقت سان گڏ ڪنهن نوٽ بڪ ۾ لکڻ ۽ ان رڪارڊ کي پنهنجي ڊاڪٽر کي ڏيکارڻ انتهائي اهم ڳالهه آهي، جيئن ڪنٽرول ۾ موجود خرابيءَ کي دور ڪري سگهجي.

ذیابیطس جا مونجھارا: ذیابیطس جي اهم مونجھارن کي ٻن حصن ۾ ورهائي سگهجي ٿو:-

(الف)- مختصر مدتي ۾ ٿيندڙ مونجھارا (Acute Complications)

1- ذیابیطس (Diabetic Acidosis)

3- رت ۾ گلوڪوز جي شديد گهٽتائي؛ (Hypo Glycaemia).
4- جراثيم جي ڪري ٿيندڙ بيماريون:- (Infections).

(ب) - طويل مدتي ۾ ٿيندڙ مونجھارا؛ (Chronic Complications).

اهي سموريون پيچيدگيون علاج جي غفلت سبب پيدا ٿين ٿيون.

(الف)- مختصر مدتي ۾ ٿيندڙ مونجھارا:- (Acute Complications)

1- ذیابیطس جي تيزابي ڪيفيت ۽ غشي: (Diabetic Acidosis and Coma)

هي خا

شدید زخمي حالت وغيره.

ذیابیطس جي تیزابي کیفیت عام طور تي ڪجهه ڪلاڪن کان وٺي ڪجهه ڏينهن ۾ ظاهر ٿي ويندي آهي. هن حالت ۾ شديد اڃ لڳي ٿي، بار بار پيشاب جي حاجت ٿئي ٿي ۽ جسماني ڪمزوريءَ جو شديد احساس ٿئي ٿو. پيشاب جي گهٽتائي ۽ الٽيءَ جي ڪري جسم ۾ پاڻيءَ ۽ نمڪيات جي شديد گهٽتائي ٿيو وڃي. مريض جو بلڊ پريشر گهٽ ٿيو وڃي ۽ ساهه ڪڍڻ جي رفتار وڌيو وڃي. ساهه ۾ Ketone جي بوءِ

گهٽ مقدار کي واپس عام رواجي سطح تي آڻڻ آهي. (پاڻي ۽ نمڪيات رت ۾ Drip ذريعي ڏنا ويندا آهن) ۽ رت ۾ گلوڪوز جي انتهائي بلند مقدار کي انسولن جي ٿوري ٿوري مقدار کي بار بار ڏيڻ سان ڪنٽرول ڪيو ويندو آهي. مناسب وقفن سان رت ۾ گلوڪوز ۽ نمڪيات به ڇاڇيا ويندا آهن. جيڪڏهن گڏوگڏ ڪو انفڪشن هجي ته ان جو به ترت علاج ڪرڻ ضروري آهي. بچاءَ:-

هي پيچيدگي دراصل مريض جي

مثلاً تازن ميون جو رس، ڪير، ڏهي، سوپ وغيره.

(ب)؛ اهڙي حالت ۾ ذیابیطس جي مريض کي پنهنجي رت ۽ پيشاب ۾ گلوڪوز کي ڪثرت سان ٽيسٽ ڪرڻ گهرجي ۽ پنهنجي ڊاڪٽر سان هڪدم مشورو ڪرڻ گهرجي.

2- رت ۾ تیزابيت کانسواءِ گلوڪوز جو انتهائي بلند مقدار ۽ غشي:-

هي مونجهارو گهڻو ڪري ذیابیطس جي ڪراڙن مريض ۾ ٿيندو آهي.

سبب:

1- ذیابیطس جو گهڻي عرصي تائين بي قابو رهڻ يا تشخيص نه ٿيڻ.

2- ذیابیطس جي بگڙيل ڪنٽرول سان گڏ فالج يا انفڪشن جو ٿيڻ.

علامتون ۽ تشخيص:-

هن کیفیت ۾ علامتون

تقريباً هي ئي آهن جي (Diabetic Keto Acidosis and Coma) ٿينديون آهن. فرق صرف هي آهي ته هن کیفیت ۾ ساهه ۾ (Ketones) جي بوءِ نه هوندي آهي ۽ نه ئي رت ۽ پيشاب ۾ (Ketones) ملندا آهن، پر رت ۾ گلوڪوز جو مقدار انتهائي گهڻو هوندو آهي يعني تقريباً $600 \text{ mg\%}$ کان به وڌيڪ.

هن جي علاج ۽ بچاءَ جا طريقا به تقريباً ساڳيا آهن جيئن Keto Acidosis جا آهن.

3- رت ۾ گلوڪوز جي شديد گهٽتائي:- (Hypo Glycaemia)

رت ۽ پيشاب ۾ گلوڪوز جي ٽيسٽ جا نتيجا

ڏينهن، تاريخ ۽ وقت سان گڏ ڪنهن نوٽ بڪ

۾ لکڻ ۽ ان ۾ ڪارڊ کي پنهنجي ڊاڪٽر کي

ڏيکارڻ انتهائي اهم ڳالهه آهي

اچي ٿي. پيٽ ۾ سور جي شڪايت هن ۾ عام آهي ۽ آهسته آهسته غشي طاري ٿيڻ شروع ٿئي ٿي جيڪا پوءِ مڪمل بيهوشي ۾ بدلجي وڃي.

مٿي ذڪر

لاڀرواهيءَ جي نتيجي ۾ ٿيندي آهي ان لاءِ هيٺ ڏنل ڳالهين تي عمل ڪرڻ انتهائي ضروري آهي:-

(الف)؛ بگڙيل ذیابیطس جي علامتن مثلاً اڃ جي شدت، پيشاب جي بار بار ۽ گهڻي مقدار ۾ اچڻ، بک جي گهڻي لڳڻ وغيره تي فوري توجه ڏجي.

(ب)؛ ذیابیطس جي مريض کي بخار،

دست ۽ الٽين جي صورت ۾ بک نه لڳندي آهي، پر ان کي پنهنجي دوائن يا انسولن جي وزن ۾ ڪمي هرگز نه ڪرڻ گهرجي. ان صورت ۾ هن کي پاڻي وڌيڪ پيئڻ گهرجي ۽ اهڙي غذا کائڻ گهرجي، جيڪا جلد هضم ٿي سگهي،

ڪيل علامتون تشخيص ۾ ڪجهه مدد ڏيڻ ٿيون، پر پڪ ڪرڻ لاءِ پيشاب ۽ رت ٽيسٽ ڪرائڻ انتهائي ضروري آهي. پيشاب ۾ تیزابي مادا (Ketones) ۽ گلوڪوز تمام گهڻي مقدار ۾ موجود هوندا آهي ۽ رت ۾ پڻ گلوڪوز تمام گهڻو (يعني $600 - 400 \text{ mg\%}$ تائين) هوندو آهي.

هيءَ صورتحال امرجنسي واري آهي ۽ ان جي فوري تشخيص ۽ علاج تمام ضروري آهي. مريض کي جلد از جلد اسپتال ۾ داخل ڪرائجي. علاج جو سڀ کان پهريون ۽ اهم مرحلو مريض جي جسم ۾ پاڻي ۽ نمڪيات جي انتهائي

ذیابیطس جي مريض کي بخار، دست ۽ التین جي صورت ۾ بک نه لڳندي آهي. پر ان کي پنهنجي دوائن يا انسولن جي وزن ۽ ڪمي هر گز نه ڪرڻ گهرجي. ان صورت ۾ هن کي پاڻي وڌيڪ پيئڻ گهرجي ۽ اهڙي غذا کائڻ گهرجي، جيڪا جلد هضم ٿي سگهي، مثلاً تازن ميون جو رس، کير، ڏهي، سوپ وغيره.

موڪلجي.
بچاءُ- انسولن وٺندڙ مريض کي هميشه پنهنجي کيسي ۾ کنڊ جي پڙي رکڻ گهرجي. انسولن لڳڻ جي اڌ ڪلاڪ جي اندر اندر ماني کائڻ گهرجي. غذا جي مقدار ۾ ڪمي نه ڪجي. خالي

پيٽ گهڻي ورزش نه ڪجي. سخت ورزش کان اڳ ڪا ناشاستي واري شي مثلاً ميوو، بسڪٽ يا ڊبل روٽي کائڻ گهرجي. هميشه پاڻ سان گڏ ذیابیطس جي مريض هجڻ جو ڪارڊ رکڻ گهرجي.
4- جواشيمَن سبب ٿيندڙ

بیماریون (Infections)

اهي بیماریون ذیابیطس جي مريضن ۾ عام آهن اهي بیماریون وري گلوڪوز کي رت ۾ وڌائي ذیابیطس کي بگاڙن ٿيون. ان طرح سان هڪ مسلسل چڪر شروع ٿي وڃي ٿو.

ذیابیطس جي مريض ۾ ڪجهه عام انفڪشن جو ذڪر هيٺ ڏجي ٿو:-

- 1- چمڙي جا انفڪشن- (Skin In-fectious)، ڦرڙيون (Boil / Furuncle)، ناسور (Carbuncle)، فنگس (Fungus)، مثلاً Candidia-sis ۽ Ring Worms هي پيرن جي آڱرين جي وچ تي يا جنسي جڳهن تي عام ٿيندا آهن.

تشخيص- مٿيون علامتون تشخيص ۾ مدد ڏين ٿيون مريض اوچتو بيهوش به ٿي سگهي ٿو، ان لاءِ مريض جي گهر وارن ۽ دوستن کي ان جي ڄاڻ ڪرائجي. بهر حال پڪ ڪرڻ لاءِ رت ۾ گلوڪوز ٽيسٽ ڪرائڻ لازم آهي، جيڪو گهڻو ڪري 45mg% کان گهٽ هوندو آهي.

علاج- رت ۾ گلوڪوز جي شديد گهٽتائي جي فوري تشخيص ۽ علاج انتهائي ضروري آهي، ڇو ته هيءَ ڪيفيت ڪجهه ئي منٽن ۾ شدت اختيار ڪري بيهوشي طاري ڪري سگهي ٿي. ان لاءِ

شروعاتي علامتون محسوس ڪندي ئي مريض کي کڻي ته هو به وڏا گلوڪوز جا چمچا پاڻي ۾ ملائي پي ڇڏي. گلوڪوز جي جاءِ تي کنڊ، شربت، مناسڪٽ، ڪيڪ، مٺو ميوو يا ڪولڊ ڊرنڪ به وٺي سگهجي ٿي. جيڪڏهن مريض بيهوش ٿي وڃي ته کيس وات ذريعي ڪجهه به نه ڏجي، پر هڪدم انجڪشن رستي رڳ ۾ گلوڪوز داخل ڪجي يا مريض کي هڪدم اسپتال

هن ڪيفيت جي ڪري ڪجهه شديد علامتون پيدا ٿينديون آهن مثلاً ڏکڻي، ٿڌا پگهر اچڻ، چپن ۽ زبان تي سسراھٽ محسوس ٿيڻ، شديد بک لڳڻ، بيحد ڪمزوري محسوس ٿيڻ ۽ چڪر اچڻ، دل جو تيزي سان ڌڙڪڻ ۽ گهٽ ٿئي ته هي علامتون پڻ ظاهر ٿين ٿيون؛ هڪ شي جون ٻه نظر اچڻ، غنودگي ۽ غشي طاري ٿيڻ، ٻارن ۾ خاص ڪري جهٽڪا (دورا) پڻ لڳندا آهن.

سبب:-

(1)- انسولن جي انجڪشن هڻڻ بعد مناسب وقتي ۾ خوراڪ نه ورتي وئي هجي.

2- خوراڪ دست ۽ التین سبب هضم نه ٿي سگهي هجي.

3- انسولن ضروري مقدار کان وڌيڪ استعمال ڪئي وئي هجي.

4- غير معمولي ورزش خاص ڪري خالي پيٽ تي ڪئي وئي هجي.

5- ذیابیطس جي بگڙيل ڪنٽرول جي لاءِ انسولن جو مناسب مقدار نه ورتو ويو هجي.

6- ڪجهه ڪراڙن ماڻهن ۾ جن جون بکيون ۽ جيرا صحيح ڪر نه ڪندا هجن، گلوڪوز گهٽ ڪرڻ واريون گوريون رت ۾ گلوڪوز جي شديد گهٽتائي ڪري سگهن ٿيون.

رت ۾ گلوڪوز جي شديد گهٽتائي جي فوري تشخيص ۽ علاج انتهائي ضروري آهي، ڇو ته هيءَ ڪيفيت ڪجهه ئي منٽن ۾ شدت اختيار ڪري بيهوشي طاري ڪري سگهي ٿي

- 2- پيشابي سرشتي جا انفېڪشن:- (Urinary Tract Infection)
- 3- ٽيٽرن ۾ انفېڪشن:- نمونيا (Pneumonia)، تي بي (Tuberculosis).
- 4- ڏندن، ڪن ۽ وات جا انفېڪشن:-
- 5- عورتن جا مخصوص انفېڪشن:- (Vulvo Vaginitis).
- اسباب:
- 1- ذيابيطس جو بگڙيل ڪنٽرول.
- 2- زخري يا ڌڪ لڳڻ.
- 3- مناسب جسماني صحت ۽ صفائي کان لاپرواهي.
- علامتون:- بخار، جسر ۾ سور ۽ بڪ جي گهٽتائي وغيره. ان کانسواءِ جتي انفېڪشن هوندو آهي اتي جون خاص علامتون پڻ هونديون آهن. مثلاً پيشاب جي انفېڪشن ۾ پيشاب جو ساڙو وغيره. تشخيص:- هن جي لاءِ خاص ٽيسٽون ڪرائيون آهن. مثلاً سيني جو ايڪسري، پيشاب جي ٽيسٽ وغيره.
- علاج:- مڪمل جسماني آرام، سور جون دوائون، جيڪڏهن Bacteria جو انفېڪشن هجي ته اينٽي بائيوٽڪ (Antibiotic) دوائون وغيره. فنڪس جي لاءِ مخصوص دوائون ۽ ڪريمر. جسر مان پڪريز (Pus) ڪڍڻ لاءِ ڪڏهن ڪڏهن جراحيءَ جي ضرورت پئجي سگهي ٿي.
- رت ۾ گلوڪوز کي ڪنٽرول رکڻ انتهائي ضروري آهي، پر انسولن يا گورين کي صرف ان لاءِ بند نه ڪجي ته مريض کي بڪ نه ٿي لڳي. پاڻي گهڻو پيئڻ گهرجي ۽ ڪا ناشستي واري شي مثلاً تازن ميون جو رس، سوپ، يخني يا کير ٿوري ٿوري وقفن سان وٺڻ گهرجي. شديد انفېڪشن جي صورت ۾ ذيابيطس جون گوريون وٺندڙ مريض کي وقتي طور تي انسولن جي ضرورت پڻ پيش اچي سگهي ٿي.
- بچاءُ:-
- (1) ذيابيطس جو بهترين ڪنٽرول.
- (2) حفظان صحت جي مڙني اصولن جي پابندي.
- (3) ڪنهن به زخري جو فوري علاج.
- (4) هر ڇهن مهينن ۾ پيشاب جو مڪمل ٽيسٽ، هر سال ڏندن جو معائنو.

مائرون پنهنجي ٻارن کي پن سالن تاءِ کير پيارين (القرآن)
 . ٻار لاءِ بهترين غذا ماءُ جو کير آهي.
 . ماءُ جو کير ٻار لاءِ خدا جي نعمت ۽ مڪمل غذا آهي.



. ٻار جي پيدا ٿيڻ کان پوءِ ان کي
 پن ڪلاڪن جي اندر ماءُ جو کير
 ڏيڻ گهرجي. هن کير ۾ غذائيت
 ۽ بيمارين کان بچاءُ جا جزا
 هوندا آهن.

سڙڻ BURNS

ڪارڻ، بچاءُ ۽ تر ت مدد

ڊاڪٽر امير چنا

ايم. بي. بي. ايس. ايف. سي. بي. ايس. اسسٽنٽ پروفيسر آف سرجري، جناح پوسٽ گريجوئيٽ ميڊيڪل سينٽر ڪراچي

علاج (Under Hill 1932) سڙڻ جي علاج جي سلسلي ۾ ڪافي اڳتي نڪري ويا آهن، هنن سڙڻ ڪري جسم اندر پاڻي جي نقصان ۽ سندس جسم ۾ واپسي تي ڪافي روشني وڌي آهي انهي کانپوءِ علاج جي باري ۾ ماهرن جو ڪافي مباحثو رهيو پر حقيقت ۾ پتي نه ڪرڻ ۽ پاڻي جي جسم ۾ داخل ڪرڻ وارن خيالن جي اهميت کان اڄ به ڪوئي انڪار نه ٿو ڪري سگهي.

دنيا جي پهرين اسپتال جتي صرف سڙيل مريضن جو علاج ڪيو ويندو آهي اها 1832ع ڌاري (Syne) جي نظرداري ۾ ايڊنبرا (Edinbragh) ۾ شروع ڪئي وئي هئي. اوٽويهين صدي جي شروعات ۾ (Evans) تنهن بعد (Brooke) فارمولو پيش ڪيو جنهن ذريعي سڙيل انسان جي جسم ۾ پاڻي ۽ ٻين چارج ٿيل ذرن کي داخل ڪرڻ جو مقدار معلوم ڪيو ويندو آهي (Brook's Electrolyte Re-placement Forumla) اهو سلسلو اتي ختم نه ٿيو آهي پر مسلسل ڪم ۽ تحقيقات جي ذريعي سڙيل ماڻهن کي بچائڻ ۽ واپس ڪم تي لڳائڻ جي ان ٿڪ ڪوشش جاري آهي. ڇاڪاڻ ته سڙڻ

ڪري علاج ڪرڻو ٿو پوي، جن کي آمريڪي سڙڻ واري سٽ (American Burns Association) وڇولي کان مٿاهين درجي واري سڙڻ جو نالو ڏنو آهي انهي نتيجي سڙڻ وڳهي مرنديون جي تعداد چوڏهن هزار (14000) آهي. بدقسمتي سان اسان جي ملڪ ۾ ڪٿي به اهڙو تحقيقي ڪم نه ٿيو آهي جنهن جي ذريعي احتياطي سان اندازو لڳائي سگهجي ته اسان وٽ ڪيترا اهڙا بدقسمت انسان آهن جيڪي سڙڻ وڳهي موت يا معذوري جو شڪار ٿين ٿا.

بهرحال ترقي يافتہ ملڪن جي انگن مان اهو اندازو لڳائڻ هروڀرو ايڏو ڏکيو نه آهي ته سڙڻ ڪيڏو نه هڪ اهم مسئلو آهي.

تاريخ ۾ انهي مسئلي ۾ دلچسپي ۽ ڄاڻ جو ذڪر هپوڪريٽس (Hippocrates) جي زماني کان آهي. الرازي ۽ ابوسينا سڙڻ واري جڳهه تي ٿڌي شيءِ لڳائڻ جي لاءِ لکيو آهي 1905ع ۾ سنيو (Sneue) تمام سٺي طريقي سان اهو بيان ڪيو آهي ته سڙڻ جي ڪري پيدا ٿيل زخمر کي پتي ڪري بند ڪرڻ جي ضرورت نه آهي. فرينڪ (Frank 1877) ۽ انڊرهل

اوائلي دؤر ۾ انسان کي باهم واري عمل جي ڄاڻ کان هٽي، يوناني ڏند ڪٿائن مطابق پروميٿيوز (Prometheus) اهڙو ديوتا هيو جنهن انسان کي باهم جي تخليق ڪرڻ ۽ ان جي خاصيتن متعلق ٻڌايو، انهي ڳالهه جي ڪري هن ديوتا کان ٻيا ديوتا ۽ ديويون ناراض ٿي ويون ۽ کيس هڪ وڏي وڻ سان ٻڌي، طاقتور ڳجهن (Vultures) کي ڇڏيائون ته سندس جگر استعمال ڪنديون رهن، پر ڪجهه ديوتا جيڪي هن کان ناراض نه هئا اهي سندس جگر کي ٻيهر رات جو رات ۾ زندهه ڪري ڇڏيندا هئا ۽ ڳجهون صبح جو وري پنهنجو ڪم ڪرڻ شروع ڪري ڇڏينديون هيون ديو مالائي تاريخ ۾ شايد انسان کي علم ڏيڻ جي لاءِ اها وڏي ۾ وڏي سزا هئي.

باهم کي قبضي ڪرڻ ۾ انسان کان شايد ڪٿي ڪوتاهي ضرور ٿي آهي ڇا لاءِ ته آمريڪا جهڙي ترقي يافتہ ملڪ ۾ به هر سال ٻه ملين (Two Million) کان مٿي ماڻهو سڙن ٿا. هڪ ٻي رپورٽ جي مطابق هر سال هڪ ملين جي آبادي منجهان 300 (ٽي سؤ) ماڻهو ان حد تائين زخمي ٿين ٿا جو انهن کي داخل

جو علاج صرف زندگي بچائڻ نه آهي پر مريض کي زندگي جي تمنا ۽ زنده رهن جي خواهش سان لبريز ڪرڻو هوندو

قصر جو هٿرادو تند جو ڪپڙو جنهن ۾ باهم پڪڙڻ جي وڌيڪ صلاحيت هوندي آهي ۽ ڪجهه انسانن جي

ماڻهو سڙڻ جو شڪار ٿئي ٿو اهڙي قصر جو سڙڻ تمام خطرناڪ ٿئي ٿو. تيزاب ۽ سوڊا (Acid and

Alkali) جي ڪري سڙڻ جا واقعا ڪارخانن ۾ عام آهن جتي آهي ۽ اهڙا ٻيا ڪيميائي مادا استعمال ڪيا ويندا آهن.

شعائن جي ڪوبه سڙڻ:
(Radiatin Burns)

تابڪاري مادي مان خارج ٿيل شعائن جي ڪري سڙي طرح ۽ ڪيميائي عمل جي ڪري گرمي پيدا ٿيڻ سان ان سڙي طرح خطرناڪ قصر جي سڙڻ جي حالات پيدا ٿيو پوي. اهڙي نموني جي عمل جي ذريعي آباد ٿيل شهرن کي ٿوري دير ۾ ختم ڪري سگهجي ٿو مثال طور هيروشيما ۽ ناگاساڪي جا شهر ۽ ان ۾ رهندڙ ماڻهو.

اڄ به انسان تعليم ۽ صحت کان وڌيڪ هٿيار کي حاصل ڪرڻ لاءِ پئسو خرچ ڪري ٿو جنهن مان باهم پيدا ڪري سگهجي مثال طور نيپارم ۽ ٻيا اهڙا ڪيترائي هٿيار، جن جو استعمال نار واري جنگ ۾ دنيا کي ڏيکاريو ويو.

سڙڻ ۽ ان جي سببن کي هيٺين نموني ورهائي سگهجي ٿو.

سڙڻ سبب رسيل زخم جي ڪري نه صرف انسان معذوري جو شڪار ٿيندو آهي جنهن سبب سندس روزگار جو ذريعو ختم ٿيندو آهي پر شڪل ڦرڻ جي ڪري سماجي ۽ خانداني زندگيءَ تي به گهرو اثر پوندو آهي.

پنهجي ٿوري بي پرواهي به خطرناڪ قصر جي سڙڻ جو سبب بڻبي آهي.

اسان جي اردگرد موجود پلاسٽڪ، فٽائل ۽ ٻين اهڙي قصر جي مادي جون ٺهيل شيون باهم لڳڻ جي ڪري زهريلا گرم بخارات ڪڍن ٿيون، انهي سبب سامه جي نلي ۽ ڦڦڙن کي سخت چيهو پهچي ٿو ۽ اسپتال ۾ مريض جي حالت باوجود ظاهري ڪوشش جي بگڙندي رهي ٿي.

باهم جي شعلن کان سواءِ ڪنهن ٽهڪندڙ پاڻي جي جسم مٿان ڪرڻ سبب ڦوڪڻا به ٿي پوندا آهن جيڪي سخت قصر جو سور پڻ ڪندا آهن ۽ ان جو شڪار اڪثر ننڍي عمر جا بچڙا پائيندڙ ٻار (Toddlers) ٿيندا آهن.

بجلي جي تمام مٿاهين وهڪري وارين تارن (High Tension Lines) جي ڪليل هجڻ جي ڪري اڻڄاڻائي ۾

ذريعو ختم ٿيندو آهي پر شڪل ڦرڻ جي ڪري سماجي ۽ خانداني زندگيءَ تي به گهرو اثر پوندو آهي. مٿين حقيقت جو اندازو انهي ڳالهه مان لڳائي سگهجي ٿو ته پنجاهه سيڪڙي کان مٿي سڙڻ وارن جي عمر 30 (ٽيهه) سالن کان گهٽ هوندي آهي اهڙا انسان جن جو منهن، هٿ، سينو يا تنگن جي وچ وارو حصو سڙي وڃي ٿو، اسان جي سماج ۾ تمام رحم جوڳين حالتن ۾ رهن ٿا. انهن ماڻهن جي لاءِ علاج سان گڏوگڏ سماجي ۽ مالي ساٿ جي به سخت ضرورت پوي ٿي.

سڙڻ جا ڪجهه ڪارڻ ۽ سندن ورڇ:
(CAUSES & CLASSIFICATION)

سڙڻ سبب زخمي ٿيڻ به اسان جي ماحولياتي تبديلين کي ظاهر ڪري ٿو، تاريخ کان اڳ جو انسان آسماني بجلي ڪرڻ جي ڪري يا ٻرندڙ جبل مان تتل لاءِ نڪرڻ جي ڪري سڙي پوندو هيو، اڄ نه صرف اهو خطرو موجود آهي پر عام استعمال ٿيندڙ چلها ۽ گئس جا شعلا پڻ سڙڻ جو عام سبب آهن، اهڙي

اسان جي اردگرد موجود پلاسٽڪ، فٽائل ۽ ٻين اهڙي قسم جي مادي جون ٺهيل شيون باهم لڳڻ جي ڪري زهريلا گرم بخارات ڪڍن ٿيون، انهي سبب سامه جي نلي ۽ ڦڦڙن کي سخت چيهو پهچي ٿو ۽ اسپتال ۾ مريض جي حالت باوجود ظاهري ڪوشش جي بگڙندي رهي ٿي.

پڙهندڙ جي سهولت خاطر هيٺ چارٽ نمبر - 1 ڏجي ٿو.

عام رواجي صورتحال ۾ سڙڻ جي درجہ بندي ڪرڻ ڪجهہ مشڪل ٿي پوندي آهي. خاص ڪري ٻي درجي جي سڙڻ ۾ چمڙي جي ڪافي سڙڻ جي ڪري جلد اندازو لڳائڻ مشڪل ٿي پوندو آهي، انهيءَ ڪري اهو اندازو پهرين دفعي ۾ ئي قطعي طور تي نہ لڳائي سگهيو آهي ۽ روزانہ جي معمول ۾ مريض کي اسپتال ۾ داخل ڪرڻ کان

بجلي جي تمام مٿاهين وهڪري وارين تارن (High Tension Lines) جي کليل هجڻ جي ڪري الڳائڻي ۾ ماڻهو سڙڻ جو شڪار ٿئي ٿو اهڙي قسم جو سڙڻ تمام خطرناڪ ٿئي ٿو.

- 1- گرم پاڻي جي ڪرڻ سڙڻ 1-Scalds
 - 2- شعلن جي ڪري سڙڻ 2- Dry Heat Burns.
 - 3- بجلي جي ڪري سڙڻ 3-Electrical Burns.
 - 4- ڪيميائي مادن جي ڪري سڙڻ 4- Chemical Burns.
 - 5- تابڪاري اثرن جي ڪري سڙڻ 5- Radiation Burns.
- مٿين نموني کان علاوه سڙڻ تي اسين درجن ۾ بہ ورهائي سگهون ٿا.

چارٽ - 1

ٽيون درجو 3RD DEGREE	ٻيو درجو 2ND DEGREE	پهريون درجو 1ST DEGREE	
چڱي دير تائين شعلي تپيل شيء يا ڪيميائي مادي جو لڳڻ	ٿوري عرصي لاءِ گرم پاڻيٺ شعلي يا ڪيميائي مادي جو لڳڻ	تمام تيز اس يا شعلي جي پسگردائي	سبب
بلڪل سفيد يا وري ڪوئلي وانگر ڪارو يا هلڪي رنگ ٿيل شي وانگر (Translucent)	واڳڻائي يا ڪارن داغن سان ڳاڙهو	ڳاڙهو	رنگ
خشڪ، ٿلهي ڪپڙي وانگر جنهن مان خون نليون ڄميل رت سان نظر اينديون	آلا، وڏا ڦلڪڻا، يا ڳاڙيندڙ سطح (Weeping)	خشڪ، يا ننڍڙا ڦلڪڻا	سطح
سور نہ ٿيندو	سور ٿيندو، اونهي ٻي درجي ۾ سڙي مان مدو نہ ٿئي پر دٻاءُ محسوس ٿيندو	سور ٿيندو	احساس
ٻي ڪل لڳائڻي پوندي (Skin Grafting)	10 کان 21 ڏينهن يا 21 ڏينهن کان مٿي.	3 کان 4، ڏينهن	وقت چيٽڻ

اڄ به انسان تعليم ۽ صحت کان وڌيڪ هٿيار کي حاصل ڪرڻ لاءِ پنسو خرچ ڪري ٿو جنهن مان باهم پيدا ڪري سگهجي مثال طور نپام بم ۽ ٻيا اهڙا ڪيترائي هٿيار، جن جو استعمال نار واري جنگ ۾ دنيا کي ڏيکاريو ويو.

ڇڏيو آهي. اسان کي خبر آهي ته سڙڻ جو زخمر گهڻ طرفو (Multi Dimentional) اثر رکي ٿو، ته اسان کي نه صرف انهي جي گهراڻي پر ماپ (Size) جو به اندازو لڳائڻو پوندو آهي، جنهن لاءِ مختلف طريقا آهن پر عام طور استعمال ايندڙ طريقا هيٺ ڏجن ٿا.

1- 9 (نون) جو قانون. (Rule of Nine)

طرح ڇڻڻ جي خاصيت نه رهندي ۽ زخمر کي کل لڳائي پوندي. مٿي بيان ڪيل طريقن جي ذريعي

پوءِ به لڳائڻو رهيو آهي. ٻي طريقي ۾ وري کل جي ڪجهه حصي يا پوري کل جي سمورن حصن جي سڙڻ مان اندازو لڳائي سگهيو آهي انهي کي سمجهڻ لاءِ اڳتي ڏنل تصوير ڏسو تصوير 1- هن ۾ کل جي تنهن تائين سڙڻ کي ظاهر ڪيو ويو آهي جنهن مطابق پگهر جي غودون جي پاڙ تائين يا ان کان مٿي تائين سڙڻ کي ڪجهه حصو سڙڻ (Partial Thick- ness يا پورو سڙڻ (Full Thick- ness) چئبو آهي.

هنگامي طبي امدادي ڪمري ۾ هڪ سور ۽ ٻي قرار ۾ ڦٽڪندڙ مريض جي مٿان تفصيلي تجزيو ڪري نه سگهيو آهي. تنهن ڪري هڪ اندازي لڳائڻ کانپوءِ علاج شروع ڪري ڇڏيو آهي

2- لنڊ برونر جو قانون. (Lund Brownder Law)

3- هٿ جي تري جو قانون. (Rule of Palm)

1- 9 (نون) جو قانون. (Rule of Nine)

هي طريقو اسان سمجه ۾ ايندڙ ۽ جلدي حساب ڪرڻ لاءِ موزون آهي. هن طريقي سان جسم کي سيڪڙي جي حساب سان ورهايو ويو آهي جهڙوڪ هر ٻانهن منهن ۽ ٻڳي هڪ تنگ جي هڪڙي پاسي ۽ ڌڙ جي هڪ پاسي کي

اسان کي خبر پوي ٿي ته هڪ زخمر ڪيترو گهرو آهي ۽ ان کل جي ڪيترن تنهن کي نقصان پهچايو آهي ڪن صورتن ۾ جيڪي ترت امداد جي تحت هلي بيان ڪيون، اهو معلوم ڪرڻ ته زخمر ڪيترو گهرو آهي ضروري نه هوندو آهي بلڪه زندگي کي بچائڻ جي عمل کي پهرين اهميت ڏيڻي آهي.

ان کان علاوه هنگامي طبي امدادي ڪمري ۾ هڪ سور ۽ ٻي قرار ۾ ڦٽڪندڙ مريض جي مٿان تفصيلي تجزيو ڪري نه سگهيو آهي. تنهن ڪري هڪ اندازي لڳائڻ کانپوءِ علاج شروع ڪري

20 سيڪڙي کان مٿي سڙڻ جي ڪري جيڪا پائينٽ ٻاهر نڪرندي انهي جي ڪري، دل جو ڪم متاثر ٿي پوندو ۽ سندس رت پمپ ڪرڻ جي خاصيت متاثر ٿي پوندي جنهن ڪري رت جي نلڪين جي ذريعي جسم جي مختلف حصن ۾ خون جي رسد گهٽجي ويندي

ان صورت ۾ جڏهن سڙڻ جو اثر ڪل جڳ غودون کي مڪمل طور ختم ڪري ڇڏي ٿو ۽ کل جي هيٺيان واري ته تائين پهچي ٿو ته ان کي پورو سڙڻ يا (Full Thickness Burns) چئبو آهي. انهي صورت ۾ رت جو مڪمل طور ڇڻڻ ناممڪن آهي جنهن ڪري مٿان جسم جي ٻي حصي تان ڪل وٺي لڳائي پوندي آهي.

ڪن حالتن ۾ جڏهن زخمر جي سنڀال چڱي طرح نه ڪئي وڃي ته ڪجهه حصو سڙڻ وارو زخمر جراثيم جي حملي ڪري پوري طرح سڙڻ واري زخمر وانگر ٿي ويندو ۽ ان ۾ پڻ پوري


جي غير تناسبی کی اہمیت ذنی ویشی آهی، جنهن مطابق ۱ سال جي عمر تائين هڪ ٻار جي مٿو ۽ ٻڳجي پوري جسر جو، ويهه سيڪڙو آهي، جڏهن ته 15 سالن جي عمر کانپوءِ اها 9 في سيڪڙو ٿئي ٿي اهڙي نموني، انهي فرق کي غور هيٺ آڻي هي فارمولا تيار ڪيو ويو آهي.

3- هٿ جي توڻي جو قانون.
(Rule of Palm)


مٿي ڏنل نون جي قانون ٻر اها ڏکيائي آهي ته هي 15 سالن جي گهٽ عمر جي ٻارن لاءِ استعمال نه ٿو ڪري سگهجي، ڇا لاءِ ته ٻارن جو مٿيون ڌڙ هيٺين ڌڙ کان وڌيڪ هوندو آهي سندس پکيڙ (Surface Area) پڻ گهڻي هوندي آهي انهي ڪري صحيح طرح سان حساب لڳائي نه سگهيو آهي. هن قانون ٻر ٻارن جي واڌ ۽ مٿين هيٺين ڌڙ

ايراضي ذنی وئي آهي. اهڙي نموني پوري جسر کي 100 برابر رکيو ويو آهي، هن حساب دوران سطحي ۽ هلڪي ٻڳاڙهي رنگ (Erythma) کي ٻڳيو نه ويندو آهي. وڌيڪ سمجهڻ لاءِ ڏسو. شڪل نمبر - ۲.

2- لنڊ برونڊر جو قانون.
(Lund Brownder Law)



شڪل نمبر - ۱



شڪل نمبر - 2

مٿي بيان ڪيل طريقن سان اهو معلوم ٿيو ته ٻارن ۾ استعمال لاءِ ۽ سڙڻ جو اندازو لڳائڻ لاءِ هر وقت چارٽ يا نقشي جي مدد درڪار رهي ٿي. جيتوڻيڪ سڙيل مريض جو ٻار ٻار معائنو ڪرڻ تمام ضروري هوندو آهي انهي ڪري ڪوبه هڪ قانون هميشه لاءِ صحيح نه ٿو رهي سگهي. آساني خاطر عمر معلوم ڪرڻ کانسواءِ هڪ طريقو جنهن کي تري جو قانون (Rule of Palma) به سڏيو آهي، استعمال ڪري سگهيو آهي، ان جي تحت سڙيل انسان جي هٿ جي تري جي برابر ايريا کي (1) هڪ في صد ڳڻيو آهي، جنهن جي ڪري آساني سان ايريا معلوم ڪري سگهيو آهي ۽ پائڻ کي جسر ۾ داخل ڪرڻ وقت اندازو لڳايو آهي ۽ سڙڻ جي خطري کي سمجهي سگهيو آهي.

گرمي جسم تي ڪيئن اثر انداز ٿئي ٿي:-

انسان جو جسر 75 ٽرلين (75 Trillion) خليا جو ٺهيل آهي، هر هڪ خليو منفرد نموني سان ۽ سڀ گڏجي اجتماعي نموني سان جسر اندر ڪم ڪندا رهن ٿا اهي جسر جي هڪ خاص گرمي پد تي مقرر ٿيل ڪم سرانجام ڏين ٿا. سڙڻ جي ڪري چمڙي ۽ رت جي نلڪين جا گهرڙا وڌ ۾ وڌ متاثر ٿين ٿا. ان ڪري اهو سرشتو به اثر انداز ٿئي ٿو. سڙڻ ڪري گهرڙي جي اندر وارو پاڻي ٻاڦ ٿي وڃي ٿو ۽ ان ۾ اهڙي تبديلي اچي ٿي جو ان جي

سندس رت پمپ ڪرڻ جي خاصيت متاثر ٿي پوندي جنهن ڪري رت جي نلڪين جي ذريعي جسر جي مختلف حصن ۾ خون جي رسد گهٽجي ويندي ۽ ٻين لفظن ۾ دل ڏانهن رت گهٽ ويندو.

ڇاڪاڻ ته پاڻيڪ ٻاهر نڪري رت جو حجم (Volume) گهٽائي ڇڏيندو. انهيءَ سبب جي ڪري رت جا جزا پاڻي ۾ ملي پون ٿا ۽ رت وڌيڪ گهاٽو ٿيو پوي ۽ سندس وهڪري ۾ رڪاوٽ جي خاصيت (Viscosity) گهٽجي وڃي.

بڪي (Kidney) ڏانهن رت جي گهٽ وهڻ جي حالت ۾ پيشاب گهٽ ٿئي ٿو، صورتحال بگڙڻ جي حالت ۾ بڪيون پنهنجو ڪم ڪرڻ ڇڏي ڏين ٿيون ۽ پيشاب ٺهڻ بلڪل بند ٿيو.

ساهه جي سرشتي ۾ جيڪا تبديلي ايندي آهي ان ۾ اهو ڏسبو آهي ته سڙڻ مهل ڪيتري دير تائين ۽ ڪهڙي قسم جي دونهين ۾ ساهه کنيو ويو آهي

پوي. رت جي پاڻيڪ (Plasma) جي ٻاهر نڪرڻ کانپوءِ رت جي ڳاڙهن جزن (R.B.C.) ۾ به تباهي اچي ٿي سندن پردو ڦاٽي پوي ٿو، مواد ٻاهر نڪري اچي ٿو اهو نقصان جيترو سڙڻ (Burns) جو زخم زياده درجي جو هوندو ايترو زياده ٿيندو، ڪن ماهرن جي خيال ۾ 8 کان 12 سيڪڙو ڳاڙها ذرا روزانو ضايع ٿين ٿا ۽ سندن اهو ضايع ٿيڻ هڪ هفتي کان به مٿي هلندو رهي ٿو. رت جي چمڻ واري سرشتي

بڪي (Kidney) ڏانهن رت جي گهٽ وهڻ جي حالت ۾ پيشاب گهٽ ٿئي ٿو، صورتحال بگڙڻ جي حالت ۾ بڪيون پنهنجو ڪم ڪرڻ ڇڏي ڏين ٿيون ۽ پيشاب ٺهڻ بلڪل بند ٿيو پوي.

مادن جي نڪرڻ سان رت جون نلڪيون موڪريون ٿي وڃن ٿيون. گهرڙن ۾ تبديلي جي ڪري پاڻيڪ رت جي دوري مان نڪري ٻاهر اچي ٿي. اها پاڻيڪ پاڻ سان گڏ لحميات (Protein) ۽ چارج ٿيل ذرات (Electrolytes) کي به کڻي اچي ٿي، جنهن جو مقدار انهي تي منحصر آهي ته ڪيترو سڙڻ جي ڪري زخم پيدا ٿيو آهي يعني جيترو سڙڻ جو تناسب زياده هوندو اوترو ئي شيون رت جي دوري مان نڪري

اينديون ۽ گهرڙن جي وچ وارين وٿين (Intra Cellular يا Extra Space Vascular Compartment) ۾ جمع

ٿيڻ شروع ٿي وينديون، جنهن جي ڪري ظاهري طور تي سوڄ ٿي پوندي. 20 سيڪڙي کان مٿي سڙڻ جي ڪري

سڙڻ جي ڪري جسم ۾ جيڪا تبديلي اچي ٿي اها نه صرف سطح تي بلڪه جسم جي هر حصي تي پنهنجو اثر رکي ٿي. گرمي جي ڪري سڙڻ کان علاوه انسان بجلي، ڪيميائي ۽ تابڪاري اثرن جي ڪري به سڙي پوي ٿو

جيڪا پاڻيڪ ٻاهر نڪرندي انهي جي ڪري، دل جو ڪم متاثر ٿي پوندو ۽

موت واقع ٿئي ٿو جنهن کي سڙجي (Coagulation Necrosis) سڏجي ٿو. سڙڻ جو نتيجو گرمي پد ۽ جسر تي گرم شيء جي لڳڻ جي وقت تي منحصر ٿئي ٿو. اهڙي قسم جي تند جنهن کي باهه جهڻن جي خاصيت هوندي آهي اها باهه جي شعلي جي ٿوري ڇههءَ سان وٺي ٻرڻ شروع ڪندي آهي ۽ گرمي جو درجو هڪدم مٿي چڙهي ويندو آهي. اهڙي قسم جي تند جو ٺهيل ڪپڙو استعمال ڪندڙ انسان وڌيڪ خطري ۾ هوندا آهن.

سڙڻ جي اثر جو اندازو انهيءَ حقيقت مان لڳائي سگهجي ٿو ته 20 سيڪڙو سڙڻ جي زخم جي ڪري جسر جي سرشتي ۾ جيڪا تبديلي ايندي آهي اها ايتري ته شديد هوندي آهي جيڪا تڏهن ٿيندي آهي جڏهن (مثال طور) ڪنهن انسان جون ٻئي چنگهون ريل جي ڦيٽي هيٺان اچي وڃن (ڏسو ڪارلسن

1970ع).

اهي تبديليون ڪهڙي نموني سان ٿين ٿيون، ان جو اپٽار هيٺ ڪجي ٿو. سڙڻ کانپوءِ

خون جي سرشتي (System) ۾ تبديلي اچي ٿي، گرمي ۽ سڙڻ جي ڪري سڌي طرح ۽ ڪجهه

سڙڻ جي ڪري جسر ۾ جيڪا تبديلي رت جي مهيا نه ٿيڻ ڪري خراب ٿي

(Coagulation System) ۾

به خاص تبديلي اچي ٿي. سامه جي سرشتي ۾ جيڪا تبديلي ايندي آهي ان ۾ اهو ڏسبو آهي ته سڙڻ مهل ڪيتري دير تائين ۽ ڪهڙي قسم جي دونهين ۾ سامه ڪنيو ويو آهي، جيڪڏهن زهريلو دونهون جسر ۾ داخل نه ٿيو آهي ته ڪجهه دير تائين سامه جي رفتار ڪافي تيز رهندي آهي.

انهيءَ جو سبب هڪ ته اهو هوندو آهي ته سڙڻ کانپوءِ آڪسيجن جي ضرورت وڌندي آهي، ان صورت ۾ جڏهن ڦڦڙن جي گهرڙن کي نقصان پهتل هوندو آهي، سامه جي رفتار تيز هجڻ، جي باوجود رت ۾ آڪسيجن جو مقدار گهٽجي ويندو آهي، سامه جي گهٽتائي يعني (Pulmonary Insufficiency) جون نشانيون ظاهر ٿي پونديون آهن جنهن ڪري سامه جي سنڀال لهن لاءِ مشيني طريقا (Mechanical Ventilation) استعمال ڪبا آهن.

داخله واري سوشو:
(Gastro Intestinal System)

هن سرشتي تي به ٻين وانگر ڪجهه خاص قسم جا اثرات ٿين ٿا ۽ انهن جو انحصار به انهي تي آهي ته زخم ڪيترو گهرو ۽ گهڻو آهي. ڪن حالتن ۾ رت جو دورو معدي جي اندرين پردي ڏي بنهه گهٽجي وڃي جنهن ڪري ان ۾ زخم پيدا ٿيو پون ٿا. رت جو دورو معدي ڏانهن ان صورت ۾ جلد بحال ٿيو وڃي جنهن صورت ۾ پاڻيٺ وغيره جسر ۾ جلد داخل ڪئي ٿي وڃي. مٿين ذڪر مان اهو ظاهر ٿيو ته

ڪيئي ڪيميائي تيزاب ۽ خار (Acid & Alkohil) جيڪي عام طور ڪارخانن ۾ استعمال ٿين ٿا ورلي گهر ۾ به سڙڻ جو سبب بڻجن ٿا. ان جو شڪار اڪثر ناسمجھ ٻار يا وري قاتلان يا خودڪشي جو شڪار انسان هوندا آهن جيترو تيزاب گهاٽو هوندو ايترو گهرو زخم پيدا ڪندو آهي.

اچي ٿي اها نه صرف سطح تي بلڪه جسر جي هر حصي تي پنهنجو اثر رکي ٿي.

گرمي جي ڪري سڙڻ کان علاوه انسان بجلي، ڪيميائي ۽ تابڪاري اثرن جي ڪري به سڙي پوي ٿو عام طرح گهريلو استعمال جي بجلي جنهن جي طاقت (220V) گهٽ هوندي آهي، سڙڻ کان وڌيڪ جهٽڪو لڳڻ يا ڪري پوڻ جي ڪري ڌڪ لڳڻ جو خطرو وڌيڪ هوندو آهي، پر ناسمجھ ٻارن جي معاملي ۾ جڏهن ڪا تار يا اهڙي ڪا ٻي شيءِ غلطي سان وات ۾ وجهن ٿا ته پاڻيٺ جي ڪري گهٽ طاقت واري بجلي به محدود جڳهه ۾ گهرو زخم پيدا ڪري ڇڏي ٿي. ٻي صورت ۾ محدود طاقت واري بجلي جي اثر جي ڪري دل بند ٿي ويندي ۽ سامه ڪٽڻ جي قوت ختم ٿي ويندي آهي.

مٿين بيان ڪيل مضمون مان اها ڳالهه ظاهر ٿي ته:

- 1- سڙڻ انسان کي شروعاتي دور کان وٺي ڪافي تڪليف ڏئي آهي.
 - 2- سڙڻ ڪري پورو انساني جسر ۽ معاشرتي زندگي متاثر ٿئي ٿي.
 - 3- سڙڻ کانپوءِ تڪليف تمام گهڻي ۽ علاج تمام مهانگو آهي.
 - 4- موت ۽ معذوري جي ڪري عام حالتن ۾ گهر جو سڄو نظام درهر برهر ٿيو وڃي.
- مٿين ڳالهين کي ذهن ۾ رکندي، سڙڻ کان بچاءَ جي طريقن تي جيترو زور ڏجي اوترو بهتر ٿيندو.

وڏي طاقت واري بجلي (High Teinsion Current) جي ڪري تمام گهرا زخم ٿي پون ٿا، گرمي جو درجو اهڙي صورت ۾ 25000 ڊگري سينٽي گريڊ تائين پيدا ٿي ويندو آهي. انهي بجلي جي اثر جي ڪري خون جي نالين ۾ رت جمبي ويندو آهي ۽ جسر جو اهو حصو جيڪي ظاهر طور تي سڙيل هوندو آهي ان کان وڌيڪ حصو


1- ٻام ٻارڻ کان وٺي وسائڻ تائين جي عمل ۾ انهي جڳهه تي ڪنهن وڏي جي موجودگي جو هجڻ ضروري آهي.
2- ويڪرا ڪپڙا جهڙوڪ ساڙهي وغيره کليل وار، پلاسٽڪ يا اهڙي ڦسر جي تند وارا يا سنڀا ڪپڙا پائڻي رڌ بچاءَ نه ڪجي.

3- ٻرڻ جي عمل جي دوران يا ٻرندڙ چلڻي ۾ تيل يا گئس يا ڪا ٻرڻ ۾ استعمال ٿيندڙ شيءِ نه تبديل ڪجي نه ڀرسان آڻجي.

4- اهڙي شيءِ جنهن کي ٻام لڳڻ جو خطرو هجي مثال، پلاسٽڪ جي تهر، رنگ، يا ان مان ٺهيل شين کي باورچي خالي ۾ جڳهه نه ڏجي.

5- رڌ بچاءَ دوران ٻارن کي پري رکجي.

6- چلڻ تان لٽل شيءِ کي مٿاهين جڳهه جهڙوڪ ٿلھي يا ميز وغيره جي ڪناري يا ڪنڊ تي نه رکجي ۽ ان تي هميشه نظر رکجي ته ننڍڙا ٻار ان کي چڪي پنهنجي مٿان ڪيرائي ڇڏيندا آهن. جيڪو ٻارن ۾ سڙڻ جو هڪ اهم ۽ عام ڪارڻ آهي.



انهي دوران ۽ شروع کان وٺي ساهه جي سرشتي تي نظر رکڻ کپي، ڏکيائي جي صورت ۾ هٿرادو ساهه کڻڻ جو عمل اختيار ڪجي، بجلي جي جهٽڪي لڳڻ واري صورتحال ۾ دل جي خاص

مريض جو وزن معلوم ڪري سڙڻ جي ڪري نقصان جو اندازو لڳائڻ کپي يعني (Depth & Extent of Burns) انهي معلومات کي استعمال ڪري پائڻ جو اندازو ڪرڻ کپي.

اسپتال ۾ ترقي مدد:

رڳ ۾ لوڻ واري پاڻيٺ جو داخل ڪرڻ احتياطي سان مختصر معلومات حاصل ڪرڻ.

- 1- ڪپڙن کي باهم لڳڻ جي صورت ۾ هڪ هنڌان ٻئي هنڌ ڊڪون نه پائجن، هڪدم زمين تي لپي پئجي ۽ ليٽريون پائجن.
- 2- خالي هٿن يا ٻرڻ جوڳي مواد سان باهم نه وسائجي بلڪه رلهي، اوني غلر، ٿلهي چادر سان پاڻ کي يا سڙيل کي ويڙهڻ کپي يا پاڻي وجهڻ کپي.
- 3- ٻرڻ جي عمل لاءِ هوا ۾ موجود آڪسيجن جو هجڻ تمام ضروري آهي، انهي ڪري اهڙو ڪوبه عمل جيڪو ٻرڻ جي لاءِ هوا کي هٽائي ڇڏي ۽ مددگار ثابت ٿئي.
- 4- بجلي جي صورت ۾ پهريان بجلي جو ذريعو، تار يا بٽن بند ڪرڻ کپي ٻي صورت ۾ پلاس يا ڪهاڙي ذريعي تار ڪٽي ڇڏجي ۽ زخمي کي پري ڪري ساهه ۽ دل جي رفتار ڏسڻ کپي.
- 5- ڪيميائي مواد جي سڙڻ جي ڪري خاص اثر ٿارڻ وارو مواد (Antidote) استعمال ڪجي، هنگامي صورت ۾ پاڻي سان ڌوئجي جيئن اهو مواد جسم تان هٽي وڃي ۽ گهٽ وقت ۾ گهٽ نقصان پهچائي سگهجي.
- 6- سڙڻ جي صورت ۾ جسم تي ڪافي مقدار ۾ صاف ۽ ٿڌو پاڻي هارڻ گهرجي جيئن گرمي جي ڪري پيدا ٿيندڙ اثر کي هڪدم گهٽائي سگهجي. زخم کي ڌوئڻ کانپوءِ سڙيل ڪپڙو ظاهر نظر ايندڙ ٻاهرين شيءِ هٽائي ڪنهن به صاف ۽ استري ٿيل ڪپڙي سان زخم ڍڪي مريض کي اسپتال اماڻجي.
- 7- سڙڻ کان پوءِ جسم تي ٿيل ڦلوسڻ - (Blisters) کي ڦيهڻ نه گهرجي.

سنيال رڪن ڪپي (E.C.G.)
(Monitor) انهن سيني ڳالهين
کي خيال ۾ رڪن کانپوءِ مريض
جي سڙڻ جي خاص سنيال جو دور
شروع ٿئي ٿو. مطلب ته سني
شروعاتي سارسنيال جي ڪري
مريض کي خاص سنيال واري شعبي
۾ گهڻي تڪليف نه ٿيندي آهي،
ٻي صورت ۾ مسئلا تمام گهڻا
وڌي ويندا آهن.

**حقيقت ۾ سڙڻ کان بچاءَ ٿي سڙڻ جو بهترين علاج
آهي، ٻي صورت ۾ سڙڻ ۽ توت سارسنيال جي
ذريعي مريض جا ڪافي مسئلا حل ڪري سگهجن ٿا.**

1- ڏسو - Baker cl-el-
Sur- American Journal of
gery 1980, 139: 513

حقيقت ۾ سڙڻ کان بچاءَ ٿي
سڙڻ جو بهترين علاج آهي، ٻي
صورت ۾ سڙڻ ۽ توت سارسنيال
جي ذريعي مريض جا ڪافي
مسئلا حل ڪري سگهجن ٿا.

دعوتِ اسلامی



بيوتتي كلينڪ Beauty Clinic

ملڪ جو ناميارو چمڙي روڳ جو ماهر ڊاڪٽر شرف علي شاھ ويڇ وسيلي بيوتتي كلينڪ جي عنوان سان چمڙي جي روڳن ۽ ڪارڻ ۽ چمڙي جي سارسنيال توڙي وڻندڙ شخصيت جي لاءِ ماهرانا صلاحون ۽ ڄاڻ ڏيڻ جو سلسلو شروع ڪري رهيو آهي. سونهن سينگار لاءِ چمڙي جي جملي اهڃڻ، تڪليفن ۽ پيڇڳڻ بابت هنن صفحن ۾ اسين سوالن جوابن جو سلسلو شروع ڪري رهيا آهيون جنهن بابت ڊاڪٽر شرف علي شاھ جن ماهرانا جواب ۽ مشورا ڏيندا. اميد ٿي ڪجي ته هن سلسلي مان اسان جا پڙهندڙ پاڻ ۽ ٻينرو مڪمل فائدو حاصل ڪندا.

هن ڀيري اسين ڊاڪٽر صاحب جن جو پهريون مضمون هن موضوع جي تعارف، سڃاڻپ ۽ بنيادي ڄاڻ لاءِ شايع ڪري رهيا آهيون.

ادارو

چمڙي بابت حقيقتون

ڊاڪٽر شرف علي شاھ (چمڙي روڳ جو ماهر)

ترجمو: شمس سومرو

ميريڪل گهرڙا (Mereckle Cells)
۽ اڃاٽل گهرڙا (Indeterminate Cells)
اچي وڃن ٿا.

ڪل جي مٿئين تهه ۾ مٿان کان هيٺ تائين چار پرتا هوندا آهن جن کي شروعاتي پرت (Stratum Corneum) دائيڊار پرت (Stratum Granulosum) ۽ چٽائون پرت (Stratum Spinosum) ۽ ترو پرت (Stratum Basale) چوندا آهن. جڏهن ته مٿئين ڪل جو پنجون پرت انسپڊ (Stratum Lueidum) هٿ - ترين (Palms) ۽ پير ترين ۾ ٿيندو آهي.

ڪل جو مٿيون تهه لڳاتار تازو رهڻ لاءِ بدليو رهندو آهي چوڪور تهڙو پرت (Stratified Squamous Epithelium) ۽ ڪل جا رنگيل گهرڙا (Keratinocytes) هر وقت پنهنجي مقرر جاءِ (Attachment) کان تر پرت (Basment Membrane) واري هنڌ ڏانهن ۽ تر پرت وارا گهرڙا چمڙي واري سطح ڏانهن حرڪت ڪندا رهندا آهن.

ڪل جو مٿيون تهه يا (Epidermis) ڪل جو سڀ کان شروعاتي حصو هوندو آهي جنهن جي ٿولھ 0.04 ملي ميٽر کان 1.5 ملي ميٽر جي وچ ۾ هوندي آهي. ڪل جو هي ابتدائي حصو مختلف قسم جي گهرڙن (Cells) منجهان ٺهيل هوندو آهي، جيڪي ڪنهن به ڳنڍيندڙ اوجي يا اوچن Connective Tissue (s) جي ڪري پاڻ ۾ ڳنڍيل هئڻ بدران هڪ ڪري لسائي سان گڏوگڏ ڳنڍيل رهندا آهن.

ڪل جي مٿ - تهڙين - گهرڙن (Epidermal Cells) جي گهڻائي، جن مان 95% سيڪڙو گهرڙا (ڪل مٿ تهڙين گهرڙن جي تعداد منجهان) ڪل جا گهرڙا (Keratinocytes) هوندا آهن. جڏهن ته باقي 5 سيڪڙو گهرڙن منجهان رنگدار گهرڙا (Melanocytes) لينگرهان گهرڙا (Langerhan Cells)

ڪل يا چمڙي جسر جو ڊگهي ۾ گهو حصو آهي، جيڪو هڪ بالغ شخص جي حالت ۾ عام رواجي طرح جسر جي اٽڪل روءِ 20 هر چورس فوٽن جي ڪيڙ هجي ٿو ۽ جسر جي ڪل وزن جو 1% سيڪڙو وزن رکي ٿو.

هن جي ٿولھ هڪ ڏهاڻي پنج ملي ميٽر کان 4 ملي ميٽر هوندي آهي. جڏهن ته جسر تي سڀ کان ٿلهو ڪل جو تهه پيرن جي ترين ۽ سنهڙو تهه اکين جي چيرن (Eye Lids) تي هوندو آهي.

پنهنجي جوڙجڪ بنياد (Structure) جي لحاظ سان ڪل کي ٽن ڀاڱن ۾ ورهايو ويو آهي. ڪل جو مٿيون تهه يا (Epidermis)، وچيون تهه يا (Dermis) ۽ هيٺيون تهه يا جنهن کي ڪل جو هيٺيون اوچو (Subcutaneous tissue) به چيو وڃي ٿو.

هي گهرڙا جڏهن گهرڙن واري ترت پرت کان چمڙيءَ جي شروعاتي پرت (Stratum Corneum) ڏانهن حرڪت ڪندا آهن ته سندن شبيهي بناوٽ (Morphology) بدلي ويندي آهي ۽ هو چمڙيءَ جي شروعات پرت ڏانهن ايندي ايندي مڪمل طرح پري (Keratinized) پنهنجا مرڪز (Nuclei) وڃائي ناس ٿي ويندا آهن.

گهرڙن جي اهڙي پري پوڻ يا پور - گهرڙن ٿيڻ واري اسريل عمل (Maturation Process) کي چمڙي جوڙ (Epidermopoiesis) چوندا آهن جيڪو عام رواجي حالتن ۾ 28 ڏينهن ۾ مڪمل ٿيندو آهي.

ڪل جو وچيون تهه (Dermis) ڪولاجن تنڊن (Collagen Fibers)، لچڪدار تنڊن (Elastic Fibers)، ۽ تر مواد (Ground Substance) تي مشتمل هوندو آهي، جنهن ۾ رت نليون (Blood Vessels)، لف واهيون (Lymph Vessels)، تنئون (Nerves)، چمڙيءَ جا سڻپ وارا غدود (Sebaceous Glands)، غدود (Sweat Glands) ۽ بـج جون ڳوٺريون (Hair - Follicles) ۽ ڪيترن ئي قسم جا مختلف گهرڙا شامل آهن.

ڪل جون وچيون تهه (Dermis) اٽڪل روءِ 10 کان 30 پيرا ڪل جي مٿئين تهه (Epidermis) کان ٿلهيرو ٿيندو آهي

ڪل جي وچئين تهه کي ٻن ڀاڱن ۾ ورهائي سگهجي ٿو سنهو پيپلري زون (Papillary Zone) جيڪو ڪل جي

مٿئين تهه جي آخري چيڙي کان هڪدم پوءِ شروع ٿيندو آهي هي ڀاڱو ڪولاجن تنڊن فائبرو بلاسٽس (Fibroblasts) ۽ تر - مواد (Ground Substance) ۽ رت نلين سان ڳتيل هوندو آهي، جيڪي هن سنهڙي حصي ۾ بي ترتيب نموني هيٺ مٿي پڪڙيل هوندا آهن جڏهن ته ڪل جي هن حصي جو ٻيون ڀاڱو ٿلهيرو هوندو آهي جنهن کي ريتيڪيولر زون (Reticular Zone) چوندا آهن، جيڪو ڪولاجن جي گهڻائي مواد (Dense Collagen) لچڪدار تنڊن (Elastic Fibers) تي ٻڌل هوندو آهي - ڪل جي هن ڀاڱي ۾ رت نليون، تر مواد ۽ فائبرو بلاسٽس پيپلري زون جي ڀيٽ ۾ گهٽ هوندا آهن.

ڪل جو آخري يا هيٺيون تهه (Subcutaneous Tissue) ڪل جي وچئين تهه (Dermis) ۽ انهي ڇهه (Deep Fascia) جي وچ ۾ هوندو آهي جنهن ۾ لائپوسائٽس (Lipocytes) ۽ سڻپ گڏ ڪرڻ وارا گهرڙا (Fat Storage Cells) هوندا آهن.

هن تهه ۾ سڻپ جو مقدار (Fat Sheet) عمر، جنس، نسل، جنسي غدودي حالتن ۽ ڪاڌ - خوراڪ (Endocrinological & Nutritional) جي حاصلات تي دارو مدار رکي ٿي.

ڪل جي انساني جسم ۾ اهميت:

ڪل جسم جو هڪ تمام ضروري حصو آهي ۽ ڪل کانسواءِ زندگيءَ جو جاري رهڻ ناممڪن آهي.

ڪل اندروني عضون کي ڍڪڻ کانسواءِ انهن کي واپو منڊل جي هائيڪار اثرن ۽ ڪنهن به نقصان کان

بچاءُ جو ڪم ڏيندي آهي.

ڪل جسماني گرمي پد (Body Temperature) کي برقرار ۽ هڪ ڪرو رکڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪندي آهي.

گرمي پد کي برقرار رکڻ کانسواءِ چمڙي جسم ۾ پاڻي ۽ لوڻ ڳارن (Electrolytes) جي قدرتي توازن کي پڻ برقرار رکڻ جو ڪم ڏيندي آهي.

جسم ۾ گرميءَ جو خاص درجو، پاڻي ۽ لوڻيائ (Water and Electrolytes) جو خاص مقدار زندگيءَ جي اهم سرشتن جهڙوڪ دل جو ڌڙڪڻ، ساهه کڻڻ، دماغ ۽ بڪين جو ڪم ڪرڻ لاءِ تمام ضروري آهي، جيڪڏهن انهن مٿين شين ذريعي توازن برقرار نه رهندو ته زندگي جاري رهي نه سگهندي.

ڪل ڇهن جي حساسيت هجڻ ڪري هڪ حساس عضوي جو ڪم به ڏيندي آهي جهڙوڪ ٿڌ يا گرميءَ جو محسوس ٿيڻ، شين جو چاهه، سور وغيره.

ڪل سماجي وهنوار ۾ پنهنجي رنگت ۽ وارن يا بـج جي ڪري شخصيت جي نروار ڪرڻ ۾ مددگار ٿيندي آهي.

ڪل جسم جي قدرتي بچاءُ واري سرشتي (Immunological System) لاءِ پڻ نهايت ڪارائتو ڪردار ادا ڪندي آهي.

انهي کانسواءِ ڪل پاڻيٺ، پگهر، سڻپ، مٿل گهرڙن، جي اخراج جو ڪم به سرانجام ڏيندي آهي.

ڪل دوائن کي داخل ڪرڻ (سين / ٽڪن / ملر وسيلي) ۾ هڪ اهم رستي (Route) جو ڪم ڏيندي آهي.

سڀ کان اهم عمل اهو ته ڪل وٽامن ڊي ٺاهڻ ۾ بهرو وٺندي آهي.

**** هي گهرڙا جئين ته لينگرهان ۽ ميرڪل نالي طبي ماهرن ڳولي لڌا هئا - تنهنڪري انهن گهرڙن کي سندن نالي پٺيان سڃاڻپ وارو اصطلاح ڏنو ويو آهي.**

OVARIAN CANCER

عورتن ۾ آئيدائيءَ جو ڪينسر

خاصوشي سان وگھرندي ۽ مواتمار بيماري

علي مرتضيٰ ڌاريجو

برقي تڏهن جڏهن اڃان تائين ان جون ڪي نشانين ظاهر نه ٿين ٿيون، اهڙيون ڪي تپسون ڪرايون وڃن؟ انهن سوالن جي جواب لاءِ آمريڪا جي چوٽيءَ جي اهڙن ڊاڪٽرن ۽ ماهرن سان رابطو ڪيو ويو جيڪي ڪينسر جي ڪيترن بر مڃيا وڃن ٿا، ان سلسلي ۾ هڪ ماهر جي راءِ هئي ته، هڪ اهڙي عورت جنهن جو پيٽ وڏي وڏو ٿي ويو هجي ته بس هڪدم ڊاڪٽر کان پنهنجي تپاس ڪرائڻ گهرجي جو ممڪن آهي ته هوءَ آئيدائيءَ جي ڪينسر جو بلڪل ائين شڪار ٿي پئي هجي جيئن ڪنهن فرد کي مٿي جي سور سبب اها صلاح ڏجي ته هو ڪنهن نيوروسرجن کان تپاسرائي جو ممڪن آهي ته ڪيس دماغ ۾ ٿيomer/ ڳوڙهي هجي.

هڪ ٻئي ڊاڪٽر جو رايو آهي ته، اهڙيون عورتون جنکي مٿي بيان ڪيل نشانين/تڪليفون پيدا ٿين ٿيون تنکي آئيدائيءَ جي ڪينسر پيدا ٿيڻ جا امڪان تمام گهٽ هجن ٿا.

ساڳئي وقت ان ڳالهه جو به اظهار ڪيو ويو آهي ته، آئيدائيءَ جي ڪينسر جي نشانين پيدا ٿيڻ کان پوءِ ان جو

ڊاڪٽر کان پاڻ تپاسرايو. اهڙين حالتن ۽ نشانين جي پيدا ٿيڻ کان پوءِ ڪيتريون عورتون ڊاڪٽرن وٽ پهچن ٿيون ۽ ان ڳالهه لاءِ اسرارڪن ٿيون ته سندن نهائين جي چڪاس ڪري سندن آئيدائين جي صحتمنديءَ جي ڄاڻ رکي وڃي. جنهن لاءِ سونو گرام ۽ رت جي CA125 تپاس به ڪئي ويندي آهي.

جيڪڏهن توهان کي آئيدائيءَ جي ڪينسر ٿيڻ جو ٿورو به شڪ آهي ته ان لاءِ هڪدم ڪنهن اهڙي ڊاڪٽر سان صلاح مٿورو ڪريو جيڪو زنانين ڪينسر جو ماهر ۽ ان جي بجاءِ ۽ علاج جو ڳوڙو تجربو رکندڙ هجي.

ساڳئي وقت اهو سوال به پيدا ٿئي ٿو ته ڇا اهڙي هر هڪ عورت جنهن کي مٿي بيان ڪيل مبهري عام رواجي نشانين پيدا ٿين ٿيون ته ان کي به آئيدائيءَ جي ڪينسر هجڻ جي شڪ ۽ ان لاءِ اهڙيون تپاسون ڪرائڻ گهرجن؟ ساڳئي وقت اهو سوال به اهميت وارو ٿي سگهي ٿو ته ڇا اهڙن ڪن ٽين جو تعين ڪيو ويو آهي جن کي ذهن ۾ رکندي آئيدائيءَ جي ڪينسر کي شروعاتي حالتن

”هن جي زال کي سڄي عمر اهو پئورهندو آيو ته هوءَ ڪينسر جو شڪار ٿي پوندي“، سندس مڙس چواڻي ته جيتوڻيڪ تمام هوشيار ڊاڪٽر ڪيس چڪاسيندا به رهيا پر تنهن هوندي به ڪو ڊاڪٽر اهو لهي نه سگهيو ته هوءَ آئيدائيءَ (Ovary) جي ڪينسر ۾ مبتلا آهي جڏهن سندس اهڙي تشخيص ڪئي ويئي تيستائين سندس ڪينسر ڪافي وڌي چڪي هئي. تنهنڪري ماهر ڊاڪٽرن جي اهائي صلاح آهي ته جيڪڏهن توهان کي اهڙيون ڪي معمولي ۽ ان چٽيون يا مبهري تڪليفون پيدا ٿينديون رهن جهڙوڪ: پيٽ جو وڏي وڃڻ، ڪپڙن پائڻ کانپوءِ اهڙو احساس پيدا ٿيڻ ته انهن سوڙهه پيدا ڪئي آهي. پٺيءَ جو سور يا اوچتي سائائي محسوس ڪرڻ، ته اهڙين حالتن ۾ پريشان ٿيڻ جي ضرورت ناهي ڇاڪاڻ ته اهڙيون ڳالهيون عام رواجي حالتن ۾ پيدا ٿينديون رهن ٿيون. ها، البت جيڪڏهن اهڙيون ڳالهيون دائمي طور تي رهندڙ هجن ۽ خاص طور تي توهان جي ڪنٽرول ڪنهن کي آئيدائيءَ جي ڪينسر ٿي هجي ته اهڙين حالتن ۾ هڪدم ڪنهن هوشيار

علاج ڪرڻ وڌيڪ ڏکيو ٿي پوندو آهي. آمريڪي ماهرن جي راءِ موجب ته آئيدانيءَ جي ڪينسر جي جيڪڏهن تڏهن تشخيص ڪئي وڃي يا اها لڌي وڃي ۽ ان وقت ان جون نشانين ظاهر نه ٿيون هجن ته اهو هڪ بهترين وقت سمجهيو ويندو آهي ڇاڪاڻ ته اهڙيءَ شروعاتي حالت ۾ اهڙين عورتن جي زندگي رهڻ جا 80 کان 90 سيڪڙو امڪان هجن ٿا. جڏهن ته افسوس ناڪ ڳالهه هيءَ به آهي ته آئيدانيءَ جي ڪينسر جي شروعاتي حالتن ۾ ڪهڙيون ۽ ڪئين تپاسون ڪيون وڃن اهڙا ڪي به متعين ڪيل تپاڪونهن جيئن اهره جي ڪينسر يا ڳهڻ جي ڪينسر لاءِ آهن.

آمريڪن ڪينسر سوسائٽيءَ آمريڪا جي نئشنل ڪينسر انسٽيٽيوٽ وارن جو اهو به چوڻ آهي ته، جيئن ته آئيدانيءَ جي ڪينسر وڌيڪ ٿيندڙ آهي تنهن ڪري اقتصادي لحاظ کان اهو اجايو ثابت ٿيندو ته سماج ۾ رهندڙ اهڙين سڀني عورتن جي چڪاس ڪئي وڃي. ڇاڪاڻ ته اهڙي عام رواجي عورت کي سندس سڄيءَ حياتيءَ دوران آئيدانيءَ جي ڪينسر جا امڪان 65 مان هڪ ٿي سگهي ٿو، نسبتاً اهره جي ڪينسر جي جنهن جا امڪان 8 مان هڪ ٿي ٿو. عورتن جي گهڻائي جي آئيدانيءَ جي ڪينسر لاءِ ڇنڊ ڇاڻ ڪرڻ جي چڪاس ڪرڻ جي ان سبب به مخالفت ڪئي

ويندي آهي ڇاڪاڻ ته اهڙين وڌ ۾ وڌ بهترين چڪاسن کي به مشڪوڪ سمجهيو وڃي ٿو. خاص طور تي رت جي CA-125 تپاس ته ان حوالي سان انتهائي بيڪار پائڻي وڃي ٿي. جڏهن ته اهڙي هڪ تپاس جنهن کي قابل اعتبار سمجهيو وڃي ٿو اها آئيداني جي بايوپسي ڪرڻ آهي ۽ اهڙين حالتن ۾ جڏهن رت جي تپاس CA-125 غير معمولي اچي ته ان سبب اهڙي عورت کي هروڀرو آپريشن ڪرائڻي پوي ٿي. اهڙين حالتن ۾ هڪ عورت کي ڇا ڪرڻ گهرجي؟ ان جو جواب هي ٿي سگهي ٿو ته هر هڪ عورت کي آئيدانيءَ جي ڪينسر کان بچڻ لاءِ هاڻي کان ئي

تپاس جا طريقا: اها اڃان تائين هڪ اڻپوري سائنس سمجهي وڃي ٿي ته آئيدانيءَ جي ڪينسر جي نشانين پيدا ٿيڻ کان سواءِ اها لهي سگهجي پر تنهن هوندي به سائنسدان ۽ ماهر ان کيتر ۾ ڪم ڪري رهيا آهن ته جيئن اهڙا ڪي طور طريقا اختيار ڪري سگهجن پر جيسيتائين اهڙا ڪي طور طريقا مروج ٿين تيسيتائين هيئن ٽين ڏانهن ڌيان ضرور ڏجي:

نهائين جي تپاس (Pelvic examination): آئيدانيءَ جي ڪينسر تپاس ۽ لهڻ لاءِ اها هڪ بنيادي ۽ ضروري تپاس سمجهي وڃي ٿي. هن تپاس ۾ ڊاڪٽر هڪ هٿ جي آڱر ڳرپ نالي ۾ وجهي ٻئي هٿ سان پيٽ کي زور ڏئي آئيدانيون چڪاسي ڏسندي آهي ته منجهن ڪي غير معمولي ڳالهيون ته پيدا نه ٿيون آهن، ان بجاءِ ڪي ڊاڪٽر هڪ آڱر ڳرپ نالي ته ٻي مقعد ۾ وجهي ڏسندا آهن جو سندن چوڻ آهي ته اها تپاس مٿين تپاس کان وڌيڪ اثرائتي ثابت ٿئي ٿي، جڏهن ته انهن تپاسن جي موثر ثابت ٿيڻ جو مدار ڊاڪٽر جي تجربي ۽ سکيا تي منحصر آهي ته عورت جي هڏ ڪاٺ تي پڻ چوٽه جيتري عورت ڏسبي/ ٺلهي هوندي اوتروئي تپاس ۾ تڪليف پيدا ٿيندي.

ڳرپ نالي جو الٽراسائونڊ (transvaginal ultrasound): اهي عورتون جنکي آئيدانيءَ جي ڪينسر ٿيڻ جو گهڻو امڪان يا سراسري طور تي عام عورتن کان وڌيڪ خطرو رهي ٿو تن لاءِ هيءَ تپاس مٿين تپاس سان گڏ ڪرڻ وڌيڪ اثرائتي ثابت ٿيندي آهي. هن تپاس رستي انهن عورتن کي پڻ چڪاسيو ويندو آهي جن جي نهائين جون ٻيون تپاسون اڻپوريون يا مشڪوڪ هجن ٿيون. ٽرانس ويڄائينل الٽراسائونڊ کي سونو گرام (Sonogram) به سڏجي ٿو هن تپاس ۾ هڪ اوزار ڳرپ نالي ۾ اڻائي پوءِ هاءِ فريڪيوئنسي جون آوازي لهرون اماڻيون وينديون آهن جيڪي آئيداني ۽ ڳڀيڙن کي لڳي واپس ٿي هڪ عڪس پيدا ڪنديون آهن، هن تپاس مان اها به خبر پئجي سگهي ٿي ته آئيداني وڌي ويل آهي جيڪا ڪينسر جي نشاني به ٿي سگهي ٿي، جڏهن ته اها تپاس ناقص به ٿي سگهي ٿي چوٽه ڪن ماهرن مطابق ته، هر وڌيل آئيداني ڪينسر باني نه به هوندي آهي. ان سبب هيءَ تپاس رڳو انهن عورتن لاءِ مخصوص ٿئي ٿي جنکي آئيدانيءَ جي ڪينسر ٿيڻ جو گهڻو امڪان رهيو.

رت جي CA-125 تپاس: هن تپاس ۾ رت ۾ موجود انهن اينٽي باڊين جي ڇاڇ ڪئي ويندي آهي جيڪي آئيدانيءَ جي ڪينسر باني هجڻ سبب اهي خارج ڪن ٿيون جڏهن ته هيءَ تپاس ناقص سمجهي ويندي آهي، ڇاڪاڻ ته هن تپاس رستي اڌ کان مٿي اهي شروعاتي آئيدانيءَ جون ڪينسرون لهي نه ٿيون سگهجن جيڪي لهڻ گهرجن. ڪن اڀياسن مان اهو به ظاهر ٿيو آهي ته، هن تپاس ۾ انهن عورتن ۾ پڻ ڪينسر هجڻ جي غلط خبر پوي ٿي جن کي اصل ۾ ڪينسر هوندي ئي ناهي ۽ اهي صحتمند هجن ٿيون. جڏهن ته حمل، ڳڀيڙن جي استر جي سوزش، نهائين جي ڪنهن روڳ/ سوزش، ڳڀيڙن جي فائبروائڊس وارين حالتن ۾ پڻ هن تپاس رستي غلط رزلٽ ملي ٿي ته ڪينسر موجود آهي. اهو ئي سبب آهي جو آمريڪا جو ادارو ايف ڊي اي هن تپاس جي استعمال ڪرڻ جي سفارش نه ٿو ڪري سواءِ انهن عورتن لاءِ جنکي آئيدانيءَ جي ڪينسر اٿلي پون جو خطرو رهيو.

هوشيار رهڻ گهرجي. ان سلسلي ۾ جن به مائهن سان رابطو ڪيو ويو تن جو چوڻ هيو ته هر هڪ عورت کي ان امڪان کي رد ڪرڻ نه گهرجي ته هوءَ آڻيداني جي ڪينسر جو شڪار ٿي نه ٿي سگهي ڇاڪاڻ ته اها به هڪ حقيقت آهي ته ٻين ڪيترين ڪينسر جي پيٽ بر آڻيدانيءَ جي ڪينسر نسبتاً گهٽ ٿيندڙ آهي مثال طور؛ جيڪڏهن هن سال آمريڪا ۾ آرم جي ڪينسر ۾ متاثر ٿيل 182000 مريض تشخيص ڪيا ويندا ته ان حساب سان آڻيدانيءَ جي ڪينسر ۾ مبتلا مريضائن جو انگ رڳو 22000 هوندو. ان سلسلي ۾ هڪ ٻئي ماهر جو چوڻ آهي ته جيئن ته عورتن جي تمام گهڻيءَ گهڻائي کي آڻيدانيءَ جي ڪينسر نه ٿيندي آهي، تنهن ڪري ان سبب پريشان ٿيڻ جي ضرورت ناهي.

جڏهن ته ڪي عورتون اهڙيون به ٿي سگهن ٿيون جن کي آڻيدانيءَ جي ڪينسر ٿيڻ جو وڌيڪ خطرو ٿي سگهي ٿو، تنهن ڪري اهڙين عورتن کي گهرجي ته، هو اهڙين ڳالهين کان هوشيار

هر هڪ عورت کي ان امڪان کي رد ڪرڻ نه گهرجي ته هوءَ آڻيدانيءَ جي ڪينسر جو شڪار ٿي نه ٿي سگهي

جڏهن ماسي يا ڏاڏي اهڙي ڪينسر جو شڪار ٿيل هجي تڏهن پڻ اهڙي عورت کي آڻيدانيءَ جي ڪينسر ٿيڻ جو وڌيڪ امڪان ٿي سگهي ٿو پر ايترو گهڻو به نه جيترو ڪ پهرئين مثال ۾ ذڪر ڪيو ويو آهي. ٽيسٽائين، توهان ايترو ضرور ڪري سگهو ٿا ته، جيڪڏهن توهان کي ڄاڻ آهي ته توهان جي ڪٽنب ۾ ڪو آڻيدانيءَ جي ڪينسر ۾ مبتلا ٿيو آهي ته توهان پنهنجي ڪنهن ڪينسر يائي ماهر (زنائين ڪينسر يائي بيمارين جي ماهر) سان ملي اهو ڏسي سگهو ٿا ته توهان کي ان ڪينسر ٿيڻ جو ڪيترو خطرو / امڪان ٿي سگهي ٿو. ڪينسر يائي بيمارين جي ماهرن جو اهو به مشاهدو آهي ته، ڪيتريون عورتون ان غلط فهميءَ ۾ رهن ٿيون ته سندن آڪهه ۾ آڻيدانيءَ جي ڪينسر جي

رهن ۽ اهي ڳالهيون آهن؛

ان ڳالهه ۾ شڪ ناهي ۽ سڀ ماهر اها ڳالهه مڃين ٿا ته اهي عورتون آڻيدانيءَ جي ڪينسر ٿيڻ جو وڌيڪ شڪار ٿين ٿيون جن جي ڪٽنب ۾ ڪو ان ڪينسر ۾ مبتلا ٿي چڪو هوندو آهي خاص طور تي اهڙي عورت جنهن جي ڪنهن ويجهي مائٽياڻي ان ۾ مبتلا ٿي چڪي هوندي آهي جيڪا ماءُ، پيءُ يا ڌيءَ به ٿي سگهي ٿي.

حمل روڪ گھوڙين جا اٿو: حمل روڪ گھوڙين کائڻ سان انجن وارو عمل ٿي نه ٿو سگهي بلڪل ائين جيئن ڳوهرارپ ۾ ٿئي ٿو ۽ اها آڻيدانيءَ جي ڪينسر کان بچڻ لاءِ هڪ سٺي ڳالهه سمجهي ويندي آهي. جيڪڏهن حمل روڪ رڳو هڪ سال لاءِ به واپرائون وڃن ته ان سان به آڻيدانيءَ جي ڪينسر ٿيڻ جو امڪان گهڻو گهٽجي وڃي ٿو. چئن سالن تائين استعمال ڪرڻ سان اهڙو امڪان 50 سيڪڙو گهٽجي وڃي ٿو. هڪ ماهر مطابق ته اهي آڻيدانيءَ جي ڪينسر کان بچڻ جو اهڙو اپاءُ آهي جهڙوڪ اها عورت تي دفعا پيٽ سان ٿي هجي.

ته ڇا ان لحاظ کان آڻيدانين جي ڪينسر کان بچڻ لاءِ حمل روڪ گھوڙيون استعمال ڪجن؟ ان جي جواب ۾ ماهرن جو چوڻ آهي ته، اهو هر عورت تي مدار رکي ٿو؛ ڇاڪاڻ ته ڪن عورتن لاءِ اها فائديمند ثابت ٿي نه ٿي سگهي، اهڙيون عورتون جيڪي دل جي مرضن ۾ مبتلا، هاءِ بلڊپريشر- جيري جي تڪليف ۾ ورتل- آرم جي ڪينسر جو شڪار ۽ ڪين اسٽروڪ يا فليباٽيس جو خطرو رهي ٿو تن لاءِ حمل روڪ گھوڙي فائديمند ثابت ٿيڻ بجاءِ هاجيڪار ثابت ٿي سگهي ٿي. ساڳئي طرح سان اهي عورتون جيڪي قماڪ چڪين ٿيون تن کي پڻ حمل روڪ گھوڙيون واپرائڻ جي صلاح نه ڏني ويندي آهي خاص طور تي اهي جيڪڏهن 35 سالن کان وڌيڪ ڄمار جون آهن.

جڏهن ته اهي عورتن جيڪي سلامتيءَ سان اهي گھوڙيون کائي سگهن ٿيون ۽ ڪين آڻيدانيءَ جي ڪينسر ٿيڻ جا امڪان موثر طور تي گهٽجي وڃن ٿا ۽ ان گھوڙي جا اهڙا اثر تا حياتي هلندڙ ٿين ٿا.

اهڙيون عورتون جيڪي ڇڙيون چانڊ يا سنڍ (جن کي آڻيدانيءَ جي ڪينسر ٿيڻ جو گهڻو خطرو رهي ٿو) رهن ٿيون تن کي حمل روڪ گھوڙيون واپرائڻ گھرجن يا نه، اهو موضوع اڃان سخت بحث هيٺ آهي.

ساڳيءَ طرح سان ماهرن اهو به واضح طور تي ٻڌايو آهي ته عورتون جيڪي 40 سالن کان مٿي عمر جون آهن ۽ ڪين آڻيدانيءَ جي ڪينسر جو خطرو رهي ٿو تن کي حمل روڪ گھوڙين جي استعمال ڪرڻ سان فائدو ٿي سگهندو. جڏهن ته ڪن جو خيال آهي ته 45 سالن کان مٿي عمر جون اهڙيون عورتون جن کي خطرو هجي ٿو سي حمل روڪ گھوڙيون استعمال ڪري سگهن ٿيون.

جڏهن ته اهي عورتون جن کي آڻيدانيءَ جي ڪينسر ٿيڻ جو خطرو نه ٿو رهي تن کي حمل روڪ گھوڙيون حمل روڪڻ لاءِ ئي استعمال ڪرڻ گھرجن ۽ نه ڪي آڻيدانيءَ جي ڪينسر کان بچڻ لاءِ.

ڇا آنيڊانيون ڪڍرائڻ گھوڄن: آنيڊانين جي ڪينسر سبب جيسيتائين آنيڊانين جي ڪڍرائڻ يا نه ڪڍرائڻ جو تعلق آهي ته اهو هڪ وڏو سوال آهي ۽ ان سوال جي جواب ۾ هر سال آمريڪي عورتون هائوڪار ۾ جواب ڏين ٿيون. انهن هر سال ايتريون صحتمند عورتون آنيڊانين جي ڪينسر کان بچڻ لاءِ آپريشن ڪرائينديون رهن ٿيون. جڏهن ته ساڳئي وقت اهو سوال به پيدا ٿئي ٿو ته ان لاءِ ڪيترين عورتن کي آنيڊانين ڪڍرائڻ (Oophorectomies) جي ضرورت هوندي آهي پر جيڪڏهن آنيڊانين جي ڪينسر کي ڏسجي جيڪا ٻين ڪينسرن جي پيٽ ۾ نسبتاً وري ٿيندڙ آهي يعني ته آمريڪا ۾ ئي ان سبب رڳو 22000 عورتون هر سال متاثر ٿين ٿيون ته ان لحاظ کان اهو چئي سگهجي ٿو ته ڪيتريون عورتون هروڀرو آنيڊانيون ڪڍرائي ڇڏين ٿيون رڳو ان پوءِ سبب ته متان ڪين آنيڊانين جي ڪينسر نه ٿي پوي ۽ هو جڏهن انهن ڪرائين ٿيون ته ڪين فائدي ٿيڻ بجاءِ ڪن ٻين تڪليفن پيدا ٿيڻ جو وڌيڪ خطرو رهي ٿو. جنهن ۾ دل جون بيماريون ۽ هڏن جو ڳرڻ (Osteoporosis) اچي وڃي ٿو.

ماهرن اهو به ڏٺو آهي ته اهي عورتون جيڪي عمر جي 30 ۽ 40 واري ڏهاڪن دوران آنيڊانيون ڪڍرائي ڇڏين ٿيون تن کي انهن عورتن جي پيٽ ۾ جيڪي انهن نه ٿيون ڪن، تن جي پيٽ ۾ هرٿ اٽڪ ۽ دڙ جي هڏي جي ڀڄي پوڻ جو وڌيڪ شڪار ٿيڻو پوي ٿو جنهن جو سبب هڏن جو ڳرڻ / ڍانڍو ٿي وڃڻ ٻڌايو وڃي ٿو. جيتوڻيڪ اهڙين تڪليفن کان بچڻ لاءِ هارمون (هارمون ريپليسمنٽ ٿراپي) استعمال ڪري سگهجن ٿا پر تنهن هوندي به آنيڊانين نه هجڻ سبب جيڪي تڪليفون پيدا ٿين ٿيون ۽ انهن جو جيڪو ڪارج آهي انهن جي پورائي ڪري نه ٿي سگهجي. هڪ اهڙي عورت جيڪا سنڍ ٿيڻ کان اڳ ۾ آنيڊانيون ڪڍرائي ڇڏي ٿي تنهن کي اڳتي باقي سڄي زندگي لاءِ هارمون استعمال ڪرڻا پون ٿا. ساڳئي وقت ماهرن جو اهو به مشاهدو آهي ته حمل روڪ گورين رستي جيڪو ايسٽروجن جسم پاڻ پيدا ڪندو رهي ٿو ان سلسلي ۾ هڪ ماهر جو چوڻ آهي ته ”آنيڊانيون ايسٽروجن جو جيڪو شاندار مقدار هميشه لاءِ پيدا ڪنديون رهن ٿيون ان جي مصنوعي هارمون رستي کوٽ پوري ڪري نه ٿي سگهجي.

اهوئي سبب آهي جو ڪيترا ڊاڪٽر چاهيندا آهن ته صحتمند عورتن کي جيتري قدر ممڪن ٿي سگهي اهي آنيڊانين سميت زندگي گذارينديون رهن. اهوئي سبب آهي جو ڪيل سروي مان ڪنهن به ڪينسر جي ماهر اهو نه چيو ته هو چاليهن سالن کان گهٽ عمر جون آنيڊانيون ڪڍڻ چاهيندا آهن بشرطيڪ منجهن ڪتنبي لحاظ کان آنيڊانين جي ڪينسر پيدا ٿيڻ جا ڪي گهڻا امڪان موجود نه هجن ۽ اهو به تڏهن جڏهن سندس گهٽ ۾ گهٽ سندس ٻن ويجهن مائيتيائين کي آنيڊانين جي ڪينسر ٿي هجي ۽ هن ٻار ڄڻي بس ڪيا هجن.

پراهرڙيءَ صورتحال ۾ ڇا ڪري سگهجي ٿو جڏهن ڪا عورت آپريشن رستي ڳپيڙن ني ڪڍرائي ڇڏي (Hysterectomy) ساڳئي وقت اها ڳالهه به ضرور ذهن نشين ڪرڻ گهرجي ته ڪٽنب ۾ ڪنهن کي آنيڊانين جي ڪينسر ٿيڻ يا هجڻ جو اهو مطلب به نه هوندو آهي ته انهن جي پوينرن کي به اها ڪينسر ضرور ٿيندي آهي جڏهن ته ان جو رڳو مطلب اهو ورتو ويندو آهي ته توهان جي جسم ۾ اهڙي کوٽي ڇڏڻ موجود ٿي سگهي ٿي جنهن سبب توهان به ان قسم جي ڪينسر ۾ شڪار ٿي سگهو ٿا. بدقسمتي سان سائنس اڃا ايتري ترقي نه ڪئي آهي جو ڪنهن کي چڪاسي ۽ سندس جين جي اڀياس ڪرڻ سان اهو ٻڌائي سگهجي ته ڪنهن کي اها ڪينسر ٿي سگهي ٿي ۽ ڪنهن کي نه. جڏهن ته اميد ڪئي وڃي ٿي ته ايندڙ پنجن سالن دوران اهڙيون جنيٽيڪي تهاسون مروج ٿي وينديون جن رستي اهڙي ڇنڊڇاڻ ڪري سگهجي.

آيد موجود آهي. جڏهن ته ان بجاءِ اهو، هينن هجي ٿو ته، اصل ۾ سندن ڪنهن مائٽياڻيءَ کي ڪنهن ٻئي قسم جي ڪينسر هجي ٿي جيڪا پوءِ وڌيڪ وڌيڪ آڻيڻي ٿي.

سڳي وقت اهو ويچار به پيش ڪيو ويندو آهي ته آڻيڻيءَ جي ڪينسر جا ڪي قسم موروثي آهن. ان سلسلي ۾ ماهرن جو چوڻ آهي ته ائين رڳو پنج سيڪڙو ٿئي ٿو. ڇاڪاڻ ته، ڪنهن ويجهي مائٽياڻيءَ کي آڻيڻيءَ جي ڪينسر ٿي پوڻ جو اهو مطلب نٿو گهرجي ته اها اڌ سبب ٿي آهي. جڏهن ته اها اتفاق به ٿي سگهي ٿي. ان جي وڌيڪ تصديقي ڪرڻ لاءِ اهڙيءَ

مائٽياڻيءَ جو ميڊيڪل رڪارڊ به ڏسي سگهجي ٿو (جيڪڏهن توهان کي اهڙو شڪ آهي ته انجو رڪارڊ ضرور ڏسو) ان مان توهان کي اهڙو ثبوت ملندو ته واقعي توهان آڻيڻيءَ جي ڪينسر جي اڌ سبب شڪار ٿيا آهيو يا نه، جڏهن ڪنهن ڪٽنب ۾ ڪو آڻيڻيءَ جي ڪينسر جي اڌ سبب مبتلا ٿئي ٿو ته اهڙي ڪينسر نئين فرد کي سرسري طور تي اڳئين فرد کان عمر جي لحاظ کان ڏهه سال اڳهر ٿي پوي ٿي.

ماهرن جو اهو به چوڻ آهي ته، آڻيڻيءَ جي ڪينسر يا ٿي اڌ جو اهي عورتون وڌيڪ شڪار ٿين ٿيون جن جون به يا ٻن کان وڌيڪ ويجهيون

مائٽياڻيون (ماءُ، پيءُ يا ڌيءُ) آڻيڻيءَ جي ڪينسر ۾ مبتلا ٿيون هجن يا ڪا هڪ ويجهي مائٽياڻيءَ ڪيتريون ٻيون مائٽياڻيون (مائي، ڏاڏي يا ڪي ٻيون) ان ڪينسر جو شڪار ٿيون هجن.

هڪ اهڙيءَ عورت کي آڻيڻيءَ جي ڪينسر ٿيڻ جو امڪان تڏهن پڻ وڌي وڃي ٿو جڏهن؛

سندس ڪٽنب ۾ آڻيڻيءَ جي ڪينسر سان گڏوگڏ ارهه جي ڪينسر به ٿيندڙ هجي. (۲) سندس ڪٽنب ۾ آڻيڻيءَ جي ڪينسر سان گڏوگڏ آڻيڻيءَ جي ڪينسر سان گڏوگڏ، ڦڦڙ، لبلب يا پراسٽيٽ جي ڪينسر مان به ڪا ڪينسر موجود هجي.

جڏهن ته ڪن ماهرن جو ويساهه

آڻيڻين واري ڪينسر جا خطرو ۽ انهن کان بچاءُ: ڪينسر اڀياسن مان اهو به ظاهر ٿيو آهي ته جڏهن جنسي عضون تي ٽالڪر پائوڊر عام طور تي هنيو وڃي ٿو ته ان سبب به آڻيڻين جي ڪينسر ٿيڻ جو امڪان وڌي وڃي ٿو. هڪ تازي اڀياس مان اهو ظاهر ٿيو ته اهي عورتون جيڪي صحت صفائي جي لحاظ کان هر روز ڪيترن سالن تائين پائوڊر هڻنديون رهيون، خاص طور تي ان عرصي دوران جڏهن هو ٻار جنم جي سگهه رکندڙ عمر ۾ هيون ته اهڙين عورتن کي، عام رواجي عورتن جي پيٽ ۾ آڻيڻين جي ڪينسر ٿيڻ جو ٽيڻ تي وڌيڪ خطرو رهيو. ائين چوڻ ٿو ٿئي جيتوڻيڪ ان جي ڪارڻن جي مڪمل ڄاڻ حاصل ٿي نه سگهي آهي پر تنهن هوندي به سمجهيو وڃي ٿو ته پائوڊر سبب هڪ اهڙي گڏيل پيدا ٿي جيڪا آهستي آهستي پوءِ ڳپيرن ۽ فيلوپين نلين رستي آڻيڻين تائين پهچي وڃي ٿي جنهن سبب سمجهيو وڃي ٿو ته آڻيڻين ۾ سوزش پيدا ٿي پوي ٿي ۽ اها اڳتي هلي ڪينسر ي صورت اختيار ڪري ٿي. ساڳئي وقت اهڙن اڀياسن مان اهو به پتو ٿيو آهي ته ائين بلڪل ٿئي ته اهو پر تمام گهٽ عورتن ۾ اهوئي سبب آهي جو اهڙي اڀياس ڪندڙ ماهرن عورتن کي صلاح ڏني آهي ته اهي سنئون سٺو جنسي عضون، انڊروئيز، نپڪن ۽ ڊايافراڊ وغيره کي پائوڊر هڻڻ جي عادت ختم ڪري ڇڏين.

جيستائين آڻيڻيءَ جي ڪينسر ٿيڻ جي خطري / امڪان جو تعلق آهي ته، هڪ اهڙي عورت جيڪا هڪ دفعو به مڪمل طرح سان حامله ٿئي ٿي ته ان کي ان سبب آڻيڻين جي ڪينسر ٿيڻ جو خطرو 40 سيڪڙي تائين گهٽجي وڃي ٿو بنسبت ان عورت جي جيڪا ڪڏهن به حامله نه ٿي آهي. هڪ دفعي جي حامله ٿيڻ کانپوءِ جڏهن اهڙي عورت وري پيٽ سان ٿئي ٿي ته هر دفعي جي ڳور هاري ٿيڻ سان اهڙو خطرو اڃان به وڌيڪ 14 سيڪڙي تائين گهٽيو وڃي ٿو.

ٻار کي ڍڪ ڌارائڻ سان جتي ٻيا ڪيترائي آڻيڪ فائدا پيدا ٿين ٿا جيڪي ٻار کي حاصل ٿيندا رهن ٿا ته ساڳئي وقت ان جا فائدا اهڙيءَ ماءُ کي حاصل ٿين ٿا جو هر دفعي اهڙو ڍڪ ڌائيندڙ ٻار ماءُ جي آڻيڻين جي ڪينسر ٿيڻ جي امڪان کي گهٽائيندو رهي ٿو. جڏهن ٻار کي 12 کان 24 مهينن تائين لاڳيتو ڍڪ ڌاريو ويندو هجي ته ائين ڪرڻ سان ان جي ماءُ کي 1/3 تي ڪينسر ٿيڻ جو خطرو گهٽجي وڃي ٿو.

ساڳئي وقت ماهرن اهو به ڏٺو آهي ته، جڏهن اهڙا ڪاڌا ڄمار واپاريا وڃن جن ۾ پيشاڪشورين ڄمار هجي جهڙوڪ گجرون، لاهوري گجرون ۽ گهرن انگن واريون سايون ڀاڄيون ته انهن کي به آڻيڻين جي ڪينسر ٿيڻ جو گهٽ ۾ گهٽ امڪان رهي ٿو. هڪ اڀياس مان اهو به ظاهر ٿيو ته جڏهن مناسب سائيز جون ٽي گجرون هر پنهين ڏينهن کاڌيون وڃن ته اهڙين عورتن کي آڻيڻين جي ڪينسر ٿيڻ جو گهٽ ۾ گهٽ امڪان رهيو.

آهر تپاسون ڪن ٿا مثال طور، اهي عورتون جنڪي هن ڪينسر ٿيڻ جو وڌيڪ امڪان هجي ٿو تن جي رڳو نهائين جي هر ڇهين مهيني چڪاس ڪئي وڃي ٿي ته سڄي گريپ ناليءَ جي الٽراسائونڊ رڳو انهن عورتن جي ڪئي وڃي ٿي جن ۾ جڏهن ضروري سمجهي وڃي ٿي خاص طور تي انهن عورتن جي جيڪي هن ڪينسر سبب وڌيڪ ڊپ ۾ رهن ٿيون يا گهڻيون ٿلهيون هجن ٿيون


آئيڊائيءَ جي ڪينسر کان هوشيار رهن جو مطلب اهو ورتو ويندو آهي ته، ڪنهن ڪينسر جي ماهر کان سدائين پنهنجي چڪاس ڪرائجي رهجي ۽ ان لاءِ بهتر هوندو آهي ته اهڙو ماهر چونڊجي جيڪو زنانين ڪينسر بيمارين جو ماهر هجي ۽ ان کان وقت به وقت چڪاس ڪرائجي رهجي جو ته اهڙي ڊاڪٽر کي زنانين ڪينسر جي چڪاس جي خاص تربيت مليل هوندي آهي

آهي ته جڏهن ڪابه ويجهي مائٽيائي ڪينسر ۾ مبتلا هجي ته اهڙين حالتن ۾ پڻ توهان هن ڪينسر ۾ مبتلا ٿي سگهو ٿا.

آئيڊائيءَ جي ڪينسر کان هوشيار رهن جو مطلب اهو ورتو ويندو آهي ته، ڪنهن ڪينسر جي ماهر کان سدائين پنهنجي چڪاس ڪرائجي رهجي ۽ ان لاءِ بهتر هوندو آهي

ته اهڙو ماهر چونڊجي جيڪو زنانين ڪينسر بيمارين جو ماهر هجي ۽ ان کان وقت به وقت چڪاس ڪرائجي رهجي ڇو ته اهڙي ڊاڪٽر کي زنانين ڪينسر جي چڪاس جي خاص تربيت مليل هوندي آهي ۽ آئيڊائيءَ جي ڪينسر جي حوالي سان جن به ماهرن سان رابطو ڪيو وڃي تن جي اهڙين سڀني عورتن کي جن کي هن ڪينسر ٿيڻ جو گهڻو امڪان رهي ٿو. ساڳي صلاح هئي ته، اهڙيون عورتون 12 سالن کان وٺي 25 سالن جي عمر تائين هر ڇهن مهينن کانپوءِ پنهنجي نهائين جي چڪاس ۽ سڄي گريپ نالي جي الٽراسائونڊ تپاس ڪرائينديون رهن.

جڏهن ته ڪي ماهر اهڙا به آهن جيڪي اهڙين عورتن جي هر ڇهين مهيني ۾ هڪ دفعو نهائين جي چڪاس ته ٻئي ڇهين مهيني الٽراسائونڊ جي



يا جڏهن نهائين جي تپاس مان ڪي مشڪوڪ ڳالهون حاصل ٿين ٿيون. جيتوڻيڪ اڌ سبب عورتون وڌيڪ وڌيڪ آئيڊائيءَ جي ڪينسر ۾ مبتلا ٿين جي خطري ۾ رهن ٿيون پر تنهن هوندي به

هارمونن سبب متحرڪ ٿينديون رهن ٿيون ۽ ان ماهر جي خيال موجب ته اهڙيون آئيڊائيون پڻ ڪينسر يائي بيماريءَ جو وڌيڪ شڪار ٿيڻ جي خطري ۾ رهن ٿيون. ساڳئي طرح سان هڪ اهڙي عورت

جيڪڏهن ڪا عورت مٿي ڄاڻايل عمر جي حد ۾ آهي ته کيس اپاءَ طور ڪنهن ڪينسر يائي ماهر (زناني بيمارين جي ماهر) سان لهه وچڙ ۾ اچڻ گهرجي ۽ آئيڊائين جي ڪينسر کان هوشيار رهن لاءِ اهڙا احتياطي اختيار ڪرڻ گهرجن، ان

هر سال هڪ دفعو نهائين جي چڪاس ڪرائڻ گهرجي، ڪيترا ماهر اها به صلاح ڏيندا آهن ته اهڙين عورتن کي سال ۾ هڪ دفعو سڄي گريپ نالي جي التراسائونڊ ڪرائڻ گهرجي ته ڪي اهو معقول سمجهندا آهن ته التراسائونڊ تپاس 35 سالن جي عمر کان وٺي اڳتي سال ۾ هڪ دفعو ضرور ڪرائجي رهجي.

95 سيڪڙو عورتون اهڙيون هجن ٿيون جنڪي اڌ سبب اها ڪينسر پيدا نه ٿي ٿئي. ائين چوڻي ته ايتري عورتن کي آئيڊائين جي ڪينسر ٿي پوي ٿو انجي سببن ۽ ڪارڻن جي ڳولها ڪندي سائنسدانن کي ٻن قسمن جون عورتون نظر آيون آهن جن ۾ عام رواجي جن کان وڌيڪ اها ڪينسر ٿي پوي ٿي ۽ اهي آهن؛ اهي عورتون جنڪي ڪڏهن به ٻار نه ٿيو آهي ۽ انهن ڪڏهن به حمل روڪ گوريون استعمال نه ڪيون آهن ۽ اهي عورتون جيڪي ارهه جي ڪينسر جو شڪار ٿيون آهن. ان سلسلي ۾ اهو سوال به هڪ خاص اهميت رکي ٿو ته ڪنهن عورت جي ويجهه واري عمر (اها عمر جڏهن هوءَ ٻار پيدا ڪرڻ جي سگهه رکندڙ هئي) ۾ کيس ڪيترا دفعا آنجن وارو عمل ٿيو آهي يا ان مان گذري آهي (آنجن، اهو ماهوار عمل جڏهن آئيڊائيءَ مان انورسجي تيار ٿئي ٿو) ته اهي ڳالهون به آئيڊائيءَ جي ڪينسر پيدا ڪرڻ ۾ اهميت واريون سمجهيون وڃن ٿيون. ان سلسلي ۾ هڪ ماهر جو خيال آهي ته جيڪڏهن ڪا عورت سنڊجڻ (MENOPAUSE) تائين سدائين آنجن واري عمل مان گذرندي رهي ۽ ان عمل ۾ حمل، ڏک ڏيڻ ۽ حمل روڪ گورين سبب به خلل پيدا نه ٿئي ته اهڙيءَ عورت جون آئيڊائيون هر مهيني

جيڪا ارهه جي ڪينسر جو شڪار ٿي هجي ته اها به آئيڊائيءَ جي ڪينسر ۾ مبتلا ٿيڻ جي خطري ۾ رهي ٿي ۽ ائين چوڻو ٿئي، انجي ڪارڻن جي اڃان تائين مڪمل ڄاڻ حاصل ٿي نه سگهي آهي. ارهه جي ڪينسر جيان آئيڊائيءَ جي ڪينسر کي پڻ عمر سان ٿيندڙ سمجهيو وڃي ٿو مطلب ته جيئن جيئن ڪا عورت عمر ۾ وڌندي ويندي ته کيس هن ڪينسر ٿيڻ جو امڪان به وڌندو ويندو. سائنسدانن مطابق ته آئيڊائيءَ جي ڪينسر ٿيڻ جو وڌيڪ خطرو 50 ۽ 65 سالن جي ڄمار ۾ رهي ٿو يعني ته، هڪ لک عورتن ۾ اهو انگ 28 مان وڌي 54 ٿي وڃي ٿو ۽ اهو انگ 70 کان 74 سالن جي ڄمار دوران ڇهه کي پهچي ٿو ۽ وڌي 60 ٿي وڃي ٿو. تنهن ڪري هڪ اهڙي عورت جيڪا مٿين سراسري عمر جي حد ۾ ايندي هجي تنهن کي اها ڳالهه ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته وڌندڙ عمر سان گڏوگڏ اهڙو خطرو به وڌندو رهي ٿو.

تپاس 35 سالن جي عمر کان وٺي اڳتي سال ۾ هڪ دفعو سڄي گريپ نالي جي التراسائونڊ ڪرائڻ گهرجي ته ڪي اهو معقول سمجهندا آهن ته التراسائونڊ تپاس 35 سالن جي عمر کان وٺي اڳتي سال ۾ هڪ دفعو ضرور ڪرائجي رهجي. جڏهن ته ساڳئي وقت هو اها ڳالهه به ڪن ٿا ته جيتوڻيڪ التراسائونڊ تپاس هڪ مختصر تپاس آهي پر تنهن هوندي به اها مڪمل نه ٿي سمجهي وڃي. چوڻو التراسائونڊ رستي آئيڊائين جي ٿيل واڌ ته لهي سگهجي ٿي پر اهو ٻڌائي نه ٿو سگهجي ته اها ڪينسر يائي آهي يا نه تنهن ڪري اهڙي تپاس ڪرائڻ کان اڳ ۾ انهي خامين ۽ خوين بابت ماهر ڊاڪٽر سان ضرور صلاح مشورو ڪجي. مختصراً ته دنيا جي هڪ نامور ۽ ماهر ڊاڪٽر عورتن کي ان ڳالهه جي تاڪيد ڪئي آهي ته، هر سال هڪ دفعو پنهنجي نهائين جي چڪاس ۽ پاپ ٽيسٽ ضرور ڪرايو. مئموگرام ڪرائڻ به نه وساريو ته هر مهيني پنهنجن ارهن جي ذاتي تپاس به ضرور ڪندا رهو.

دنيا جي هڪ نامور ۽ ماهر ڊاڪٽر عورتن کي ان ڳالهه جي تاڪيد ڪئي آهي ته، هر سال هڪ دفعو پنهنجي نهائين جي چڪاس ۽ پاپ ٽيسٽ ضرور ڪرايو. مئموگرام ڪرائڻ به نه وساريو ته هر مهيني پنهنجن ارهن جي ذاتي تپاس به ضرور ڪندا رهو.

PSYCHOSIS

ڊاڪٽر عبدالحميد ميمڻ
ماهر دماغي ۽ ذهني امراض
پريگري هائوس نزد چاندي سينيما حيدرآباد

3- پراڻي ماليخوليا (Chronic Psychosis):

اهڙو ماليخوليائي مرض جيڪو آهستي آهستي شروع ٿي ڊگهي عرصي تائين قائم رهندو آهي ۽ مستقل حيثيت اختيار ڪري وٺندو آهي جيڪڏهن، ان جو علاج شروع نه ڪيو وڃي ته نتيجا خطرناڪ به ٿي سگهن ٿا. هيٺين مثالن مان ان جي وڌيڪ وضاحت ٿي ويندي.

مثال نمبر 1:

رفيق 20 سالن جو نوجوان هاري پنهنجي والدين سان ڳوٺ ۾ رهندو آهي. هڪ سال اڳ هو ڏاڍو ڪلشو ملڻو، خوش اخلاق ۽ محنتي نوجوان هيو هو پنهنجي ڳوٺ جي سڀني فلاحين ڪمن ۾ وڏي چڙهي حصو وٺندو هو. آهستي آهستي منجهس هڪ تبديلي محسوس ڪيئي ويئي ته هو انهن ڳالهين کان پري ٿي ويو ان جو ڪو خاص سبب به ڪونه هو. هو ڏينهن ڏينهن خاموش ٿيندو ويو- ڪڏهن ڪڏهن هو ڪلندو، پڻڪندو ۽ پنهنجي پاڻ سان ڳالهائڻ لڳندو هو. چوندو ته ڪوئي کيس قتل ڪندو، عورتون کيس گاريون ڏين ٿيون، سندس کاڌي ۾ زهر مليل آهي، آهستي آهستي سندس رويو وڌيڪ بگڙجندو ويو هو هڪ طرف ويٺو

ٿين ٿا. اهڙيون ماليخوليائون، جن جي اصل سبب جي خبر نه هجي انهن کي ”فنڪشنل سائيڪوسس“ (Functional Psychosis) ڪوٺيو آهي ڪن ماڻهن کي اها بيماري جسماني بيمارين کان پوءِ يا دماغ کي نقصان رسڻ کانپوءِ ٿيندي آهي جيڪا ”نامياتي ماليخوليا“ (Organic Psychosis) (آرگينڪ سائيڪوسس) ڪوٺبي آهي.

ان کي هيٺين ٽن قسمن ۾ ورهائي سگهجي ٿو، جيڪي بيماري جي اوچتي ظاهر ٿيڻ، بيماريءَ جي دؤران، ان جي ڊيگهه ۽ نتيجن تي مشتمل آهن.

1- اوچتي ماليخوليا

(Acute Psychosis):

اهڙو ماليخوليائي ذهني مرض جيڪو اوچتو ظاهر ٿي ٿوري عرصي تائين رهندو آهي، جنهن جو ڪوبه سبب ناهي هوندو ان کي اوچتي ماليخوليا يا ايڪيوٽ سائيڪوسس چئبو آهي.

2- اٽلنڊر ماليخوليا (Recurrent Psychosis):

اهڙي ماليخوليا جيڪا وقفن ۾ ظاهر ٿئي- وڃ ۾ اهڙا وقفا ايندا آهن جن ۾ مريض نيڪ ٿي ويندو آهي ۽ وري بيماري موٽي ايندي آهي.

هي شديد قسم جي ذهني بيماري آهي جنهن ۾ مريض جو حقيقت سان تعلق ختم ويندو آهي، هو پنهنجي هڪ الڳ دنيا ۾ رهندا آهن ۽ پنهنجو خيال ناهن رکي سگهندا. پنهنجي روزمره جي زندگيءَ جون ضرورتون خود پوريون ناهن ڪري سگهندا. هو پنهنجو پاڻ کي بيمار ناهن سمجهندا ۽ ٻين تي الزام هڻندا آهن هو عجيب و غريب قسم جي تجربن مان گذرندا آهن، کين مختلف قسم جا آواز ٻڌڻ ۾ ايندا آهن، هو پنهنجي چوڌاري اهڙيون شيون ڏسندا آهن جيڪي ٻين کي ڏسڻ يا ٻڌڻ ۾ ناهن اينديون. سندن خيالن ۾ تسلسل ناهي هوندو ٻيا ماڻهو کين قبول ناهن ڪندا. سندن ڳالهه ٻولهي، سوچ ۽ خيال صحيح ناهن هوندا، جنهن جي ڪري کين روزمره جي ڪم ڪارين ۽ معاشرتي ۽ گهريلو ذميوارين نڀائڻ ۾ مشڪل پيش ايندي آهي. هو پنهنجي خاندان ۽ پاڙيسرين لاءِ پريشاني جو ڪارڻ بڻجندا آهن، علامت جي ڊريگهه ۽ شديد نوعيت جي ڪري هو ذهني دٻاءُ، انتشار ۽ ذهني معذوري جو شڪار هوندا آهن.

ماليخوليا ۾ مرض جو اصل سبب معلوم ڪرڻ تمام ڏکيو آهي ڇو جو ڪيترائي سبب ملي ڪري ان بيماريءَ جو باعث

هو پنهنجو پاڻ کي بيمار ناهن سمجهندا ۽ ٻين تي الزام هڻندا آهن هو عجيب و غريب قسم جي تجربن مان گذرندا آهن، کين مختلف قسم جا آواز ٻڌڻ ۾ ايندا آهن، هو پنهنجي چوڌاري اهڙيون شيون ڏسندا آهن جيڪي ٻين کي ڏسڻ يا ٻڌڻ ۾ ناهن اينديون.

تڪيندو رهندو. سندس والدين کيس فقيرن، پيرن ۽ مزارن تي وٺي ويا پر هو بيمار ٿيندو ويو، سندس ننڊ ختر ٿيندي ويئي، هو پنهنجي جسر جي صفائي وغيره کان بلڪل لاپرواهه ٿي ويو. هو مستقل قسم جي ماليخوليا ۾ مبتلا آهي. اها تمام عام قسم جي بيماري آهي کيس بغير ڪنهن سبب جي آهستي آهستي اها بيماري شروع ٿي. ان بيماري کي (Schizo Phrenia) (اسڪائيزو قرينيا) چئبو آهي. اها پندرهن کان ويهن سالن جي عمر ۾ شروع ٿيندي آهي. جنهن جو سبب نامعلوم آهي اها تمام گهڻي عرصي تائين هلندي آهي. جيڪڏهن ان جو علاج نه ڪرايو وڃي ته وڌيڪ بگڙجي ويندي آهي. ڪيترائي ماڻهو ان بيماريءَ جو شڪار ٿيندا آهن. مناسب علاج سان ان بيماري تي قابو ڪري سگهجي ٿو ۽ مريض سٺي زندگيءَ گذارڻ جي قابل ٿي سگهي ٿو. دوائن جي استعمال کانپوءِ فائدو ٿيڻ تي مريض کي روزمره جي معمولن طرفن آڻي سگهجي ٿو.

هٿال ٺهيو 2:

25 ساله امينا ٽن ٻارن جي ماءُ آهي. هوءَ تمام خوش ذوق، نرم ۽ نازڪ مزاج جي مالڪ هئي. تقريباً ٻن هفتن کان سندس رويي ۾ هڪ عجيب قسم جي تبديلي اچي ويئي آهي. هن تمام گهڻيون ڳالهيون ڪرڻ شروع ڪري

ڏنيون آهن. ڪڏهن ڪڏهن هوءَ مچرجي پوندي آهي ۽ ٻين کي گاريون ڏيڻ شروع ٿي ويندي آهي نه هوءَ ڪجهه کائي ٿي ۽ نه ئي سمهي ٿي ۽ ڪڏهن ڪڏهن هوءَ گهڻيءَ ۾ هر ننڍڙي ٻار جو پيڇو ڪري ٿي، ڪڏهن رڙيون ٿي ڪري ته روڪيو هو منهنجي ٻچي کي ڪنڀون ٽا وڃن. ٻڌايو ٿو وڃي ته ٻه هفتا اڳ هن پنهنجو 6 سالن جو ٻار بيماريءَ سبب وڃايو آهي. امينا جي بيماري، ”اوپٽي ٿيندڙ ماليخوليا“ (Acute Psychosis) آهي. اها بيماري اوچتو شروع ٿي. ان جو عرصو تمام ٿورو آهي اهڙين بيمارين ۾ وقفو تمام ٿورڙي عرصي جو ٿيندو آهي اها مڪمل علاج سان ليڪ ٿي ويندي آهي. ڪي وري مستقل بيماريءَ جي شڪل اختيار ڪري وٺنديون آهن جن جو علاج ڪافي عرصي تائين ڪرڻو پوندو آهي.

هٿال ٺهيو 3:

35 سالن جو غلامون هڪ فيڪٽريءَ ۾ ملازم آهي. هو تمام محنتي ۽ وقت جو پابند هيو. پنهنجي ڪم کي سٺي نموني انجام ڏيئي رهيو هو. هڪ مهيني کان هو راتن جو جاڳي ٿو. ضرورت کان وڌيڪ خوش مزاج ٿي ويو آهي هرو ڀرو ڪلڻ شروع ڪري ڏيندو آهي حد کان وڌيڪ ڳالهائڻ ۽ تيز ٿي پيو آهي هو پنهنجي ڪم تي ڌيان نه ٿو ڏيئي

سگهي. هو تمام جلدي تنگ ٿي پوندو آهي بغير ڪنهن سبب جي معمولي ڳالهين تي مچرجي پوندو آهي هو پنهنجو پاڻ کي تمام اهم انسان سمجهندو آهي ۽ ان مطابق عمل ڪرڻ شروع ڪندو آهي. هو چوندو آ ته مون وٽ تمام گهڻي دولت آهي، مان تمام وڏو قابل ماڻهو آهيان هو هر قسم جا ڪم ڪرڻ جي دعويٰ ڪندو آهي جيڪڏهن ڪوئي کيس چئلينج ڏئي ته هو مچرجي پوندو آهي ۽ گاريون ڏيندو آهي وڙهن مرڻ تائين تيار ٿي ويندو آهي جيڪڏهن سڀ هن سان راضي هجن ته اهو انهن سان ڪل يوڳ شروع ڪري ڏيندو آهي هو لطيفا ٻڌائيندو آهي ۽ ڪلندو رهندو آهي ڪنهن کي به ڳالهائڻ جو موقعو ناهي ڏيندو. هن ۾ تمام گهڻي طاقت اچي ويندي آهي سندس حد کان وڌيڪ ڳالهيون سندس وڌندڙ حرڪتون، ننڊ نه اچڻ، سندس گهر وارن لاءِ هڪ مسئلو بنيل آهي. معلوم ٿيو آهي ته ٻه سال ۽ چار سال اڳ ان کي ان قسم جا ٻه دورا پئجي چڪا آهن جيڪي ٻن ٽن مهينن تائين رهندا هيا ۽ وچ وارن وقفن ۾ هو بلڪل ليڪ رهندو هيو. اڄ سوڌو تي دفعا مٿس بيماريءَ جو حملو ٿي چڪو آهي. هو پوين بيمارين درميان بلڪل ليڪ رهندو هيو. اڪبر جي ان ماليخوليائي نفسياتي رويي کي مينيا (Mania) چئبو آهي. مينيا جي بيماري ڪجهه ڏينهن کان وٺي مهينن تائين هلندي آهي. مريض قدرتي طور تي خود بخود ليڪ ٿي پوندو آهي. مرض جي حملي کانپوءِ مريض کي مڪمل آرام اچي ويندو آهي.

جنسي هريپيز يا جنسي پيرون داڻا

GENITAL HERPES

مشڪل ۽ مهانگو آهي، اڻسڌيءَ طرح هڪ ٻي ٽيسٽ جنهن کي TZANK ٽيسٽ چيو وڃي ٿو تنهن سان هن مرض جي تشخيص ڪري سگهجي ٿي.

علاج:

جنسي هريپيز جو علاج تمام مشڪل آهي ڇاڪاڻ جو گهڻو ڪري هي مرض علاج جي باوجود باريبار اٿلي پوندو آهي، پهريائين ته هن اڏام جيوڙي يا وائرس لاءِ ڪابه دوا موجود ڪونه هئي پر هن وقت جيتوڻيڪ دوا موجود آهي پر تنهن هوندي به اها دوا پوري طرح ڪارآمد نه آهي ۽ دوا تمام گهڻي عرصي لاءِ استعمال ڪرڻ جي ضرورت پئجي سگهي ٿي.

جنسي هريپيز جون پيچيدگيون:

جنسي هريپيز جون ڪيتريون ئي پيچيدگيون ٿي سگهن ٿيون. پراسين صرف انهن پيچيدگين جو ذڪر ڪنداسين جيڪي تمام گهڻي انداز ۾ نظر اينديون آهن ۽ تمام خطرناڪ ثابت ٿي سگهن ٿيون.

نئين ڄاول ٻار کي هريپيز جو لڳڻ: جيڪڏهن ڪنهن حمل واري عورت کي جنسي هريپيز هجي ته پوءِ اها وڃي دوران ٻار ڏانهن منتقل ٿي سگهي ٿي ۽ اهو مرض نئين

ليبارٽريءَ ۾ وائرس جو ڪلچر تمام

I جي ڪري به ٿي سگهي ٿي. جنسي هريپيز به جنسي ميلاپ جي ذريعي هڪ ماڻهو کان ٻئي ماڻهو ۾ منتقل ٿيندي آهي ۽ جنسي ميلاپ کان پوءِ گهڻو ڪري هڪ هفتي اندر جنسي جي ڪنهن حصي تي ننڍڙا، ننڍڙا

هي مرض پاڪستان ۾ تمام تيزيءَ سان وڌي رهيو آهي اڄ کان ڪجهه سال اڳ تائين ڪڏهن، ڪڏهن جنسي هريپيز ڏسڻ ۾ ايندو هيو پر چند سالن جي اندر اڄ ڪلهه هريپيز جي تعداد ۾ ڪافي واڌ آئي آهي. جنسي هريپيز جي ڪارڻ هڪ خاص وائرس (اڏام جيوڙو) آهي جنهن کي Herpes Humanis چيو وڃي ٿو.


هن وائرس جا ٻه قسم آهن جنهن کي Type I ۽ II Type جا نالا ڏنا ويا آهن.

هريپيز وائرس - I گهڻو ڪري ڇپ ۽ وات ۾ ڦوڪڻن جي صورت ۾ ظاهر ٿيندو

آهي ۽ اهي ڦوڪڻا جلدي ڦسي پوندا آهن ۽ ننڍڙا ننڍڙا

زخمي ٿي پوندا آهن جيڪي هفتي جي اندر صحيح ٿي ويندا آهن. ڇپ جي هريپيز تمام عام آهي ۽ اڪثر ڪافي ماڻهن کي خاص طور تي بخار وقت نڪرندي آهي، تنهنڪري هن کي اڪثر بخار جا داڻا به چيو ويندو آهي.

جنسي هريپيز گهڻو ڪري هريپيز وائرس - II جي ڪري ٿيندي آهي پر ڪڏهن ڪڏهن هريپيز وائرس -



ڦوڪڻا نڪرندا آهن ۽ ان جڳهه جي چمڙي به ڳاڙهي ٿي پوندي آهي، جلد ئي اهي ڦوڪڻا ڦسي پوندا آهن.

تشخيص:

هي مرض گهڻو ڪري مرض جي علامتن سان ئي تشخيص ڪيو ويندو آهي. ليبارٽريءَ ۾ وائرس جو ڪلچر تمام

جنسي حسا Genital Warts

۾ ڪوبه توجه نه ڏيندو آهي ۽ آهي
داڻا آهستي آهستي سائيز ۽ تعداد ۾
وڌندا ويندا آهن.

تشخيص:

گهڻو ڪري ڊاڪٽر معائني کانپوءِ هي
مرض تشخيص ڪري وٺندو آهي.
پر ڪن مريضن ۾ (Skin Bisop-
sy) جي ضرورت پئجي سگهي ٿي.

علاج: جنسي حسن جو علاج
باآساني هڪ خاص دوا لڳائڻ سان
ٿي سگهي ٿو جنهن کي ڪيميڪل
ڪارٽري چيو وڃي ٿو، جيڪا دوا
ڊاڪٽر خود مريض کي لڳائيندو
آهي.

انهي کان علاوه مشين جي ذريعي هنن
کي ساڙي سگهجي ٿو جنهن کي
اليڪٽرڪ ڪارٽري چيو ويندو آهي،
ڪن حالتن ۾ جيڪڏهن حسا تمام
وڏي سائيز جا هجن ته پوءِ آهي
آپريشن جي ذريعي ڪٽيا ويندا آهن.

حسا جيڪڏهن ڪنهن به بالغ عورت يا
مرد ۾ جنسي عضون تي يا انهن جي
پيرسان هجن ته آهي هميشه جنسي
تعلقات ذريعي ڦهلبا آهن، هونئن ته
حسا جسم جي ڪنهن به حصي تي ٿي
سگهن ٿا. جهڙوڪ چهرو، ڪنڌ،
هٿ، پير وغيره ۽ انهن جڳهن تي
حسن ڦهلجڻ جا سبب جنسي تعلقات
کان علاوه به ٿي سگهن ٿا.

جنسي حسن جو ڪارڻ هڪ اڏام
جيوڙو آهي جنهن کي (Human Po-
pilloma Virus) چيو وڃي ٿو.

علامتون: هن مرض ۾ سخت چمڙي
جي رنگ جهڙا مختلف سائيزن جا داڻا
جنسي عضون يا انهي جي آسپاس
نڪرندا آهن. انهن داڻن ۾ مريض کي
گهڻو ڪري ڪا تڪليف نه ٿيندي آهي،
پر عورتن ۾ ڪڏهن ڪڏهن خارش
جي شڪايت ٿي سگهي ٿي. تڪليف نه
هجڻ ڪري مريض گهڻو ڪري شروع

ڄاڻل ٻار جي سڄي جسم تي حملو
ڪري ٿو جنهن ۾ اندروني عضوو
جهڙوڪ دماغ وغيره به اثرانداز ٿي
سگهي ٿو ۽ اڪثر انهي مرض سان
ٻار جو موت ٿي وڃي ٿو ۽ علاج
جي باوجود بچڻ جي اميد تمام
گهٽ رهي ٿي.

**عورت جي جنسي عضوي جي
ڪينسر:**

Cancer of Cervix

جيڪڏهن جنسي هريز گهڻي عرصي
لاءِ موجود هجي ته ڪڏهن ڪڏهن
اها ڪينسر جي شڪل اختيار ڪري
سگهي ٿي، C.A. Cervix يا
سروڪس جي ڪينسر عورتن ۾
تمام عام آهي ۽ انهي جا ڪيترائي
سبب ٿي سگهن ٿا جن مان جنسي
هريز هڪ اهم سبب آهي.

نفسياتي پيچيدگيون:

جيئن ته اسين مٿي ذڪر ڪري آيا
آهيون ته جنسي هريز بار بار اٿلي
پوندي آهي ۽ ڪڏهن ڪڏهن
ته تمام جلدي يعني هر هفتي
هن مرض جو حملو ٿي سگهي
ٿو، تنهنڪري مريض تمام
پريشان ٿي ويندو آهي ۽
نفسياتي مرض جون علامتون
شروع ٿي سگهن ٿيون
جهڙوڪ بي آرامي، ڪم ۾ دل
نه لڳڻ، چڙچڙاڻ ۽ ايتريقدر
جو ڪجهه مريضن ۾
خودڪشي جو رجحان به پيدا
ٿي سگهي ٿو.

**هن مرض ۾ سخت چمڙيءَ جي رنگ جهڙا
مختلف سائيزن جا داڻا جنسي عضون يا انهي
جي آسپاس نڪرندا آهن. انهن داڻن ۾ مريض
کي گهڻو ڪري ڪا تڪليف نه ٿيندي آهي، پر
عورتن ۾ ڪڏهن ڪڏهن خارش جي شڪايت ٿي
سگهي ٿي**

خانداني منصوبہ بندي جا گپ روڪ طريقا

نور محمد ميمڻ

سينيئر انسٽرڪٽر پاپوليشن ويلفيئر
ٽريننگ انسٽيٽيوٽ ڪراچي

INTRA UTERINE DEVICE

آءِ يو ڊي يا چلي جو تعارف

آءِ يو ڊي چلو يا عورت جي جسم اندر ڪيئن ڪم ڪري ٿو:

چلو عورت جي پچيداني ۾ رکڻ بعد پنهنجو ڪم شروع ڪري ٿو ۽ رحم اندر اهڙو ماحول پيدا ڪري ٿو جو مڙد جو تخمي جيو ڇرپر جي قابل نٿو رهي يا ان جي ڇرپر متاثر ٿئي ٿي ۽ هو اني ڪي ٻوڪي نه سگهندو جيئن ته تخمي جيو عورت جي بيضي جي نالي ۽ رحم اندر بي حرڪت ٿي وڃي ٿو تنهن ڪري ان ۾ اها طاقت يا زور باقي نٿو رهي جو هو عورت جي بيضي اندر داخل ٿي انڪي ٻوڪي سگهي، ان کان سواءِ چلو رکڻ بعد رحم جو اندروني ماحول ڪجهه اهڙو ٿيو وڃي جو رحم اندر سنهين نسن جي وچايل چار جيڪا رحم جي هڪ ديوار سان لڳل هوندي آهي انڪي ايترو ته سنهو ڪيو ڇڏي جو بيضو ٻوڪڻ کان اڳ يا ٻوڪڻ بعد ان چار ۾ جهتي نٿو سگهي جو دراصل اها ئي سنهي چار آهي، جيڪا

ڪيترن ملڪن ۾ زير استعمال آهي ۽ اندازاً 85 Million عورتن جي استعمال ۾ آهي، هن جو استعمال چين ۾ تمام گهڻو آهي. اندازاً 8 نمونن جا چلا چين ۾ استعمال ٿين ٿا.


چلي جو هڪ نئون نمونو ڪاپرٽي آهي جنهن تي جست چڙهيل آهي، جيڪو پروجيسٽرون (Progestron) خارج ڪري ٿو ۽ هر هنڌ مهيا آهي ۽ ڏاڍو ڪامياب آهي هن جو نمبر (Copper T380 A) آهي. ان لاءِ WHO يا ورلڊ هيلٿ آرگنائيزيشن ۽ ٻين عالمي ادارن متفق طور تي هن جو استعمال منظور ڪيو آهي ۽ موجوده دور جي وڌندڙ گهرجن مطابق هڪ حل طور تجويز ڪيو آهي. خاص طور تي ٽچ

پياريندڙ عورتن لاءِ هيءَ انتهائي بهترين طريقو آهي، جو ٻار جو کير ساڳيو رهيو ان جي مقدار ۾ ڪابه ڪمي واقع نٿي ٿئي. ان ماءُ کي ڪاپرٽي لڳرائڻ گهرجي جنهن جي ٻار نه هئڻ جو يقين هجي ان ڪري چلي چڙهائڻ جو بهترين وقت ٻن ماهوارين جي وچ وارو عرصو آهي.


Intra Uterine Device

هيءَ چلو هن وقت ٻن خاص نمونن ۾ موجود آهي هڪ کي لپيز لوپ (پلاسٽڪ جو چلو) چئجي ٿو، جنهن جا هن وقت دنيا ۾ 8 نمونا (Varieties) آهن، ۽ هڪ ٻيو ماڊل ڪاپرٽيءَ جو آهي جن جا نمونا ۽ شڪليون هيٺ ڏجن ٿيون ته جيئن اسان جون پڙهيل عورتون ان جي شڪل ڏسي ۽ ان متعلق پڙهي ڄم روڪ طريقن مان پنهنجي لاءِ ڪو طريقو پسند ڪن ۽ پاڪستان جي خانداني منصوبہ بنديءَ جي پروگرام مان لاپ حاصل ڪن.

گپ روڪ طريقن مان هڪ طريقو چلي يا آءِ يو ڊي جو آهي جيڪو بيحد ڪامياب طريقو آهي هن جي رکڻ مان اها مراد آهي ته ڪا اهڙي پائيدار شيءِ عورت جي پچيدانيءَ ۾ رکجي جيڪا بيضي يعني Ova ۽ مڙد جي تخمي جيو يعني Sperm جي ميلاپ کي روڪڻ ۾ ڪاميابيءَ سان ڪم ڪري ۽ جڏهن ٻار پيدا ڪرڻ جي خواهش ٿئي ته اهو چلو ڪڍي وري ڄم جو طريقو بحال ڪري سگهجي. هي ڪلينڪل طريقو آهي جو سواءِ ڪلينڪ جي چلي جو لڳرائڻ ممڪن ڪونه آهي تنهن ڪري هن کي ڪلينڪل طريقو چئجي ٿو. هي هن وقت دنيا جي



آءِ يو ڊي



ڪاپرٽي

ہوکیل بیضي کي جھلي وڌيڪ نشونما ڏيئي نطنفي جي وجود ٺاهڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪري ٿي جتان 9 مهينن ۾ ڪيترن مرحلن مان گذري ٻار ٺهي جڙي راس ٿي پيدا ٿي دنيا ۾ اچي ٿو.

ڪن آءِ يو ڊي يا چلن جي جوڙجڪ اهڙي آهي، جيڪي هارمون کي خارج ڪندا آهن، جنهن ڪري ٻچي دائي ۽ جو منهن جو جيڪو اصل رستو آهي، تخرم ٿيو جو اهڙي طرح ٿلهو ٿيو پوي جو تخرم ٿيو جو اندر داخل ٿيڻ ناممڪن بڻايو ڇڏي، ٻين الفاظن ۾ ٻچي دائي ۽ جي منهن اندر موجود پاڻي کي ايترو ته گهاتو ڪيو ڇڏي جو ڄڻ ته ٻچيدائيءَ جو منهن بند ٿيو وڃي جيئن عموماً عورت کي ٻار ٿيڻ بعد ٻچيدائيءَ جو منهن بند ٿي وڃي ٿو عام طور تي چلي رکڻ بعد عورت 1 سال کان 5 سالن تائين ٻار ڄڻ کان محفوظ ٿيو پوي ۽ جن چلن تي جست چڙهيل آهي 4 سالن کان 8 سالن تائين ڪارآمد آهن انهن چلن کي ڪاپر ٽي چٽو آهي.

آءِ يو ڊي چلي جي ناکاميءَ جو تناسب:

آءِ يو ڊي هڪ پلاسٽڪ مان ٺهيل چلو آهي ان جون مختلف سائزون ۽ نمبر آهن، جيڪي مختلف عورتن جي مختلف ازدواجي حيثيت معلوم ڪرڻ بعد رکيون آهن، يعني جن عورت کي هڪ يا 2 ٻار آهن ته ان جي رحم جي ويڪرائ ٿوري هوندي ان کي ننڍي سائز جو چلو رکيو ويندو پر ڪن عورتن کي وڌيڪ ٻار ٿيا هجن ته ان لاءِ چلي جي سائز به ڪجهه وڌيڪ مناسب رهندي ڇو جو غير مناسب سائز جي ڪري به ڪڏهن ڪڏهن چلو ٻاهر نڪري ايندو آهي. بهترين آءِ يو ڊي

ڪاپر تي آهي، ان جي ناکاميءَ جو تناسب صرف هڪ سيڪڙو آهي، يعني هيءَ ڄم روڪ طريقو 99% ڪامياب آهي ان کان سواءِ هارمون خارج ڪندڙ آءِ يو ڊي به ٻي حد ڪامياب آهن، ان جو تناسب به پهرين سال ۾ هڪ سيڪڙي جي لڳ ڀڳ آهي.

Expulsions

ڪڏهن ڪڏهن چلو خود بخود ٻاهر نڪري اچي ٿو اهڙي ناکاميءَ جو تناسب وڌ ۾ وڌ 2 کان 3 سيڪڙو آهي، جنهن جو به گهڻو ڪري سبب غير تربيت يافتہ ڊاڪٽريائي هئڻ ڪري ٿي ٿو ان لاءِ ته سائز يا نمبر جي چونڊ يا رکڻ جي مهارت ۾ غلطي ٿي ويندي آهي ان کانسواءِ اهو امڪان به صرف چلي رکڻ بعد هڪ ٻن ڏينهن اندر ٿي سگهي ٿو ته عموماً چلي هڪ دفعو پنهنجي جاءِ والاري ته پوءِ ان جي خود بخود خارج ٿيڻ جو امڪان بلڪل ڪونهي.

آءِ يو ڊي يا چلي لڳاءُ مان فائدا:

هن ڄم روڪ يا ڳپ روڪ طريقي مان اڪيچار فائدا آهن جن مان مکيه فائدا هيٺ ڏجن ٿا جن مان پڙهيل خواتين لاپ مائي سگهن ٿيون ۽ ڳپ روڪ طريقي ۾ خود طريقو پسند ڪري پوري اعتماد سان ان مان پنهنجو مقصد حاصل ڪري سگهن ٿيون.

1- ته هيءَ طريقو يعني آءِ يو ڊي بي حد مؤثر طريقو آهي ۽ وڏي مدي لاءِ ڪار آمد آهي يعني هڪ دفعو چلو لڳاءُ سان اٽڪل 5 سال ٻار پيدا ٿيڻ جي خطري مان مائرون آجيون رهن ٿيون.

2- تمام آسان طريقو آهي ۽ هن لاءِ نه

ته ڪو وقت گهڻو درڪار آهي ۽ نه ڪو پسڻو خرچ ٿئي ٿو ويتر خانداني منصوبہ بنديءَ جو عملو وقت به وقت گهر اچي دوائون ڏيئي ڪوبه اهڃاڻ آهي ته معلوم ڪري تسلي ڏئي ٿو ۽ فالو اپ لاءِ دوائون ڏئي ٿو.

3- ته ٻار ٻار دوائن حاصل ڪرڻ ۽ پئسا خرچ ڪرڻ جي جهنگهت مان هميشه لاءِ نجات ملي ٿي ۽ 5 سالن تائين انسان بلڪل بي اونو ٿيو وڃي.

4- وري ٻار پيدا ڪرڻ جي خواهش پيدا ٿئي ته چلو ڪنهن به ويجهي ڪلينڪ تان ڪيرائي سگهجي ٿو ۽ ٻار اڳي وانگر وري ٿيڻ شروع ٿيندو.

5- هن ڄم روڪ طريقي جو جوڙي جي ميلاپ واري سسٽم سان ڪوبه تعلق ڪونهي معنيٰ ڪابه روڪ ٿام نه رهندي جوڙو جيترا پيرا چاهي ملي سگهي ٿو ٻئي طرف ڪجهه ڄم روڪ طريقا اهڙا پڻ آهن، جيڪي جيترا پيرا ميلاپ جي خواهش ڪبي اوترا پيرا استعمال ڪبو مثلاً رٻڙ ڪنڊور يا ڊيورافورم.

6- هيءَ طريقو 98% کان وڌيڪ مؤثر ۽ ڪامياب ثابت ٿيو آهي.

7- انهن عورت لاءِ هيءَ ڳپ روڪ طريقو بلڪل آسان آهي، جن کي ٻين طريقن ۾ ويساءِ ڪونهي يا باريار دوائون حاصل ڪرڻ جي جهنگهت مان جان چڏائڻ چاهين ٿيون. اگر ڪڏهن تڪليف ٿئي يا وڌيڪ ٻار جي خواهش هجي ته آساني سان ڪيرائي سگهجي ٿو. ڇو جو رکڻ جي ڀيٽ ۾ هن جو ڪيڏن آسان آهي.

8- چلو ماهواريءَ يا ٻار ٿيڻ کان بلڪل فورا بعد رڪارڊائي سگهجي ٿو ۽ باريار ٻار ضائع ٿيڻ جو خطرو ۽ ٻار ٿيڻ جي خطري مان آجو رهي سگهجي ٿو.

آءِ يو جي چلي جي استعمال مان نقصان:

جيئن ته ٻار پيدا ٿيڻ هڪ فطري نظام آهي، ان قدرتي سسٽم ۾ جيڪڏهن اسان ڪا هٿ چراند ڪيون ته اها ڪوشش ايڏي مڪمل ته نه هوندي جهڙي طرح نظام فطرت ڪم ڪري ٿو. تنهن ڪري انساني حڪمت عملي جا جيترا فائدا آهن، ان تناسب سان ڪجهه نقصان ۽ انديشا به آهن ان کان سواءِ جڏهن اسان پنهنجي مرضيءَ مطابق اولاد پيدا ڪرڻ چاهيون ٿا ۽ اولاد جي ذميدارين ۾ ڪمي آڻي خوش حال رهڻ گهرون ٿا ته پوءِ ڪجهه قربانيون به ڏيڻيون پونديون ۽ ڪجهه تڪليفون پڻ سهڻيون پوندون. ان اصول تحت چلي رکائڻ مان جيڪي امڪاني نقصان آهن، اهي هيٺ ڏجن ٿا:

1- چلو رکائڻ، ان جو ڪيڊرائڻ ۽ ان جو ميڊيڪل فالو اپ هڪ انتهائي ذميداريءَ جو آهي، ان لاءِ تربيت يافتہ عملي جو هر وقت موجود هئڻ ۽ ان وٽ ضروري اوزار ۽ مشينون هئڻ به هڪ وڏو مسئلو آهي، جيڪڏهن انهن مان هڪ ڳالهه به گهٽ هوندي ته مسئلا وڌندا ۽ تڪليف جو انديشو رهي ٿو.

2- ڪڏهن ڪڏهن ڪجهه عورتن کي چلي رکڻ وقت ڏاڍو سور ٿئي ٿو جنهن جو سبب عورت جي انتهائي نازڪ جسر جي نازڪ حصي ۾ هڪ ڌاريون يعني پلاسٽڪ جو چلو رکجي ٿو ۽ ٻچيدائي ان سخت مادي مان ٺهيل چلي کي آسانيءَ سان برداشت نه ڪندي آهي.

3- ڪڏهن ته بي قاعده ماهواري شروع ٿيو پوي ۽ وري ڪڏهن ڪڏهن تمام گهڻو رت اچڻ شروع ٿيو پوي ۽ ڪمزوري پيدا ڪري ٿي.

4- ڪجهه عورتن کي نهائي ۾ تمام گهڻو سور ٿئي ٿو، اهي سڀ علامتون مختصر عرصي لاءِ آهن سو جيڪڏهن اهي تڪليفون جيڪي تمام ٿورين عورتن کي ٿين ٿيون جيڪڏهن برداشت ڪجن ته قدرتي نظام خود بخود انهن جو ازالو ڪري ٿو ۽ تڪليفون ڏور ٿيو وڃن، پر جيڪڏهن برداشت ڪجن ته پوءِ 5 سالن تائين ٻار پيدا ٿيڻ جي جهنگهٽ مان جان چٽي پوي ٿي.

5- جيڪڏهن چلو ڊگهي عرصي لاءِ يعني 5 سالن کان وڌيڪ عرصي لاءِ رکجي ته عورت جي (Fallopian Tube) سنهي ٿيڻ جو ڪجهه امڪان رهي ٿو.

اهڙيون زالون جن ڪي شڪ هجي ته سندس مڙس يا ساٿي جا ڪن ٻين عورتن وغيره سان جنسي تعلقات آهن يا هئڻ جو شڪ هجي ته اهڙيءَ عورتن کي به آءِ يو ڊي چلو نه رکائڻ گهرجي جو هنن ۾ ڪنهن ڏکي بيماري ٿيڻ جو امڪان ٿي سگهي ٿو، جن عورتن کي ٻچيدائيءَ ۾ ڪنهن به قسم جي خرابي هجي ته اهڙيون عورتون به چلو نه رکائڻ

6- جيڪڏهن غير تربيت يافتہ عورت کان چلو رکرائبو ته چلي جو ٻچيدائيءَ مان سوراخ ڪري (Abdominal Cavity) ۾ داخل ٿيڻ جو امڪان به ٿي سگهي ٿو اهڙي صورت ۾ آپريشن ذريعي چلو ٻاهر ڪڍرائي ڇڏجي ۽ جيتوڻيڪ چلو استعمال ڪندڙ عورتن کي ٻار ٿيڻ جو امڪان گهٽ ٿيڻ ڪري ٿي کان ست سيڪڙي عورتن کي نلي واري حمل يعني Ectopic Pregnancy جو خطرو ٿي

وڃي ٿو. اهڙي پوزيشن کان ٻچڻ لاءِ چلي لڳرائيدڙ عورتن کي فيملي پلاننگ سينٽر تي وقت به وقت معائني لاءِ وڃڻ گهرجي.

آءِ. يو. جي/چلي واري ڄم روڪ طريقي جا سلامتي جا نڪتا ۽ تباهي اشارا:

هڪ عام روايتي اشارو انهن عورتن لاءِ بي حد خطرناڪ آهي جن کي نرن ۾ يا نهائيءَ ۾ نئين يا پراڻي سوچ سور يا Infection هجي يا جن عورتن کي خدشو هجي ته انهن کي نرن ۾ يا نهائي ۾ جلن محسوس ٿئي ٿي معنيٰ (Pelvic Inflammatory Disease (PID)

بيماري جو ڪوبه اهڃاڻ آهي يا جنسي وچڙندڙ بيماري جهڙوڪ Aids يا Chlamydia هجي يا خدشو محسوس ڪن ته انهن لاءِ آءِ يو ڊي مناسب طريقو نه آهي. ان کانسواءِ اهڙيون زالون جن کي شڪ هجي ته سندس مڙس يا ساٿي جا ڪن ٻين عورتن وغيره سان جنسي تعلقات آهن يا هئڻ جو شڪ هجي ته اهڙي عورتن کي به آءِ يو ڊي چلو نه رکائڻ گهرجي جو هنن ۾ ڪنهن ڏکي بيماري ٿيڻ جو امڪان ٿي سگهي ٿو.

جن عورتن کي ٻچيدائيءَ ۾ ڪنهن به قسم جي خرابي هجي ته اهڙيون عورتون به چلو نه رکائڻ ۽ ٻيو ڪو طريقو استعمال ڪن.

چلو رکرائڻ انهن عورتن لاءِ به سودمند نه آهي جن کي Ectopic Pregnancy جهڙي حمل جو شديد خطرو آهي، جن عورتن کي ڪمزوري يا خون جي ڪمي هجي غير متوقع خون اچڻ (يوئيءَ مان) ٻچيدائي يا ان جي منهن ۾ ڪينسر هجي ان کي عام چلو نه

رڪائڻ گهرجي بلڪه هارمون خارج ڪندڙ ڇلو تجويز ڪري سگهجي ٿو. ڇلو رڪائڻ انهن عورتن لاءِ به ڪنهن حد تائين جو ڪاٽڻو آهي جن کي ٻچيدائيءَ ۾ سوراخ يا ڪو اهڙو زخم وغيره هجي يا نهائي تي ورم يا سوڄ هجي ڇو جو ڇلو رکڻ وارو آلو يا اوزار انهن لاءِ وڌيڪ خطري جو باعث ٿي سگهي ٿو جن عورتن کي سائي يا ڀرڻان هجي، ڳڙيون پونديون هجن، بلڊ پريشر هجي انهن لاءِ ڇلو تجويز ڪرڻ به مناسب ڪونهي.

هيٺين حالتن ۾ عورتن کي ڊاڪٽر کان معائنو ڪرائڻ گهرجي جن کي لڻ سان ماهواري ايندي هجي جو پيٽ ٿيڻ جو امڪان رهي ٿو شديد بخار، نهائيءَ ۾ سور يوني مان پاڻي ايندو هجي وغيره

آءِ يو ڊي/چلي جي استعمال ۾ غير ضروري رڪاوٽون:

هن ڳڻ روڪ يا ڄم روڪ طريقي ۾ پڻ ڪجهه ضروري يا غير ضروري رڪاوٽون آهن جيڪي مختلف ملڪن ۾ مختلف وجوہات ڪري رکيون وڃن آهن، انهن رڪاوٽن لاءِ جواز به انهن ملڪن جي اندروني پاليسيءَ جهڙوڪ صحت يا خانداني منصوبه بندي جي اصولن مطابق طم ٿيل آهي، جيڪي آهي ملڪ پنهنجي قومي مفاد وٽان مناسب سمجهن ٿا، انهن رڪاوٽن جو تفصيل هيٺ ڏجي ٿو.

1- ڪن ملڪن ۾ آءِ يو ڊي يا ڪاپر تي جو استعمال ڄم روڪ لاءِ نه پر ڪن ٻين مقصدن لاءِ منظور ڪيو ويو آهي، جهڙوڪ ٻچيدائيءَ جي علاج متعلق يا ڪنهن ان سان تعلق يا واسطو رکندڙ بيماريءَ بابت.

2- ڪن ملڪن ۾ ڇلو صرف شادي شده عورتن کي لڳايو وڃي ٿو آهي انهن عورتن کي جن 1 کان وڌيڪ ٻار ڄميا هجن ته ڪن ملڪن ۾ اهڙين عورتن کي ڇلو لڳائڻ وقت مڙس جي رضامندي ۾ حاصل ڪئي وڃي ٿي.

3- جن ملڪن ۾ جنسي ميلاپ تي ڪا پابندي يا رڪاوٽ ڪانهي انهن ملڪن ۾ نا بالغ ڇوڪرين کي ڇلو رکائڻ لاءِ مائٽن کان رضامندي حاصل ڪرڻ ضروري آهي.

ڪجهه ملڪن ۾ ڊاڪٽرن کي چلي رکڻ ۽ ان کي ڪيڏن تي پابندي آهي. بهرحال اهڙي ڪا به رڪاوٽ پاڪستان ۾ ڪانهي ۽ ائين چوڻ غلط نه ٿيندو ته اها خدمت پاڪستان ۾ وڌ ۾ وڌ ميسر آهي ۽ اهو طريقو انتهائي ڪامياب ۽ قابل عمل تصور ڪيو وڃي ٿو.

آءِ يو ڊي/چلي جي استعمال لاءِ مشورو:

آءِ يو ڊي يا چلي استعمال ڪندڙ عورتن يا خائمنند عورتن کي هيٺين ڳالهين جي ڇنڊ ڇاڻ ڪرڻ بعد ئي ڇلو تجويز ڪرڻ گهرجي ٻيءَ صورت ۾ نقصان جو انديشو رهي سگهي ٿو.

1- جنهن عورت کي نهائي يا نرن ۾ جلن يا ساڙ محسوس ٿئي ان جاءِ تي ٿوري گهڻي سوڄ هجي ته ان لاءِ ڇلو نقصان جو باعث بڻجي سگهي ٿو.

2- جنهن عورت کي جنسي ميلاپ مان وڇڙندڙ بيماري هجي يا ان جو انديشو هجي ته اهڙي عورت کي ڇلو نه رکرائجي پر جيڪڏهن عورت کي ڇلو چڙهيل آهي ۽ هو پنهنجي مرد سان AIDS يا STDs جهڙين بيمارين جو خطرو محسوس ڪري ته مڙد کي ڪنڊور

استعمال ڪرڻ کان ڪيائڻ نه گهرجي. 3- جيڪڏهن ڪنهن عورت کي ٻچيدائي يا بيضي جي ناليءَ ۾ ڪا بيماري هجي ته اهڙي عورت کي ڇلو نه لڳائڻ گهرجي. 4- عورت ڇلو ڪنهن ماهر ڊاڪٽريائي کان لڳرائي جو ٿوري به بي احتياطي ٽڪڙ يا مهارت ۾ ڪمي Infection پيدا ڪري سگهي ٿي.


5- عورت کي ڇلو رکائڻ وقت هيٺيان اگر اثر (Side Effects) ٿي سگهن ٿا، ان لاءِ هن کي ذهني طور تيار ڪرڻ گهرجي مثلاً ماهواريءَ جو سڪڙڻ يا سڪڙجڻ يعني رت ايندڙ مقدار.

6- ماهواريءَ جو عرصو گهٽجي به سگهي ٿو پر اهو صرف وقتي اثر آهي ڪجهه ڏينهن بعد اها تڪليف خود بخود ختم ٿي ويندي وري ماهواري وڌيڪ به اچي سگهي ٿو ان لاءِ پڻ پريشان نه ٿيڻ گهرجي.

7- ڪڏهن ڪڏهن تمام ٿورين عورتن کي ڇلو نڪري به سگهي ٿو اهو امڪان صرف 6 سيڪڙو آهي، هر هڪ عورت چلي لاءِ موزون به نه هوندي آهي ان جي خبر هنجو بلڊ پريشر چيڪ ڪري ۽ پيشاب ٽيسٽ ڪري اهڙين ٻن چڪاسن بعد فيصلو ڪجي ٿو. جيڪو فيملي پلاننگ سينٽر تي معائني بعد ڪجي ٿو.

جيڪڏهن مٿين ڳالهين کي ذهن ۾ رکي ڇلو رکرائبو ۽ هن جو وقت به وقت فيملي پلاننگ سينٽر کان معائنو ڪرائجي ته پوءِ هي انتهائي بهترين پائيدار ۽ بي ضرر ڄم روڪ طريقو آهي، جيڪو ڪيترن ئي نمونن ۾ موجود آهي، ڳالهه صرف احتياط ۽ دلچسپيءَ جي آهي ۽ ٿوري تڪليف برداشت ڪرڻ سان ٻار پيدا ٿيڻ واري وڏي تڪليف کان آجو رهي سگهجي ٿو.


نزلہ، زکام اور کھانسی کی افیّت!



اگلا شکار آپ بھی ہو سکتے ہیں
احتیاط برتیے

بر وقت سعالین لیجیے

جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ سعالین
نزلہ، زکام، ہنگے کی خراش اور کھانسی کی مفید دوا



مَدَنی سائنس اور ثقافت کا عالمی منصوبہ۔
آپ ہمدرد دوست ہیں۔ اعتماد کے ساتھ معنوعات ہمدرد خریدتے ہیں۔ ہمارے مائع تین اقسامی
شیریں عام و صحت کی تعمیر میں مل رہے ہیں۔ اس کی تعمیر میں آپ بھی شریک ہیں۔

هپٽائٽس بي (B) بابت چند حقيقتون

- هپٽائٽس بي (B) هڪ موتمار بيماري آهي، جيڪا هپٽائٽس بي وائرس (HBV) سبب ٿيل هجي ٿي.
- سڄي دنيا ۾ اندازاً 2000 ملين انسان هن مرض ۾ وڃڻ لڳا آهن.
- هپٽائٽس بي (B) ائڊز جهڙي موذي مرض کان به هڪ سٺو دفعا وڌيڪ روڳ واري آهي.
- هپٽائٽس بي (B) سڄي دنيا ۾ هر سال هڪ کان ٻه ملين انسانن جي موت جي ذميوار آهي.
- هي بيماري رت (Blood)، مردائڻي نطفي (Semen)، ڳوڙهن (Tears) ۽ ٻين جسماني پاڻين وسيلي هڪ انسان مان ٻئي انسان ۾ منتقل ٿي ٿي.
- پاڪستان ۾ ڏهن ماڻهن مان هڪ ڄڻو هپٽائٽس بي (B) جو ڪيريئر آهي (ڪيريئر جو مطلب اهو انسان جيڪو ٻئي انسان کي بيماري منتقل ڪري).
- پاڪستان ۾ جگر جي ڪينسر وارن مريضن مان 62 سيڪڙو مريض، هپٽائٽس بي (B) ۾ مبتلا هجڻ سبب پوڳين ٿا.
- هپٽائٽس بي (B) ۾ مبتلا ٿيڻ کانپوءِ ان جو ڪوبه علاج نه آهي.
- هپٽائٽس بي (B) جي مرض کي صرف ۽ صرف ان جي روڪڻ وارين سين (Vaccination) سان ئي روڪي سگهجي ٿو.
- پنهنجي پاڻ کي ۽ پنهنجي ٻارن کي هپٽائٽس بي (B) جي هاجن کان بچايو، اڄ ئي ان جي روڪڻ واريون سيون (Vaccination) لڳايو.

پاڪستان ميڊيڪل ايسوسيئيشن پاران
ماڻهن ۾ صحت جي سجاڳي آڻڻ جو پيغام

سنڌ زرعي يونيورسٽي ٽنڊو ڄام ۾ ”السڪين ميموريل بلڊ بئنڪ“ جي افتتاحي تقريب جو احوال

ريپورٽ: نظير سومرو، زرعي يونيورسٽي ٽنڊو ڄام

ڪيو. هن کان اڳ آجيان جي تقرير ڪندي ڊاڪٽر سيد نصرالله شاهه جيلاني، وائس چانلر، استاد صاحبان، شاگردن ۽ شاگردن جي پريور شرڪت تي ٿورو ميجو. السڪين بلڊ بئنڪ جي باني انچارج ڊاڪٽر اعجاز حسين لغاري ”السڪين ميموريل بلڊ بئنڪ“ جا مقاصد بيان ڪندي چيو ته هن بلڊ بئنڪ

جو نالو مون پنهنجي والده مرحوم جي نالي سان رکيو آهي. جنهن جو موت وقت تي بلڊ نه ملڻ جي ڪري ٿيو هن وقت اسپتال ۾ ڪيترائي اهڙا مريض داخل آهن، جن کي وقت تي بلڊ نٿو ملي يا غربت سبب اهي خرچ برداشت نٿا ڪري سگهن ۽ وقت کان اڳ سندن موت واقع ٿيو وڃي. ان جذبي تحت هي بلڊ بئنڪ قائم ڪئي وئي آهي، ته جيئن ضرورت مند مسڪين مريضن کي بغير ڪنهن ڏوڪر جي وقت سر بلڊ مهيا ڪيو وڃي. ڊاڪٽر اعجاز حسين لغاري پنهنجي انهن سڀني ساٿين ۽ استادن جو پڻ شڪريو ادا ڪيو. جيڪي ساڻس هر وقت هن نيڪي جي ڪم ۾ برابر جا شريڪ رهيا آهن. هن وائس چانسلر ڊاڪٽر ارشاد علي سومرو، ڊاڪٽر اسلم

بگهيو، ڊاڪٽر احسان قادر ڪانڌڙو، ڊاڪٽر عبدالله جمالي، ڊاڪٽر نثار احمد وگهيو، ڊاڪٽر عابد سومرو، ڊاڪٽر اياز احمد سيال، ڊاڪٽر سيد نصرالله شاهه جيلاني جن جي جذبي کي ساراهيو. جن انسانيت جي عظيم خدمت خلق واري هن جذبي تحت سندس ساٿ ڏنو.

انهيءَ جذبي جي ساراه ڪندي چيو ته هيءَ انسان ذات جي خدمت ڪرڻ جو هڪ بهترين طريقو آهي. سومري صاحب هن بلڊ بئنڪ جي باني انچارج، فائينل



ڊي. وي. ايم جي شاگرد ڊاڪٽر اعجاز حسين لغاري ۽ سندس ٽيم کي مبارڪون ڏيندي چيو ته اوهان جي هيءَ ڪوشش تعريف جوڳو عمل آهي. ۽ نوجوانن کي اهڙن نيڪ ڪمن ۾ پريور حصو وٺڻ گهرجي. سومري صاحب ان موقعي تي بلڊ اسٽور ڪرڻ لاءِ ”السڪين ميموريل بلڊ بئنڪ“ کي هڪ فرج ڏيڻ جو اعلان

سنڌ زرعي يونيورسٽي ٽنڊو ڄام سنڌ جي سڀني يونيورسٽين کان خوبصورت ۽ سرسبز يونيورسٽي طور سڃاتي ويندي آهي. هن عظيم درسگاه ۾ ڪجهه ڏينهن اڳ انسانيت جي خدمت ۽ پلائي لاءِ ڪم ڪندڙ نوجوان شاگردن پاران ”السڪين ميموريل بلڊ بئنڪ“ جو قيام عمل ۾ آندو ويو. جنهن جو باقاعده افتتاح زرعي يونيورسٽي ٽنڊو ڄام جي وائس چانسلر محترم ڊاڪٽر ارشاد علي سومري ڪيو. سر افتتاح کان ڪجهه پل اڳ سمورن شاگردن کي هٿن ۾ گلاب جي گلن جا هار هڻا، ۽ اکين ۾ اوسيڙو هڻو ته هن عظيم مقصد لاءِ بلڊ بئنڪ جو افتتاح ڪندڙ تقريب جي خاص مهمان جناب ڊاڪٽر ارشاد علي سومري جو انتظار ڪيو پئي ويو. سندس پهچڻ تي کيس هار پارايا ويا. سمورن شاگردن ۽ شاگردن پائين سندن گرم جوشيءَ سان استقبال ڪيو. ”السڪين ميموريل بلڊ بئنڪ“ جي باني انچارج ڊاڪٽر اعجاز حسين لغاري آجيان لاءِ قطار ۾ بيٺل ۽ هن نيڪ ڪم ۾ هٿ وٺائيندڙ دوستن جو فردن، فردن ڊاڪٽر ارشاد علي سومرو صاحب سان تعارف ڪرايو. هن موقعي تي مفت ۾ بلڊ



گروپنگ به ڪئي وئي. هن بلڊ بئنڪ جي افتتاحي تقريب جي موقعي تي، يونيورسٽي جي وائس چانسلر ڊاڪٽر ارشاد علي سومري ”السڪين ميموريل بلڊ بئنڪ“ جي قائم ٿيڻ تي خوشي جو اظهار ڪندي، سنڌ زرعي يونيورسٽي ٽنڊو ڄام جي نوجوانن جي

گئلپ ٽيندر گھرائڻ بابت نوٽيس

بلڊنگس ڊپارٽمينٽ جا مڃيل ليڪيدار جيڪي هلندڙ مالي سال لاءِ تجديدِي / لسٽ ۾ شامل هجن، کان هيٺ ڏنل ڪمن لاءِ بي - 1 فارمن تي مهيند گئلپ ٽيندر گھرائڻ ٿا.

جريان نمبر	ڪم جو نالو	ڪٽيل رقم	سوٽي رقم	ٽيندر في	تڪميل جي مدت
------------	------------	----------	----------	----------	--------------

شامل لسٽ مطابق

ٽيندر اهڙن لائق ليڪيدارن کي جاري ڪيا ويندا جيڪي پنهنجن درخواستن سان گڏ نيشنل بئنڪ وٽان ڪال ڊپازٽ جي صورت ۾ ضروري سوٽي رقم 7/3/95 تائين يا ضروري في جي ادائگي سان جمع ڪرائيندا.

ٽيندر 9/3/95 تي منجهند جو 12 وڳي (مقرر) تائين ورتا ويندا ۽ ساڳي ڏينهن تي منجهند جو 1-30 وڳي اهڙن ليڪيدارن يا انهن جي عيوضين جي موجودگي ۾ ڪوليا ويندا جيڪي هيٺ صحيح ڪندڙ جي آفيس ۾ حاضر ٿيڻ لاءِ ايندا.

شرطن وارو ڪوبه ٽيندر نه مڃيو ويندو.

هيٺ صحيح ڪندڙ يا مجاز اٿارٽي بنا ڪنهن سبب ٻڌڻ جي ڪنهن به هڪ يا مڙني ٽيندرن کي مڃڻ / رد ڪرڻ جو حق محفوظ رکي ٿو.

جريان نمبر	ڪم جو نالو	ڪٽيل رقم	سوٽي رقم	ٽيندر في	تڪميل جي مدت
1	پوليس لائين ضلعي ملير ڪراچي لاءِ نان ريڊيڊ نيشنل اڪوموڊيشن جي تعمير.	2500000/=	50000/=	1000/=	12 مهينا
	1- ايس. ايس. بي آفيس				
	2- ميگزين	380000/=	7600/=	200/=	6 مهينا
	3- ڪمپائونڊ وال	55000/=	1100/=	200/=	3 مهينا
	4- ڊي. ايس. بي / آر. آءِ آفيس	550000/=	11000/=	700/=	6 مهينا
	5- گارڊ روم	650000/=	13000/=	700/=	6 مهينا
	6- اسٽور ۽ گودام	240000/=	4800/=	200/=	3 مهينا
	7- موٽر گئريج	315000/=	6300/=	200/=	3 مهينا

ايگزيڪيوٽو انجنيئر
پراونشل بلڊنگس ڊويزن - II
پوليس ورڪس ڪراچي

انفرميشن / ڪراچي - 830

ويج ڊسڪائونٽ ڪوپن

جنوري 1995 کان وٺي ماهوار ويج پنهنجي پڙهندڙن لاءِ خاص تحفو ”ويج ڊسڪائونٽ ڪوپن“ متعارف ڪرائي رهيو آهي۔ پڙهندڙ هن صفحي تي ڇاپيل خاص دڪاندارن جا ڪوپن ڪينچي سان ڪوپن بر لکيل تاريخ واري معيار اندر انهن وٽان مقرر ڪيل رعايت حاصل ڪري سگهن ٿا.

لاڙڪاڻي جي مرڪزي علائقي ۾ هر قسم جي بيڪري ۽ جنرل اسٽور وارين شين جو مرڪز **ثناء بيڪرز (ايئرڪنڊيشنڊ)** پاڪستان چؤڪ لاڙڪاڻو

ويج جي هن ڊسڪائونٽ ڪوپن پيش ڪرڻ تي 31 مارچ 1995 تائين هر گرامڪ کي پنج سيڪڙو (5%) رعايت ڏني ويندي.
نوٽ: فوٽو اسٽيٽ ڪاپي ناقابل قبول هوندي.
هڪ ڪوپن هڪ ئي دفعي لاءِ ڪارآمد هوندو

هر قسم جي سلوار قميص، پينٽ شرٽ ۽ ويسڪيٽ جي سلائي جو اعليٰ مرڪز **ريٽلائنس ٽيلرز**

شاپ نمبر 11-16 پرڳڙي پلازا سامهون جنرل پوسٽ آفيس لاڙڪاڻو پروپرايٽر: احمد علي حيدري
ويج جي هن ڊسڪائونٽ ڪوپن پيش ڪرڻ تي 31 مارچ 1995 تائين هر گرامڪ کي هر قسم جي سلائي تي پنج سيڪڙو (5%) رعايت ڏني ويندي.
نوٽ: فوٽو اسٽيٽ ڪاپي ناقابل قبول هوندي.
هڪ ڪوپن هڪ ئي دفعي لاءِ ڪارآمد هوندو

خون، پيشاب، بلغم، پائخاني وغيره جي هر قسم جي معياري ٽيسٽ جو مرڪز

نيشنل پيٿالاجيڪل لئبارٽري

نزد الحبيب هوٽل بئريج روڊ سکر

ويج جي هن ڊسڪائونٽ ڪوپن پيش ڪرڻ تي 31 مارچ 1995 تائين هر قسم جي ٽيسٽ ڪرائڻ تي ڏهه سيڪڙو (10%) رعايت حاصل ڪريو.
نوٽ: فوٽو اسٽيٽ ڪاپي ناقابل قبول هوندي.
هڪ ڪوپن هڪ ئي دفعي لاءِ ڪارآمد هوندو

هر قسم جي ڌنڌي وارا دوست توجهه ڏين

هر قسم جي دڪاندار، هوٽل، ميڊيڪل اسٽور، پيٿالاجي لئبارٽري ۽ ٻين ڌنڌي وارن لاءِ ويج ڊسڪائونٽ ڪوپن اسڪر ۾ مفت شموليت
اوهان هن اسڪر مان فائدو حاصل ڪري پنهنجو ڪاروبار وڌائي سگهو ٿا.

لکڙم لاءِ

مئنيجنگ ايڊيٽر ماهوار ويج، جي. پي. او باڪس نمبر 568 ڪراچي.

سنو لباس، سٺي سلائي باصلاحيت
شخصيت جي سڃاڻپ

فائيو اسٽار ٽيلرز

جينٽس اسپيشلسٽ

لڳ سادات مسجد ريشم گلي، لاڙڪاڻو فون 42672

ويچ جي هن ڊسڪائونٽ ڪوپن پيش ڪرڻ تي 31 مارچ 1995
تائين هر قسم جي سلائي تي ڏهه سيڪڙو (10%) رعایت حاصل ڪريو.
نوٽ: فوٽو اسٽيٽ ڪاپي ناقابل قبول هوندي.
هڪ ڪوپن هڪ ئي دفعي لاءِ ڪارآمد هوندو

هر قسم جي مذهبي، ادبي ۽ عام
ڪتابن جو مرڪز

مڪتب برهان

پبلشرز، بڪ سيلرز ايڪسپورٽرس

اردو بازار، ڪراچي

فون نمبر - 219221-2631670

ويچ جي هن ڊسڪائونٽ ڪوپن پيش ڪرڻ تي 31 مارچ 1995
تائين هر قسم جي ڪتابن جي خريداري تي پنجويهه سيڪڙو
(25%) رعایت حاصل ڪريو.
نوٽ: فوٽو اسٽيٽ ڪاپي ناقابل قبول هوندي.
هڪ ڪوپن هڪ ئي دفعي لاءِ ڪارآمد هوندو

10% Special Discount

FAROOQ KITAB GHAR

Shop No: 32, 33 Urdu Bazaar, Karachi

Deals in:

Medical, Engineering, Computer and Commerce Books

ويچ جي هن ڊسڪائونٽ ڪوپن پيش ڪرڻ تي 31 مارچ 1995
تائين هر قسم جي ڪتابن جي خريداري تي ڏهه سيڪڙو (10%)
رعایت حاصل ڪريو.

نوٽ: فوٽو اسٽيٽ ڪاپي ناقابل قبول هوندي.
هڪ ڪوپن هڪ ئي دفعي لاءِ ڪارآمد هوندو

هر قسم جي سنن کاتن سان گڏ ڄانه ۽ ٿڌي جو
بهترين انتظام

ذوالفقار ريسٽورنٽ

الله آباد محلو موهن جو دڙو روڊ، لاڙڪاڻو

ويچ جي هن ڊسڪائونٽ ڪوپن پيش ڪرڻ تي 31 مارچ 1995
تائين هر قسم جي کاڌي تي ڏهه سيڪڙو (10%) رعایت حاصل ڪريو.
نوٽ: فوٽو اسٽيٽ ڪاپي ناقابل قبول هوندي.
هڪ ڪوپن هڪ ئي دفعي لاءِ ڪارآمد هوندو

هر قسم جي سلوار قميص پينٽ ۽ شرٽ
جي سلائي جو مرڪز

راھيل ٽيلرز

پنگوريه ڳوٺ نزد مسجد قادريه، عزيز
آباد نمبر -3، ڪراچي

ويچ جي هن ڊسڪائونٽ ڪوپن پيش ڪرڻ تي 31 مارچ 1995
تائين هر قسم جي سلائي ڪراڻ تي ڏهه سيڪڙو (10%)
رعایت حاصل ڪريو.
نوٽ: فوٽو اسٽيٽ ڪاپي ناقابل قبول هوندي.
هڪ ڪوپن هڪ ئي دفعي لاءِ ڪارآمد هوندو

سياسي، سماجي رسالا، اخبارون ۽ هر قسم جي
اسٽيشنري جو مرڪز

راھيل بوڪ اسٽال

سامهون المنظر سنڌيما لاڙڪاڻو

ويچ جي هن ڊسڪائونٽ ڪوپن پيش ڪرڻ تي 31 مارچ 1995
تائين هر قسم جي ڪتابن تي ڏهه سيڪڙو (10%) رعایت حاصل ڪريو.
نوٽ: فوٽو اسٽيٽ ڪاپي ناقابل قبول هوندي.
هڪ ڪوپن هڪ ئي دفعي لاءِ ڪارآمد هوندو

گئلپ ٽيندر گھرائڻ بابت نوٽيس

بلڊنگس ڊپارٽمينٽ وٽان تسليم ٿيل ٺيڪيدارن جن ڪئلينڊر سال 1995 لاءِ تجديد فيس جمع ڪرائي آهي، کان شامل لسٽ ۾ ڪمن جي ڏنل تفصيل لاءِ بي - 1، بي - 11 فارمن تي مهربند گئلپ ٽيندر گھرائڻن ٿا. خالي ٽيندر فارم هيٺ صحيح ڪندڙ جي آفيس مان هر ٽيندر فارم روڪ پئسن (ناقابل واپسي) تي حاصل ڪري سگھجن ٿا. اهڙو ٽيندر پرينڊڙ جيڪو دستبردار ٿيندو يا پنهنجي ٽيندر ۾ ڦيرڦار ڪندو سو پنهنجي سوٽي رقم گورنمينٽ وٽ ضبط ڪرائيندو جيستائين سوٽي رقم ڪنهن شيڊول بئنڪ يا ٽريزري ۾ جمع نه ڪرايل هوندي، ڪوبه ٽيندر جاري نه ڪيو ويندو ۽ ٽريزري چالان يا ڊپازٽ اٽ ڪال پي آرڊر خالي ٽيندر فارم حاصل ڪرڻ وقت ڏيکارڻو پوندو. سوٽي رقم روڪ پئسن جي صورت ۾ قبول نه ڪئي ويندي. مجاز اٿارٽي ڪنهن به هڪ يا مڙني ٽيندرن کي بغير ڪنهن سبب ٻڌائڻ جي رد ڪرڻ جو حق محفوظ رکي ٿي ۽ سندس فيصلو آخري هوندو. شرطن وارا ٽيندر نه مڃيا ويندا.

ٻيا شرط ۽ ضابطا هيٺ صحيح ڪندڙ جي آفيس ۾ يا سندس نوٽيس بورڊ تي ڪنهن به ڪم واري ڏينهن تي آفيس اوقات دوران ڏسي سگھجن ٿا. ٽيندر جاري ڪرڻ جي تاريخ 95-3-7، ۽ وڳي منجهند تائين. ٽيندرن ڪلڻ جي تاريخ 95-3-9 ۽ وڳي منجهند تائين.

جريان نمبر	ڪم جو نالو	ڪٽيل رقم	سوٽي رقم	تڪميل جي مدت	ٽيندر في
1	جيڪب لائينز ڪراچي ۾ ٽيڪنيڪل ٽريننگ سينٽر ٻرپا ڪرڻ.	2500000/=	50000/=	18 مهينا	1000/=
2	بفرزن نارٿ ڪراچي ۾ امپليمينٽيشن آف نيشنل ووڪيشنل ٽريننگ پروجيڪٽ فيز - II فار وومن.	1700000/=	34000/=	12 مهينا	1000/=

ايگزيڪيوٽو انجنيئر
پراونشل بلڊنگس نمبر-4
ڪراچي

انفرميشن / ڪراچي - 827

ماهور ويچ

ڪراچي

سنڌي ۾ صحت بابت پهريون رسالو

جيڪڏهن اوهان چاهيو ٿا ته:

- صحت جي سجاڳي آڻيندڙ سنڌي ٻولي جو هي نرالو رسالو ماهوار ”ويچ“ باقاعديءَ سان اوهانجي هٿ ۾ هر مهيني پهچي ۽ سنڌي جو هي نرالو رسالو بنا ڪنهن مالي بحران جي هلندو رهي.
 - ٻولي جي واڌاري ۽ ارتقا ۾ اوهانجو حصو شامل هجي.
- ته پوءِ:

- اڄ ئي ماهوار ”ويچ“ جي سالياني خريداري جو ڪوپن پري موڪليو.
- ڪوپن سان گڏ سالياني خريداري جو چنڊو هڪ سؤ پنجاهه روپيا / ڇهه ماهي خريداري جو چنڊو 75 روپيا بئنڪ ڊرافٽ ذريعي موڪليو.
- بئنڪ ڊرافٽ ”ماهور ويچ“ (Monthly WAJ) جي نالي ۾ ٺهيل هجي.
- سالياني خريداري جو چنڊو موڪلي اوهان ماهوار ويچ پنهنجي دوستن ۽ پيارن کي سڄي سال لاءِ تحفي طور به موڪلي سگهو ٿا. اسان توهانجي دوست/ عزيز کي رسالي موڪلڻ سان گڏ اهو اطلاع ڪنداسين ته رسالو ڪنهن جي پاران تحفو ٿيل آهي.
- ڪوپن ۽ بئنڪ ڊرافٽ هيٺين پتي تي عام پوسٽ واري لفافي ذريعي موڪليو

مئنيجنگ ايڊيٽر ماهوار ويچ، جي.پي.او باڪس نمبر 568 ڪراچي

نوٽ: چيڪ ۽ مني آرڊر قابل قبول نه هوندو. هر سالياني خريدار کي سالياني في جي بدلي رسالي جا 12 پرچا موڪليا ويندا.

خريداري جو فارم

منهنجو/ منهنجي دوست / عزيز جو نالو ماهوار ”ويچ“ جي سالياني / ڇهه ماهي خريدارن جي لسٽ ۾ شامل ڪيو وڃي.
مان ساليانو / ڇهه ماهي چنڊي جو بئنڪ ڊرافٽ ۽ پنهنجا / پنهنجي دوست/ عزيز جا تفصيل هن فارم ۾ شامل ڪري موڪليان پيو.

نالو (ذات سان گڏ): _____

انڊريس: _____

شامل بئنڪ ڊرافٽ جو نمبر _____

صحیح _____ تاريخ _____

PFIZER

A global company at home with many nations

In the war against disease ... Pfizer has contributed over a hundred years of painstaking research and experience. This performance leads to the worldwide trust in Pfizer quality medicines.





پاکستان

* ایک جدید جمہوری مملکت، جو ایک امتیازی تاریخی و ثقافتی پہچان رکھتی ہے۔ مستقبل کیلئے عظیم امکانات اور امیدوں کی سرزمین
* وافرادی اور افرادی وسائل سے مالا مال * ترقی کے لئے شہری اور تکنیکی لوازم کی حامل۔

وزیراعظم بے نظیر بھٹو

کی جہاں پرور اور بیدار مغزیادت میں عوامی حکومت کے پرچوش، ترقیاتی عزائم سے سرشار، بیرونی سرمایہ کاروں کو وسیع تجارتی و صنعتی منصوبوں کے لئے فراخ دلانہ سہولتیں مہیا کرتی ہے۔



نیشنل بینک آف پاکستان

اپنی ملکی و غیر ملکی شاخوں کے وسیع سلسلہ کے ذریعے عرصہ دراز سے پاکستان کی معاشی ترقی، بیرونی تجارت کے فروغ اور بار آور روابط قائم کرنے میں مدد و معاون رہا ہے۔

نیشنل بینک آف پاکستان

قومی ترقی۔ قومی بینک



موجودہ دارو... ق م