


مدوائفري باتصوير

ڊاڪٽر شير شاه سيد



ملہوائفري باتصوير

سهيڙيندڙ ۽ سنواريندڙ
ڊاڪٽر شير شاه سيد

پاڪستان نيشنل فورم آن وومينز هيلٿ 

مڊوائفري با تصويرو
Midwifery ba Tasweer

(Pictorial Midwifery)

Compiled & Edited by
Dr. Shershah Syed

چاپو پهريون (اردو) 2006ع
چاپو پهريون (سنڌي) 2007ع

ڪمپوزنگ ۽ لي آئوٽ : انتيل ڪميونيڪيشنز حيدرآباد
اردو مان ترجمو : اسلم خواجا
پاران : ايم ايڇ پنهور انسٽيٽيوٽ آف سنڌ اسٽڊيز، ڄامشورو.

پاڪستان نيشنل فورم آن وومينز هيلٿ ۽ ڪتاب جو سهڻو ڀنڊڙو ڪتاب ۾ ڏنل ڄاڻ جي استعمال جي ذميواري قبول
نٿا ڪن.

سمورن صحت ڪارڪنن تي اها ذميواري ٿي اچي ته هو پنهنجو پاڻ سان به مخلص هجن ۽ جن ماڻهن جي صحت
جي سار سنڀال ٿا لهن، تن بابت پنهنجي اهليت ۽ مهارتن جي حد کان به واقف هجن. ان جو مطلب اهو آهي ته علاج لاءِ فقط
اهي طريقا ئي استعمال ڪجن جن جي تربيت پرايل هجي، جڏهن ڪنهن عورت کي اهڙي ڪنهن علاج جي گهرج هجي
جنهن جي واسطيدار صحت ڪارڪن کي تربيت مليل نه هجي ته ڪنهن وڌيڪ تجربيدار صحت ڪارڪن جي مدد
حاصل ڪجي. پنهنجي علائقي ۾ محفوظ طريقي سان ڪم ڪرڻ واسطي مقامي صحت ڪارڪنن ۽ طبي عملدارن کان
صلاح وٺجي. هن تربيتي ڪتاب مان نوان طريقا ۽ مهارتون سکڻ ۾ مدد ملندي پر ڪوبه ڪتاب ڪنهن ماهر ۽
تجربيدار استاد جي عملي تربيت جي جاءِ نٿو والاري سگهي. جڏهن به موقعو ملي پڙهجي، ٻڌجي ۽ سکجي.

هن ڪتاب جي تياريءَ ۾ هيٺين ڪتابن کان مدد حاصل ڪئي وئي آهي.
1. مڊوائفن واسطي درسي ڪتاب 2. جتي عورتن لاءِ ڊاڪٽر نه هجي 3. آسان مڊوائفري

پاڪستان نيشنل فورم آن وومينز هيلٿ

Pakistan National Forum on Women's Health
PMA House, Garden Road, Karachi

Digitized by M. H. Panhwar Institute of Sindh Studies, Jamshoro.

انتساب

اسپتال ۽ صحت مرڪزن ۾
ڪم ڪندڙ
نرسن، مڊوائٽن، ٽيڪنيشنن ۽ صحت ڪارڪنن
جي نالي
جن کان سواءِ ڪا اسپتال، ڪو صحت مرڪز
ڪم نٿو ڪري سگهي ۽
جن کي طبي شعبي ۽ سماج ۾
اُهو مقام نه ڏنو ويو آهي
جيڪو سندن حق آهي.

فهرست

54	پيشاب ۾ پروٽين چيڪ ڪرڻ جا طريقا	7	حمل ۽ وڃڻ جي حوالي سان پاڪستان ۾ عورتن جي صورتحال
55	تن مرحلن جي دير	8	ماٿرن جا موت
58	وڃڻ جي جاءِ تي ڪمري کي جيون کان محفوظ ڪرڻ جو طريقو	9	عورت جي جسم جا اهم عضوا
60	پارٽو گراف	11	عورت جي توليدي نظام جي فزيولا جي
64	پارٽو گراف تي وڃڻ جا سور ريڪارڊ ڪرڻ	12	ماهوارِيءَ جو نظام
66	وڃڻ دوران ٿيندڙ پيچيدگيون	14	يوٽرس يونٽائن ٽيويز ۽ اووريز ڪي رت جي فراهميءَ جو نظارو
67	يوٽرس ۾ ٻار جون مختلف حالتون	15	يوٽرائن ٽيوب جو ڪراس سيڪشن
68	ڇهن قسمن جون پريزنٽيشنون	16	چوڪرين ۾ بلوغت جون تبديليون
69	سيفيلڪ يا هيڊ پريزنٽيشن جون مختلف حالتون	17	عورت جي توليدي نظام جي ايناتومي
70	بريج (ڏڏ ڀر) پريزنٽيشن جون مختلف حالتون	18	پيلوڪ بون ۽ پيلوس
71	بريج پريزنٽيشن جون 6 حالتون	19	پيلوس جي اندرين ڪناري جو منظر
72	فيس پريزنٽيشن جون 6 مختلف حالتون	19	پيلوڪ فلور جو ٻاهر يون تهه
73	وڃڻ کان اڳ ڄاڻن ٻارن جي پريزنٽيشن	20	پيلوڪ فلور جي اندرين سطح
74	ورٽيڪس پريزنٽيشن جون 6 حالتون	20	يوٽرس کي سهارو ڏيندڙ حصا
76	وڃڻ کان اڳ ڳور هاريءَ جو معائنو	21	عورت جي پيلوڪ بون
84	وڃڻ جو عمل ۽ فيٽس جي مٿي جي پوزيشن	22	ليگامينٽس ۽ پيلوس جو ٻيو حصو
91	حمل جي پڄاڻيءَ تي اوڙ جي صورتحال	22	عورت جي پيلوس جو اندريون ڪنارو
95	اوڙ جي پيچيدگي	23	پيلوس جا چار قسم
96	وڃڻ ۾ دير يا رڪاوٽ	24	يوٽرس جون ماپون
100	يوٽرس جي غير اثراتي حرڪت (غير اثراتي ڪنٽريڪشن جي سلسلي)	25	پيلوس جو ڪورونل سيڪشن
101	حمل دوران ايمبريو ۽ فيٽس جي سائيز	26	پيلوس کي وڃڻ مان ڪپي ڏيکاريل آهي
102	نئين ڄاول ٻار ۽ بالغ ماڻهوءَ جي عضون ۾ جسماني تناسب	27	حمل
103	فيٽس ٻرڻ جي گردش	28	حمل جي واڌ ويجهه
104	فيٽس جي ڪوپٽيءَ جا مختلف حصا	30	ڳور هاريءَ جو معائنو ۽ رجسٽريشن
105	فيٽس جي ڪوپٽيءَ جا آڏا قطر	34	حمل جون علامتون ۽ نشانيون
106	فيٽس جو مٿو	35	ڳور هاري عورت جي سارسنيال جا مرحلا
107	فيٽس جي ڪوپٽيءَ جا اهم حصا	36	ڳور هاري عورت جو معائنو
108	فيٽس جي ڪوپٽيءَ جا قطر	37	ٻار جي دل جو ڌڪو
109	پريزنٽيشن مهل ڪوپٽيءَ جون مختلف حالتون ۽ ماپون	38	ٻار جو رخ
110	برو پريزنٽيشن	40	حمل دوران ڪهڙا چڪاس (Test) ضروري آهن؟
111	ورٽيڪس پريزنٽيشن	41	عورتون جن ۾ حمل ۽ وڃڻ دوران پيچيدگين جو وڌيڪ خطرو ٿئي ٿو
112	مٿي جي پريزنٽيشن ۽ مولڊنگ	42	حمل دوران تڪليفون ۽ انهن جا علاج
113	مٿي جون اندريون جهليون ۽ رت جي گردش	44	حمل دوران سارسنيال جا اهم ٺڪتا
114	فيٽس جي مٿي جو ڪورونل سيڪشن	49	محفوظ وڃڻ جي تياري
115	ضميما	53	حمل دوران شديد نوعيت جون پيچيدگيون

پيش لفظ

مڊوائفن جي تعليم ۽ تربيت جي حوالي سان هڪ وڌيڪ ڪتاب ”مڊوائفري باتصوير“ جي اشاعت ان سفر جو هڪ اهم قدم آهي جنهن جو مقصد حمل ۽ وڃڻ دوران مائرن کي غير ضروري موتن کان بچائڻ ۽ وڃڻ واري عمل کي سولو بنائڻ آهي.

عورتن جي صحت جي سارسنيال، حمل ۽ وڃڻ جي مرحلي کي مائرن لاءِ محفوظ بنائڻ مڊوائف جي بنيادي ذميواري آهي. اهو فرض تربيت پرايل مڊوائف تي بهتر طريقي سان نڀائي سگهي ٿي. مڊوائفن لاءِ سنڌي ۽ ڪتابن جون هئڻ، سندن تربيت ۾ وڏي رڪاوٽ هو. پاڪستان نيشنل فورم آن وومينز هيلٿ پنهنجي محدود وسيلن جي باوجود ان ڪم جو ذميو ڪيو آهي. 2001ع کان هيل تائين فورم طرفان مائرن جي صحت، حمل ۽ وڃڻ جي تربيت جي حوالي سان سنڌي ۽ اردو ۾ هيٺيان ڪتاب شايع ڪيا ويا آهن:

1- مڊوائفري باتصوير

2- مڊوائفن لاءِ درسي ڪتاب

3- آسان مڊوائفري

4- حمل ۽ وڃڻ جي پيچيدگين جو علاج

5- وڃڻ جي هنگامي سارسنيال

6- جتي عورتن لاءِ ڊاڪٽر نه هجي

په وڌيڪ ڪتاب ڇپرائڻ جو معاملو ويچار هيٺ آهي، جن مان هڪ جو موضوع ”سڪڻ ۾ صحت ڪارڪنن جي مدد ڪرڻ“ آهي جڏهن ته ٻيو ڪتاب انفڪشن کان بچاءُ جي عملي طريقن بابت هوندو. اسان جي ڪوشش هوندي ته وسيلن ٿيندي ئي اهي ڪتاب شايع ڪري نرسن، مڊوائفن ۽ ٻين صحت ڪارڪنن لاءِ پيش ڪيا وڃن.

”مڊوائفري باتصوير“ پنهنجي طور تي مڪمل ڪتاب ناهي. ان جو مقصد اڳي ئي موجود مڊوائفريءَ بابت ڪتابن جي ڪجهه اهم ۽ بنيادي سبقن جي اُڀتار ۽ عملي تربيت دوران اها ڄاڻ استعمال ڪندي ذهن ۾ پڪو ڪرڻ آهي ته جيئن مڊوائفن جي اها صلاحيت سگهاري ٿي وڃي ۽ هو خطرن جي وقت سر نشاندهي ڪري عملي اُڀاءُ وٺي سگهن ۽ ماءُ ۽ ٻار جي زندگي بچائي سگهن.

مڊوائفريءَ جي شاگردياڻين کي گهرجي ته هيءُ ڪتاب هر وقت پاڻ سان گڏ رکن ۽ اهو سمجهڻ جي ڪوشش ڪن ته عورتن جي توليدي نظام جا نازڪ عضوا، حمل دوران ۽ حمل کان پوءِ مختلف تبديلين مان ڪهڙي ريت گذرن ٿا. جيستائين عورت جي توليدي نظام ۽ جسم جي ٻين عضون بابت درست سائنسي ڄاڻ نه هوندي اوستائين انهن عضون جي اهميت، ڪم ۽ ڪارڪردگي کي سمجهڻ ممڪن ناهي.

اسان کي اميد آهي ته نرسنگ ۽ مڊوائفريءَ جي استادن کي انهن ڪتابن مان پنهنجي تدريسي ڪمن ۾ مدد ملندي. مڊوائفريءَ جي تعليم ۽ تربيت ڪتابن، ڪلاس رومن ۽ وارڊ کان شروع ٿي ليبر روم ۾ ختم ٿئي ٿي. مڊوائفري

ٽيوٽر کي ڪلاس کان پوءِ ليبر روم ۾ به موجود هئڻ گهرجي ۽ تربيت جي عملي پهلون تي نظر رکڻ گهرجي. اهو مقصد سدائين سامهون هئڻ گهرجي ته مڊوائف کي ڳوٺ يا پاڙي ۾ ڪم ڪرڻو آهي، ان ڪري پيشيور صلاحيتن سان گڏوگڏ منجهس اها اهليت به هئڻ گهرجي ته هوءَ ڳوٺ يا پاڙي جو ماحول سمجهي، درپيش مسئلن ۽ دستياب وسيلن جو صحيح اندازو لڳائي ۽ پوري اعتماد سان پنهنجي مهارتن، اهليت ۽ ذهانت کي استعمال ڪري عورتن جي خدمت ڪري ان ريت مقامي آبادي مٿس ڀروسو ڪندي ۽ ساڻس گڏجي ڪم ڪار ڪرڻ لاءِ به تيار ٿيندي.

حمل ۽ وڃڻ وارن لکين عورتن جي موت ۽ معذوريءَ جو هڪ اهم سبب اهو آهي ته غير تربيت يافتہ دائين ۽ جملي ڊاڪٽرن کي انساني زندگين سان ڪيڏڻ جي ڪلي چوٽ ڏني وئي آهي. اهي عطائي ڊاڪٽر ۽ اڻپڙهيل دائيون نه ته جديد طبي چارڻ کان واقف آهن ۽ نه ئي سندن سائنسي بنيادن تي تربيت ٿي آهي.

اهڙي صورتحال ۾ ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته اسانجون مڊوائفون، مڊوائفريءَ جي هنر جي تعليم ۽ تربيت ۾ مهارت حاصل ڪن ۽ پاڪستان ۾ مائرن جي بي وقتائي ۽ بيجا موتن جي للڪار کي منهن ڏيڻ لاءِ پنهنجو پاڻ کي تيار ڪن. جهالت، مائرن جا موت ۽ عورتن جي معذوري اسان جا دشمن آهن. ايئن سمجهو ته اسين جنگ واريءَ حالت ۾ آهيون ۽ مڊوائفون ان جنگ ۾ اسان جو هر اول دستو آهن. علم، تربيت، تجربو ۽ ڏاهپ مڊوائفن جا هٿيار آهن. انهن هٿيارن سان پنهنجو پاڻ کي ليس ڪريو. پختي عزم ۽ خدمت واري جذبي سان ميدان ۾ لهو ۽ انهن ويرين کي شڪست ڏئي جنگ کٽي وٺو.

هر سال ٽيهه هزار مائرن کي موت کان بچائڻ ۽ چار لک عورتن کي حمل يا وڃڻ جي ڪنهن پيچيدگيءَ وڳهي معذوريءَ کان محفوظ رکڻ اسان سڀني جي ذميواري آهي ۽ ان ذميواريءَ کان ڪن ٿار ڪرڻ ڪنهن به حڪومت ۽ معاشري لاءِ ايئن ئي آهي جيئن مرد لاءِ نامرديءَ وارو مهڻو!


هيءُ ڪتاب جو پهريون ايڊيشن آهي، اسان کي اعتراف آهي ان ۾ ڪيتريون ئي خاميون رهجي ويون هونديون. اسين اوهان جا ٿورائتا رهنداسين جو جيڪڏهن انهن خامين، ڪوتاهين جي نشاندهي ڪندا ته جيئن ڪتاب جو ايندڙ ايڊيشن بهتر بنائڻ ۾ اسان جي مدد ٿي سگهي.

شير شاهه سيد

پاڪستان نيشنل فورم آن وومينز هيلٿ

حمل ۽ ويمر جي حوالي سان پاڪستان ۾ عورتن جي صورتحال

- لڳ ڀڳ ٽي ڪروڙ عورتون ٻار ڄڻ واري ڄمار جون آهن.
- عورتن ۾ ڳچي جي شرح 5 آهي يعني پنهنجي ڳچي واري ڄمار ۾ عورتون سراسري پنج ٻار ڄڻ ٿيون.
- ساليانو 40 کان 50 لک ٻار ڄمن ٿا.
- 30 سيڪڙو کان گهٽ عورتن کي حمل دوران مناسب سارنڀال ملي ٿي.
- 80 سيڪڙو کان وڌيڪ ويمر گهرن تي ٿين ٿا (گوناڻي علائقن ۾ 89 سيڪڙو جڏهن ته شهري علائقن ۾ 64 سيڪڙو).
- گهرن تي ٿيندڙ ويمن مان 95 سيڪڙو ويمر غير تربيت يافتہ دائين هٿان ٿين ٿا.
- ساليانو ٿيندڙ ويمن مان فقط 20 سيڪڙو ئي تربيت يافتہ صحت ڪارڪنن هٿان ٿين ٿا.
- ڳورھاري عورتن مان 55 سيڪڙو رت جي کوٽ جو شڪار ٿين ٿيون (هيموگلوبين 10 گرام سيڪڙو کان گهٽ).
- ڳورھاري عورتن جي ٽئين حصي ۽ ٽڄ ڌارائيندڙن جي اڌ کي سندن گهرج جي توانائي واري مقدار کان 70 سيڪڙو گهٽ توانائي ملي ٿي.
- ڳورھاري عورتن مان فقط 54 سيڪڙو کي جهٽڪن جا ٻه ٽڪا لڳن ٿا.
- ويمر ٿيندڙ عورتن جي فقط چوٿين حصي کي ويمر کان پوءِ واري سارنڀال نصيب ٿئي ٿي.
- فقط 30 سيڪڙو عورتون حمل روڪ شيون استعمال ڪن ٿيون.
- حمل روڪ شيون استعمال ڪندڙ عورتن ۽ استعمال جي خواهش رکندڙ عورتن ۾ فرق دنيا جي ٻين ملڪن جي پيٽ ۾ پاڪستان ۾ وڌيڪ آهي (38 سيڪڙو).
- پاڪستان ۾ هڪ لک ويمن دوران 340 کان 550 عورتون موت جو شڪار ٿين ٿيون ان کان گهڻي وڌيڪ تعداد ۾ بيمار ٿي عارضي يا مستقل معذوريءَ جو شڪار ٿين ٿيون.
- هر ويهن منٽن ۾ هڪ ماءُ حمل يا ويمر جي ڪنهن پيچيدگيءَ سبب مري ٿي.
- هر ڪلاڪ ۾ 45 ماڻھون سڄي ڄمار لاءِ پيڙا ۽ معذوريءَ جو شڪار ٿيون بڻجن.




ماترن جا موت

اُهي موت جيڪي حمل جي پهرين ڏينهن کان وٺي وڃن ۽ ان جي چاليهن ڏينهن اندر حمل يا وڃي ڪنهن پيچيدگيءَ سبب ٿين تن کي ماترن جو موت (Maternal death) سڏجي ٿو. ڪنهن حادثي وڳهي ٿيندڙ موت ان ۾ شامل ناهن.

ماترن جي موت جو تناسب


هڪ لک جيئن ٻارن جي وڃي ٽي مرندڙ عورتن جو تعداد پاڪستان ۾ 340 کان 550 آهي. پنج سبب جيڪي حمل ۽ وڃي دوران ماترن ۾ سڀ کان وڌيڪ موت جو سبب بڻجن ٿا:

- 1- رت وهڻ (hemorrhage)
- حمل دوران رت وهڻ (antepartum hemorrhage/abortion)
- وڃي دوران يا ان کان پوءِ معمول کان وڌيڪ رت وهڻ (postpartum hemorrhage)
- 2- حمل دوران دورا ۽ جهٽڪا (eclampsia)
- 3- وڃي کان پوءِ وارو بخار (puerperal sepsis)
- 4- وڃي ۾ دير / وڃي ۾ رڪاوٽ (prolonged/obstructed labor)
- 5- حمل ضائع ٿيڻ / ڪرائڻ (abortion)




تصوير 1: محفوظ ممتا لاءِ گهربل بنيادي عنصر

عورت جي جسم جا اهم عضوا




تصوير 2: هن تصوير ۾ عورت جي جسم جا اهم عضوا ڏيکاريل آهن.




تصوير 3: هن تصوير ۾ نقطي وارين لائينن ذريعي عورت جي جسم اندر موجود يوٽرس ۽ ٻيا عضوا ظاهر ڪيل آهن.

عورت جي توليدي نظام جي فزيولاڄي

- ماهواري ختم ٿيڻ کان پوءِ ٻچيدائي ٻيهر بيضو ٺاهڻ لڳي ٿي ۽ يوٽرس اندر تهنه ٺهڻ جو عمل ٻيهر شروع ٿئي ٿو.
- ايندڙ ڀيري بيضو ٺهڻ ۽ ٻچيدائيءَ کان ٻاهر اچڻ (ovulation) وارو عمل چوڏهين ڏينهن ۾ ٿئي ٿو. (ماهواري اچڻ جي پهرين ڏينهن کان چوڏهون ڏينهن).
عام طور تي ماهواريءَ جو مقدار 40 کان 80 ملي ليٽر هوندو آهي. اهورت ڄمي نه ويندو آهي. جڏهن ماهواري وڌيڪ مقدار ۾ هوندي آهي ته رت ڄمڻ شروع ٿيندو آهي، جنهن کي ڪلات سڏبو آهي.
- ماهواريءَ جو نظام (Menstrual Cycle)
هر مهيني ٻچيدائيءَ مان هڪ بيضو (ovum) نڪري نيوٽ ۾ اچي ٿو.
ان دوران يوٽرس جي اندرين پٽين ۾ هڪ ٿلهي ۽ نرم تهه جڙي ٿي.
مرداڻي جُزي (sperm) جي نه هئڻ سبب يوٽرس جي اندر ٺهيل ٿلهي نرم تهه چڻي پوي ٿي جيڪا ماهواريءَ واري رت جي صورت ۾ عورتاڻي عضوي مان خارج ٿئي ٿي، ان کي حيض يا ماهواري سڏجي ٿو.




تصوير 5: گرافيئن فوليڪل جي زندگيءَ جو دورانيو ۽ ان جا مختلف حصا.




تصوير 6: هڪ گرافيئن فوليڪل (گرافي ڪيسو) جيڪو پختو ٿي چڪو آهي ۽ ڦاٽڻ لاءِ تيار آهي.

يوٽرس، يوٽرائن ٽيويڙ ۽ ٻچيدائيءَ کي رت جي فراهميءَ جو نظام




تصوير 7: يوٽرس کي رت وڌي مقدار ۾ ملي ٿو جهڙي ريت تصوير ۾ ڏيکاريل آهي.



تصوير 8: يوٽرائن ٽيؤب کي ڪڍي ڏيکاريل آهي. اووم حاشيبي واري مهاڙم داخل ٿي رهيو آهي جتي اسپرم سان گڏجي ٻار ٺهي ٿو.

یوٽرائن تیوب جو کراس سیکشن



تصویر 9: هن تصویر ۾ یوٽرائن تیوب جا مختلف حصا واضع کیا ویا آهن.

چوڪرين ۾ بلوغت جون تبديليون

1- جسماني تبديليون


- قد ۾ اضافو
- اُره وڌڻ
- عورتاڻي عضوي ۽ بغلن تي وار ڦٽڻ
- چمڙي جي سٺپ ۽ موھيڙا
- دڏ ڳرا ٿيڻ
- وزن وڌڻ
- عورتاڻي عضوي جي بناوت ۾ معمولي تبديلي
- ماهواري شروع ٿيڻ
- آواز ۾ معمولي تبديلي

2- نفسياتي، ذهني ۽ سماجي تبديليون

- جسماني تبديلين سبب پريشاني ۽ لڄ
- هٻڪ، حيا
- جنسي احساسن سبب لڄ ۽ گھٻراهت
- مخالف جنس ڏانهن لاڙو
- ماهواريءَ کان اڳ چيڙاڪ پٽو ۽ جذباتيت
- پنهنجي باري ۾ محتاط ٿيڻ ۽ نوت ڪرڻ ته هوءَ
- ڪيئن پئي لڳي
- پنهنجو پاڻ تي پاڙڻ
- بي تڪلفي ۽ گھاتي دوستي
- ڪٽنبي روايتن کي قبول ڪرڻ يا انهن کان انحراف ڪرڻ


عورت جي توليدي نظام جي ايناٽومي

ٻاهريان جنسي عضوا




تصوير 10: هن تصوير ۾ عورت جا ٻاهريان جنسي عضوا ڏيکاريل آهن. حمل دوران ٻاهرين جنسي عضون ۾ به تبديلي اچي ٿي ته جيئن وڌيڪ دوران ٻار جو مٿو سولائيءَ سان توليدي عمل مان گذري سگهي. وڌيڪ سورن جي پٽي ۽ ٽين مرحلي ۾ جنسي عضون کي نقصان رسي سگهي ٿو ۽ اهڙا زخمي اچي سگهن ٿا جن جي ڪري عورت جي عام زندگي متاثر ٿئي يا هوڙ سڄي ڄمار لاءِ معذور ٿي پوي.

پيلوڪ بون ۽ پيلوس




تصوير 11: پيلوڪ فلور جي اندرين سطح. ويم دوران عام طور تي ٻار جو مٿو پيلوڪ فلور تي اچي ٽڪرائبو آهي. عام ويم ۾ پيلوڪ فلور سان گڏ يوٽرس جا سگهه ڪنٽريڪشنر ويم کي سولوبنائڻ ۾ مدد ڪندا آهن.

پيلوس جي اندرين ڪناري جو منظر جنهن ۾ مختلف قطر ظاهر ڪيل آهن




تصوير 12: عام قدبٽ واري عورت ۾ هيءُ قطر انتهائي اهميت ٿا رکن. انهن جي گهٽ وڌ ٿيڻ سان حمل ۽ ويم جو عمل متاثر ٿي سگهي ٿو.

پيلوڪ فلور جو ٻاهريون تهه




تصوير 13: پيلوڪ فلور جي ٻاهرين سطح ۾ ويم دوران اهم ڪردار ٿي ادا ڪري

پيلوڪ فلور جي اندرين سطح




تصوير 14: ٻار جو مٿو پيلوڪ فلور جي سطح سان ٽڪرائجي ڦرندو آهي ۽ وڃي عمل مڪمل ٿي ويندو آهي.

يوٽرس ڪي سهارو ڏيندڙ حصا




تصوير 15: حمل ٿيڻ مهل، وقت سان گڏوگڏ يوٽرس جو حجم وڌندو آهي ۽ ان ۾ موجود ٻار جو وزن به وڌڻ لڳندو آهي. ڏوئرن جا سگهارا ريشا جن کي ليگامنٽس سڏبو آهي، نه رڳو يوٽرس کي سهارو ٿا ڏين پر ان کي پنهنجي جاء تي رهندي وڌڻ ۾ به مدد ٿا ڪن.

عورت جي پيلوڪ هڏي




تصوير 16: پيلوس جي وڏي هڏي، جنهن جا اهم حصا واضع ڪيا ويا آهن، اصل ۾ اها تن هڏين
 اليڪ، اسپيچئم ۽ پبويس جي گڏجڻ سان ٺهي ٿي. ٻنهي پاسن جي پيلوڪ هڏي گڏجي پيلوس
 جوڙي ٿي (ايندڙ صفحي جي تصوير ڏسو)

ليگامينٽس ۽ پيلوس جو پويون حصو




تصوير 17: ليگامينٽس کي ظاهر ڪرڻ لاءِ پيلوس پوئين پاسان ڏيکاريل آهي.

عورت جي پيلوس جو اندريون ڪنارو




تصوير 18: عورت جي پيلوس جو اندريون ڪنارو جتان ٻار پيلوس ۾ داخل ٿئي ٿو.



تصوير 19: وچان ڪپي ڏيکاريل
پيلوس، جنهن ۾ مختلف زاويا ۽
پيلوڪ ڪينال جو محور واضح آهي.


پيلوس جا چار قسم



چئن قسمن جي پيلوس جا مخصوص اندريان رستا


تصوير 20: عام طور تي يورپي ۽ ايشيائي عورتن ۾ گائنا ڪوائڊ پيلوس هوندو آهي. اينڊرائونڊ پيلوس
مردن وانگر هوندو آهي. جڏهن ته آفريڪي عورتن ۾ پليٽي پلائڊ پيلوس ٿئي ٿو.

يوٽرس جون ماپون




تصوير 21: هن تصوير ۾ ڏيکاريل يوٽرس ۽ ان جون ماپون غير ڳورهاري عورت جي يوٽرس جون آهن. حمل ٿيڻ کان پوءِ جيئن جيئن ٻار جو وزن وڌندو آهي، يوٽرس به ان حساب سان وڌندو آهي.

پيلوس جو ڪورونل سيڪشن (coronal section of pelvis)



تصوير 22: هن تصوير مان اندازو ٿي سگهي ٿو ته حمل ڪهڙي جاءِ تي ٿئي ٿو ۽ ٻار ڪهڙي ريت عورتائي عضوي مان لنگهي ٻاهر ٿو اچي. يوترس جي ٻنهي پاسن پچيداني ۽ يوترائن ٽيوب جي نشاندهي ڪيل آهي.

پيلوس ڪي وچان ڪپي ڏيکاريل



تصوير 23: هن تصوير ۾ عورت جي پيٽ اندر توليدي عضوا هڪ پاسي کان ڏيکاريل آهن. پچيداني، يوٽرائن ٽيوب يوٽرس ۽ عورتاڻو عضوو واضع آهن. اهي سمورا عضوا حمل ۽ وڃڻ ۾ بنيادي ڪردار وارا آهن.

حمل

موجود اسپرم وڌي تعداد ۾ (تقريبن 50 ڪروڙ) عورت جي عورتائي عضوي ۾ خارج ٿيندا آهن. • اهي اسپرم عورت جي يوٽرس ۽ ٽيوب ڏانهن حرڪت ڪندا آهن.


- سمورا اسپرم يوٽرس مان ٿيندا ٽيوب ۾ نه ويندا آهن.
- فقط هڪ اسپرم عورت جي ٽيوب ۾ موجود اووم ۾ جذب ٿي کيس ڳور هاري ڪندو آهي.
- ڳيڄڻ لائق اووم ٽيوب مان ٿيندو يوٽرس ۾ پهچي ان جي تيار ٿيل پٽ سان ڳهٽي ويندو آهي. ان جو مطلب اهو آهي ته حمل ٿي ويو آهي.

مرد ۽ عورت جي جنسي عمل جي نتيجي ۾ مرد جو اسپرم عورت جي اووم سان ڳنڍجي ٿو. ان عمل کي ڳيڄڻ يا fertilization سڏجي ٿو. اها حمل جي شروعات آهي.

حمل ٿيڻ جو عمل


- هر مهيني پچيداني مان اووم خارج ٿي ٽيوب ۾ ايندو آهي.
- ان دوران يوٽرس جي اندرين ته هارمون جي اثر هيٺ ٿلهي ۽ نرم ٿي ويندي آهي.
- جنسي ميلاپ دوران مردائي توليدي مادي (semen) ۾

حمل جي واڌ ويجهه




تصوير 24: حمل دوران يوٽرس ۾ واڌ ويجهه سان گڏ وڌندو آهي ۽ جسم جي اندرين عضون تي دٻاءُ وڌڻ لڳندو آهي. حمل دوران عورت جي جسم ۾ مزاج ۾ تبديلين جون تمام گهڻيون علامتون انهيءَ دٻاءُ ڪري ظاهر ٿينديون آهن.

حمل جي واٽ ويجهه



تصوير 25: تصوير ۾ ڏيکاريل آهي ته حمل جي مختلف مرحلن ۾ فندس جي اوچائي کيسٽائين هوندي آهي.



عضوا	ڪلوگرام
اُرهه	0.4
چري	3.5
اڏور	0.6
ٻار	3.4
ايمنيوٽڪ فلويڊ	0.6
يوٽرس (واٽ کان پوءِ)	1.0
رت جو مقدار (واٽ کان پوءِ)	1.5
اضافي سيلولر فلويڊ	1.5
ڪُل	12.5

تصوير 26: حمل دوران جسم جي وزن ۾ واٽ جي ورهاست

ڳورهاريءَ جو معائنو ۽ رجسٽريشن

(ڇاڪاڻ جو ڳوٺن جون گهڻي ڀاڱي عورتون حمل دوران صحت مرڪز نه اينديون آهن، ان ڪري وڏي تعداد ۾ ڳورهاري عورتن بابت پتو نه لڳي سگهندو آهي ۽ صحت مرڪزن ۾ سندن اندراج به نه ٿيندو آهي.)

• ڄاڻ ۾ ايندڙ هر ڳورهاري عورت کي ڳورهاري عورتن واري رجسٽر ۾ درج ڪريو ۽ ڳورهاريءَ جو ڪارڊ ٺاهيو.

• ڳورهاري عورت جو اندراج وٺڻ جي امڪاني مهيني واري صفحي تي ڪريو.

• پهرين ملاقات تي رجسٽر ۾ هيءَ ڄاڻ درج ڪريو:

- اندراج جي تاريخ
- ڳورهاري ۽ سندس مڙس جو نالو
- پتو
- ڄمار
- قد
- آخري ماهواريءَ جي تاريخ
- وٺڻ جو متوقع مهينو
- هيل تائين ٿيل ڪل حمل
- جيئري ٻارن جو تعداد
- پوئين/هاڻوڪي حمل جا جوکم
- وزن

• ڳورهاري عورت جو ڪارڊ هڪ حمل دوران ٿيندڙ سمورين ملاقاتن جو رڪارڊ هوندو جنهن ۾ هر ملاقات دوران ٿيندڙ معائني جا تفصيل درج هوندا.

حمل دوران معائنا ڪڏهن ٿيڻ گهرجن

• ڳورهاري عورت کي باقاعدي سان پنهنجو معائنو ڪرائڻ گهرجي.

• حمل دوران ڳورهاري عورت کي گهٽ ۾ گهٽ ٽي ڀيرا پنهنجو معائنو ضرور ڪرائڻ گهرجي.

پهريون معائنو: حمل جي پهرين ٽن مهينن دوران.

ٻيو معائنو: حمل جي چوٿين کان ڇهين مهيني دوران.

ٽيون معائنو: حمل جي ستين مهيني کان وٺي ٽيڻ تائين.

حمل دوران معائني ۽ سارسنيال سان خطرناڪ

علامتن جي وقت سر سڃاڻپ ۾ مدد ملي ٿي ۽ وقت سر

رت جي ڪوٽ جو پتو لڳائڻ ۽ حمل جي مناسب واڌ ويجهه

ڄاڻڻ ۾ مدد ملي ٿي. ماءُ جو صحت مرڪز سان رابطو ٿو

رهي ۽ وقت سر علاج جي فراهميءَ سان معذوري ۽ موت

کان بچي سگهجي ٿو. حمل دوران معائنو نه ڪرائڻ به

حمل ۽ وٺڻ دوران ٿيندڙ موتن جو هڪ وڏو سبب آهي.

ڳورهاري عورت کي رجسٽر ڪرڻ جو طريقو

• صحت مرڪز تي ايندڙ ڳورهاري عورتن جو ڪارڊ

ٺاهڻ ۽ سندن نالا رجسٽر ۾ درج ڪرڻ.

• علائقي ۾ موجود دائي / دائين کان ڳورهاري عورتن

بابت ڄاڻ حاصل ڪري ساڻن رابطو ڪرڻ ۽ کين

رجسٽر ۾ درج ڪرڻ.

• علائقي جي گهرن جو مختصر سروي ڪري ڳورهاري

عورتن جو پتو لڳائڻ ۽ رجسٽر ۾ داخل ڪرڻ

ريڪارڊ ڪارڊ

داخل نمبر _____

ڳورھاريءَ جو طبي ريڪارڊ

نالو _____ مڙس جو نالو _____ تاريخ _____

ڄمار _____ مڙس / ڳورھاريءَ جو پيشو _____ فون نمبر _____

مڪمل پتو _____

اڳوڻن ويمن جو ريڪارڊ

نمبر	سال	ھنڌ	حمل جو عرصو	حمل جي پيچيدگي	ويمن ڪيئن ٿيو	ٻار جي جنس	وزن	ھاٿوڪي ڪيفيت
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

ريڪارڊ ڪارڊ

Past Medical History اڳوڻو طبي ريكارڊ	Family History ڪٽنب ريكارڊ
Jaundice سائي	Diabeties منا پيشاب Yes No
Blood Transfusion رت چڙهڻ	B.P. بلڊ پريشر Yes No
	T.B. سلهه Yes No

General Information عام حالت	Height قد	Chest ڇاتي
Heart دل	Abdomen پيٽ	Breast اُره
Hosp. Adm اسپتال ۾ داخلا	File No. فائل نمبر	

حمل دوران هن ريكارڊ وسيلي شروعات ۾ ٿي غير معمولي تبديلين جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو. هيءُ چارٽ اهم آهي. هر مڊاوائف کي پنهنجي مريضن جو ريكارڊ ان ريت رکڻ گهرجي.

حمل جون علامتون ۽ نشانيون

1- ماهواريءَ جو بند ٿيڻ

هيءَ حمل جي سڀ کان پهرين علامت آهي پر ڪجهه موقعن تي ڪنهن بيماريءَ سبب به ماهواري بند ٿي سگهي ٿي. ان ڪري ان سان گڏوگڏ حمل جي ٻين علامتن کي به ڏسڻ گهرجي.

2- اُرهڻ ۾ تبديلي

- حمل جي شروعاتي هفتن ۾ اُرهڻ ۾ ڳروپڻ ۽ ڇهنڊڙيون محسوس ٿينديون آهن. گڏوگڏ ڳورھاري اُرهڻ ۾ هلڪي سور جي به دانهن ڪندي آهي. اُرهڻ جو وزن به وڌي ويندو آهي.
- اُرهڻ ۾ ڳري پڻ ۽ سور سان گڏوگڏ ڏنڊي (نپل) ۽ ان جي دائري جو رنگ وڌيڪ گهرو ٿي ويندو آهي.

3- اُلتِي يا جيءَ ڪچو ٿيڻ

پهرين ٽن مهينن دوران هر ڳورھاريءَ کي اها شڪايت ٿي سگهي ٿي پر ٽن مهينن کان پوءِ عام طور تي اها شڪايت ختم ٿي ويندي آهي.

4- هر هر پيشاب اچڻ

پهرين ٽن مهينن دوران يوٽرس هيٺين پاسي ٿي ويندو آهي ۽ انجي ماپ وڌڻ ڪري مٿاني تي ان جو دٻاءُ وڌي ويندو آهي. ساڳي ريت حمل جي آخري ٽن مهينن ۾ به جڏهن ٻار جو مٿو ڏڏجي هڏين جي وچ ۾ اچي ويندو آهي ته مٿاني تي دٻاءُ وڌڻ ڪري ڳورھاريءَ کي هر هر پيشاب اچي سگهي ٿو.

5- پيٽ جو وڌڻ

حمل جي ٽن مهينن کان پوءِ ٻارجي واڌ ويجهه دوران پيٽ وڌڻ شروع ٿي ويندو آهي ۽ هر مهيني معائني دوران ان کي محسوس ڪري سگهجي ٿو.

6- پيٽ ۾ ٻار جي حرڪت

پهرين حمل واري عورت سورھين يا ويھين هفتي دوران ٻار جي چرپر محسوس ڪندي آهي. جڏهن ته وڌيڪ ٻارن واري عورت اها چرپر جلدي محسوس ڪري وٺندي آهي.

ڳورھاري عورت جي سارسنپال جا مرحلا

جانچ (Assessment)

هستري

هاڻوڪي حمل بابت

- آخري ماهواريءَ جي تاريخ / مهينو
- وڃڻ جي متوقع تاريخ

تاريخ ڪيڊ جو طريقو

آخري ماهواري شروع ٿيڻ جي تاريخ + 7 ڏينهن + 9

مهينا = متوقع تاريخ

مثال طور: جيڪڏهن آخري ماهواري 7 جنوريءَ تي

شروع ٿئي ته وڃڻ جي متوقع تاريخ: 7 جنوري + 7 ڏينهن

+ 9 مهينا = 4 آڪٽوبر ٿيندي

حمل جو عام طور تي عرصو

- 38 کان 40 هفتا (9 مهينا)

ميدیکل / سرجیکل هستري

- دل جي بيماري، گڙدن جي بيماري، منا پيشاب، رويلا
- انفیکشن، رت جي منتقلي
- ايڊز يا ڪا جنسي بيماري، مرگهي
- ڪوٽيل آپريشن

پوئين حمل جي ڄاڻ

- گڻ حمل / گڻ ڪيترا ٻار ٿيا (جيئرا ۽ مثل)
- جيئرن ٻارن جو تعداد (هن مهل)
- جيئرو ڄمڻ کان پوءِ گذاري ويل ٻارن جو تعداد
- جيئري ٻارن جون ڄمارون
- ضائع ٿيل حمل (تعداد)
- پويون وڃڻ ڪهڙي ريت ٿيو (نارمل، وڏي آپريشن سان، اوزارن سان)
- پوئين حمل، وڃڻ يا ان جي چاليهن ڏينهن اندر ڪا پيچيدگي
- پهرين ٻارن کي ٽيڇ ڌارائڻ بابت ڄاڻ

ڳور هاري عورت جو معائنو

پنهنجي شلوار جا پائڻچا پنهني مڙين کان مٿي ڪري مڙيءَ جي جوڙ کان مٿي وچ ۾ گهٽ ۾ گهٽ 30 سيڪنڊ پنهنجي آڱوٺي سان دٻايو ڪٽ پوڻ جو مطلب آهي ته بيماريءَ ڪري سوچ آهي جيڪڏهن ڪنهن بيماريءَ وگهي سوچ آهي ته ان لاءِ وڌيڪ چڪاس جي ضرورت آهي جهڙوڪ:

1 - پيشاب جي چڪاس

2 - بلڊپريشر جي چڪاس ڪرائڻ

جيڪڏهن مڊوائف وٽ سهولتون ناهن ته ڳور هاريءَ کي اسپتال اُماڻي ته جيئن چڪاس کان پوءِ سندس مڪمل علاج ٿي سگهي ڇاڪاڻ جو بيماريءَ سبب ٿيندڙ سوچ، جنهن ۾ ڪٽ پئجي وڃي، خطرناڪ آهي.

پيٽ جو معائنو

(12 کان 14 هفتن کان پوءِ هر ملاقات تي)

پيٽ جو ماپ / يوٽرس جي سائيز (حمل جي 12 هين هفتي کان پوءِ)

يوٽرس جي سائيز ڏسڻ جو طريقو

ٻار جي وڌڻ سان پيٽ اندر يوٽرس مٿين پاسي ڏانهن وڌندو آهي. پهرين ٽن مهينن ۾ يوٽرس پيلوس جي اندر ٿي ويندو آهي. پوءِ پيلوس ۽ ڏن تائين پهچي ويندو آهي. ايندڙ مهينن ۾ يوٽرس هر مهيني ٻن آڱرين جيترو وڌندو آهي. ڏسو تصوير 25

معائني دوران ڇا ڏسڻ ضروري آهي؟

پهرين ملاقات تي

● قد (حمل دوران هڪ پيرو)

● اُرهڻ جو معائنو (حمل دوران هڪ پيرو)

پهرين ملاقات ۽ ان کان پوءِ هر ملاقات تي

● بخار، ساهه جي رفتار ۽ نبض

● بلڊپريشر

● وزن

● چهره، هٿن ۽ پيرن تي سوچ:

1 - ڳور هاريءَ جو وزن هڪ مهيني ۾ 2 ڪلويا ان کان وڌيڪ وڌي وڃي ته اها سوچ جي علامت ٿي سگهي ٿي.

2 - مڙين تي هلڪي سوچ خطري جي ڳالهه ناهي.

3 - چهره آڱريون سُجڻ نظر اچن ته پڇو:

ڇا هُن پنهنجي مُنڊي سوڙهي ٿيڻ سبب لاهي ڇڏي آهي، جيڪڏهن جواب ها ۾ ٿو ملي ته ان جو مطلب اهو آهي ته پيل ڪٽ سوچ سبب آهي.

4 - جيڪڏهن اکين جي هيٺين حصي يا ان جي چوڌاري سوچ آهي ته پڇو ته ڇا ننڍ مان اُٿڻ کان پوءِ اها سوچ رهي ٿي، جيڪڏهن جواب ها ۾ آهي ته اها بيماريءَ جي علامت آهي.

5 - عورت کي آرام واري پوزيشن ۾ ويهاريو کيس چئو ته

ٻار جي دل جو ڌڙڪو (F.H.S)

- حمل جي 16 کان 18 هين هفتي کان پوءِ ٻار جي دل جو ڌڙڪو حمل جي 16 کان 18 هفتن کان پوءِ ٻڌي سگهجي ٿو.
- هڪ منٽ ۾ ٻار جي دل جي ڌڙڪي جي عام رفتار 120 کان 160 پيرن جي وچ ۾ ٿئي ٿي ۽ عام طور تي نارمل ٻار ۾ لڳ ڀڳ 140 پيرا في منٽ ٻڌي سگهجي ٿو.
- اوزار کي ماءُ جي پيٽ ۽ پنهنجي ڪن سان اهڙي ريت لڳايو جو ٻاهريون ڪو آواز يا گوڙ ٻڌڻ ۾ خلل نه وجهي.
- ڪن تي اوزار رکي اوزار تان هٽ هڻائي ڇڏيو ۽ واچ ڏانهن نهاريندي دل جو ڌڙڪو ڳڻڻ شروع ڪريو.
- حمل جي 16 کان 18 هين هفتي کان پوءِ ٻار جي دل جو ڌڙڪو ٻڌڻ جو طريقو
- سڀ کان پهرين عورت کان اجازت وٺي کيس صاف ستري بستري تي سڌو/ پٺ ڀر ليٽڻ ۾ مدد ڪريو.
- ڳوڙهاريءَ جي قميص اُڙهن تائين مٿي ڪريو.
- پنهنجي هٿن جي مدد سان ٻار جي چيلهه محسوس ڪريو. جنهن پاسي چيلهه هجي، ان پاسي ڏن جي چوڌاري دل جو ڌڙڪو ٻڌڻ واري اوزار (fetoscope) جي مدد سان ٻار جي دل جو ڌڙڪو ٻڌو.



تصوير 27: فيٽواسڪوپ ذريعي ٻار جي دل جو ڌڙڪو ٻڌڻ جو منظر

ٻار جو رُخ (Lie)

جڏهن ڳورهاريءَ جي پيٽ کي چُهو ته کيس اوهان جا هٿ ٿڌا نه لڳن ڇاڪاڻ جو پيٽ گرم هوندو آهي.

نوٽ: ليٽائڻ کان اڳ ڳورهاريءَ کي چئو ته هوءَ پيشاب ڪري وٺي ته جيئن پيٽ جو معائنو ڪرڻ دوران کيس پيشاب جي حاجت نه ٿئي.

معائنو

معائنو ڪرڻ کان پوءِ يوٽرس جي سائين ٻار جي پوزيشن، ٻار جي حرڪت ۽ جيڪڏهن گُک ۾ ٻار ڏکيو آهي ته ان جو پتو لڳي ويندو.

حمل جي 28هين هفتي کان پوءِ ڳورهاريءَ

جي پوزيشن

سڀ کان اڳ ۾ ڳورهاريءَ کي پنهنجي ڪم بابت ٻُڌايو. پوءِ ڪانٽس اجازت گهرو. جيڪڏهن سندس گهر معائنو ڪري رهيو آهيو ته ڌار ڪمري ۾ صاف ستري بستري تي کيس سڌو ليٽايو. مٿس صاف چادر وجهو فقط پيٽ جي مٿان قميص هٽايو تنگيون ۽ ڇاٽي اُگهاڙيون نه هئڻ گهرجن. ڳورهاريءَ جي ساڄي پاسي بيهو يا ويهي رهو. پوءِ پنهنجا ٻئي هٿ پاڻ ۾ رڳڙي گرم ڪريو ته جيئن



تصوير 28: هٿن ذريعي ٻار جي پوزيشن معلوم ڪرڻ جو طريقو

ٻار جي جسم جا حصا محسوس ٿيندا، محسوس ڪريو ته ڪهڙي پاسي ٻار جي چيلھ آهي ۽ ڪهڙي پاسي هٿ ۽ پير.

هڪ پاسي جيڪڏهن ٻار جي چيلھ محسوس ٿي رهي هوندي ته لازمي طور تي سندس هٿ ۽ پير ٻئي پاسي هٿڻ گهرجن. جيڪڏهن ٻنهي پاسي ٻار جي چيلھ محسوس نه ٿئي ته ان جو مطلب آهي ته ٻار جي چيلھ ماءُ جي چيلھ واري پاسي آهي. ڳورھاريءَ جي پوزيشن تبديل ڪريو يعني کيس چئو ته هوءَ ساڳي ريت لپتي رهي پر پنهنجا گوڏا موڙي ۽ اوهين پنهنجا هٿ پيٽ جي هيٺين حصي تي ساڳي ريت رکي جيئن اڳ ۾ رکيل هئا، محسوس ڪريو ته مٿي اوهان ڇا محسوس ڪيو هو ۽ هيٺ ڇا آهي.

جيڪڏهن ڪا گول ۽ سخت شيءِ ٿي محسوس ٿئي ته اهو ٻار جو مٿو هوندو. هٿ سان مٿي کي محسوس ڪري اهو ساڄي کاٻي ڦيرايو جيڪڏهن حرڪت ڪري ٿو ته ان جو مطلب اهو آهي ته اهو پيلوس جي اندر ناهي ۽ جيڪڏهن مٿو حرڪت نه ڪري ته ان جو مطلب آهي ته مٿو پيلوس ۾ ڦاسي پيو آهي ۽ جيڪڏهن هيٺ يا مٿي سخت شيءِ محسوس نه ٿئي ته ان جو مطلب آهي ته ٻار آڏو آهي.

- 1- جيڪڏهن پيٽ ۾ ٻار جي پوزيشن نارمل (vertex) آهي ته پيٽ هموار ۽ ٻاهر ڏانهن نڪتل نظر ايندو.
- 2- جيڪڏهن پيٽ عام سائيز کان وڌيڪ ڪشادو ۽ ويڪرو ٿو نظر اچي ته ٻار جي پوزيشن آڏي (transverse) آهي.
- 3- جيڪڏهن جاڙا ٻار آهن ته به پيٽ گهڻو ڪشادو ۽ ويڪرو نظر ايندو ۽ پيٽ جي اوچائي معمول کان وڌيڪ هوندي.

پيٽ ڇهڻ جو طريقو

جهڙيءَ ريت پهرين ٻڌايو ويو آهي ته معائنو ڪرڻ کان اڳ پنهنجا هٿ گرم ڪري وٺو ڳورھاريءَ جي ساڄي پاسي بيهو ان ريت اوهين ۽ ڳورھاري هڪٻئي جي آمهون سامهون هونديون. پنهنجا ٻئي هٿ پيٽ جي مٿان يوٽرس جي اوچائيءَ تي رکي پنهنجي آڱرين جي مدد سان يوٽرس جي چوٽاري معائنو ڪريو (palpate).

- 1- ٻار جا ڏڏا محسوس ڪريو اهي نرم محسوس ٿيندا. پر جيڪڏهن ٻار جي پوزيشن آڏي آهي ته يوٽرس جو مٿيون حصو خالي محسوس ٿيندو.
- 2- ساڳي ريت پنهنجا ٻئي هٿ پيٽ جي هيٺين حصي تي آڻيو هڪ هٿ سان ٻار کي پيٽ جي ٻئي پاسي ڌڪيو ۽ ان کي هٿ سان محسوس ڪريو اوهان کي

حمل دوران ڪهڙا چڪاس (Test) ضروري آهن؟

- رت ۾ هيموگلوبن جو مقدار (حمل دوران 2 کان 3 ڀيرا، خاص طور تي آخري ٽن ماهيءَ ۾ لازمي).
 - بلڊ گروپ (زندگيءَ ۾ هڪ ڀيرو خاص طور تي پهرين حمل ۾ ضروري آهي).
 - بلڊ شگر (حمل دوران گهٽ ۾ گهٽ هڪ ڀيرو).
 - پيشاب ۾ شگر ۽ پروٽين (ٻيءَ ۽ ٽن ماهيءَ ۾ هڪ ڀيرو).
 - بيا تيست جهڙوڪ الترا سائونڊ (جيڪڏهن ضرورت هجي ته).
- سڄي حمل دوران عورت جو وزن لڳ ڀڳ 12 ڪلو وڌندو آهي. شروعاتي 12 هفتن ۾ وزن وڌڻ جي رفتار گهٽ ۽ مختلف ٿئي ٿي. 16 کان 28هين هفتي ۾ لڳ ڀڳ 6 ڪلو وزن وڌندو آهي. 28هين هفتن کان پوءِ هر مهيني ۾ تقريبن 2 ڪلو وزن وڌندو آهي. جيڪڏهن هر مهيني وزن نه ڀيرو وڌي يا معمول کان گهڻو وڌي رهيو آهي ته ڳور هاريءَ کي اسپتال آڻائڻ جي ضرورت آهي.

عورتون جن ۾ حمل ۽ ويم دوران پيچيدگين جا خطرا / جوکم وڌيڪ ٿين ٿا (High Risk Pregnancies)

اهڙيون عورتون

- جن جو قد تمام گهڻو ننڍو هجي (4 فوٽ 8 انچ کان گهٽ) سندن ڏڏن جون هڏيون سوڙهيون هئڻ ڪري ويم واري عمل ۾ ڏکيائون پيش اچي سگهن ٿيون.
- جن جي ڄمار 18 سالن کان گهٽ هجي.
- جن جي ڄمار 35 سالن کان وڌيڪ هجي.
- جيڪي 5 يا وڌيڪ ڀيرا ڳورهايون ٿيون هجن. (هر هر حمل سبب ماءُ جي جسم ۾ رت جي ڪوٽ ۽ ويم کان پوءِ يوٽرس جي هڪدم نه سڪڙجڻ ڪري وڌيڪ رت وهڻ جو امڪان رهي ٿو).
- جن جو وزن تمام گهڻو يا گهٽ هجي (45 ڪلو کان گهٽ يا 80 ڪلو کان وڌيڪ).
- جن جي ڏڏ جي هڏين يا تنگن جي بناوت درست نه هجي.
- جن کي ڪا مستقل بيماري جهڙوڪ منا پيشاب، دل جي بيماري، هاءِ بلڊپريشر، دم / ساهه جي بيماري وغيره هجي.
- پوئين حمل ۾ بار جي پوزيشن صحيح نه رهي هجي.
- جن جي پوئين حمل جا نتيجا چڱا نه نڪتا هجن (بار مٿل / گهٽ وزن وارو ڄائو هجي).
- جن جا هڪٻئي پويان ٻه حمل ضايع ٿيا هجن.
- جن جو پوئين حمل دوران تمام گهڻو رت ضايع ٿيو هجي.
- جن جو آخري ويم سيزيرين سيڪشن ذريعي ٿيو هجي.
- جيڪي ٻن سالن کان گهٽ عرصي ۾ ٻيهر ڳور هاري ٿيون هجن.
- جن جي ڪُڪ ۾ جاڙا بار هجن.
- جن کي پوئين حمل ۾ ڪنهن قسم جي پيچيدگيءَ جو مُنهن ڏسڻو پيو هجي.
- جن ۾ رت جي ڪوٽ جون علامتون هجن.

حمل دوران تڪليفون ۽ انهن جو علاج

1- اُلتِيءَ ۽ جِيءَ ڪچو ٿيڻ

علاج

1. ڳورھاريءَ کي گھرجي ته سمھڻ مهل مٿي جي هيٺان اوچو ويھائڻ و رکي، ليٽڻ مهل مٿو باقي جسم جي پيٽ ۾ مٿي هٽڻ گھرجي.
2. پاڻي گھڻي مقدار ۾ پيئي ۽ کاڌي کان پوءِ پٺاڻ ڪري
3. وڌيڪ مرچن ۽ مصالحن واري کاڌن کان پرهيز ڪري

جيڪڏهن ڇاتيءَ ۾ ساڙو ۽ تڪليف وڌيڪ هجي ته هڪدم ڊاڪٽر سان لهه وچڙ ۾ اچي.

3- قبضي

قبضيءَ جي شڪايت به حمل دوران معدي ۽ آندڻ جي گھٽ حرڪت جي ڪري ٿئي ٿي.

علاج

1. عام ڏينهن جي پيٽ ۾ پاڻي ۽ ٻيا پاڻياٺ وڌيڪ مقدار ۾ واپرائجن.
2. کاڌي ۾ گھڻي پاڻي ريشي واريون شيون شامل ڪجن مثال طور اڇاڻيل اٽي جي ماني.
3. کاڌي ۾ سبزين ۽ ميون جو مقدار وڌائجي، خاص طور تي پنن واريون سبزيون.
4. حمل دوران قبضي توڙ شيون مثال طور ڪيسٽر آئل نه واپرائڻ گھرجي.

نوٽ: جيڪڏهن قبضيءَ جي شڪايت ڪيترن ئي ڏينهن تائين لاڳيتو رهي ٿي ته ڳورھاريءَ کي اسپتال آڻائڻو.

اها عام شڪايت آهي جيڪا گھڻي پاڻي هر ڳورھاريءَ کي پهرين ٽن مهينن دوران ٿيندي آهي. اُلتِيءَ ۽ جِيءَ ڪچو ٿيڻ جي شڪايت عام طور تي سڄي ڏينهن جي پيٽ ۾ صبح جو وڌيڪ ٿيندي آهي. شروعاتي ٽن مهينن دوران معمولي اُلتين خطري جي ڳالهه ناهي پر تمام گھڻيون ۽ مسلسل اُلتين ٿيڻ نقصانڪار آهي.

علاج

1. ڳورھاريءَ کي گھرجي ته صبح سوږي ٿي ڪا مٺي شيءِ جهڙوڪ ڪير، بسڪوٽ وغيره واپرائي پوءِ هڪ اڌ ڪلاڪ کان پوءِ ناشتو ڪري
2. پاڻي گھڻي مقدار ۾ پيئي پر کاڌي دوران هرهر پاڻي نه پيئي.
3. کاڌو وقفي وقفي سان کائي (هڪ وقت ۾ ٿورو مقدار پر هرهر).

ڪيس گھڻا روغني کاڌا نه کائڻ گھرجن، ان سان جِيءَ ڪچو ٿيڻ جي شڪايت وڌي سگھي ٿي.

نوٽ: جيڪڏهن تمام گھڻيون ۽ شديد قسم جون اُلتيون هجن يا حمل جي 3 مهينن کان پوءِ به اُلتيون جاري رهن ته پوءِ ڳورھاريءَ کي اسپتال آڻائڻ جي ضرورت آهي.

2- ڇاتيءَ جو ساڙو

حمل دوران معدي ۽ آندڻ جي حرڪت گھٽجي ويندي آهي ۽ هاضمي واري سرشتي ۾ تبديلي ايندي آهي، ان جي ڪري کاڌي کان پوءِ اڪثر ڇاتيءَ ۾ ساڙو ٿيندو آهي. بلڪل سڌو ليٽڻ يا اڳتي ڏانهن جهڪڻ تي اها شڪايت وڌي سگھي ٿي.

4- چيلهه ۾ سور

آهي. پر جيڪڏهن ان کان اڳ به ان قسم جي شڪايت رهي هجي ته پوءِ ڊاڪٽر وٽ ضرور وڃڻ گهرجي ته جيئن سور جي صحيح تشخيص ۽ علاج ٿي سگهي.

6- تنگن ۾ سور

حمل دوران ڳورھاريءَ جي تنگن ۾ سور جي شڪايت وڌي ويندي آهي، جنهن جا مختلف سبب ٿي سگهن ٿا.

علاج

1. ڳورھاري عورت کي تنگن جي ورزش ڪرايو.
 2. شديد سور جي صورت ۾ تنگن جي گرم پاڻيءَ سان ٽڪور ڪريو.
- نوٽ: شديد سور يا سوچ جي صورت ۾ ڳورھاريءَ کي اسپتال آڻايو.

حمل دوران چيلهه ۾ معمولي سور غلط پوزيشن ۾ ويهڻ جي ڪري ٿيندو آهي. ٻار جي واڌ ويجهه سان گڏوگڏ پيٽ اڳتي ڏانهن وڌيڪ نڪرندو آهي، جنهن جي ڪري ڪلهه پوئتي ڏانهن جهڪي ويندا آهن ۽ چيلهه ۾ سور شروع ٿي ويندو آهي.

علاج

1. ڳورھاريءَ کي وڌيڪ آرام ڪرڻ گھوڄي.
2. نرم بستري بدران ٿورڙي سخت بستري تي سمهڻ گھرجي.
3. ڏينهن جو آرام دوران چيلهه جي هيٺان ويهائڻو رکڻ گھرجي.

5- پيٽ ۾ سور

حمل جي آخري ٽن مهينن دوران ڳورھاريءَ کي اڪثر پيٽ جي سور جي شڪايت، ٻار جي چُرپر سبب ٿيندي

حمل دوران سارسنيال جا اهم نُڪتا

صلاح مشوري جي اهميت

- جيڪڏهن حمل دوران مڊوائف ڳورھاريءَ سان ملاقاتون ڪندي رهي ۽ کيس مشورا ڏيندي رهي ته ڳورھاري:
- حمل دوران پيش ايندڙ صورتحال لاءِ جسماني ۽ ذهني طور تي تيار رهندي.
- پنهنجو پاڻ کي تندرست محسوس ڪندي.
- وڃر دوران ۽ ان کان پوءِ ڪنهن گھربل ضرورت لاءِ مناسب اُپاءُ ڪري سگھندي.
- تازي ڄاول ٻار جي ضرورتن ۽ سارسنيال لاءِ هر طرح سان تيار رهندي.

پرپور خوراڪ

- ڳورھاري عورت جي هڪ ڏينهن واري خوراڪ ۾ 2500 ڪيلوريز هئڻ گھرجن.
- سٺي خوراڪ طاقت ڏئي ٿي ۽ بيمارين کان بچائي ٿي. ڄمندڙ ٻار جي صحتمند واڌ ويجهه لاءِ سٺي خوراڪ انتهائي ضروري آهي. ڳورھاري عورت پنهنجو پاڻ کي ۽ گُڪ ۾ پلجندڙ ٻار ٻنهي کي غذائيت فراهم ڪري ٿي. ياد رهي ته سٺي خوراڪ مان مطلب متوازن خوراڪ آهي نه ڪي مهانگي ۽ روغني خوراڪ.
- ڏينهن ۾ گھٽ ۾ گھٽ پنج ڀيرا کاڌو کائي:
- صبح جوناشو
- وڃر ۾ هلڪي خوراڪ
- منجهند جي ماني

— وڃر ۾ هلڪي خوراڪ

- رات جي ماني
- هڪ ڀيرو پيٽ ڀري کائڻ بدران ڪيترائي ڀيرا ٿورو ٿورو کائجي ته جيئن بدهضمي ۽ ڇاتيءَ ۾ ساڙو نه ٿئي.
- مصالحيدار يا روغني کاڌن جو استعمال ڇاتيءَ ۾ ساڙو يا بدهضمي ڪري سگھي ٿو. انهن کان پرھيز ڪجي.
- ڏينهن ۾ گھٽ ۾ گھٽ 8 گلاس پاڻي ۽ ٻيا سادا پاڻياٺ وغيره جهڙوڪ کير، پٽڙي لسي وغيره استعمال ڪريو. ان سان قبضيءَ جي شڪايت به نه رهندي.
- کاڌي ۾ ميوا، سبزيون ۽ ريشي واري خوراڪ استعمال ڪريو.
- کير، ڌوئڻو لسي ۽ ساون پنن واريون ڀاڄيون استعمال ڪريو ته جيئن جسم کي ڪيلشيئم ملي سگھي.
- خوراڪ سان گڏ روزانو فولڪ ايسڊ جون گوريون به استعمال ڪرڻ گھرجن.
- متوازن خوراڪ ۾ کير، بيضا، داليون، سبزيون، ميوا، چانور، ماني، گوشت، مڇي وغيره شامل آهن. پر انهن سڀني جو هڪ ئي وقت هئڻ ضروري ناهي ۽ مشورو ڏيڻ مهل انهن جي فراهمي ۽ خرچ جو خيال رکجي.
- ماءُ ۾ خوراڪ جي گھٽتائيءَ تي ٻار جواثر
- ماءُ ۾ خوراڪ جي گھٽتائي سبب، ٿيندڙ ٻار تي هيٺيان اثر پئجي سگھن ٿا:
- 1 — ٻار جو وزن ۽ قد گھٽ هوندو.

اڳي جاوا هجن، تن ۾ موت جي شرح ٻين جي پيٽ
مروڙيڪ ٿئي ٿي.

ذاتي صفائي

ڳورھاري عورت کي گهرجي ته پنهنجو جسم صاف
سٿرو رکي ته جيئن هوءَ حمل دوران صحتمند رهي ۽
بيمارين کان بچيل رهي.

2- ٻار وقت کان اڳي ڄمي سگهي ٿو.


3- غذائيت جي کوٽ جو شڪار ٿي سگهي ٿو.

4- قوت مدافعت جي کوٽ ٿي سگهي ٿي.

5- اڪثر بيمار ٿي سگهي ٿو.

6- ذهني طور تي بيمار ٿي سگهي ٿو.


اُهي ٻار جن جو وزن گهٽ هجي ۽ جيڪي وقت کان




تصوير 29: حمل ۽ ٽچ ڌارائڻ دوران صحتمند خوراڪ استعمال ڪرڻ گهرجي.

پنهنجي چمڙي خاص طور تي ڪاڪوس ۽ پيشاب
 وارين جاين کي صاف سٿرو رکجي.
 • خراب ڪپڙا ڏوٽي اُس ۾ سڪائجن.
 • هر پيري کاڌو کائڻ کان پوءِ گرڙي ڪجي ۽ ڏند صاف
 رکجن.

ان لاءِ ضروري آهي ته:
 • جيڪڏهن ممڪن هجي ته روزانو نه هفتي ۾ جيترا
 پيرا ممڪن هجي، وينجهجي.
 • آڱرين جا ٺنهن ننڍا رکجن.
 • ڪاڪوس ڪرڻ کان پوءِ ۽ کاڌي پيئي جي شين کي
 ڇهڻ کان اڳ هٿ صابن سان ڏوئجن.




ڪاڪوس پيشاب لاءِ پاڻي استعمال ڪريو



ڏندن کي روزانو برش يا مسواڪ سان صاف ڪريو



ڪاڪوس پيشاب کان پوءِ صاف پاڻي سان هٿ ڏوٽو ۽
 صاف نوال يا هوا ۾ خشڪ ڪريو.



ننڍا ۽ صاف ٺنهن صحت لاءِ ضروري آهن



روزانو وينجهڻ سٺي ڳالهه آهي، جيڪڏهن ممڪن نه
 هجي ته هفتي ۾ گهٽ ۾ گهٽ ٻه ڀيرا وينجهو.






پاڻي ڍڪيل تانن ۾ محفوظ ڪريو ۽ پنهنجي رهڻ جي
 جاءِ کي صاف سٿرو رکڻو

تصوير 30: ذاتي صفائي ۽ صحت جي حفاظت جو خيال رکڻ سان نه رڳو عام ڏينهن ۾ پر حمل ۽ وڃر دوران
 به صحتمند رهڻ ۾ مدد ملي ٿي.

آرام

- آرام ڪرڻ مهل ڪاٻي پاسي ڀر ليٽجي.
- گهڻي دير بيٺڻ کان پرهيز ڪجي. جيڪڏهن بيٺڻ ضروري هجي ته ڪوشش ڪريو ته اُتي ئي بيٺي بيٺي تنگن ۽ پيرن کي حرڪت ڏيو.
- هلڪي ڦلڪي ورزش ڪريو جنهن جو بهترين طريقو ٿورڙي فاصلي تائين پसार ڪرڻ آهي.
- حمل جي آخري ٻن تن مهينن دوران سخت ۽ ٽڪائيندڙ ڪم وقت کان اڳي وڃي ۽ ٻار جي واڌ ويجهه تي اثر وجهڻ جو سبب بڻجي ٿو.
- ڳورهاريءَ لاءِ آرام انتهائي ضروري آهي. پر ان سان گڏوگڏ روزمره جون مصروفيتون يا هلڪي ڦلڪي ورزش به انتهائي اهم آهي.
- ڳورهاريءَ کي روزانو ڏينهن ۾ هڪ ٻه ڪلاڪ ليٽي آرام ڪرڻ گهرجي.
- ڏينهن جو ليٽي آرام ڪرڻ سان ڳورهاري پنهنجي پيرن ۽ تنگن تي سوچ گهٽائي سگهي ٿي.
- ڏينهن ۾ جيترا پيرا ويهڻ ممڪن هجي، پيرا پيا ڪري رهي.



تصوير 31: حمل دوران ماءُ کي وڌ کان وڌ آرام ڪرڻ گهرجي.

جهٽڪن جا ٽڪا

حمل دوران ماءُ کي جهٽڪن کان بچاءُ جا ٽڪا هٿائڻ انتهائي ضروري آهي. ٽڪن جو ڪورس پهرين حمل کان ئي شروع ڪرڻ گهرجي. هڪ ڀيرو 5 ٽڪن جو ڪورس مڪمل ٿيڻ کان پوءِ هر حمل ۾ ٽڪو هٿائڻو نه پوندو آهي.

ٽڪن جو ڪورس

- 1- پهريون ٽڪو: حمل جو پتو لڳندي ئي
 - 2- ٻيو ٽڪو: پهرين ٽڪي جي هڪ مهيني کان پوءِ
 - 3- ٽيون ٽڪو: ٻئي ٽڪي جي ڇهن مهينن کان پوءِ
 - 4- چوٿون ٽڪو: ٽين ٽڪي جي هڪ سال کان پوءِ
 - 5- پنجون ٽڪو: چوٿين ٽڪي جي هڪ سال کان پوءِ
- نوٽ: جيڪڏهن حمل کان اڳ ڪڏهن ڪو ٽڪو نه لڳو آهي ته حمل جي ستين يا اٺين مهيني ۾ پهريون ۽ ان جي هڪ مهيني ۾ پهريون ۽ ان جي هڪ مهيني کان پوءِ ٻيو ٽڪو لڳرايو (باقي ٽڪا مٿين طريقي موجب لڳندا).
- جيڪڏهن حمل کان اڳ هڪ يا ٻه ٽڪا لڳي چڪا آهن ته حمل جي ستين يا اٺين مهيني ۾ هڪ ٽڪو (باقي ٽڪن لاءِ مٿين طريقي تي عمل ڪريو).

ٽيڇ

تازي ڄاول ٻار لاءِ پهرين خوراڪ ماءُ جي ٽيڇ آهي. قرآن پاڪ ۾ الله سائين جو حڪم آهي، ”مائرون پنهنجي

ٻارن کي ٻن سالن تائين پنهنجي ٽيڇ ڌارين. “ حمل دوران مڊوائف ڳورھاريءَ کي ذهني ۽ جسماني طور تي ٻار کي پنهنجي ٽيڇ ڌارين لاءِ تيار ڪري ۽ ماءُ ۽ ٻار لاءِ ان جا فائدا ڳڻائي.

- وڃر کان هڪدم پوءِ ٻار کي ماءُ جي ڇاتيءَ سان لڳايو.
- ٻار جي ماءُ جي اُڙھ چوسڻ سان يوٽرس سڪڙبو آهي ۽ ان ريت اوڙو سولائيءَ سان ٻاهر اچي ويندي آهي ۽ يوٽرس مان به گهڻو رت نه وهندو آهي.
- ماءُ جي پهرين ٽيڇ ڪولسٽرم سڏبي آهي جيڪا ٻار لاءِ بهترين ۽ مڪمل خوراڪ آهي. اها ٻار کي بيمارين کان محفوظ ٿي رکي.
- ڄمڻ کان ترٽ پوءِ ٻار کي ماءُ جي ڇاتيءَ سان لڳائڻ ڪري ٻار کي حرارت ۽ گرمي پهچي ٿي جيڪا سندس زندگي ۽ صحت لاءِ ضروري آهي.
- ماءُ ۽ ٻار جو تعلق سگهارو ٿئي ٿو.
- ڇهن مهينن تائين ٻار کي فقط ۽ فقط ٽيڇ پيارڻ گهرجي.
- ٻار کي ڄمڻ کان ستت پوءِ ڪا گهٽي / ڦڪي ڏيڻ هاجيڪار ٿئي ٿو.
- وڃر کان پوءِ شروع جي چئن کان ڇهن مهينن تائين ٻار کي فقط پنهنجي ٽيڇ ڏيڻ سان ماءُ نئين حمل کان محفوظ ٿي رهي.

محفوظ ويمر جي تياري

- حمل ۾ ماءُ جي سارسنيال دوران ڳورهاريءَ کي محفوظ ويمر لاءِ ضروري شين بابت ٻڌايو وڃي ته جيئن هوءَ ويمر کان اڳ سمورين گهريل شين جو مناسب استعمال ڪري وٺي.
 - ڪنهن به هنگامي صورتحال ۾ اسپتال وڃڻ جي اجازت ۽ مناسب رقم جو انتظام ۽ سواريءَ جو بندوبست.
 - ويمر لاءِ مناسب روشن ۽ صاف ڪمر.
 - وڇاڻڻ لاءِ صاف ڇادرون.
 - ٻار لاءِ موسم آهر صاف ڪپڙا ۽ ويڙهڻ واري ڇادر.
 - رات جو استعمال ڪرڻ لاءِ ڪا لالٽين (بجلي نه هئڻ جي صورت ۾).
 - پاڻي گرم ڪرڻ جو انتظام ۽ صابن.
 - برٽ ڪٽ (غير استعمال شده) جي استعمال کي يقيني بنائڻ.
 - ويمر لاءِ استعمال ٿيندڙ شين کي جيوڙن کان محفوظ ڪرڻ.
 - ويمر جا سور شروع ٿيڻ مهل ماءُ کي وينجهي سينجهي صاف سٿرو هڻڻ گهرجي.
- ايندڙ حمل وچ ۾ وقفو**
- حمل دوران ان ڳالهه جي ضرورت آهي ته ڳورهاريءَ کي ايندڙ حمل ۾ وقفي بابت ڄاڻ ڏجي ته جيئن هوءَ پنهنجي ٻار جي بهتر طور تي پرورش ڪري سگهي ۽ پنهنجي صحت به برقرار رکي سگهي.
- ٻن ٻارن جي جنم ۾ 2 کان 3 سالن جو وقفو ضروري آهي ته جيئن ماءُ حمل ۽ ويمر دوران وڃايل سگهه بحال ڪري سگهي ۽ ٻارن جي پالنا بهتر طريقي سان ڪري سگهي.
 - ٻار کي شروعاتي ڇنڻ کان ڇهن مهينن تائين باقاعدي سان فقط ۽ فقط پنهنجي ٿڃ ڌارائڻ سان ايندڙ حمل ۾ وقفو اچي ٿو پر اهو يقيني طريقي سان ڳورهاريءَ کي وقفي جي مختلف طريقن کان واقف ڪيو وڃي.
 - وقفي جي طريقن بابت ٻڌايو ته اهي ڪهڙيءَ ريت استعمال ٿيندا آهن.
 - ڳورهاريءَ کي ٻڌايو ته هوءَ ان ڏس ۾ پنهنجي مڙس سان ضرور صلاح مشورو ڪري.
- حمل دوران خطري جون علامتون**
- خطرناڪ علامتن جو مطلب آهي ته ماءُ ۽ ٻار جي صحت کي انتهائي خطرو آهي.
- 1- هيڊورنگ / اينيميا
 - 2- رت وهڻ، رت جا داغ لڳڻ يا عورتاڻي عضوي تي ڳاڙهاڻ
 - 3- عورتاڻي عضوي مان بدبودار مواد خارج ٿيڻ
 - 4- ٽين مهيني کان پوءِ به آلتيون جاري رهن
 - 5- ٻيٽ ۽ هيٺين حصي ۾ شديد سور
 - 6- مٿي ۾ شديد سور نظر ڏنڻ لڳي ٿيڻ، ڦيري اچڻ، هٿن ۽ پيرن تي سوڄ

رت جي ڪوٽ وارو خطرو ڪهڙين مائرن ۾ وڌيڪ هوندو آهي

- مردن جي پيٽ ۾ عورتن ۾ رت جي ڪوٽ وڌيڪ ٿئي ٿي، جنهن جا هيٺيان سبب ٿين ٿا:
- 1- ڳور هاري عورتن کي گهٽ خوراڪ ملندي هجي.
 - 2- حمل دوران وقفي وقفي سان رت ايندو هجي.
 - 3- ويهر جا سور گهڻي دير تائين رهن ۽ ان دوران رت ضايع ٿئي.
 - 4- بنا وقفي جي حمل ٿيڻ.
 - 5- ٻه يا وڌيڪ ڀيرا حمل ضايع ٿيا هجن.
 - 6- ٽيڇ ڌارائيندڙ مائرون.
 - 7- ماهوريءَ جو وڌيڪ اچڻ.

رت جي ڪوٽ جون علامتون

- 1- اکين ۾ اڇاڻ.
- 2- ٽڪاوٽ ۽ ڪمزوري.
- 3- ساهه ڀرجڻ.
- 4- دل جو تيز ڌڙڪو گهٻراهٽ.
- 5- مٿي جو سور هر هر بخار ٿيڻ.

رت جي شديد ڪوٽ جون علامتون

- 1- عورت جي اڇاڻ مائل بي رونق رنگت.
- 2- هر مهل ٽڪيل رهڻ.
- 3- ساهه ڦوڪجڻ.
- 4- دل جو تيز تيز ڌڙڪڻ.
- 5- نبض جي رفتار 80 في منٽ کان وڌيڪ ٿي وڃڻ.
- 6- ٻڪ نه لڳڻ.
- 7- ڦيري ٿيڻ.
- 8- اکين آڏو اونڊاهي ڇانئجڻ.
- 9- جسم تي معمولي سوڄ.

رت جي ڪوٽ چڪاس

- 1- اکين جي هيٺين ڇيڙن جو اندريون حصو ڏسو انهن جو رنگ جيڪڏهن گلابي آهي ته نيڪ آهي، جيڪڏهن اڇاڻ مائل ۽ هلڪو گلابي آهي ته رت جي ڪوٽ آهي. (تصوير 32)
- 2- هٿ ترين جو رنگ ڏسو، گلابي آهن ته نيڪ آهي، جيڪڏهن هلڪيون گلابي ۽ اڇيون آهن ته رت جي ڪوٽ آهي. جيڪڏهن اوهاڻ کي پنهنجي هيٺو گلوبين جي مقدار جو پتو آهي ته پنهنجي هٿن جي رنگ جي ڳور هاريءَ جي هٿن جي رنگ سان پيٽ ڪريو ان سان به پتو لڳي ويندو ته رت جي ڪوٽ آهي يا نه.
- 3- ننهن جو معائنو ڪريو. ننهن کي دٻائي ڇڏي ڏيو ۽ ڏسو ته اهي ٻيهر تيزيءَ سان رت سان ڀرجي ٿا وڃن يا ان ۾ دير ٿي لڳي. انهن جو رنگ ڪيئن آهي، جيڪڏهن جلدي رت سان ڀرجي وڃن ۽ رنگ گلابي هجي ته نيڪ آهي پر دير سان ڀرجن ۽ رنگ به هلڪو گلابي ۽ اڇو هجي ته پوءِ رت جي ڪوٽ آهي.



تصوير 32: اکين جي رنگت جو اندازو ڇيڙن جي اندرين حصي کي ڏسڻ سان ٿئي ٿو.

- جيڪڏهن ڳورھاريءَ ۾ هيٺوگلوبين 8 گرام کان گهٽ آهي ته روزانو جيڪتوفر انجيكشن ڏهن ڏينهن تائين هٿاڻ جو مشورو ڏيو.

فولاد جي گورين جا فائدا

- 1- فولاد جون گورين کائڻ سان ڳورھاريءَ ۾ رت جي ڪوٽ نه ٿيندي جنهن ڪري سندس صحت بهتر رهندي
- 2- ڳورھاري رت جي ڪوٽ سبب هر هر بيمار نه ٿيندي
- 3- فولاد جي گورين سبب ٻار تندرست ڄمندو آهي ۽ سندس زندگيءَ جي شروعاتي سالن ۾ کيس رت جي ڪوٽ نه ٿيندي جنهن ڪري هو بيمارين کان محفوظ رهندو.
- 4- فولاد جون گورين استعمال ڪرڻ سان وڃر دوران وڌيڪ رت وهڻ جي شڪايت نه ٿيندي

فولاد جي گورين جا ضمني اثر

- 1- اُلتِي يا جيءُ ڪچو ٿيڻ جي شڪايت ٿي سگهي ٿي
- 2- پيٽ ۾ سور وٺڻ يا پيٽ جي خرابي ٿي سگهي ٿي
- 3- ڪاڪوس جو رنگ ڪارو ٿي ويندو آهي جن عورتن ۾ فولاد جي گورين جا ضمني اثر ظاهر ٿين، تن کي گهرجي ته اُهي فولاد جون گورين کاڌي پيئي جي وچ ۾ استعمال ڪن، ان سان سندس شڪايت گهٽجي ويندي

رت ۾ هيٺوگلوبين جا چرچ جو طريقو

- سڀ کان پهرين پنهنجا هٿ صابن ۽ پاڻيءَ سان ڌوئي خشڪ ڪري استعمال ڪري ڦٽو ٿيندڙ دستانا پايو.
- هيٺوگلوبينو ميٽر جو اسٽينڊ ڪڍي ٻاهر کڻو ڪريو.
- HB ٽيوب ۾ 20 سيڪڙو هائيڊرو ڪلورڪ ايسڊ، ڊراپر ذريعي وجهو.

رت جي ڪوٽ کان بچاءُ جون احتياطي

تدبيرون

1- اضافي خوراڪ

ڳورھاريءَ لاءِ انتهائي ضروري آهي ته هوءَ پنهنجي خوراڪ ۾ اضافو ڪري جيڪڏهن پهرين هڪ ماني کائيندي هئي ته هاڻ کيس ٻه مانيون کائڻ گهرجن، هڪ پنهنجي لاءِ ۽ ٻي ڪُڪ ۾ پلجندڙ ٻار لاءِ. ڳورھاريءَ کي پنهنجي خوراڪ ۾ ٻيٽي ڪرڻ گهرجي، ڇاڪاڻ جو هاڻ سندس ذميوار آهي ته هوءَ پاڻ ۾ ۽ ٿيندڙ ٻار ۾ رت جي ڪوٽ ٿيڻ کان بچي.

2- فولاد واري خوراڪ

ڳورھاريءَ کي گهرجي ته هوءَ حمل دوران اهڙي خوراڪ استعمال ڪري جنهن ۾ فولاد جو مناسب مقدار موجود هجي، جهڙوڪ:

- 1- گوشت (هڪري ڍڳي، مرغِي، مڇي وغيره)
- 2- داليون
- 3- سبزيون (ساڳ، پالڪ، قلفو، واڱڻ)
- 4- خشڪ ميوو (ڪشمش، ڪجور وغيره)
- 5- ميوو (صوف، ڏاڙهون وغيره)
- 6- بيضا

دوائن ذريعي رت جي ڪوٽ ختم ڪرڻ

- فيرس سلفيٽ 180 mg جون گورين ڏينهن ۾ ٻه کان ٽي ڀيرا، مانيءَ کان پوءِ.
- فولڪ ايسڊ 5 mg هڪ گوري روزانو.
- فولاد جي گوريءَ کي هضم ڪرڻ ۾ وٽامن سي مدد ڏئي ٿي. ان ڪري ميون جي شڪل ۾ وٽامن سي وڌ کان وڌ مقدار ۾ کائو.
- اڄڪلهه مارڪيٽ ۾ اهڙيون گورين به ملن ٿيون جن ۾ فولاد ۽ وٽامن سي هٽي ملن ٿا.

احتياط

- ڳورھاري عورت جي ڌوتل کابي هٿ جي وچئين آڱر کي ٿيڻ ڪرڻ واري پنهنجي کابي هٿ ۾ سوڳهو ڪري جهليو ۽ آڱر جي پور تي لانسٽ سان سوراخ ڪري پيٽ سان 0.02 ml رت ڇڪيو ۽ ان کي HB ٽيوب ۾ وجهي لوڏيو. ٻه منٽ انتظار ڪريو ته جيئن رت ايسڊ ۾ چڱي ريت ملي وڃي.
 - HB ٽيوب ۾ ڊراپر سان ڊسٽلڊ واٽر اوسٽائين وجهنديون رهو جيستائين اسٽينڊ ۾ لڳل ٻنهي پاسن وارن ٽيوين جا رنگ هڪجهڙا نه ٿي وڃن.
 - اهو معياري رنگ هوندو. هاڻ وري HB ٽيوب تي هيڊي رنگ سان لکيل گرام سيڪڙو نمبر ڏسي هيموگلوبين ريڪارڊ ڪريو. اهوئي هيموگلوبين جو مقدار هوندو.
- 1- آڱر ۾ فقط هڪ ڀيرو سوراخ ڪريو
 - 2- اسپرٽ سان آڱر صاف ڪريو جيڪڏهن اسپرٽ موجود ناهي ته تهڪايل صاف پاڻيءَ ۾ ڪپهه ٻوڙي آڱر صاف ڪريو
 - 3- دستانا ضرور چاڙهيو ته جيئن آڱر ۾ سوراخ ڪندي پنهنجو پاڻ کي سُئي لڳڻ کان بچائي سگهيو.
 - 4- جيڪڏهن طبي ڪارڪن جي پنهنجي آڱر ۾ سُئي لڳي پوي يا استعمال ٿيل سُئي لڳي پوي ته جلد کان جلد صابن ۽ پاڻي يا اسپرٽ سان هٿ ڌوئي صاف ڪريو.

حمل دوران شديد نوعيت جون پيچيدگيون

- وڌيڪ رت ضايع ٿيڻ جي صورت ۾ رت جي ٻن کان چئن بوتلن جي ضرورت پئجي سگهي ٿي، جنهن لاءِ ڳورهاريءَ جي گهر وارن کي تيار ڪريو ۽ گهر ڀاتين کي رت جو عطيو ڏيڻ لاءِ همٿايو.

سوچ

- جسم جي ريشن ۾ اضافي ڀاڱي جمع ٿيڻ سان متاثر ٿيل حصي جو ڦوڪجي وڃڻ.



تصوير 33: ڳورهاريءَ جي جسم ۾ سوچ جو اندازو سندس پيرن مان ڪري سگهجي ٿو.

- حمل دوران رت وهڻ يا داڳ

(ante-partum hemorrhage)

- حمل دوران دورا، جهٽڪا

(pre-eclampsia/ eclampsia)

- يوٽرس کان ٻاهر حمل جي واڌ ويجهه

(ectopic pregnancy)

- صدمو (shock)

حمل جي 28هين هفتي (ستين مهيني) کان

اڳ رت وهڻ جي صورت ۾ ٿيندڙ آڀاءُ

- جيڪڏهن عورت وڌيڪ رت وهڻ سبب صدمي ۾ آهي ته هڪدم اسپتال آڻائڻ جو انتظام ڪريو ۽ ان دوران صدمي جي سارسنيال موجب آڀاءُ وٺو. ان سان گڏوگڏ:
- عورتاڻي عضوي مان ضايع ٿيندڙ رت جو مقدار ڄاڻيو.
- آءِ وي لائين هڻو. نارمل سلائين يا رنگرليڪٽيٽ يا هيمپڪسل جيڪڏهن مريض صدمي ۾ هجي ته ڊرپ جي رفتار تيز رکو.
- جيڪڏهن سور ٿي رهيو هجي ته انجيڪشن ڊڪلوفينينڪ 75 ملي گرام ڏونري ۾ هڻو.
- هسٽري ۽ معائني مان حمل ضايع ٿيڻ جي قسم جو تعين ڪريو ته جيئن ان موجب علاج ڪري سگهجي.
- مڊوائف پاڙي/ ڳوٺ جي سطح تائين محدود سهولت پهچائي سگهي ٿي. ابتدائي سارسنيال کان پوءِ ضرورت هجي ته مريض اسپتال آڻايو.

پيشاب ۾ پروٽين چيڪ ڪرڻ جو طريقو

ٽهڪائڻ جو طريقو	ڊپ اسٽڪ طريقو
• ٽيسٽ ٽيوب ۾ پيشاب وجهي، ٽيسٽ ٽيوب جي مٿين حصي کي شعلي سان گرم ڪريو ايسٽائين جو اُهو تهڪڻ لڳي. تهڪي ويل حصو ڏنڊلو به ٿي سگهي ٿو. • ٽيسٽ ٽيوب ۾ ايسٽيڪ ايسڊ جا 3/2 ڦڙا وجهو. • جيڪڏهن تهڪايل حصي جو ڏنڊلو پڻ برقرار رهي يا ايسٽيڪ ايسڊ وجهڻ سان اُهو ڏنڊلو ٿي وڃي ته ان جو مطلب آهي ته پيشاب ۾ پروٽين موجود آهي. • جيڪڏهن پيشاب صاف ٿورهي يا ان جو ڏنڊلو پڻ ختم ٿي وڃي ته ان جو مطلب آهي ته پيشاب ۾ پروٽين ناهي.	• ڊپ اسٽڪ کي پيشاب ۾ ٻوڙيو. • ڊپ اسٽڪ کي ٻاهر ڪڍي ان جي بوتل تي ڏنل رنگن واري چارٽ سان پيٽيو. • هيڊي رنگ کان سائورنگ: پروٽين موجود ناهي. • نيرو رنگ: پروٽين موجود آهي.

- عام طور تي نارمل حمل دوران به ڳورهارين جي پيرن تي سوچ ٿي ويندي آهي. خاص طور تي شام مهل، ان ڪري اها پري ايڪليمپسيا جي ڪا اعتبار جوڳي علامت ناهي.
- چاهي يا هٿن تي سوچ پري ايڪليمپسيا جي علامت آهي.
- ڪڏهن ڪڏهن سوچ ڪنهن مخصوص حصي تي ظاهر نه ٿيندي آهي پر ڳورهاريءَ جو وزن اوچتو وڌي ويندو آهي، مثال طور هڪ هفتي ۾ هڪ ڪلوگرام يا ان کان وڌيڪ وزن وڌڻ (عام طور تي هڪ هفتي ۾ اڌ ڪلو وزن وڌندو آهي) ان ريت وزن جو وڌڻ پري ايڪليمپسيا جي نشاندهي ٿو ڪري.

ٽن مرحلن جي دير

حمل ۽ ويم دوران موتن جو وڏو سبب

ٻي دير

مناسب طبي سهولتن جي نشاندهي ۽ انهن تائين پهچڻ ۾ دير

اها دير ڳورھاريءَ کي طبي امداد لاءِ وٺي وڃڻ جو فيصلو ڪرڻ کان پوءِ صحت مرڪز يا اسپتال جي نشاندهي ڪرڻ ۽ ان تائين پهچڻ ۾ ٿئي ٿي.

سبب

1- طبي سهولتن جي هوند ۽ انهن جو ماڳ (اهي ڪٿي آهن)

2- فاصلو (گهر کان صحت مرڪز/ اسپتال جو)

- سفر ۾ ڪيترو وقت لڳندو.
- رستو/ موسم

3- آمدرفت جا ذريعا

- سولائيءَ سان دستيابي

4- ڪرايو

- جيڪڏهن ڪرايو وڌيڪ آهي ۽ گهر وارن وٽ ايترا پئسا ڏوڪڙ ناهن ته به دير ٿي سگهي ٿي.

ٽئين دير

مناسب سهولتن ۽ پريور علاج جي فراهمي ۾ دير

اها دير ڳورھاريءَ جي اسپتال پهچڻ کان پوءِ ڪيس

تڪڙي ۽ مناسب علاج جي فراهمي ۾ ٿئي ٿي.

پهرين دير

پيچيدگيءَ جي سڃاڻپ ۽ سهولتون استعمال ڪرڻ واري فيصلي ۾ دير

اها دير حمل يا ويم دوران ٿيندڙ ڪنهن پيچيدگيءَ کي سڃاڻڻ ۾ ۽ اهو فيصلو ڪرڻ ۾ ٿيندي آهي ته هاڻ ڳورھاريءَ کي طبي امداد لاءِ ڪنهن صحت مرڪز يا اسپتال وٺي وڃڻ گهرجي.

سبب

سماجي

1- بيماريءَ جي نوعيت

پيچيدگين جي سڃاڻپ ۽ انهن جي شدت جو اندازو نه هوندو آهي.

2- عورت جي حيثيت

— ڪيس گهر کان ٻاهر نڪرڻ جي ڪيتري آزادي آهي؟

— اُن معاشري ۾ عورت جي صحت جو ڪهڙو قدر آهي؟

— عورت جي تعليم.

3- اسپتال جي ڪارڪردگي/ پوئين ڪارڪردگيءَ جو

تجربو/ اسپتال جي معيار بابت ماڻهن جي راءِ.

4- خلوت (privacy) جو انتظام ۽ احترام.

معاشي

- ڪٽنب/ عورت وٽ پئسا ڏوڪڙ گهڻا آهن.

- اسپتال ۾ علاج جا خرچ پري سگهڻ جي سگهه.

سبب

اسپتال ۾ معياري علاج معالجي ۾ دير

- 1- اسپتال جي عملي جو رويو
- 2- اسپتال جو طريقي کار (جهڙوڪ داخلا مهل واري جو انتظار ۽ رجسٽرن ۾ اندراج جهڙا معاملو).
- 3- اسپتال ۾ تربيت يافتہ عملي، ضروري طبي سهولتن ۽ دوائن / اوزارن جي دستيابي.
- 4- انتظار ڪرڻ جو عرصو (سهولتون ملڻ لاءِ ڪيتري دير انتظار ٿو ڪرڻو پوي).
- 5- اسپتال جو عملو ڪيترو ڌڻ ۽ فرض شناس آهي.
- 6- مقامي روايتن جي پٺڀرائي، مثال طور عورتن جي معائني لاءِ ليڊي ڊاڪٽر جو لازمي هئڻ.
- 7- خاص ڌيان (مرض جي نوعيت موجب مريض کي ترجيحي بنيادن تي چڪاسڻ).

ٽن ديرن کي منهن ڏيڻ جي حڪمت عملي

صحت ڪميٽي ٺاهڻ

- صحت ڪميٽي هيٺين فردن تي ٻڌل ٿي سگهي ٿي:
- مقامي سماجي تنظيم (CBO) جو هڪ عيوضي ۽ علائقي جا بااثر فرد جيڪي ان ڏس ۾ دلچسپي رکن.
- پاڙي / ڳوٺ ۾ موجود صحت ڪارڪن / مڊوائف.

صحت ڪميٽيءَ جون ذميواريون

- صحت ڪميٽيءَ کي پنهنجي ڳوٺ / پاڙي لاءِ هڪ طريقي ڪار طئي ڪرڻ گهرجي ته حمل ۽ ويم دوران ڪنهن عورت کي پيچيدگي ٿي پوي ته کيس جلد کان جلد ويجهي اسپتال تائين ڪيئن اُماڻبو. ان ڏس ۾ هيٺيان معاملو طئي ڪري سگهجن ٿا:

- ويجهي ترين صحت مرڪز جي نشاندهي
- صحت مرڪز جي انتظاميه سان رابطو
- صحت مرڪز تي ٿيندڙ علاج جي خرچن جو ڪاٺو
- صحت مرڪز تائين فاصلو ۽ ٽرانسپورٽ جا خرچ

- ٽرانسپورٽ لاءِ 24 ڪلاڪ گاڏيءَ جي موجودگي
- ڪنهن هنگامي صورتحال ۾ رٿم جي دستيابي
- ريفر ڪرڻ جو طريقي ڪار
- مڊوائف يا صحت ڪارڪن ۾ خطرناڪ علامتن جي وقت سر سڃاڻپ جي صلاحيت
- علائقي واسين ۾ صحت جي حوالي سان سڃاڻپ ۽ جان لاءِ صحت جا تعليمي سيشن ڪرائڻ.

الف: عام هدايتون

- هنگامي صورتحال ۾ ڪنهن کي گهرائڻو آهي.
- سڀ کان پهرين اهو فيصلو ڪريو ته ڪنهن کي گهرائڻ جي ضرورت آهي يا مريض کي ڪيڏانهن وٺي وڃڻ جي ضرورت آهي ته جيئن مريض کي شروعاتي طبي امداد ڏئي سگهجي.
- جيڪڏهن اوهين سمجهو ٿيون ته ڪنهن کي گهرائڻ جي ضرورت آهي ته پوءِ هيٺين ڳالهين تي غور ڪريو:
 - طبي امداد کان اڳ
 - اهو فرد ڪيترو پري آهي؟
 - اُن مهل موجود آهي يا نه. ٽڪڙي طبي امداد ڏيڻ لاءِ وٽس سامان سڙو ۽ دوائون موجود آهن يا نه؟

طبي امداد کان پوءِ جڏهن اهو فيصلو ڪريو ته

مريض کي منتقل ڪرڻو آهي ته پوءِ ڏسو ته:

- ڊاڪٽر جي ڪلينڪ يا اسپتال گهڻو پري آهي؟
- هن مهل اُتي ڪير موجود هوندو؟
- اُتي ڪهڙيون سهولتون ميسر آهن؟

جڏهن اهو فيصلو ڪري وٺو ته مريض کي منتقل

ڪرڻ ضروري آهي ته پوءِ اهو ڏسو ته

- ڪهڙيءَ ريت منتقل ڪرڻو آهي؟
- ڪهڙي سواري موجود آهي؟

رڪو ان ريت زبان به ڪڇڻ کان بچي پوندي ۽ ساهه ڪڍڻ
پر به سولائي ٿيندي

پوزيشن

سفر دوران ڳورهاريءَ کي آرام واري حالت ۾ لڻايو ته جيئن کيس گهٽ کان گهٽ تڪليف ٿئي. سندس مٿو يا چهره ٿورو پاسيرو رکو. جيڪڏهن رت وهي رهيو آهي ۽ هوءَ نون مهينن جي ڳورهاري آهي ته پير مٿي نه ڪريو ۽ پاسيرو لڻايو. جيڪڏهن وڃي ٿي چڪو آهي ته پيرن کي مٿي کان ٿورو مٿي رکو.

دراڻيور لاءِ هدايتون

- دراڻيور غير ضروري دير نه ڪري
- دراڻيور کي مختصر ترين رستي جو پتو هئڻ گهرجي.
- دراڻيور کي اسپتال، اسپتال جي عملي، ليبر روم، رت ۽ دوائن جي انتظام بابت پتو هئڻ گهرجي. ڇاڪاڻ جو ڪڏهن ڪڏهن مريض ڪي ڏوراهين علائقي مان آندو ويندو آهي ۽ گهر پاتين کي شهر بابت ڪا گهڻي ڄاڻ نه هوندي آهي. اهڙي صورت ۾ دراڻيور سندن مدد ڪري سگهي ٿو.
- مريض ڪي گاڏيءَ ۾ آرام واريءَ حالت ۾ لڻايو ۽ گاڏي انتهائي احتياط سان هلايو.
- سفر دوران ڪنهن امڪاني خطري جي صورت ۾ مريض سان گڏ ويندڙ همراهن ۽ دراڻيور کي طبي امداد بابت ڄاڻ هئڻ گهرجي.
- جيڪڏهن سفر دوران گاڏيءَ ۾ ڪا خرابي ٿي پوي ته دراڻيور ۾ اها هڪدم نيڪ ڪرڻ جي صلاحيت هئڻ گهرجي.

- دراڻيور موجود آهي؟
- سواري پهچڻ ۾ ڪيترو وقت لڳندو؟
- سواريءَ جو پاڙو ڪيترو ٿيندو؟
- گڏ ڪير ويندو؟
- ان کان پوءِ اهو فيصلو ڪريو ته ڪهڙي سواري سولائيءَ سان ۽ جلدي ملي سگهي ٿي.

ب: خاص هدايتون

- پاڻياٺ ڏينديون رهو (پيئڻ لاءِ ڪانه ڪا شيءِ مسلسل ڏينديون رهو)
- جيڪڏهن آءٌ وي لائين لڳائي ڇڏي آهي ته ڳورهاريءَ کي سفر دوران يعني اسپتال ويندي به اها رستي ۾ لڳي رهڻ ڏيو ان جو خيال رکو ته ڊرپ نڪري نه وڃي.
- جيڪڏهن آءٌ وي لائين نه لڳائي آهي ۽ ڳورهاري هوش ۾ آهي ته وات ذريعي موسم پٽاندر پاڻياٺ ڏينديون رهو ته جيئن کيس صدمي يا بيهوشيءَ ۾ وڃڻ کان بچائي سگهجي.

ساهه جو رستو

اها پڪ ڪري وٺو ته عورت جون ڪ ۽ وات صاف آهن ۽ ساهه جو رستو کليل آهي ۽ هوءَ ساهه ڪڍي رهي آهي. ڇڪاسيو ته جيڪڏهن سندس نڪ يا وات ۾ ڪا شيءِ آهي ته تڙ تڪڙ ۾ پنهنجي آڱرين جي مدد سان اها ٻاهر ڪڍي نڪ. وات صاف ڪريو ته جيئن کيس ساهه ڪڍڻ ۾ ڪا ڏڪيائي نه ٿئي. جيڪڏهن ساهه ڪڍڻ ۾ ڏڪيائي ٿي رهي هجي ته پوءِ ايترو استعمال ڪريو. ايترو نه هئڻ جي صورت ۾ چمچي جي ڏانڊيءَ تي صاف ڪپڙو ويڙهي ڳورهاريءَ جي وات ۾ ڏندن جي وچ ۾ زبان جي هڪ پاسي

ويمر جي جاءِ ۽ ڪمري کي جيوڻن کان پاڪ ڪرڻ جو طريقو

- بسترو ميز ۽ استعمال ۾ ايندڙ ٻيون شيون ڪپڙي سان صاف ڪريو. جيڪڏهن اهي شيون ناهن ۽ ويمر زمين تي ڪرائڻو آهي ته فرش ڏوئي وٺو.
- پاڻي ۽ صابن سان هٿ چڱي ريت ڏوئي وٺو.
- هٿن کي هوا ۾ خشڪ ٿيڻ ڏيو.
- جڏهن فرش خشڪ ٿي وڃي ته جوتا لاهي اندر وڃو.
- ضرورت کان سواءِ ٻاهر نه وڃو.
- ويمر ۾ اوهان جو هٿ وٺائيندڙ کي به جيوڻن کان پاڪ هٿن گهرجي. هو به اوهان وانگر هٿ ڏوئي ۽ جوتا لاهي ڪمري ۾ اچي.

ويمر جي جاءِ ۽ بسترو تيار ڪرڻ
ويمر لاءِ اهڙو ڪمرو چونڊيو جيڪو صاف سترو


کليل، هوادار ۽ روشن هجي. بسترو ڪمري جي هڪ پاسي لڳايو. دروازي ۽ دريءَ پٺيان نه لڳايو ڇاڪاڻ جو انهن جي کلڻ سان ايندڙ هوا ڳور هاري ۽ ٻار لاءِ هاجيڪار ٿي سگهي ٿي.

- ويمر واري ڪمري مان غير ضروري ماڻهن کي ڪڍي ڇڏيو. ڇاڪاڻ جو وڌيڪ ماڻهن جي موجودگي ۾ ڳور هاري پريشان ۽ لهجي ٿيندي.

- جيوڻن کان پاڪ استعمال ۾ ايندڙ شيون ڪنهن صاف ستري ميز تي ترتيب سان رکي. جيڪڏهن ميز نه هجي ته ڪنهن صاف جاءِ تي صاف اخبار يا ڪپڙو وڇائي اهو سامان رکي.

- ويمر لاءِ بسترو کٽ تي وڇائجي ته بهتر آهي پر جيڪڏهن کٽ ناهي ته زمين تي به وڇائي سگهجي ٿو.

- سڀ کان پهرين پٿرائي يا ميٽرس تي اڳيئي ڌوئل ۽ هوا ۽ اُس ۾ خشڪ ڪيل چادر وڇايو.



تصوير 34: ويمر ڪرائڻ لاءِ هنن شين جي ضرورت هوندي آهي



- پنهنجي صاف هٿن سان پلاسٽڪ جي چادر ڪڍي بستري تي اهڙي نموني سان وڇايو جواها عورت جي چيلھ کان تنگن جي هيٺ تائين اچي وڃي. هاڻ ويڻ لاءِ جيوڙن کان پاڪ جاءِ ۽ بسترو تيار آهن.

هٿن کي جيوڙن کان پاڪ ڪرڻ

- سڀ کان پهرين صاف پاڻي ۽ صابن کڻي جيڪڏهن پائيوڊين سلوشن آهي ته بهتر ٿيندو.
- سمورا زيور لاهي ڇڏيو جهڙوڪ گھڙي چوڙيون، منڊي وغيره ته جيئن هٿ ڌوڻ ۾ سولائي ٿئي ڇاڪاڻ جو انهن اندر مير ۽ جيوڙا موجود هوندا آهن. پنهنجا لائڻ زيور ڪنهن محفوظ جاءِ تي رکي.
- پنهنجا نهنن ڪپيو.
- ڪڙتي جا ڪف نونين کان مٿي چاڙهيو.

تصوير 36: جيوڙن کان حفاظت لاءِ ڌوڻ هٿ هوا ۾ خشڪ ڪرڻ سڀ کان بهتر طريقو آهي.

- صابن يا جيڪڏهن پائيوڊين سلوشن آهي ته ان سان پنهنجا هٿ چڱيءَ ريت مهتي ڌوڻو.
- جيڪڏهن اوهان وٽ نلڪو يا وهندڙ پاڻي ناهي ته پنهنجي ساٿيءَ کي چئو ته هو هٿ ڌوڻائڻ ۾ اوهان جي مدد ڪري.
- پنهنجي هٿن ۽ ٻانهن تي چڱيءَ طرح صابن هڻو هٿن جي آڱرين، ترين، انهن جي پٺ ۽ ٻانهن کي گھٽ ۾ گھٽ 20 سيڪنڊ مهتيو جيڪڏهن نرم برش موجود آهي ته نهنن ۽ هٿن کي ان سان صاف ڪريو.
- اها پڪ ڪريو ته آڱرين کان نونين تائين هٿن کي چڱيءَ ريت صاف ڪري ورتو اٿو پوءِ پاڻي وجهي چڱيءَ ريت ڌوڻو ۽ پڪ ڪريو ته هٿ بلڪل صاف ٿي ويا آهن.
- هٿ صاف ڪرڻ کان پوءِ ڪنهن غير صاف شيءِ کي ڇهڻ کان پاسو ڪريو.



تصوير 35: ويڻ ڪرائڻ کان اڳ مڊوائف کي پنهنجا هٿ چڱيءَ ريت ڌوڻ گھرجن.

پارٽو گراف

- لفظ پارٽو گراف (partograph) انگريزيءَ جي ٻن لفظن، پارٽوريشن (parturition) يعني ويم ۽ گراف (graph) يعني اهڙو خاڪو جنهن ۾ ليڪن ذريعي ڪنهن عمل جا لاها ڇاڙها واضع ڪيا وڃن، سان گڏجي ٺهيو آهي.
- اهو خاڪو 1970ع کان استعمال ڪيو پيو وڃي ته جيئن اهڙي ويم جي عمل جي نشاندهي ٿي سگهي، جنهن جي پيش رفت معمول موجب نه ٿي رهي هجي.

پارٽو گراف جي اهميت ۽ استعمال

- 1- پارٽو گراف هڪ اهڙو ذريعو آهي جنهن وسيلي ويم جي عمل جي پيش رفت ۽ ان دوران ماءُ ۽ ٻار جي ڪيفيتن جي اهم پاسن کي ريكارڊ ڪيو ويندو آهي.
- 2- ويم جو عمل تيز ڪرڻ لاءِ مناسب وقت جي نشاندهي ڪري سگهجي ٿي.
- 3- ويم جي عمل ۾ رڪاوٽ هئڻ کان گهڻو اڳ پيلوس ۽ ٻار جي مٿي ۾ مناسب تناسب نه هئڻ جو پتو لڳي ٿو وڃي.
- 4- پارٽو گراف جو استعمال ”جلدي خبردار ڪندڙ نظام“ طور ڪيو ويندو آهي.
- 5- پارٽو گراف جي استعمال سان ويم جي عمل دوران ماءُ کي منتقل ڪرڻ، ويم جو عمل تيز ڪرڻ يا ختم ڪرڻ وارو فيصلو جلدي يا وقت سر ڪري سگهجي ٿو.

- 6- ان جي مدد سان ويم واري عمل دوران ماءُ ۽ ٻار ٻنهي کي بهتر طور تي ۽ باقاعدي مشاهدي هيٺ رکي سگهجي ٿو.
- 7- ماءُ يا ٻار کي لاڳو خطرن جي جلدي نشاندهي ٿي سگهي ٿي.
- 8- ان جو استعمال گهٽ خرچ، اثرائتو ۽ عملي طور تي هر قسم جي ماحول ۾ مفيد ۽ ڪارگر آهي.
- 9- ان جي استعمال سان ويم جو عمل ڊگهو ٿيڻ کان بچي سگهجي ٿو. آپريشن جي ضرورت گهٽ پوي ٿي ۽ تازي ڄاول ٻارن ۾ پيچيدگيون به گهٽ ٿين ٿيون.

پارٽو گراف جا بنيادي اصول

- ويم جي عمل جو فعال مرحلو سرويڪس جي 4 سينٽي ميٽرن تائين ڪلڻ تي شروع ٿيندو آهي.
- ويم جي عمل جو پهريون يا پوئين مرحلو 8 ڪلاڪن کان وڌيڪ عرصي تائين نه هلڻ گهرجي.
- فعال ويم جي عمل ۾ سرويڪس ڪلڻ جي رفتار هڪ سينٽي ميٽر في ڪلاڪ کان گهٽ نه هئڻ گهرجي.
- اندروني معائنو گهٽ کان گهٽ ۽ فقط هڪ ڀيرو ڪريو جيترو ڪنهن محفوظ ويم لاءِ ضروري هجي (چئن ڪلاڪن ۾ فقط هڪ ڀيرو اندروني معائنو ڪرڻ جو مشورو ڏنو ويو آهي).
- مڊوائف لاءِ بهتر ٿيندو ته پنهنجي طور تي پارٽو گراف ٺاهڻ بدران اڳيئي ڇپيل معياري پارٽو گراف استعمال ڪري ته جيئن مختلف ليڪون ٺاهڻ ۾ ڪا غلطي نه ٿئي.

صحت جي عالمي تنظيم جو ماڊل پارٽو گراف

Name	Gravida	Para	Hospital number
Date of admission	Time of admission		Ruptured membranes
hours			

Fetal Heart rate

Amniotic Fluid Moulding

Cervix (cm) (Plot X)

Descent of head (Plot O)

Hours

Time

Contractions per 10 mins

Oxytocin given U/L drops/min

Drugs given and IV fluids

Pulse and BP

Temp °C

Urine

ٽیلھي ڦاٽڻ جي نتيجي ۾ خارج ٿيندڙ پاڻي (amniotic fluid)

خارج ٿيندڙ پاڻي جو رنگ، هر اندروني معائني تي نوٽ ڪريو ۽ درج ڪريو. هيٺ ڏنل انگريزي اکرن (B, M, C, I) سان ڪيفيت ريكارڊ ڪريو:
Intact = I: اڃان ٽيلھي ثابت آھي (ڦاٽي ناھي)
Clear = C: صاف پاڻي خارج ٿيڻ (ٽيلھي ڦاٽڻ کان پوءِ)
Meconium = M: ميڪونيم گاڏڙ وارو پاڻي خارج ٿيڻ (ٽيلھي ڦاٽڻ کان پوءِ)
Blood = B: رت جي گاڏڙ وارو پاڻي خارج ٿيڻ (ٽيلھي ڦاٽڻ کان پوءِ)

ٻار جي مٿي جي چوڌاري وارين ھڏين جو

ھڪٻئي تي وري اچڻ

ٻار جو مٿو جڏهن ماءُ جي پيلوس اندر اچي ويندو آھي ته سندس ھڏين جا جوڙا ھڪ ٻئي جي بلڪل ويجهو اچي ويندا آھن ۽ انھن جا ڪنارا ھڪٻئي تي وري ايندا آھن. ان ريت ٻار جو مٿو ماءُ جي ڏڏي واري ھڏيءَ اندر گھڙي ويندو آھي يا پنھنجي جاءِ ٺاھيندو آھي.

ھينيون ڳالھيون ريكارڊ ڪريو:

1. ھڏين جا جوڙا ھڪٻئي جي سامھون آھن.
2. ھڏين جي جوڙن جا ڪنارا ھڪٻئي جي مٿان اچي ويا آھن پر پوئتي ھٽائي سگھجن ٿا.
3. ھڏين جي جوڙن جا ڪنارا ھڪٻئي جي مٿان اچي ويا آھن پر پوئتي نه ٿا ھٽائي سگھجن ٿا.

سرويڪس جو ڪلڻ هر اندروني معائني تي ان جي ڇاڇ لھو ۽ X نشان سان ان کي پارٽو گراف تي ريكارڊ ڪريو. پارٽو گراف تي 4 سينٽي ميٽرن سان نشان لڳائڻ شروع ڪريو.

ويمر جي پھرين مرحلي جا ٻہ حصا ٿين ٿا

1. تاخير مرحلو (latent phase)

- سرويڪس جي آھستي رفتار سان ڪلڻ جو عرصو جنھن ۾ سرويڪس ٻڙيءَ کان ٽي سينٽي ميٽر ڪلي ٿو ۽ آھستي آھستي پڪڙجي ختم ٿيڻ (effacement) شروع ٿيندو آھي.
- ڪنٽريڪشن ھلڪا ۽ بي قاعدي ھوندا آھن.
- اھو مرحلو ڇھن کان آٺ ڪلاڪ ھلندو آھي.

2. فعال مرحلو (active phase)

- سرويڪس جي تيز رفتاريءَ سان ڪلڻ جو عرصو ٽن سينٽي ميٽرن کان ڏھن سينٽي ميٽرن تائين.
- ليبر تيز ۽ باقاعدي.
- فعال مرحلي ۾ پھرين ويمر واري عورت (primigravida) ۾ سرويڪس ڪلڻ جي رفتار ھڪ سينٽي ميٽر في ڪلاڪ ۽ ھڪ کان وڌيڪ ويمر ڪرايل عورت ۾ 1.5 سينٽي ميٽر في ڪلاڪ ٿئي ٿي.

پارٽو گراف تي درج ٿيندڙ ڄاڻ

ماءُ بابت ڄاڻ

- نالو
- ھيل تائين ٿيل ڪُل حمل
- جيئرن ٻارن جو تعداد
- اسپتال جو رجسٽريشن نمبر
- داخلا جي تاريخ ۽ وقت
- پاڻيءَ جي ٽيلھي ڦاٽڻ جو وقت

ٻار جي دل جي ڌڙڪي جي رفتار

- ھر اڌ ڪلاڪ کان پوءِ ريكارڊ ڪريو.

ډنل دوائون، ڪابه اضافي ډنل دوا ريڪارڊ ڪريو.
نبض، هر 30 منٽن کان پوءِ نڪتي (۰) واري نشان
سان ريڪارڊ ڪريو.

بلڊپريشر، هر چئن ڪلاڪن کان پوءِ تير جي نشان
سان ريڪارڊ ڪريو.

گرمي ڊاٻه هر ٻن ڪلاڪن کان پوءِ ريڪارڊ ڪريو.
پروٽين، ايسي ٽون مقدار جڏهن ماءُ پيشاب ڪري ت
انهن شين بابت چيڪ ڪري ريڪارڊ ڪريو.

پارٽو گراف ٺاهڻ مهل ياد رکڻ جهڙيون ڳالهيون

- ٻار جو مٿو هيٺ اچڻ جو اندازو هميشه اندروني معائنو
ڪرڻ کان اڳ پيٽ جي معائني سان ڪريو.
- ٻار جو مٿو هيٺ اچڻ جو نشان پڙي سان لڳايو.
- سرويڪس جي مهاڙ ڪلڻ جو نشان X سان لڳايو.
- جڏهن ڳورهاري فعال مرحلي دوران اسپتال ۾ داخل
ٿيندي آهي ته سندس سرويڪس جي ڪلڻ جي سائيز
جو نشان ”چٽاءُ واري ليڪ“ تي لڳايو.
- اسپتال يا صحت مرڪز ۾ داخلا جو وقت ”زير و
تائيم“ هوندو آهي، جڏهن عورت ويڙ جي پوشيڊي
مرحلي ۾ هوندي آهي.
- جڏهن ويڙ جو عمل پوشيڊي کان فعال مرحلي ۾ ايندو
آهي ته سرويڪس ڪلڻ جو نشان هڪدم چٽاءُ واري
ليڪ جي فعال حصي تي منتقل ڪيو ويندو آهي.

چٽاءُ واري ليڪ هيءُ ليڪ سرويڪس جي چار
سينٽي ميٽر ڪلڻ کان شروع ٿي مڪمل طور تي يعني ڏهه
سينٽي ميٽر ڪلڻ تائين هوندي آهي ۽ ان جو ڪلڻ هڪ
سينٽي ميٽر في ڪلاڪ جي رفتار سان ٿيندو آهي.

عمل واري ليڪ، هيءُ ليڪ چٽاءُ واري ليڪ جي
متوازي ساڄي پاسي 4 ڪلاڪن جي وٿيءَ سان ٿيندي
آهي.

مٿو هيٺ اچڻ ان جي جاچ پيٽ تي محسوس ڪرڻ
سان ٿيندي آهي.

ڪلاڪ، ان مان مطلب اهو وقت آهي جيڪو ويڙ جي
فعال مرحلو شروع ٿيڻ کان پوءِ گذري چڪو آهي. (نوت
ڪيل يا اندازو لڳايل)

وقت اصل مشاهدي جو وقت ريڪارڊ ڪريو.

ڪنٽريڪشن هر اڌ ڪلاڪ کان پوءِ ريڪارڊ ڪريو.
پيٽ تي هٿ رکي ڏهن منٽن اندر ٿيندڙ ڪنٽريڪشن
محسوس ڪري ڳڻيو ۽ هر ڪنٽريڪشن جو عرصو
سيڪنڊن ۾ لھو:

• 20 سيڪنڊن کان گهٽ عرصو

• 20 کان 40 سيڪنڊن جو عرصو

• 40 سيڪنڊن کان وڌيڪ جو عرصو

آڪسي ٽوسن، آڪسي ٽوسن دوا جي مقدار ۾ ډنل
پاڻياٺ ۾ في منٽ ڦڙن جو تعداد هر اڌ ڪلاڪ کان پوءِ
(جڏهن دوا ڏني پئي ويندي هجي)

پارٽو گراف تي ويم جا سوريڪارڊ ڪرڻ

- خانن کي 1 کان 5 تائين جانمبر ڏنا ويندا آهن.
- هر خانو هڪ ڪنٽريڪشن ظاهر ٿو ڪري ان ڪري جيڪڏهن 10 منتن جي وٿيءَ ۾ ڪنٽريڪشن ٿيا آهن ته ٻن خانن کي شيڊ هڻو.
- 10 منتن جي وٿيءَ ۾ ٽينڊر ڪنٽريڪشن جو تعداد ريكارڊ ڪريو.
- جيڪڏهن سرويڪس ڪلڻ جو نشان ”چٽاءُ واري ليڪ“ جي ساڄي پاسي اچڻ لڳي ته اهو چٽاءُ آهي ته ويم جو عمل ڊگهو ٿي سگهي ٿو.

سار سنڀال

- ماءُ کي پاڻياٺ پيئڻ لاءِ ڏيو ته جيئن منجهس پاڻيءَ جي کوٽ نه ٿئي ۽ ڏنل ۽ خارج ٿيل پاڻياٺ جو چارٽ ٺاهيو.
- ماءُ کي آڪسيجن فراهم ڪريو.
- مٿان کي خالي رکڻ يقيني بڻايو.
- ويم جي سڄي عمل کي جيوئن کان محفوظ رکڻ جو يقيني انتظام ڪريو.
- جيڪڏهن ڪارڊيو ٽوڪوگراف مشين هجي ته ٻار جي دل جو ڌڙڪو ۽ ڪنٽريڪشن ريكارڊ ڪريو.
- ويم جو عمل تيز ڪرڻ لاءِ آڪسي ٽو سن استعمال ڪريو ۽ فارسيپ يا ويڪيوم جي مدد سان ويم ڪرايو.
- ڪنٽريڪشن جو عرصو ريكارڊ ڪرڻ
- خاني اندر نڪتا هلڪي ڪنٽريڪشن جي نشاندهي ٿا ڪن، هڪ ڪنٽريڪشن 20 سيڪنڊن کان گهٽ عرصي وارو.
- آڏي ليڪ وچولي نوعيت جو ڪنٽريڪشن ظاهر ڪري ٿي، هڪ ڪنٽريڪشن جو عرصو 20 کان 30 سيڪنڊ.
- مڪمل ڪاري رنگ وارو تيز ڪنٽريڪشن ظاهر ڪري ٿو، هڪ ڪنٽريڪشن جو عرصو 40 سيڪنڊن کان وڌيڪ.

سرويڪس ڪلڻ جي رفتار جو ”عمل واري

ليڪ“ تي هڻڻ

- ”عمل واري ليڪ“ 4 ڪلاڪن جي فرق سان ”چٽاءُ واري ليڪ“ جي ساڄي پاسي.
- جيڪڏهن سرويڪس ڪلڻ جي رفتار ”عمل واري ليڪ“ تي اچي وڃي ته دير ٿيڻ جي سبب جو تعين ڪريو ۽ تڪڙو ٻاءُ وٺو.
- سرويڪس ڪلڻ جي رفتار جو ”چٽاءُ واري ليڪ“ جي ساڄي پاسي اچڻ
- جيڪڏهن سرويڪس معمولي رفتار سان ڪلي ٿو ته ان جو نشان چٽاءُ واري ليڪ جي مٿان يا ان جي کاٻي پاسي ٿوري.

سار سنڀال


- صحت مرڪز تي موجود ڊاڪٽر کي اطلاع ڪريو.

- ماءُ جي حالت ٻيهر جاڇيو ۽ سروپڪس ڪلڻ ۾ دير
- ماءُ جي سبب جو تعين ڪريو.
- ماءُ کي آڪسيجن ڏيو
- ٻار جي دل جو ڌڙڪو ۽ ڪنٽريڪشن مسلسل
- ريكارڊ ڪريو
- ماءُ کي نس ذريعي پاڻياٺ ڏينديون رهو ۽ وات ذريعي
- کاڌو پيئڻ بند ڪرايو س.
- ماءُ کي ڏنل پاڻياٺ ۽ ٻين شين ۽ سندس جسم مان
- خارج ٿيندڙ شين جو چارٽ ٺاهيو.
- هنگامي طور تي رت جو بندوبست ڪريو
- پيشاب ۾ مٺاڻ ۽ پروٽين جي موجودگيءَ جو پتو لڳايو
- جيڪڏهن ماءُ جي حالت ۾ بهتري نه اچي ته آپريشن
- جي تياري ڪريو.

ويم دوران ٿيندڙ پيچيدگيون


- ويم ۾ دير يا ويم جي رڪاوٽ
- بار جو ڏکيائي ۾ هئڻ
- ڪورڊ سامهون اچڻ ۽ ويم کان اڳ ڪورڊ جو ٻاهر اچڻ
- ويم دوران بار جا گلهه ڦاسي پوڻ
- اوڙ جو يوٽرس اندر رهجي وڃڻ
- يوٽرس جو ڦاٽي پوڻ
- يوٽرس، عورتاڻي عضوي يا پيرينيم جو زخم يا چير.

يوٽرس ۾ ٻار جون مختلف حالتون




تصوير 37: يوٽرس ۾ عام طور تي حمل جي آخري ڏينهن ۾ ٻار مٿي ڏانهن هوندو آهي پر ڪڏهن ڪڏهن ٻار مختلف طريقن سان به ظاهر ٿيندو آهي. مٿين شڪلين ۾ ٻار جون مختلف حالتون ڏيکاريل آهن. شڪل A ۽ B ۾ ويجهه طريقن سان ٿي سگهي ٿو جڏهن ته شڪل C, D, ۽ E ۾ آپريشن ضروري آهي.


چهن قسمن جون پريزنٽيشنون




شکل: A ورتيڪس




شکل: B پرو




شکل: C فيس



شکل: D




شکل: E



شکل: F

تصوير 38: ٻارمٽي جي مختلف پوزيشنون سان پيلوس ۾ داخل ٿي سگهي ٿو. شکل A ۽ D جي صورت ۾ عورتاڻي عضوي رستي عام ويڙهي ٿي سگهي ٿو جڏهن ته B, C, E ۽ F ۾ سيزرين سيڪشن جي ضرورت پوندي

سيفيلڪ يا هيڊپريزيٽيشن جون مختلف صورتون



شڪل: D فيس


شڪل: C برو

شڪل: B ورتيڪس
(مٿو جهڪيل ناهي)


شڪل: A ورتيڪس
(مٿو چڱي طرح
جهڪيل آهي)

تصوير 39: مٿين تصويرن ۾ مٿي ۽ ڳچيءَ جو تناسب ڏيکاريل آهي. حمل دوران شڪل A ۽ B عام صورتون آهن ۽ ويڙهي عورتاڻي عضوي رستي عام طريقي سان ٿي سگهي ٿو جڏهن ته شڪل C ۽ D ۾ عام ويڙهي ممڪن ناهي.


بريچ (ڏڏ ڀر) پريزنٽيشن جون مختلف حالتون




شڪل: A فرينڪ بريچ



شڪل: B مڪمل بريچ




شڪل: C ڦٽ لنگ پريزنٽيشن




شڪل: D ٺي پريزنٽيشن

تصوير 40: بريچ (ڏڏ ڀر) پريزنٽيشن جون مختلف حالتون. بريچ پريزنٽيشن جي صورت ۾ ماءُ کي هڪدم اسپتال آڻڻ گهرجي. مڊوائف گهر تي بريچ ويڙهڪرائڻ جي ڪوشش نه ڪري

بريچ پريزنٽيشن جون 6 حالتون



شڪل B: ڪاٻي سيڪروپوسٽيريئر




شڪل A: ساڄي سيڪروپوسٽيريئر




شڪل D: ڪاٻي سيڪروليٿرل



شڪل C: ساڄي سيڪروليٿرل




شڪل F: ڪاٻي سيڪروانٽيريئر



شڪل E: ساڄي سيڪروانٽيريئر


تصوير 41: جيڪڏهن ٻار بريچ هجي ته ماءُ کي هر صورت ۾ اهڙي اسپتال ۾ آڻجي جتي آپريشن جون سهولتون موجود هجن.

فيس پريزنٽيشن جون 6 مختلف حالتون




شڪل A: ساڄي مينٽوپوسٽيريئر

شڪل B: کاٻي مينٽوپوسٽيريئر



شڪل C: ساڄي مينٽوليٽرل

شڪل D: کاٻي مينٽوليٽرل




شڪل E: ساڄي مينٽوانٽيريئر


شڪل F: کاٻي مينٽوانٽيريئر

تصوير 42: مٿين صورتن ۾ ٻه ڳور هاريءَ کي هڪدم اهڙي اسپتال آڻائجي جتي آپريشن جي سهولت موجود هجي.

ويم ڪان اڳ ڄاڻن ٻارن جي پريزنٽيشن



شڪل B: پهريون ٻار مٿي ڀر ۽ پيو ڏڏ ڀر آهي




شڪل A: ٻئي ٻار مٿي ڀر آهن




شڪل D: ٻئي ڏڏ ڀر آهن



شڪل C: پهريون ٻار مٿي ڀر ۽ پيو آڏو آهي




شڪل F: پهريون ٻار ڏڏ ڀر ۽ پيو آڏو آهي



شڪل E: پهريون ٻار مٿي ڀر ۽ پيو آڏو آهي

تصوير 43: ڄاڻن ٻارن جي صورت ۾ ويم اسپتال ۾ ٿيڻ گهرجي. ٻئي ٻار جي ڄمڻ ۾ مسئلا ٿي سگهن ٿا. جنهن لاءِ آپريشن لازمي هوندو.


ورتيڪس پريزنٽيشن جون 6 حالتون




شڪل A: ڪاٻي
اوڪسي پيٽوانٽيرير




شڪل B: ساڄي
اوڪسي پيٽوانٽيرير




شڪل C: ڪاٻي
اوڪسي پيٽوليٽرل



شڪل D: ساڄي
اوڪسي پيٽوليٽرل




شڪل E: ڪاٻي
اوڪسي پيٽوپوسٽيرير



شڪل F: ساڄي
اوڪسي پيٽوپوسٽيرير


تصوير 44: مٿين صورتن ۾ عورتاڻي عضوي رستي عام ويڙهي سگهي ٿو.



تصوير 45: هن تصوير ۾ ورتيڪس جون ڇھ پوزيشنون ڏيکاريل آهن، ان سان گڏ اها سيڪڙو شرح آهي جيڪا عورتن ۾ ٿئي ٿي.


(left occipito anterior)	ايل او اي = ليفٽ اوڪسي پيٽوائينٽيريئر
(Left occipito Lateral)	ايل او ايل = ليفٽ اوڪسي پيٽوليتئرل
(Left occipito Posterior)	ايل او پي = ليفٽ اوڪسي پيٽوپوسٽيريئر
(Right occipito anterior)	آراو آي = رائٽ اوڪسي پيٽوائينٽيريئر
(Right occipito Lateral)	آراو ايل = رائٽ اوڪسي پيٽوليتئرل
(Right occipito Posterior)	آراو پي = رائٽ اوڪسي پيٽوپوسٽيريئر

ويم ڪان اڳ ڳور هاريءَ جو معائنو




تصوير 46: ورتيڪس پريزنٽيشن جو پتو لڳائڻ لاءِ پيلوڪ پيل پيشين واري طريقي سان معائنو ڪيو پيو وڃي. مٿي جو واضع اُڀار (سنسي پٽ) فيٽس جي پُٺ جي پوئين پاسي موجود هوندو. مڊاوائف کي گهرجي ته ڌيان، احتياط ۽ ذميواريءَ سان عورت جو معائنو ڪري ڪابه غير معمولي صورتحال نظر اچي ته هڪدم ڊاڪٽر سان رابطو ڪرڻ گهرجي.

ويمر کان اڳ ڳور هاريءَ جو معائنو (هلندڙ)



تصوير 47: پيلوڪ پيل پيشن۔ جيڪڏهن هٿ درست پوزيشن ۾ رکيا وڃن ته انهن جا پڪڙيل آڱوٺا ڏن پير سان هڪ ٻئي پير سان هوندا. آڱرين جو رخ هيٺ ۽ اندر ڏانهن رهندو.

ويمر کان اڳ ڳور هاريءَ جو معائنو (هلندڙ)




تصوير 48: زي في سترنم هيٺان ويڪرائپ جي رُخ تي آڱريون رکي فندبس جي اوچائي ماپي پئي وڃي. ان طريقي سان ٻار جي واڌ ويجهه جو صحيح اندازو لڳائي سگهجي ٿو.

ويمر کان اڳ ڳور هاريءَ جو معائنو (هلندڙ)




تصوير 49: فنڊل پيل پيشن_ بئي هٿ تريون فنڊس جي ٻنهي پاسن آهن، ويجهي ويجهي جڙيل آڱرين جي مدد سان يوٽرس جي مٿين سري کي محسوس ڪيو پيو وڃي.

ويمر کان اڳ ڳورھاريءَ جو معائنو (هلندڙ)



تصوير 50: ليٽرل پيل پيشن۔ مڊوائف هٿ ڏن جي سطح جي متوازي يوٽرس جي ٻنهي پاسن رکيا آهن، ٻنهي هٿن سان واري واري دٻاءُ وڌو ويندو آهي.

ويم کان اڳ ڳورھاريءَ جو معائنو (ھلندڙ)




تصوير 51: پولڪ مينوئر وارو طريقو مڊوائف ساڃي ھٿ جي گرفت سان يوٽرس جو هيٺيون حصو پڪڙيل آھي ۽ سندس رُخ ماءُ جي مٿي ڏانھن آھي.

ويمر کان اڳ ڳور هاريءَ جو معائنو (هلندڙ)




تصوير 52: آلي ذريعي ٻار جي دل جي مخصوص ڌڙڪن ٻڌي پئي وڃي. ٻار جي پوزيشن ورٽيڪس ليفٽ اوڪسي پيٽواينٽير يئر آهي.

ويمر کان اڳ ڳور هاريءَ جو معائنو (هلندڙ)




تصوير 53: پوترس جي پٺ جو پتو لڳائڻ لاءِ مڊوائف آڱرين جا ٻل پيرن
جيان ”هلائي“ رهي آهي.


ويم جو عمل ۽ فيٽس جي مٿي جي پوزيشن




تصوير 54: شکل A اينڊرائڊ پيلوس جو ٻاهريون رستو ٻار جو مٿو اڪيوت پيوڪ آرچ ۾ نه پيو سماءجي ۽ پوئتي ڏانهن پيرينيئم تي زور ٿو وجهي. شکل B گائنا ڪوائڊ پيلوس جو ٻاهريون رستو مٿو پيوڪ آرچ ۾ سولائيءَ سان سماءجي وڃي ٿو.



تصوير 55: ٻار جو مٿو تنگ رستي مان گذرڻ دوران.



تصوير 56: پيلوس ڪينال مان لنگهڻ مهل فٽس جو مٿو انهن مختلف هنڌن تي بيهندو آهي. پيلوس ڪينال ۾ ڪنهن به قسم جي غير معمولي صورتحال سبب ويڙ ۾ دير ٿي سگهي ٿي.



تصوير 57: پيلوس جو وچيون سيڪشن جنهن ۾ اينٽيرويڪل سٽيريو قطر ڏيکاريل آهي.


اينٽيرويڪل سٽيريو

اوليڪ


ٽرانس ورس

ڪنارو		11	12	13
خالي جاء		12	12	12
ٻاهريون رستو		13	12	11

تصوير 58: پيلوڪ ڪينال جون ماپون سينٽي ميٽرن ۾



تصوير 59: ٻار جو مٿو پيلوڪ ڪناري جي سطح ۾ داخل ٿي رهيو آهي ۽ پيلوڪ مٿاڙ جي سطح کان هٽي رهيو آهي.




شڪل: C



شڪل: B

شڪل: A



تصوير 60: هن تصوير ۾ ڏيکاريل آهي ته فيٽس جو مٿو ٻاهر پيو اچي. شڪل A تيزيءَ سان ٻاهر ايندڙ مٿي کي هن ريت روڪيو ويندو آهي. شڪل B فيٽس جو مٿو ٻاهر ڪڍڻ لاءِ ڪنٽرول ڪيو پيو وڃي. شڪل C فيٽس جو چهرو ٻاهر آڻڻ لاءِ پيري نيٽم کي ڍرو ڪيو پيو وڃي.




شکل: A




شکل: B




شکل: C



تصوير 61: شکل A فيٽس جو مٿو ٻاهر پيو اچي، شکل B مٿو واپس پنهنجي اصل حالت ۾ اچي رهيو آهي، شکل C ٻاهريون ڦيرو




شکل A:




شکل B:

تصوير 62: شکل A هيٺان ڏانهن هلڪو چڪڙ سان فيٽس جو اڳيون گلهو ٻاهر اچي ويندو آهي. شکل B مٿي ڏانهن هلڪو وٺي وڃڻ سان فيٽس جو پويون گلهو به ٻاهر اچي ويندو آهي.


$\frac{5}{5}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{0}{5}$
سنسي پٽ ۽ اوکسي پٽ کناري کان مٿي آهي	سنسي پٽ اڀريل آهي جڏهن ته اوکسي پٽ هيٺ لهي رهيو آهي	سنسي پٽ اڀري رهيو آهي جڏهن ته اوکسي پٽ کي ڇهي سگهجي ٿو	سنسي پٽ هاڻ اڳوڻي جيترو اڀريل نه رهيو آهي	سنسي پٽ ۽ اوکسي پٽ کي محسوس نٿو ڪري سگهجي	مٿو پيلوڪ فلور تي اچي چڪو آهي
					

تصوير 63: پيلوڪ کناري تي پنجين پيل پيبل ڊيسينٽ آف دي فيٽل هيڊ جوجائزو.


حمل جي پڄاڻيءَ تي اوڙ جي صورتحال



تصوير 64: ميٽرئل سرفيس



تصوير 65: فيٽل سرفيس




امبليڪل ناليون ٻڌجڻ
واري هنڌ تي ٻن حصن ۾
ورهائجي ٿيون وڃن

تصوير 66: ٻن حصن ۾ ورهايل اوڙ




تصوير 67: اوڙ جي ويلا مينٽس انسرسن




تصوير 68: امبليڪل ڪورڊ جو ڪراس سيڪشن ڏيکاريل آهي.


اڻور سان ايندڙ رت جون ناليون
ڪوريون مان لنگهي ايڪسيري
لوب تائين پيون وڃن



تصوير 69: اڻور جي سڪنچوري ايت لوب.




شکل B: کورد جي بيتل ڊور انسرسن




شکل A: سرڪم ويليت اڏور

تصوير 70: ويم کان پوءِ اڏور جو معائنو ڪرڻ گهرجي ۽ ڪنهن به غير معمولي صورتحال جو ريكارڊ رکڻ گهرجي.


اؤور جي پيچيدگي




شکل: D تائيپ 4



شکل: C تائيپ 3




شکل: B تائيپ 2




شکل: A تائيپ 1


شکل: 1 کان 4 پريويا اؤور جا مختلف قسم




شکل: H تائيپ 4



شکل: G تائيپ 3



شکل: F تائيپ 2



شکل: E تائيپ 1

تصوير 71: پريويا اؤور جو سروبيڪس جي مهاڙ سان تعلق هن ريت بڻبو آهي.

ويم ۾ دير يا رڪاوٽ (Prolonged/ Obstructed Labour)

ويم يا ليبر جو عرصو مختلف عورتون ۾ ڌار ڌار ٿيندو آهي ۽ ان جو دارومدار ڪيترين ئي شين تي آهي، جهڙوڪ:

- پوئين حمل جو تجربو
- حمل ۾ وڌي
- يوٽرس ۾ ٻار جي پوزيشن ۽ پريزنٽيشن (سامهون ايندڙ حصو)
- ماءُ جي پيلوس جي بناوٽ ۽ حجم
- ڪنٽريڪشن جي رفتار ۽ سگهه
- ويم جي عرصي جو وڏو حصو پهرين مرحلي ۾ گذري ويندو آهي جڏهن ته فعال مرحلو عام طور تي 12 ڪلاڪن اندر مڪمل ٿيڻ جي توقع ڪئي ويندي آهي.
- پهريون ڀيرو ڳورهاري ٿيندڙ عورت پهرين مرحلي ۾ سراسري وڌيڪ وقت لڳائيندي آهي.
- ٻه يا ان کان وڌيڪ ڀيرا ڳورهاري ٿيندڙ عورت ڇهن ڪلاڪن کن ۾ ٻئي مرحلي ۾ پهچڻ جي توقع ڪري سگهي ٿي.
- هر ماءُ جي انفرادي معاملي ۾ اهو سراسري عرصو غلط فهمي پيدا ڪري سگهي ٿو ڇاڪاڻ جو ليبر يا ويم شروع ٿيڻ واري وقت جو تعين گذريل وقت سان ڪيو ويندو آهي، جنهن جي درست نشاندهي ڪرڻ سڌائين سولون هوندي آهي.

ڊگهي ويم واري صورتحال

پهريون ويم ڪندڙ عورت ۾ 12 ڪلاڪن کان وڌيڪ ۽ ٻه يا ٻن کان وڌيڪ ڀيرا ويم ڪرايل عورت ۾ اٺن

ڪلاڪن کان وڌيڪ ويم جا سور هوندي به ويم نه ٿيڻ واري ڪيفيت کي ڊگهو ويم سڏجي ٿو. ڊگهو ويم، ويم جي ڪنهن به مرحلي جي ڊگهي ٿيڻ سبب ٿي سگهي ٿو مثال طور:

پهرين مرحلي جو ڊگهو پوشيدو مرحلو جڏهن اٺن ڪلاڪن تائين باقاعدي ويم جا سور هوندي به سرويڪس چئن سينٽي ميٽرن کان گهٽ ڪليل هجي. پهرين مرحلي جو ڊگهو فعال مرحلو جڏهن سرويڪس ڪلڻ جي رفتار هڪ سينٽي ميٽر في ڪلاڪ کان گهٽ هجي.

ٻئي مرحلي جو ڊگهو مرحلو پهرين ويم واري عورت ۾ هڪ ڪلاڪ تائين گهڻو زور لڳائيندي به ۽ ٻه يا وڌيڪ ويم ڪرايل عورت ۾ اڌ ڪلاڪ تائين زور لڳائڻ جي باوجود ويم نه ٿئي (هڪ ڪلاڪ يا اڌ ڪلاڪ واري عرصي جو تعين سختيءَ سان نٿو ڪري سگهجي، جيڪڏهن ٻار جو سامهون وارو حصو اطمينان جوڳي رفتار سان هيٺ اچي رهيو آهي ۽ ماءُ ۽ ٻار جي حالت اطمينان جوڳي آهي).

ويم ۾ دير جا سبب

- ويم جا ناڪافي يا غير اثرائتا ڪنٽريڪشن
- يوٽرس ۾ ٻار جي پوزيشن صحيح نه هئڻ
- ماءُ جي پيلوس ۽ ٻار جي مٿي جي سائيز ۾ تناسب نه هئڻ

جي سطح تي امڪاني تڪڙو علاج شروع ڪري ڏئي ۽ ڳورھاريءَ کي اسپتال موڪلڻ جو بندوبست ڪري ان دوران هيٺين مان ممڪن آڀاءُ وٺي:

- ماءُ ۽ ٻار جو تيزيءَ سان جائزو وٺي (بلڊپريشر، نبض، بخار، ساهه جي رفتار، جسم ۾ پاڻيءَ جي ڪوٽ ۽ ٽڪاوت وغيره) ۽ ان ڏس ۾ مدد فراهم ڪري
- ڳورھاريءَ کي 18 گيج جو ڪينولو هڻي
- ڪينولو هڻڻ مهل چڪاس لاءِ رت جو نمونو حاصل ڪري (ليڪو سائيٽ ڪائونٽ، بلڊگروپ، بلڊشگر ۽ Rh فيڪٽر لاءِ جيڪڏهن اهي ٽيسٽ ڪجهه عرصو اڳ ٿي چڪا آهن ته پوءِ ٻيهر ڪرڻ جي ضرورت ناهي)
- جيڪڏهن ڳورھاري ڪيٽوسس ۾ آهي ته هڪدم نس ذريعي پاڻياٺ فراهم ڪري (نارمل سيلائن يا رنگر ليڪٽيٽ)
- جيڪڏهن مٿانو پيشاب سان ڀريل محسوس ٿئي ته ڳورھاريءَ کي پيشاب ڪرڻ لاءِ همٿائي. جيڪڏهن پاڻ مرادو نه ڪري سگهي يا آپريشن ذريعي وڌيڪ جوامڪان هجي ته ڳورھاريءَ کي پيشاب جي نلڪي لڳائي.
- پيشاب ۾ ڪيٽون (مٺاڻ) جي موجودگيءَ جو پتو لڳائي.
- جيڪڏهن پارٽو گراف ميسر هجي ته ان جو ٻيهر جائزو وٺي.
- جيڪڏهن آپريشن جي ضرورت هجي ته ڳورھاريءَ کي ڪنهن اهڙي اسپتال يا صحت مرڪز روانو ڪري جتي وڌيڪ جي پيچيدگين کي منهن ڏيڻ جو انتظام هجي.
- رت جي عطئي لاءِ ماڻهن کي تيار ڪري (آپريشن ڪرڻ جي صورت ۾ رت جي ٻن بوتلن جي ضرورت پئجي سگهي ٿي).

نوٽ: ڊگهي وڃڻ واري عرصي ۾ ضروري ناهي ته رڪاوٽ به هجي. ان بابت ٻڌايو ويو آهي ته جيڪڏهن ٻار جو سامهون وارو حصو اطمينان جوڳي رفتار سان هيٺ اچي رهيو آهي ته ان جو مطلب اهو آهي ته وڃڻ ڊگهو نه آهي پر ان ۾ رڪاوٽ ناهي. ان ڪري جڏهن وڃڻ ۾ رڪاوٽ هوندي ته اهو يقيني طور تي ڊگهو ٿيندو پر هر ڊگهي وڃڻ ۾ رڪاوٽ نه هوندي.

وڃڻ ۾ رڪاوٽ

ان صورتحال ۾ عام طور تي ڪنٽريڪشن سٺا يا اثرائتا هوندا آهن پر مڪينيڪل سببن ڪري سرويڪس جو پڪڙجڻ يا ڪلڻ ٻيهر ويندو آهي يا ٻار جو سامهون وارو حصو هيٺ نه اچي سگهندو آهي. وڃڻ ۾ رڪاوٽ جي سڃاڻپ هيٺين عنصرن جي موجودگيءَ سان ٿيندي آهي.

- وڏو ڪيٽ
- ٽين درجي واري مولڊنگ
- پريزنٽينگ حصي جو سرويڪس ۾ ڦاسي پوڻ
- سرويڪس جي سوچ
- يوٽرس جي هيٺين حصي جو ڦوڪجي پوڻ
- ريٽريڪشن بينڊ جو ٺهڻ
- ماءُ ۽ ٻار جي حالت خراب هجڻ
- ٻار جي مٿي ۽ ماءُ جي پيلوس ۾ ٺهڪاءُ نه هجڻ. اهو ان ٺهڪاءُ اوڏي مهل ٿيندو آهي جڏهن ٻار گهڻو وڏو هجي يا ٻار جو مٿو گهڻو وڏو هجي يا ماءُ جو پيلوس انتهائي ننڍو هجي يا ان ۾ ڪو نقص هجي. انهيءَ ان ٺهڪاءُ سبب وڃڻ واري عمل ۾ رڪاوٽ ٿي سگهي ٿي.

ڊگهي وڃڻ يا وڃڻ ۾ رڪاوٽ جي عمومي

سار سنڀال

جيڪڏهن ڳورھاري صدمي ۾ آهي يا صدمي ۾ وڃڻ جو امڪان اٿس ته مڊوائف کي گهرجي ته ڳوٺ يا پاڙي

ويمر جي ڊگهي مرحلي جي مخصوص

سارسنپال

گيفيت

باقاعدي ويدر جي سورن کي اٺن ڪلاڪن کان وڌيڪ جو عرصو علامتون

- سرويڪس جو چئن سينٽي ميٽرن کان وڌيڪ نه ڪلڻ
- ليبارٽري ٽيسٽ (جتي سهولت موجود هجي)
- هيموگلوبين، رينڊمر بلڊشگر
- پيشاب ۾ پروٽين، شگر ۽ ڪيٽون
- بلڊ گروپ، Rh فيڪٽر (جيڪڏهن اڳيئي پتو نه هجي)
- ڪنهن پيچيدگيءَ جي صورت ۾ وڌيڪ ٽيسٽ ڪرائڻ جي ضرورت ٿي سگهي ٿي.

سارسنپال

عورتاڻي عضون جي معائني سان سرويڪس ڪلڻ جي حالت جي ٻيهر جاچ ڪريو ۽ صورتحال جو هڪ ڀيرو ٻيهر جائزو وٺو. مڊوائف ان صورتحال جي امڪاني سببن جو اندازو لڳائي ۽ ان بنياد تي فيصلو ڪري ته ڇا ويدر گهر تي ممڪن آهي؟ جيڪڏهن نه ته ڳورھاريءَ کي اسپتال يا صحت مرڪز اُماڻڻ جو بندوبست ڪري ۽ واسطيدار فردن کي اطلاع ڪري ٻي صورت ۾ هيٺين ڳالهين تي عمل ڪريو:

عورتاڻي عضوي جي معائني تي

- جيڪڏهن سرويڪس ڪلڻ جي حالت ۾ ڪا تبديلي نه ٿي هجي پر ٻار جي حالت خراب نه هجي ته

تشخيص تي نظر ثاني ڪريو ڇاڪاڻ جو ٿي سگهي ٿو ته عورت جي ويدر جو عمل صحيح معنيٰ ۾ شروع ٿي نه ٿيو هجي.

- جيڪڏهن سرويڪس ڪلڻ واري حالت ۾ تبديلي اچي رهي هجي ته ڪوڪر ڪليمپ يا ايمنيوٽڪ هڪ جي مدد سان جهلين کي ڦاڙيو ۽ آڪسي ٽوسن يا پروسٽاگلينڊ هٿي ويدر جو عمل شروع ڪرايو.
- هر چئن ڪلاڪن کان پوءِ ڳورھاريءَ جي صورتحال جو جائزو وٺنديون رھو.
- جيڪڏهن آڪسي ٽوسن شروع ڪرڻ جي اٺن ڪلاڪن کان پوءِ به ويدر جو عمل فعال مرحلي ۾ داخل نه ٿئي ته ويدر لاءِ آپريشن جي ضرورت پوندي
- جيڪڏهن انفڪشن جون علامتون (بخار عورتاڻي عضوي مان بدبودار مادي جو خارج) نظر اچن ته: ويدر واري عمل کي هڪدم آڪسي ٽوسن جي مدد سان تيز ڪريو.
- هيٺيون اينٽي بايوٽڪ شروع ڪرايو ۽ ويدر تائين جاري رکيو:
- انجيڪشن ايمپي سيلين هڪ گرام انس ذريعي، هر ڇهن ڪلاڪن کان پوءِ
- انجيڪشن جينٽامائيسن 80 ملي گرام انس ذريعي هر اٺن ڪلاڪن کان پوءِ
- جيڪڏهن ويدر آپريشن ذريعي ٿيڻو هجي ته مٿي ڄاڻايل اينٽي بايوٽڪ سان گڏ هيٺيون به شامل ڪريو:
- انجيڪشن ميٽرونيڊا ڏول 500 ملي گرام انس ذريعي، هر اٺن ڪلاڪن کان پوءِ. ان جو استعمال بخار لهڻ جي 48 ڪلاڪن (ٻه ڏينهن) تائين جاري رکيو.

سارسنپال

- جيڪڏهن ويڊيوز ۾ رڪاوٽ جي علامت موجود نه هجي ۽ جھليون موجود هجن ته ڪليمپ جي مدد سان جھليون ڦاڙي ڇڏيو ته جيئن ويڊيوز جو عمل تيز ٿئي نه ته ڳورھاريءَ کي اسپتال آڻايو.
- جھلين جي ڦاڙڻ کان پوءِ يوٽرس جي سڪڙجڻ واري ڪيفيت يا ڪنٽريڪشن جو اندازو لڳايو.
- جيڪڏهن ڪنٽريڪشن غير اثرائتا هجن (ڏهن منٽن ۾ 3 کان گهٽ سور ۽ هڪ ڪنٽريڪشن 40 سيڪنڊن کان گهٽ عرصو برقرار رهي) ته آڪسي ٽوسن جي مدد سان ويڊيوز جو عمل تيز ڪريو.
- جيڪڏهن ڪنٽريڪشن اثرائتا هجن (10 منٽن ۾ 3 سور ۽ هر سور جو عرصو 40 سيڪنڊ يا ان کان وڌيڪ) ته انديشو آهي ته ماءُ جي پيلوس ۽ ٻار جي مٿي جي سائيز ۾ ٺهڪاءُ ناهي يا ويڊيوز ۾ رڪاوٽ، يا يوٽرس ۾ ٻار جي پوزيشن صحيح ناهي. ان صورتحال ۾ تشخيص موجب ان ڪيفيت جي مخصوص سارسنپال ڪئي ويندي آهي، جنهن لاءِ اسپتال آڻايو ويندو.

ڊگهي ويڊيوز جي فعال مرحلي جي خاص

سارسنپال

ڪيفيت

ويڊيوز جا سور / ڪنٽريڪشن

علامتون

- سرويڪس ڪلڻ جي رفتار هڪ سينٽي ميٽر في ڪلاڪ کان گهٽ
- پارٽو گراف تي ويڊيوز جي پيش رفت الرٿ لائين جي ساڄي پاسي

ليبارٽري ٽيسٽ (جتي ممڪن هجن)

- هيملوگلوبين، رينڊم بلڊ شگر
- پيشاب ۾ پروٽين، شگر ۽ ڪيٽون
- بلڊ گروپ ۽ Rh فيڪٽر
- ڪنهن پيچيدگيءَ جي صورت ۾ وڌيڪ ٽيسٽ ڪرائڻ جي ضرورت پئجي سگهي ٿي.

يوٽرس جي غير اثرائتي حرڪت (غير اثرائتي ڪنٽريڪشن جي سارسنپال) (Inefficient Uterine Contraction)

ڪيفيت

- ڊگهو ويڙ
- غير اثرائتا ويڙ جا سور

علامتون

- 10 منٽن دوران 3 کان گهٽ ڪنٽريڪشن جو عرصو
- 40 سيڪنڊن کان گهٽ
- ويڙ جي مرحلن جي سست پيش رفت يا پيش رفت جو نه هئڻ

ليبارٽري ٽيسٽ (جتي سهولت موجود هجي)

- جيڪڏهن اڳ ۾ ڪرايل نه هجن:
- هيٺو گلوبين ۽ بلڊشگر
- پيشاب ۾ پروٽين، شگر ۽ ڪيٽون،
- بلڊ گروپ ۽ Rh فيڪٽر
- ڪنهن پيچيدگيءَ جي صورت ۾ وڌيڪ ٽيسٽ ڪرائڻ جي ضرورت پئجي سگهي ٿي.

سارسنپال

- جيڪڏهن ويڙ جا سور غير اثرائتا هجن ۽ ٻار جي مٿي جي سائيز ۽ ماءُ جي پيلوس ۾ ٺهڪاءُ نه هجي ۽ ويڙ ۾ رڪاوٽ نه هجي ته ڊگهي ويڙ جو وڌيڪ امڪاني سبب غير اثرائتا ويڙ جا سور ٿي سگهي ٿو.
- غير اثرائتا ويڙ جا سور يا وڌيڪ ٻار جڙيل عورتن ۾

پهريون ٻار جڙيندڙ عورت جي پيٽ ۾ گهٽ ٿيندا آهن. ان ڪري جيڪڏهن ٻه يا وڌيڪ ويڙ ڪرايل عورت ۾ ڊگهو ويڙ ٿي رهيو هجي ته پهرين CPD واري انديشي کي ختم ڪريو ان کان پوءِ ويڙ جا مرحلا تيز ڪرڻ جا آپاءُ وٺي سگهجن ٿا.

ويڙ جو عمل تيز ڪرڻ لاءِ مڊوائف کي سهولت سان گڏوگڏ مهارت ۽ تجربو جي به ضرورت آهي. جيستائين اهو نه هجي ته ان نوعيت جا سمورا ڪيس اسپتال آڻائي ڇاڪاڻ جو گهڻو امڪان آهي ته ويڙ آپريشن ذريعي ٿئي.


- ويڙ جو عمل تيز ڪرڻ لاءِ هيٺيان قدم کنيا ويندا آهن:
- جهلين کي ڪوڪر ڪليمپ جي مدد سان ڦاڙيو ۽ ويڙ جو عمل تيز ڪرڻ لاءِ آڪسي ٽوسن استعمال ڪريو.

- ويڙ جا سور جڏهن تيز ٿي وڃن ته ٻن ڪلاڪن کان پوءِ ويڙ جي پيش رفت جو ٻيهر جائزو وٺو.

- جيڪڏهن ويڙ جي مرحلن ۾ اطمينان جوڳي پيش رفت ٿي رهي هجي ته آڪسي ٽوسن جاري رکيو ۽ هر ٻن ڪلاڪن کان پوءِ جائزو وٺنديون رهو. ڳور هاريءَ جي مستقل نظرداري ڪريو ۽ ويڙ جي مرحلن جي پيش رفت ريكارڊ ڪريو.


- جيڪڏهن ٻن معائنن دوران ڪا پيش رفت نه ٿي هجي ته آپريشن ذريعي ويڙ ڪرائڻ گهرجي.

حمل دوران ايمبريو ۽ فيٽس جي سائيز




تصوير 72: هن تصوير ۾ 3 کان 12 هفتن جي حمل دوران ايمبريو ۽ فيٽس جي سائيز واضح ڪئي وئي آهي.

نئين ڄاول ٻار ۽ بالغ ماڻهوءَ جي عضون ۾ جسماني تناسب




تصوير 73: نئين ڄاول ٻار ۽ بالغ ماڻهوءَ جي عضون ۾ جسماني تناسب تمام گهڻو مختلف ٿئي ٿو. ٻار جو مٿو سندس ڪُلن کان گهڻو وڏو ويڪرو ۽ سڄي جسم جي ڏيگهه جو چوٿون حصو ٿئي ٿو.

فيٽس ۾ رت جي گردش




تصوير 74: فيٽس ۾ رت جي گردش کي واضع ڪندڙ تصوير، ليڪ جا نشان رت جي سفر جو طرف ڏيکارين ٿا.

فيٽس جي ڪوپڙيءَ جا مختلف حصا




تصوير 75: هن تصوير ۾ فيٽس جي ڪوپڙيءَ جا مختلف حصا ڏيکاريل آهن. محراب جهڙو حصو وڏو ۽ لچڪيدار ٿئي ٿو جڏهن ته چهري ۽ بنياد وارن حصن ۾ لچڪ نه ٿيندي آهي.

فيٽس جي ڪوپڙي جا آڏا قطر




تصوير 76: فيٽس جي ڪوپڙيءَ جا آڏا قطر ڏيکاريل آهن. فيٽس جو مٿو مختلف هڏين سان گڏجي ٺهي ٿو. جڙڻ جو اهو عمل وڃي کان پوءِ مڪمل ٿيندو آهي.

فيٽس جو مٿو



تصوير 77: فيٽس جو مٿو مٿان کان ڏيکاريل آهي (مٿو ٽورڙو جهڪيل آهي).

فيٽس جي ڪوپڙيءَ جا قطر




ڏيکھ	قطر	
9.5 سينٽي ميٽر	(Suboccipitobregmatic)	= SOB سب اوڪسي پٽوريگميٽڪ
10.0 سينٽي ميٽر	(Suboccipitofrontal)	= SOF سب اوڪسي پٽوفرنٽل
11.5 سينٽي ميٽر	(Occipitofrontal)	= OF اوڪسي پٽوفرنٽل
13.5 سينٽي ميٽر	(Mentovertical)	= MV مينٽوورٽيڪل
11.5 سينٽي ميٽر	(Submentovertical)	= SMV سب مينٽوورٽيڪل
9.5 سينٽي ميٽر	(Submentobregmatic)	= SMB سب مينٽوريگميٽڪ


تصوير 79: تصوير ۾ فيٽس جي ڪوپڙيءَ جا سمورا ممڪن قطر ڏيکاريل آهن.

پريزنٽيشن مهل ڪوپڙيءَ جون مختلف حالتون ۽ ماپون

چڱيءَ ريت جهڪيل مٿي جو دائرو 29 سينٽي ميٽر




تصوير 80: ورتيڪس پريزنٽيشن ۾ فيٽس جو مٿو چڱيءَ ريت جهڪيل هجي ته تصوير ۾ ڏيکاريل صورتحال موجب ماپون حاصل ٿينديون.




تصوير 81: مولڊنگ جو اصول اهو آهي ته ٻنهي پاسن کان ٺپوڙجڻ تي ڪوپڙي ٻن پاسن کان پڪڙجي ويندي جڏهن تير وارين ڏسائن کان دٻاءُ وجهبو ته قطر گهٽجي ويندو پر ساڄي ۽ کاٻي پاسي واري ڪوپڙي وڌڻ تي قطر وڌي ويندو.

بروپريزنٽيشن




تصوير 82: بروپريزنٽيشن ۾ مولڊنگ کي ٽڪتن واري ليڪ ذريعي ظاهر ڪيو ويو آهي. ايمروي مينٽورٽيڪل




تصوير 83: بروپريزنٽيشن مينٽورٽيڪل ڊايا ميٽر 13.5 سينٽي ميٽر، پيلوڪ برم تي ٿئي ٿو.

ورٽيڪس پريزنٽيشن




تصوير 84: نارمل ورٽيڪس پريزنٽيشن ۾ مولڊنگ هن طرح ٿيندي آهي. جڏهن ته مٿو چڱي ريت جهڪيل آهي. مولڊنگ جي نتيجي ۾ سب اوڪسي پٽوريگميٽڪ قطر گهٽجي ويو. جڏهن ته مينٽو ورٽڪيل قطر وڌي ويو.


مٿي جي پريزنٽيشن ۽ مولڊنگ




شڪل: A ورتيڪس پريزنٽيشن،
جڏهن مٿو جهڪيل نه هجي




شڪل: B ورتيڪس پريزنٽيشن،
جڏهن مٿو جزوي طور جهڪيل هجي



شڪل: C ورتيڪس پريزنٽيشن،
جڏهن مٿو چڱي ريت جهڪيل هجي




شڪل: D فيس پريزنٽيشن،
(face presentation)



شڪل: E برو پريزنٽيشن،
(brow presentation)


تصوير 85: جڏهن مٿو پريزنٽ هجي ته مولڊنگ انهن طريقن سان ٿي سگهي ٿي جيڪي تصويرن ۾ ڏيکاريل آهي. مولڊنگ کي تصويرن ۾ ٺڪتي وارين ليڪن ذريعي ظاهر ڪيو ويو آهي.

مٿي جون اندريون جهليون ۽ رت جي گردش



تصوير 86: کوپڙيءَ جون اندريون جهليون ۽ وینس سائي نسز ڏيکاريل آهن. تیر جا نشان رت جي وهڪري جو طرف ٿا ظاهر ڪن.

فيٽس جي مٿي جو ڪورونل سيڪشن



تصوير 87: ڪوپڙيءَ جون اندريون جهليون ۽ وينس سائي نس ڏيکارڻ لاءِ فيٽس جي مٿي جو ڪورونل سيڪشن.

ضميمو 1.1


ايبي سيوتومي ڪرڻ جي تياري

- عام سارسنيال وارن اصولن تي عمل ڪندي جسم جي هيٺين حصي کي جيوڙا مار سلوشن سان صاف ڪريو.
- ڳورھاريءَ کي آٿٽ ڏيو ۽ سُن ڪندڙ دوا ڏيو.
- ان ڳالھ جي پڪ ڪريو تہ ڳورھاريءَ کي سُن ڪندڙ دوا لڳنوکين يا ان سان لاڳاپيل دوائن کان ڪا الرجی تہ ناهي.
- 50 سيڪڙو لڳنوکين جو 10 ملي ليٽر مقدار انجيكشن ذريعي عورتاڻي عضوي جي ميڪوسا جي هيٺ پيرينم جي چمڙيءَ هيٺان ۽ ان جي ڏونڌن جي گھرائي ۾ هڻو.
- نوٽ: لڳنوکين انجيكشن هڻڻ مهل سدائين ان ڳالھ جو خيال رکو تہ سُني ڪنھن رڳ ۾ تہ نہ لڳي وئي آهي. ان ڪري هميشہ سُني اندر وجهڻ کان پوءِ سرنج جو پلنجر چڪي ڏسو تہ ان ۾ رت نہ پيو اچي. جيڪڏھن رت اچي تہ سُني ٻاهر ڪڍي ڇڏيو. رت نڪرڻ تي دوا
- قطعي نہ لڳايو ڇاڪاڻ جو ائين ڪرڻ تي ڳورھاريءَ کي جھٽڪا لڳي سگھن ٿا ۽ هوءَ مري بہ سگھي ٿي.
- انجيكشن لڳائڻ کان پوءِ بہ منت انتظار ڪريو. ان کان پوءِ انجيكشن هٺيل جاءِ کي فورسيپ سان دبائي ڏسو تہ ڳورھاريءَ کي تڪليف جو احساس ٿئي ٿو يا نہ جيڪڏھن ٿي رهيو هجي تہ وڌيڪ بہ منت انتظار ڪريو ۽ ٻيھر چڪاسيو. پڪ ڪري وٺو تہ ايبي سيوتومي ڏيڻ واري جاءِ سُن ٿي چڪي آهي.
- سُن ڪندڙ دوا ايبي سيوتومي ڪرڻ کان ايترو اڳ لڳايو جو دوا کي اثر ڪرڻ لاءِ مناسب وقت ملي.
- ايبي سيوتومي اُن وقت ڏيو جڏھن:
 - پيرينيم پترو (thin) ٿي وڃي.
 - سور دوان ٻار جو مٿو 3 کان 4 سينٽي ميٽر حصو نظر اچي.
 - ايبي سيوتومي ڏيڻ سان رت ضايع ٿيندو آهي ان ڪري گھڻو اڳ ايبي سيوتومي نہ ڏيڻ گھرجي.


ضمیمو 1.2

ایپی سیوتومی کرڙ جي طریقو

- ایپی سیوتومی کرڙ کان اڳ لوکل اینیٿیسیا جو انجیکشن لڳایو ويندو آهي ته جيئن مریضا کي سور محسوس نه ٿئي. (شکل A)
- جیوڙن کان پاڪ دستانا پائي، ٻه اڱریون ٻار جي مٿي ۽ پیرینیم جي چمڙيءَ جي وچ ۾ رکڻ.
- قینچیءَ جو استعمال ڪندي 3 کان 4 سینٽي میٽرن جو چیر میڊیو لیٽرل پوزیشن ۾ هڻڻ.
- قینچی استعمال ڪندي عورتاڻي عضوي جي پوئین حصي جي وچ ۾ 2 کان 3 سینٽي میٽرن جو چیر لڳایو (شکل B).
- ٻار جي مٿي ۽ گُلهي کي ویر دوران قابو رکڻدي ان ڳالهه جي خاطري ڪریو ته ٻار جا ڪلها مڊلائین ۾ ڦري وڃن ته جيئن ڏنل ایپی سیوتومی وڌیک نه وڌي وڃي.
- ٻار جي مڪمل ویر کان پوءِ ڪیل ایپی سیوتومیءَ جو ڌیان سان جائزو وٺڻ ۽ ان ڳالهه جي پڪ ڪریو ته اها ڪنهن پاسي وڌي ته نه رهي آهي. ان کان پوءِ ان جي مرمت ڪریو.




شکل: A



شکل: B


تصویر 88: ایپی سیوتومی کرڙ کان اڳ ضروري آهي ته لوکل اینیٿیسیا جو انجیکشن هڻجي ته جيئن مریض کي ڪنهن قسم جو سور محسوس نه ٿئي.

پيري نيٽيم ۾ انجيكشن هڻڻ جو طريقو



شکل: A

شکل: B




شکل: C

تصوير 89: (A) پيري نيٽيم ۾ انجيكشن هڻڻ جو طريقو. (B) چير لڳايو پيو وڃي. (C) ٻاهرين جنسي عضون ۽ پيري نيٽيم ۾ تنڻي تارن جو چار هن ريت پڪڙيل هوندو آهي. انجيكشن لڳائي مريض کي سور کان بچائي سگهجي ٿو. انجيكشن کان سواءِ ايپي سيوٽومي نه ڪرڻ گهرجي.


ايپي سيوتوميءَ جي مرمت (Repair of Episiotomy)

- نوٽ: اها ڳالهه اهم آهي ته چير کي سُبڻ لاءِ جذب ٿي ويندڙ ٽانڪا هڻجن. ڀولي گلائيو لڪ ٽانڪا (ڊڪسون/ وڪرل) کي ڪرومڪ ڪيٽ گت تي ترجيح ڏني ويندي آهي ڇاڪاڻ جو اهي وڌيڪ مضبوط ٿين ٿا، الرجي نقا ڪن ۽ انفئڪشن ۽ انهن جي پيچيدگين ۽ ٽانڪا ڪلڻ جا امڪان گهٽجي وڃن ٿا. ڪرومڪ ڪيٽ گيت به متبادل طور لڳائي سگهجن ٿا پر اهي گهڻو مناسب نه هوندا آهن.
- ايپي سيوتوميءَ جي اوسي پاسي وارو حصو جيوڙا مار سلوشن سان صاف ڪريو.
- جيڪڏهن ايپي سيوتومي وڏي وئي آهي ۽ چير ڪاڪوس جي رستي يا وڏي آندڙ کي متاثر ڪيو آهي ته ان جي سارسنپال ٽين يا چوٿين درجي واري چير طور ڪريو.
- عورتاڻي عضوي جي ميڪوسا کي ٻڙي کان 2 جا لاڳيتو ٽانڪن سان بند ڪريو.
- مرمت جي شروعات ايپي سيوتوميءَ جي مٿين سري جي هڪ سينٽي ميٽر مٿان کان ڪريو ۽ لاڳيتا ٽانڪا لڳائيندي عورتاڻي عضوي جي مهاڙ تائين آڻيو.
- عورتاڻي عضوي جي مهاڙ تي ڪپيل سرا جوڙي سڀي ڇڏيو.


شڪل: A




شڪل: B



شڪل: C



شڪل: D



تصوير 90: هن تصوير ۾ پيري نيٽيمر کي ٽانڪا هٿڻ جو طريقو ڏيکاريل آهي.

ضميمو 2.1

ويم ڪان پوءِ معائنن جو شيڊول

ويم ڪان پوءِ ماءُ جو گهٽ ۾ گهٽ 5 ڀيرا معائنو ٿيڻ گهرجي. معائنن جي ان شيڊول ۾ ماءُ جي ضرورتن پٽاندر ٿيڻ ڪري سگهجي ٿي پر مڊوائف ياد رکي ته اهو گهٽ ۾ گهٽ معائنن جو تعداد آهي، وڌ ۾ وڌ نه جيڪڏهن ماءُ کي ضرورت هجي يا مڊوائف کي سهولت هجي ته انهن ۾ اضافو به ڪري سگهجي ٿو.

پهريون معائنو	ويم ڪان هڪدم پوءِ (24 ڪلاڪن اندر)
ٻيو معائنو	ويم جي ٻئي ڏينهن
ٽيون معائنو	ويم جي ٻئي هفتي
چوٿون معائنو	ويم جي چوٿين هفتي
پنجون معائنو	ويم جي ڇهين هفتي

ضميمو 2.2

ويم ڪان پوءِ معائني جا قدم

- 1- ماءُ جي ظاهري حالت
 - 2- بخار
 - 3- نبض
 - 4- بلڊپريشر
 - 5- يوٽرس جي سائيز
 - 6- عورتاڻي عضوي مان خارج ٿيندڙ رت يا رطوبت
 - 7- ماءُ جي صفائي
 - 8- ماءُ جي اُرهڻ جو معائنو ۽ سارسنڀال
 - 9- مختلف مامرن بابت ماءُ لاءِ صلاح مشورو
 - 10- نئين ڄاول ٻار جو معائنو ۽ سارسنڀال
- ماءُ جو معائنو ڪرڻ ڪان اڳ مڊوائف پنهنجا هٿ چڱيءَ ريت ڌوئي ۽ ماءُ تي واضح ڪري ته هوءَ ڇا ڪرڻ واري آهي. معائني دوران ماءُ سان ڳالهه ٻولهه ڪندي رهي ته جيئن سندس هٻڪ ۽ گهٻراهٽ ختم ٿئي.
- ويم ڪان پوءِ هر معائني تي مڊوائف هيٺين شين جو لازمي معائنو ڪري ۽ انهن مامرن بابت ماءُ کي مشورو ڏئي:

مڊوآفريءَ جي تعليم ۽ تربيت ڪتابن، ڪلاس رومن ۽ وارڊ ڪان شروع ٿي
 ليبر روم ۾ ختم ٿئي ٿي. اهو مقصد سدائين آڏو رکڻ گهرجي ته مڊوآف
 کي پاڙي يا ڳوٺ ۾ ڪم ڪرڻو آهي ان ڪري پيشيورائي مهارتن سان
 گڏوگڏ منجهس اها اهليت به هئڻ گهرجي ته هو ڳوٺ يا پاڙي جي ماحول
 کي سمجهي، درپيش مسئلن ۽ دستياب وسيلن جو صحيح ڪاٺو لڳائي ۽
 پوري اعتماد سان پنهنجي مهارت، اهليت ۽ ڏاهپ کي استعمال ڪندي
 عورتن جي خدمت ڪري ان ريت مقامي آبادي متنوع ۽ اعتماد ڪندي ۽
 سائنس گڏجي ڪم ڪرڻ لاءِ به تيار ٿيندي حمل ۽ وڃڻ دوران لکين عورتن
 جي موت ۽ معذوريءَ جو هڪ وڏو سبب اهو آهي ته غير تربيت يافتہ دائين
 ۽ جملي ڊاڪٽرن کي انساني جانين سان ڪيڏڻ جي اجازت ڏني وئي آهي.
 اهي عطائي ڊاڪٽر ۽ اڻپڙهيل دائيون نه جديد طبي ڄاڻ کان واقف آهن ۽ نه
 ئي سندن سائنسي بنيادن تي تربيت ٿي آهي. ان صورتحال ۾ ضروري آهي
 ته اسان جون مڊوآفون، مڊوآفريءَ جي هنر جي تعليم ۽ تربيت ۾ مهارت
 حاصل ڪن ۽ پاڪستان ۾ مائرن جي بي وقتائيتي ۽ بيجا موتن واري
 للڪار کي منهن ڏيڻ لاءِ پنهنجو پاڻ کي تيار ڪن. جهالت، مائرن جا موت
 ۽ عورتن جي معذوري اسان جا ويري آهن. ايئن سمجهو ته اسين جنگ جي
 حالت ۾ آهيون ۽ مڊوآفون انهن ويرين خلاف جنگ ۾ هر اول رستو آهن.
 علم، تربيت، تجربو ۽ ڏاهپ مڊوآف جا هٿيار آهن. انهن هٿيارن سان
 پنهنجو پاڻ کي هٿياربند ڪريو. پختي عزم ۽ خدمت جي جذبي سان
 ميدان ۾ اچو ۽ انهن ويرين کي شڪست ڏئي اها جنگ کٽي وٺو.

شير شاهه سيد

پاڪستان نيشنل فورم آن وومينز هيلٿ

پڙهندڙ نسل . پ ن

The Reading Generation

1960 جي ڏهاڪي ۾ عبدالله حسين ”اُداس نسلين“ نالي ڪتاب لکيو. 70 واري ڏهاڪي ۾ وري ماڻُڪ ”لڙهندڙ نسل“ نالي ڪتاب لکي پنهنجي دور جي عڪاسي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. امداد حُسينيءَ وري 70 واري ڏهاڪي ۾ ئي لکيو:

انڌي ماءُ جڻيندي آهي اونڌا سونڌا ٻارَ

ايندڙ نسل سَمورو هوندو گونگا ٻوڙا ٻارَ

هر دور جي نوجوانن کي اُداس، لڙهندڙ، ڪڙهندڙ، ڪڙهندڙ، ٻرندڙ، چُرندڙ، ڪِرندڙ، اوسيئڙو ڪندڙ، پاڙي، ڪاڻو، پاڇوڪڙ، ڪاوڙيل ۽ وڙهندڙ نسلن سان منسوب ڪري سگهجي ٿو، پر اسان انهن سڀني وچان ”پڙهندڙ“ نسل جا ڳولائو آهيون. ڪتابن کي ڪاڳر تان ڪڍي ڪمپيوٽر جي دنيا ۾ آڻڻ، ٻين لفظن ۾ برقي ڪتاب يعني e-books ٺاهي ورهائڻ جي وسيلي پڙهندڙ نسل کي وڌڻ، ويجهڻ ۽ هڪ ٻئي کي ڳولي سَهڪاري تحريڪ جي رستي تي آڻڻ جي آس رکون ٿا.

پڙهندڙ نسل (پڻ) ڪا به تنظيم ناهي. اُن جو ڪو به صدر، عهديدار يا پايو وجهندڙ نه آهي. جيڪڏهن ڪو به شخص اهڙي دعويٰ ڪري ٿو ته پڪ ڄاڻو ته اهو ڪوڙو آهي. نه ئي وري پڻ جي نالي کي پئسا گڏ ڪيا ويندا. جيڪڏهن ڪو اهڙي ڪوشش ڪري ٿو ته پڪ ڄاڻو ته اهو به ڪوڙو آهي.

جهڙيءَ طرح وڻن جا پڻ ساوا، ڳاڙها، نيرا، پيلا يا ناسي هوندا آهن اهڙيءَ طرح پڙهندڙ نسل وارا پڻ به مختلف آهن ۽ هوندا. اُهي ساڳئي ئي وقت اُداس ۽ پڙهندڙ، ٻرندڙ ۽ پڙهندڙ، سُست ۽ پڙهندڙ يا وڙهندڙ ۽ پڙهندڙ به ٿي

پڙهندڙ نسل . پ ن The Reading Generation

سگهن ٿا. ٻين لفظن ۾ پڻ ڪا خصوصي ۽ تالي لڳل Exclusive Club نه آهي.

ڪوشش اها هوندي ته پڻ جا سڀ ڪم ڪار سهڪاري ۽ رضاڪار بنيادن تي ٿين، پر ممڪن آهي ته ڪي ڪم اجرتي بنيادن تي به ٿين. اهڙي حالت ۾ پڻ پاڻ هڪٻئي جي مدد ڪرڻ جي اصول هيٺ ڏي وٺ ڪندا ۽ غير تجارتي non-commercial رهندا. پڻن پاران ڪتابن کي ڊجيٽائيز digitize ڪرڻ جي عمل مان ڪو به مالي فائدو يا نفعو حاصل ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪئي ويندي.

ڪتابن کي ڊجيٽائيز ڪرڻ کان پوءِ اهم مرحلو ورهائڻ distribution جو ٿيندو. اهو ڪم ڪرڻ وارن مان جيڪڏهن ڪو پيسا ڪمائي سگهي ٿو ته ڀلي ڪمائي، رڳو پڻن سان ان جو ڪو به لاڳاپو نه هوندو.

پڻن کي کليل اکرن ۾ صلاح ڏجي ٿي ته هو وس پٽاندڙ وڌ کان وڌ ڪتاب خريد ڪري ڪتابن جي ليکڪن، ڇپائيندڙن ۽ ڇاپيندڙن کي همٿائين. پر ساڳئي وقت علم حاصل ڪرڻ ۽ ڄاڻ کي ڦهلائڻ جي ڪوشش دوران ڪنهن به رڪاوٽ کي نه مڃن.

شيخ اياز علم، ڄاڻ، سمجھ ۽ ڏاهپ کي گيت، بيت، سٺ، ڀڪار سان تشبيهه ڏيندي انهن سڀني کي بمن، گولين ۽ بارود جي مد مقابل بيهاريو آهي. اياز چوي ٿو ته:

گيت به ڄڻ گوريلا آهن، جي ويريءَ تي وار ڪرن ٿا.

... ..

ڄڻ ڄڻ ڄاڙ وڌي ٿي جڳ ۾، هو ٻوليءَ جي آڙ ڇڻن ٿا؛
ريٽيءَ تي راتاها ڪن ٿا، موٽي منجهه پهات ڇڻن ٿا؛

... ..

ڪالهه هيا جي سرخ گلن جيئن، اڄڪلهه نيلا پيلا آهن؛
گيت به ڄڻ گوريلا آهن.....

... ..

پڙهندڙ نسل . پ ن The Reading Generation

هي بيٺ آئي، هي بمر-گولو،
جيڪي به ڪئين، جيڪي به ڪئين!
مون لاءِ ٻنهي ۾ فرق نه آ، هي بيٺ به بمر جو ساٿي آ،
جنهن رڻ ۾ رات ڪيا راڙا، تنهن هڏ ۽ چمر جو ساٿي آ -

ان حساب سان اڻڄاڻائي کي پاڻ تي اهو سوچي مڙهڻ ته ”هاڻي ويڙهه ۽ عمل جو دور آهي، اُن ڪري پڙهڻ تي وقت نه وڃايو“ نادانيءَ جي نشاني آهي.

پڻ جو پڙهڻ عام ڪتابي ڪيڙن وانگر رڳو نصابي ڪتابن تائين محدود نه هوندو. رڳو نصابي ڪتابن ۾ پاڻ کي قيد ڪري ڇڏڻ سان سماج ۽ سماجي حالتن تان نظر ڪڍي ويندي ۽ نتيجي طور سماجي ۽ حڪومتي پاليسيون policies اڻڄاڻن ۽ نادانن جي هٿن ۾ رهنديون. پڻ نصابي ڪتابن سان گڏوگڏ ادبي، تاريخي، سياسي، سماجي، اقتصادي، سائنسي ۽ ٻين ڪتابن کي پڙهي سماجي حالتن کي بهتر بنائڻ جي ڪوشش ڪندا.

پڙهندڙ سُئل جا پڻ سڀني کي چو، چالا ۽ ڪينئن جهڙن سوالن کي هر بيان تي لاڳو ڪرڻ جي ڪوٺ ڏين ٿا ۽ انهن تي ويچار ڪرڻ سان گڏ جواب ڳولڻ کي نه رڳو پنهنجو حق، پر فرض ۽ اڻٽر گهرج unavoidable necessity سمجهندي ڪتابن کي پاڻ پڙهڻ ۽ وڌ کان وڌ ماڻهن تائين پهچائڻ جي ڪوشش جديد ترين طريقن وسيلي ڪرڻ جو ويچار رکن ٿا.

توهان به پڙهڻ، پڙهائڻ ۽ ڦهلائڻ جي ان سهڪاري تحريڪ ۾ شامل ٿي سگهو ٿا، بس پنهنجي اوسي پاسي ۾ ڏسو، هر قسم جا ڳاڙها توڙي نيرا، ساوا توڙي پيلا پن ضرور نظر اچي ويندا.

وڻ وڻ کي مون پاڪي پائي چيو ته ”منهنجا پيءُ
پهتو منهنجي من ۾ تنهنجي پڻ جو پڙلاءُ.“
- اياز (ڪلهي پاتم ڪينرو)

پڙهندڙ سُئل . پ ن The Reading Generation